B-25 チャバネゴキブリ雌成虫による潜伏場所の認識

○金山彰宏・小曾根恵子（横浜市衛生研究所）

Recognition of hiding place by adult female German cockroach ,
Blattella germanica

Kanayama A. and Kosone K.

活動場所と潜伏場所とを連結した閉鎖容器を用い，住み慣れた潜伏場所を出たゴキブリが，再び同じ潜伏場所に戻るか実験的に観察した．

活動場所として48.0×68.0 cm，高さ 18.0 cm，潜伏場所には11.0×15.0 cm，高さ 8.0 cm のプラスチック容器を用いた．活動場所に二か所の潜伏場所（向かい合った位置）をとりつけた．それぞれの潜伏場所に雌成虫25個体（一方の集団はマーク）を放し，10日間それぞれの潜伏場所および活動場所に馴染ませた．10日後に両グループを合わせ，夜間活動後にそれぞれの潜伏場所に戻る個体数を経日的に観察した．

観察の結果，雌成虫の潜伏場所への帰還（定着）度は，雄成虫に比べ大きかった．

B-26 変化を好む，ゴキブリの食物学習

辻 英明（環境生物研究会）

Variety preference in cockroach food selection

Tsuji H.

ゴキブリが食物を発見し摂食するために，離れた場所からの誘引物質の香りや，接触して感ずる味覚物質の味が必須である．それぞれについて，ゴキブリの好む物質が多く報告され，ゴキブリを防除する実用的な食毒剤の成分としても利用されている．ゴキブリの食物に対する反応は遺伝的なものであり，特定の物質について異なる反応を示すゴキブリの系統も知られている．

一方，演者は，ゴキブリの対食物反応の遺伝的でない変異を検討するために，特定の餌によってゴキブリがどのように条件づけられるか実験を行った．すなわち，チャバネゴキブリを米ぬか，乾燥果実，乾燥肉製品の3種の餌のいずれかで一定期間飼育し，その後，それまで飼育に用いられた餌と他の餌のそれぞれとの組み合わせに対しどのように反応するか調べたところ，ゴキブリは元の餌より交替餌を選好する傾向が強いことが示された．この結果，防除用の食毒剤の組成として，2種以上の製剤の並存が好ましいことが判った．