れ、*T. owuensis*, *T. teramurai*, *T. intermedia*, *T. palpalis*, *T. nagayoi* はその南限は種により異なるが、北海道、東北地方、関東・中部地方の山岳地帯にとれている。この中例えば *T. intermedia* は北海道では原野にとれ、中部地方では山岳でとれるというように生物分布によくみられる水平分布の北方のものが、より南方の垂直分布の高地にあることも認められた。南西地方の種は、*T. tanaka-ryoi*, *T. (Trombiculindus) kansai*, *T. kuroshio*, *T. daisen*, *T. (Miyatrombicula) kochiensis* 等で *T. tanaka-ryoi* は富山県まで、*T. daisen* は岐阜、愛知県迄、*T. (Miya.) kochiensis* は三重県迄採集されている。ヒミズモグラに寄生する *T. yasukai*, *T. miyairii*, *Dolisia okabei*, *Shunsenia tarsalis* は九州、四国にだけ知られている。*T. wichimanni* は八丈島で採集された。特定な分布をするものでは、*T. akamushi* は夏季、信濃、阿賀野、雄物、最上川の草原のみに、*T. tosa* は夏季、高知県西南海老地方にのみ知られ、*T. scutellaris* は冬季に山形、新潟県で昔より知られていたが、伊豆諸島、房総南端では多数が2、3カ月にわたり採集され、その他、静岡県御殿場地域、鹿児島県西南部の鰻、桜島、北九州、京都府、福井県、伊豆半島、山梨県、静岡県岩田村などの如く散発的に又かなり限極して発見され、北方程発生が早く、出現している期間が短いようである。

〔伝研寄生虫〕

恙の虫

緒方 規雄

Ogata, N.: Tsutsuganomushi

恙虫病々毒を伝播するものを恙虫(つゝがむし)、赤虫(あかむ)、鳥虫(しまむし)、毛蟲(けだに)、赤恙虫(あかつがつがむし)、砂蟲(しやしつ)と呼ばれ又其学名を *Trombicula akamushi* Brumpt 1910, *Kedania tanakai* Kishida と称せられているが、古い日本の文献には恙虫を“恙の虫”と記載されているので茲に之を紹介せんとするものである。最近まで吾々は恙虫病及び恙虫に就て最古の文献として Baelz, E. in Verbindung mit Stud. med. Kawakami: Das japanische Fluss-oder Überschwemmungsfieber, eine Acute Infektionskrankheit. Virchow's Archiv Bd. IXXVIII, Heft 3, 373~420, 1879(明治12年)を挙げていた。而して此の論文の内には恙虫を Tsutsugamushi, Akamushi, Shimamushi と記載されている。尙お此の文献より一年前に英国で発表せられているものに Palm, T. A.: Some

Account of a disease called Shimamushi or Island Insekt-Desease by the natives of Japan. Edinborough med. J. 1878(明治11年)Vol. 24. がある。其の内には恙虫を Shimamushi と書かれている。演者は前記 Baelz und Kawakami の川上に就て其の消息を知らんとして、明治10年~13年に至る東京医事新誌(本誌は明治10年2月25日創刊)を渉猟した所、Baelz 及び Palm の文献より更に古き日本人学徒による貴重なる数論文を見附けたので之れを全部復写して置いた。

○棚野直: 陸軍本病院録事(明治十年十二月附)東京医事新誌第20号(明治11年)○川上清哉: 新験毒虫考説東京医事新誌第20号及び21号(明治11年)○大学医学部内科教師ベルツ氏は自費を以て恙の虫調査のため越後国へ出立せらるよし: 東京医事新誌第23号(明治11年)○棚野直: 恙虫研究病院報告摘要: 東京医事新誌第44号(明治12年)○川上清哉: 毒虫新検第二新橋水損熱 東京医事新誌第51号(明治12年)○小池正直: 恙之虫 東京医事新誌第95号10頁(明治13年)以上棚野以下の論文には恙虫の代わりに恙ノ虫又は恙之虫と記載されている。勿論此の外に鳥虫、赤虫とも記載されている。上記棚野川上両氏の論文を通読すると恙虫病の臨床及び病理に於て今日之れに改訂を要する点を見出し得ない程完成せるもので、彼の Baelz の論文は両氏の論文内容の独訳に過ぎない感がする。勿論病原に就きては Malaria に於ける Miasma 説を引用している外毒虫の刺螫に因るが附図に描写してある如く赤虫白虫を区別している。之れを今日の知見から見れば前者は三対脚、後者は四対脚であるから前者は恙虫の幼虫であり後者は親虫と解釈せらる可きものである。要するに恙虫病及び恙虫に関する文献は Baelz のものより古く而も日本学徒により詳細に調査されたる報告には敬意を表する外、“恙の虫”を尊重して *Trombicula tsutsuganomushi*—*Rickettsia tsutsuganomushi* を提唱せんとするものである。尙お棚野、川上両氏の論文は拙著(緒方規雄: 日本恙虫病研究七十七年史東京医事新誌第70巻10号昭和28年)を参照せられたし。

〔東邦大細菌〕