一般講演

1

里山と山の中の山の蚊 2. 卵トラップによる
幼虫調査 ○都野展子 (長崎大・熱帯医学研・
生物環境)

蚊成虫の垂直分布を里山と人里離れた山の2箇所で調査した結果を本支部会で昨年報告したのに続き、産卵生態について報告する。長崎市内の金屋羅山約360mと大村市多良山系内郡岳約820mの各所にタマゴトラップ(容量1500cc)を2000年7月から設置し現在まで水棲昆虫幼虫を調査した。トラップ内の種組成及び環境要因として温度、水質(pH, NH₄, NO₂, Ca, Mg, PO₄, COD)を測定した。越冬幼虫期を除きサンプリング毎に容器内の水・幼虫を空にしたのでトラップ内群集はほぼ1世代毎にシャッフルされている。そのため、蚊の繁殖状況ではなく、局所的な成虫密度(source)を背景にした蚊の産卵場所選好を調べていると考えられる。

5属10種の蚊: *Tripteroides bambusa*, *Culex sasai*, *Cx. kyotensis*, *Cx. pallidithorax*, *Cx. halifaxii*, *Armigeres subalbatus*, *Aedes japonicus*, *Ae. albopictus*, *Ae. flavopictus*, *Uranotaenia novahacura* とハナアブ、ユスリカ、ヌカカ科の幼虫を採集した(種未同定)。 *Cx. pipiens* は人家域のみから採集した。これらの蚊相は季節的に変化したため、同時期に同サイトで得られたサンプルについてトラップ内の群集と環境の対応を Canonical Correspondence analysis で多変量解析した。その結果水質よりも明暗差が重要と考えられた。二つの山域では郡岳で人吸血嗜好性のない種も含み蚊密度が低かった。この違いは、人密度よりも、森林構成樹種やギャップ頻度による光条件の違いから説明すべきかもしれない。落葉広葉樹の残る里山に対し自然林は常緑広葉樹の被度が高くギャップも少ないので全体に暗い。

3 大阪府下泉南地域の蚊について

○水田英生、野田孝治 (関西空港検疫所)、安居院宣昭 (感染研、昆虫医科学部) On the mosquitoes collected in the south Izumi area, Osaka prefecture, Japan. Hideo Mizuta, Koji Noda, Noriaki Agui

泉南地域には関西国際空港があり、海外から侵入してくる蚊科への対策を立てる上で関西国際空港のある空港島を含め、泉南地域の蚊相を把握しておくことは重要なことである。

我々は1998年4月から2001年6月まで関西国際空港において、また、2000年4月から2001年6月まで空港対岸の泉佐野市、泉南郡田尻町、泉南市において蚊の生息状況を調査した。空港島内では幼虫の調査に加え、2000年4月から空港島に10の升目を引き、各升目ごとに2個の産卵トラップを設置して調査を実施した。対岸の調査では海岸地帯、平野(水田)地帯、山脚地帯に分けて幼虫の調査を実施した。

空港島においては4属13種の蚊が採集された。特に、イナトミシオカ *Culex inatonii* は4年連続して採集され、また、2000年の7月と12月にはネットアイエカ *Culex quinquefasciatus* の一代限りの繁殖を確認した。対岸の調査では7属16種の蚊が採集され、2000年に新たに分布記録したヤンバルギンモンカ *Topomyia yambarensis* は高密度に採集された。空港を含め泉南地域で採集された蚊は6属21種であり、泉南地域には侵入蚊が比較的定着しやすい環境が存在するように思われる。

2

Laboratory and Field Evaluation of three Copepods species as Predators of immatures *Aedes albopictus* ○Hamady DIENG, Nobuko TUNO, Yoshio TSUDA, and Masahiro TAKAGI (Department of Vector Ecology and Environment, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University).

In view of the recent successes with the use of *Mesocyclops* in dengue vector control in Vietnam, to date, copepods are the most promising biological control agents.

As biological control depends on additional research, especially the discovery of capable new species, here we assessed the predatory effectiveness against the dengue vector, *Ae. albopictus* of *Mesocyclops pehpeiensis* Hu, 1943, *Macrocyclus distinctus* Richard 1887, and *Megacyclus viridis* Jurine, 1820. Copepods were collected from ricefields in Nagasaki Prefecture in April 2000. The three species differ in size and in reproductive ability. These two parameters are known to influence predation effectiveness and population increase.

In the laboratory, all species killed first, second, and third instar larvae but none of them did kill fourth instar. Daily consumption varied between 6 to 36 larvae according to larval instar and predator species.

In the long-term predation trial, all species did feed readily on developing larval populations of *Ae. albopictus* even alternative food was available.

The three species are being evaluated against *Ae. albopictus* in the field. Artificial containers were set in peridomestic area to allow *Ae. albopictus* colonization. Introduction of each species and mixture of the three species changed the larval densities between treated and controls containers. Copepods-introduced-habitats contained low average numbers (*Macrocyclus* 0.41; Mixture 1.16; *Megacyclus* 3.91; *Mesocyclops* 4.58) of immatures compared to control (56.9). In all treated containers, all the species increased in number excepted *Mesocyclops pehpeiensis* in mixture.

4

フライトミル法によるアブ類の飛翔能力の測定

上宮健吉 (久留米大医・生物) Estimation of flight capability on some Brachycerous flies by tethered flight mill performance. Kenkichi Kanmiya (Biol. Lab. School. Med. Kurume Univ.)

摩擦ロスの少ない磁気浮上式のフライトミル装置によって野生虫の各種アブ類を固定飛翔させ、諸飛翔能力を測定した。アブ科のウシアブ(15♀♀)の平均値は、総飛翔距離: 8.564km, 総飛翔時間: 115.13分, 総飛翔速度: 4.68km/h を示した。個体別では最長連続飛翔距離: 11.62km, 最長連続飛翔時間: 125.96分, 最長連続飛翔速度: 8.15 km/h の個体があった。イヨシロオビアブ(1♀)は総飛翔距離: 1.25km, 総飛翔時間: 24.49分, 総飛翔速度: 3.05 km/h, 最長連続飛翔距離: 0.58km を示した。ムシヒキアブ科ではアオメアブ(1♀1♂)の平均値は総飛翔距離: 1.71km, 総飛翔時間: 32.38分, 総飛翔速度: 3.59km/h, 最長連続飛翔距離: 0.22km を示した。シオヤアブ(1♂1♀)の平均値は総飛翔距離: 1.96km, 総飛翔時間: 35.3分, 総飛翔速度: 3.38km/h, 最長連続飛翔距離: 0.085km を示した。ミズアブ科のアメリカミズアブ(1♀)は総飛翔距離: 9.43 km, 総飛翔時間: 122.4分, 総飛翔速度: 4.621 km/h, 最長連続飛翔距離: 11.03km を示した。飛翔の連続性を全回転の休止率で見ると、ウシアブは0.64%, アオメアブは2.1%, シオヤアブは2.95%, アメリカミズアブは1.81%で、ウシアブの連続飛翔性が顕著であった。連続飛翔の上5位までの平均飛翔回数(=1m)はウシアブ1272.96回, イヨシロオビアブ208.4回, アオメアブ85.73回, シオヤアブ64回, アメリカミズアブ132回であった。以上のデータから、ウシアブの飛翔能力が距離、速度、持続性においても極めて優れていることが理解された。一方、アオメアブ、シオヤアブでは最長連続飛翔距離がウシアブの2~3.9%で、飛翔前後の体重減少率がウシアブの平均23.6%に対してアオメアブ: 2.84%, シオヤアブ: 4.9%と、飛翔に費やす体内物質が少ないことが分かった。アメリカミズアブは前2種ほどに飛翔は断続的ではなく、規則的に一定の距離を飛び、体重減少率が7.78%とムシヒキアブ類よりも高かった。