5 琉球列島石垣島産コガタハマダラカ *Anopheles minimus* の翅長と翅白斑、黒斑季節変化について ○朴 燕玉、宮城 一郎、 當間 孝子 (琉大、医、保健) Seasonal variations of ratio of pale spots to wing length of *Anopheles minimus* from Ishigaki Is., Ryukyu Archipelago, Japan ○Piao Yanyu, Ichiro Miyagi, Takako Toma

Anopheles minimus 種群の蚊 は熱帯熱、三日熱マラリアを媒介する重要な蚊である。タイや中国に広く分布する本種群は同胞種の生息が報告されている。最近 Pradya et al. (2001) は八重山諸島産の本種群は新しい同胞種として報告している。本種群を区別する重要な特徴の一つである翅の白斑の有無、白斑と黒斑の長さや比を明らかにするために琉球列島石垣島のコガタハマダラカの翅長や白斑等について季節的な変化を調べた。

石垣島で年間を通して採集したコガタハマダラカの高齢幼虫を羽化させた標本の中から二ヶ月置き成虫雌、雄の右翅をスライド標本にし、翅長や翅長に対する前縁脈の肩斑、分脈斑、亜前縁斑、前縁斑の斑長の割合を計算した。さらに、R2 脈、R3 脈、M1+2 脈、M3+4 脈、R4+5 脈 Cu1 脈、A 脈上の黒斑数についても調べ、総個体で占めるそれらの割合を計算し季節変化を調べた。

その結果、前縁脈上の白斑の長さ R4+5、A 脈上の黒斑数などに季節的な変化が認められ、他の地域のコガタハマダラカに無い HP が石垣島産のほとんどの標本にはあることが明らかになった。

7 ELISA 法によるラオス産ハマダラカからのマラリア原虫の検出 才田進 (琉大・医・保健) *Plasmodium* detection from *Anopheles* of Lao PDR using by Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), Susumu Saita

当研究室は、ラオス国立マラリア・寄生虫・昆虫学センター (CMPE) と共同で 1999 年から 3 年間の計画で文部省科学研究費補助金 (国際学術研究) により「ラオスにおける蚊媒介性感染症の疫学的調査研究」を行っており、これまでに、ラオスのハマダラカの生態について学会等で報告してきた。また、採集したハマダラカ雌の少数個体について調査地にて顕微鏡下で解剖し、オーシストを検出した事についても報告した。しかし、採集されたハマダラカの大部分は、マンパワーの不足等のために解剖する事が出来ず、標本として日本に持ち帰る事が多かった。

1999 年～2000 年ラオス中部に位置するカムワン県の森林地域数村において人囿で採集し、持ち帰ったハマダラカ乾燥標本を用い、熱帯熱および三日熱マラリア原虫 (スポロゾイト蛋白抗原) の検出を ELISA 法で現在行った。その結果、*An. dirus* s.l. 数個体から熱帯熱及び三日熱マラリア原虫がそれぞれ検出された。

これまでにやってきた調査結果を踏まえて、この地域で重要なマラリア媒介蚊を推定した。

6 ラオス国カムワン県のマラリア流行地におけるハマダラカの調査—人吸血嗜好性と吸血活動時間について— ○當間孝子¹、宮城一郎¹、才田進¹、都築中²、岡澤孝雄³、小林潤⁴、Hongkham Keomanila⁵、Samlane Phompida⁵ (¹琉球大学・医・保健、²JOCV・マラリア風土病対策・ラオス、³金沢大学・留学生センター、⁴琉球大学・医・寄生虫、⁵ラオス国立マラリア・寄生虫・昆虫学センター) Survey on *Anopheles* mosquitoes in malaria endemic area of Khammouane Province, Lao PDR-Anthropophilous index and biting activities of mosquitoes ○Takako Toma, Ichiro Miyagi, Susumu Saita, Ataru Tsuzuki, Takao Okazawa, Jun Kobayashi, Hongkham Keomanila, Samlane Phompida

文部省の科学研究費 (国際学術調査) により、ラオスのカムワン県マラリア流行地でハマダラカの調査を行っている。1 次調査 1999 年 7 月～8 月 (雨期) と 2 次調査 12 月 (乾期) の結果については、一昨年、昨年の日本衛生動物学会大会で報告した。今回は採集された蚊の人吸血嗜好性の程度や活動時間について、3 次調査 2000 年 8 月 (高温) の結果も含めて報告する。

調査はタケク近郊とボラバ郡の村で行い、人囿法と動物囿法で蚊を採集した。多数採集された蚊の中で、*Anopheles dirus* s. l. が最も人嗜好性が高く、*An. nivipes* や *An. philippinensis* は人吸血嗜好性は低かった。18:00 から 24:00 まで行った人囿法や動物囿法で多数採れた蚊のほとんどの種が、気温の高くなる雨期には 21:00 から 24:00、気温の低くなる乾期には 18:00 から 21:00 に吸血活動する割合が多くなった。2000 年 8 月 (雨期)、ボラバ郡のタバチョン村で 18:00 から翌朝 6:00 まで人囿法で蚊の採集を行った結果、*An. dirus* s. l. は 21:00 から早朝 4:00 頃にかけて吸血活動が活発になることが明らかになった。一方、*An. minimus* A は明らかな活動のピークが見られなかった。

8 蚊類のデングウイルス媒介能 (2) PCR を用いたウイルス媒介蚊の識別 ○福田昌子¹、江下優樹¹、安西三郎¹、大塚靖¹、青木千春¹、高岡宏行¹、高崎智彦²、山田堅一郎³、内田幸恵³、倉根一郎³ (¹大分医大・感染予防医学、²国立感染症研、³神戸検疫所) Vector competence of mosquitoes against dengue viruses (2) Identification of two vector mosquito species by PCR ○Masako Fukuda, Yuki Eshita, Saburo Anzai, Yasushi Otsuka, Chiharu Aoki, Hiroyuki Takaoka, Tomohiko Takasaki, Ken-ichiro Yamada, Yukinori Uchida and Ichiro Kurane

ネッタイシマカ *Aedes aegypti* やヒトスジシマカ *Aedes albopictus* はデングウイルスを媒介する蚊である。PCR 法を用いて両者を鑑別する方法を検討した。その結果、ハエ目に共通なプライマーを用いた場合は、ネッタイシマカ (タイ、グアテマラ、タンザニア) とヒトスジシマカ (日本、タイ、アメリカ) の PCR 産物の間に、約 180 bp の大きさの違いが認められた。ネッタイシマカとヒトスジシマカを PCR 法で識別することが可能であると思われた。次に、日本、タイ、アメリカの 3 地域由来のヒトスジシマカの rDNA シストロンの ITS2 (Internal Transcribed Spacer 2) 領域を比較したところ、多くは相同配列であった。また、一部配列 (10 塩基) では 2 種類の配列が日本産とタイ産ではみられ、アメリカ産ではそのうちの 1 種類だけがみられた。