A 35 ノサシバエの寄生が牛の血液成分に及ぼす影響

○森本信生・石崎 宏（畜産草地研究所 那須）

Estimation by change of the blood components of the stress which parasitism of the face fly to a cow

Nobuo Morimoto, Hiroshi Ishizaki

牛は、放牧中に飛翔性家畜害虫の吸血によるストレスを受けており、ノサシバエもその一種である。演者等は、ノサシバエを牛に寄生させ、それによって生じるストレスを、血球数・血液成分の変化によって評価した。野外に蚊帳を設置、その中に採血用に頸静脈にカテーテルを装着したフォルスタイン牛去勢牛を柵場に保定し、ハエを約100頭放飼した。その結果、ほとんどのハエは速やかに牛の体表に付着した。また、牛の血中のコルチゾールおよび遊離脂肪酸濃度は、ハエ放飼後上昇した。一方、血中グルコース、クレアチンキナーゼ濃度、およびリンパ球、単球、好中球、白血球数には、顕著な変化は認められなかった。したがって、100匹程度のノサシバエの寄生は、牛に微弱なストレスを与えていたことが示唆された。

A 36 トゲベッコウバエ *Steysskalomyza hassegawai*

Kurahashi (双翅目、ベッコウバエ科) の若齢期について

岩佐光啓[○]（帯広畜産大・昆虫）・長谷川 慎（フジ環境サービス）Immature stages of *Steysskalomyza hassegawai* Kurahashi

Iwasa M. and Hasegawa S.

ベッコウバエ科 *Dryomyzidae* は、全北区から20種ほどが記録されているが、幼虫についてはこれまでに *Dryomyza formosa*, *D. anilis*, *Oedoparena glauca* の3種で報告されているにすぎず、発生源については不明の点が多い。トゲベッコウバエ *Steysskalomyza hassegawai* は、倉橋（1982）によってベッコウバエ科の新属・新種として盛岡から記載された。本種は、しばしばベッコウバエ科の亜科として扱われていた *Helcomyzidae* の特徴をもっており、分類学的位置が明瞭でなかった。演者らは、1998年春に本種を帯広の放牧地で初めて見出し、成虫を牛糞に産卵させて飼育し、卵・幼虫・蛹を得ることができたのでこれらの特徴について報告する。