一般講演

A01 ハマダラカ唾液に存在するカルシウム結合タンパクの分子生物学的解析

○吉田 栄人¹, 渡辺 裕之¹, 羅 恩傑², 松岡 裕之¹ (¹自治医科大学感染免疫学, ²中国医科大学病原生物学)

Molecular characterization of a calcium binding protein of the salivary of *Anopheles stephensi* mosquito

Yoshida, S., Watanabe, H., Luo, E., Matsuoka, H.

マラリア原虫は、ハマダラカの唾液腺に集積し、ハマダラカが吸血する時に唾液と共にヒトの体内に注入される。すなわち、ハマダラカの唾液および唾液腺は、マラリア原虫にとって、生物適応性という観点から非常に重要な役割を演じていると予想される。我々は唾液腺とマラリア原虫との関係を調べる目的でハマダラカ *Anopheles stephensi* の唾液腺 cDNA library を構築し、抗唾液腺抗体を用いたイムノスクリーニングを行った。その結果、グリシンおよびグルタミン酸に富む酸性タンパクをコードした遺伝子をクローニングした。この遺伝子はハマダラカのメスの唾液腺で特異的に発現しており、予想されるアミノ酸配列には、6 アミノ酸よりなるユニークな GEEGGA 配列とその類似配列が 10 ヶ所存在する。バキュロウィルスにより発現した組換えタンパクを用いて解析を行った結果、カルシウム結合タンパクであることが明らかとなった。またハマダラカに頻回吸血を受けたマウスの血清中にはこの唾液タンパクに対する IgG 抗体が検出された。さらにマラリア流行地の住民には広くこの抗体が誘導されていることが明らかとなった。現在、この唾液タンパクの機能解析中である。本学会ではこの研究に関連した演題として、この唾液タンパク遺伝子のプロモーターを用いて、ハマダラカ唾液腺に外来遺伝子を発現するトランスジェニックカを作製することに成功したことについても発表を行う。

A02 唾液腺特異的に外来遺伝子を発現するトランスジェニックハマダラカの作製

○渡辺 裕之, 吉田 栄人 (自治医科大学・感染免疫学)

Establishment of salivary gland specific expression in a transgenic *Anopheles stephensi* mosquito

Watanabe, H., Yoshida, S.

(目的と意義) マラリア原虫はハマダラカ体内で発育・増殖し、スポロゾイトとし唾液腺に特異的に集積し、感染のために待機している。スポロゾイトが唾液腺に侵入するメカニズム、唾液腺中での寄生メカニズムはほとんど解明されていない。我々はすでに中腸特異的に外来遺伝子を発現するトランスジェニックハマダラカ (TG) の作製に成功している。本研究では、この技術を用いてハマダラカ唾液腺に外来遺伝子を発現する TG を作製し、唾液腺におけるマラリア原虫の生物学的適応性を解明する手段とすることを目的とする。(結果) ハマダラカ唾液タンパクをコードした遺伝子をクローニングした (本大会演題)。この遺伝子のプロモーター領域をゲノム DNA よりクローニングし、マーカー遺伝子として DsRed 遺伝子を連結した Minos transfer plasmid vector を構築した。この plasmid DNA を蚊の卵にマイクロインジェクションして TG strain を得た。TG 成虫メスの唾液腺は蛍光顕微鏡下で観察すると distal-lateral lobe 特異的に非常に強い赤色蛍光が検出された。(考察) 蚊の唾液腺に外来遺伝子を発現することに成功した初めての報告であり、唾液腺-マラリア原虫の相互作用の研究およびマラリア原虫を伝播しないハマダラカの作製等々の様々な研究が可能となる。特に distal-lateral lobe 特異的に外来遺伝子を発現できたことは今後、マラリア原虫を含む病原体の唾液腺侵入機構解明に重要な手段となると期待される。