ロドプシンの分子科学

Molecular Science of Rhodopsins

神取 秀樹

Hideki Kandori

Rhodopsins contain a retinal molecule, and convert light into chemical energy or signal. The chromophore of visual or microbial rhodopsins is a retinal Schiff base of the 11-*cis* or all-*trans* form, respectively, where specific chromophore-protein interaction determines their colors. Upon light absorption, ultrafast photoisomerization initiates protein structural changes, leading to each functional expression. By use of spectroscopic methods, we have been studying how rhodopsins respond to light. Ultrafast spectroscopy of visual rhodopsin revealed that *cis-trans* isomerization is the primary event in our vision, which is optimized in protein environment. Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy of visual and microbial rhodopsins provides various important vibrational bands related to structural changes of these proteins. Detection of protein-bound water molecules is one of the research highlights, and the comprehensive FTIR study has shown that a strongly hydrogen-bonded water molecule is the functional determinant of light-driven proton pump proteins. Here I review our spectroscopic challenge for > 25 years, particularly focusing our recent findings.

Keywords: rhodopsin, retinal, ion pump, FTIR spectroscopy, internal water molecules

1. はじめに

我々は光なしでは生きてゆくことができない。植物の光合成、動物の視覚に代表されるように、光は「いのちの源」として大きな恵みを与えてくれる。光受容蛋白質は、このように生物が光を利用する際に受容体となる蛋白質であり、機能上、受容した光をエネルギーに変換するものと、情報に変換するものに大きく分けることができる。代表的な蛋白質分子を Figure 1 に示したが、これらの分子においては、光を吸収するための低分子（chromophore あるいは発色団）

が蛋白質という限定された環境のもとに存在する。そして光を吸収すると多くの場合、蛋白質場に特異な光化学反応（異性化、電子移動など）が起こる結果としてエネルギー変換や情報変換といった機能が発現する。生体分子は時間的・空間的な階層構造を巧みに活かして多様な機能を生み出すが、光受容蛋白質の面白みはこれらの過程を徹底的に深めて追跡できるところにある。実際に、量子力学が決定的な役割を演じる電子励起状態での初期過程はフェムト秒（ 10^{-15} 秒）の時間領域の出来事であり、蛋白質の最適化構

Figure 1. Photoreceptive proteins utilize light as a source of energy or signal, where photochemical reaction of chromophore molecule initiates each function.

造を形作る進化のための時間がペタ秒 (10^{15} 秒) であるとすると、時間軸で 30 桁にも及ぶ事象が研究の対象となる。ゲノム科学や構造生物学の進展により蛋白質の共通性や多様性が理解されるようになった昨今、光受容蛋白質が提供する情報はこれまで以上に重要な意味をもつことがわかる。

光受容蛋白質の中で、レチナール分子を発色団とする蛋白質群がロドプシンである^{1,2}。Figure 1 ではロドプシンをイオンポンプ・視覚・走光性の 3 つに分類しているが、レチナール分子の構造から 11-*cis* 型を発色団とする視物質型ロ

ドプシンと all-*trans* 型を発色団とする微生物型ロドプシンに大別される (Figure 2)。視物質型ロドプシンと微生物型ロドプシンは、いずれも α ヘリックスが 7 回膜を貫通した構造をもつ膜蛋白質であり、7 番目のヘリックスにあるリジン残基とレチナールがシッフ塩基結合を形成するものの、両者のアミノ酸に相同性はなく、別々の進化をたどってきたと考えられている。にもかかわらず、蛋白質が制御する吸収波長や機能発現をもたらし超高速光異性化など、視物質型ロドプシンと微生物型ロドプシンで共通点は多い。

Figure 2. Chromophore structures and their photoreactions in visual (a) and microbial (b) rhodopsins. Photoisomerization from the 11-*cis* to all-*trans* form occurs in visual rhodopsins (a), while the all-*trans* to 13-*cis* isomerization occurs in microbial rhodopsins (b). Microbial rhodopsins also accommodate 13-*cis*, 15-*syn* structure in the dark, which differs from the 13-*cis*, 15-*anti* form after isomerization (b). This figure is reproduced from Ref. 2.

Figure 3. Structures of the retinal Schiff base region in light-driven proton pump (bacteriorhodopsin; BR, Ref. 3), light-driven chloride pump (halorhodopsin; sHR, Ref. 4), microbial light sensor (*pharaonis* phoborhodopsin; ppR, also called pSRII, Ref. 5), and animal light sensor for twilight vision (bovine rhodopsin, Ref. 6). Hydrogen atoms and hydrogen bonds are inferred based on the X-ray structure. The common structural feature is that the positively charged chromophore is stabilized by counterion(s) and protein-bound water molecules. In microbial rhodopsins, three water molecules and two negative charges constitute roughly planar pentagonal cluster structure. This figure is reproduced from Ref. 99.

分子メカニズムの理解において重要な知見を与えたのは X 線結晶構造解析による立体構造情報である。ロドプシンは膜蛋白質であるため結晶化は容易でなかったが、20 世紀から 21 世紀へのミレニアムの転換点で次々と重要なロドプシンの立体構造が報告された。実際に Figure 3 に示す光駆動プロトンポンプ³、クロライドポンプ⁴、バクテリアの光センサー⁵、動物の明暗視センサー⁶の構造決定は 1999–2001 年のわずか 3 年間のことである。ロドプシンは蛋白質が行う波長制御機構や超高速異性化反応、プロトン移動反応の連鎖による濃度勾配に逆らった輸送など、分子科学的課題の宝庫であり、ミレニアムの転換点で立体構造が次々と解明されたという事実は、私には「21 世紀はロドプシンの分子科学の時代である」と告げられているような気がしてならない。私はこれまで超高速分光や赤外分光を用いて、この魅力的な蛋白質のメカニズムを解明するため研究を行ってきた。本稿では、分野全体を網羅的に紹介するというよりは、我々のグループが行ってきたロドプシンに対する分光学的挑戦の中から、最近の研究成果を中心として紹介する。

2. 視物質型ロドプシンの分子科学

2.1 波長制御機構

可視光である 400–700 nm の光を吸収するため、我々ヒトは 3 種類の色覚視物質を使っている。RGB という色の三原色に対応する red-sensitive, green-sensitive, blue-sensitive pigments はそれぞれ 560 nm, 530 nm, 425 nm に吸収極大を示し、その結果として可視光の波長領域が決められる²。これらの色覚視物質は網膜の錐体 (Cone) 視細胞に存在するが、「ロドプシン」とは桿体 (Rod) 視細胞に存在し明暗視を担う視物質のことを指すので、色覚視物質は狭義には「ロドプシン」ではない。一方、広い意味では色覚視物質も微生物型もすべてロドプシンである。興味深い事実として、ヒトの 4 種類の視物質 (ロドプシンと青、緑、赤を吸収する色覚視物質) の発色団は同じ分子構造をもつことが挙げられる。400 nm と 700 nm という 2 倍近くのエネルギーの光を吸収するのに、例えば植物はそれぞれフラビンと開環テトラピロールやクロロフィルという異なる発色団を利用している。エネルギー差が大きいため別の発色団分子を使う、という意味で理に適っているが、同一のレチナール分子によって青も赤も見ているのは「視覚の不思議」の 1 つであり、蛋白質の波長制御の奥深さを示している。

発色団 (レチナールのプロトン化 Schiff 塩基) の電子状態を劇的に変化させる蛋白質のはたらきを考える際に指標となるのは、蛋白質以外のモデル系の吸収であるが、溶液中では対イオンや溶媒に依存して 440–480 nm に吸収極大が現れることが知られている²。溶液中において負電荷をもった対イオンは最安定な位置 (Schiff 塩基の N-H 結合の延長線上) に存在すると考えられ、発色団の正電荷を Schiff 塩

基側に最も局在させた場合と位置付けることができる。対イオンの位置が遠くなって発色団の正電荷がポリエーテル鎖に非局在化すると吸収が長波長側にシフトすることが知られているが、対イオンの距離が無限遠になったときの吸収極大は古くから大きな議論があった。最近になって分子ビームを用いた実験が行われ、対イオンが無限遠に位置すると考えられる真空中において 610 nm に吸収極大が現れることが明らかになった⁷。それまでに予想されていた値よりも短波長側に見出された実験値は、human red やバクテリオロドプシンの吸収極大が 560–570 nm と真空中の値 610 nm に近いことを考えると、蛋白質の波長制御がすでにかなり最適化されていることを示唆していた。

蛋白質が行う波長制御という「視覚の不思議」を深く理解するため、溶液以外のモデル系がいろいろと試されてきたが、これまでにほとんど成功例がなかった。ロドプシンの発色団は β イオノン環・ポリエーテル鎖という疎水的な部位と Schiff 塩基という親水的な部位をもつ両親媒的な性質があり、このような反応場の性質をモデル系で再現するのは困難と考えられてきた。このような現状のもと、我々は米国、日本、中国産の 3 種類のモンモリロナイト粘土鉱物を利用して 11-*cis* 型レチナール Schiff 塩基の吸収波長制御に成功した (Figure 4)⁸。この研究では、ベンゼン中で粘土鉱物にレチナール Schiff 塩基を取り込ませ、産地の違いにより、3 種類で可視領域の波長をカバーできたのである。産地による吸収波長の違いは粘土層の負電荷密度や層間に存在するイオン組成の違いに由来するが、粘土を用いたロドプシンモデル系の研究を深めることにより、蛋白質、粘土双方に共通するレチナール Schiff 塩基の吸収波長制御メカニズムの解明が可能になるものと期待される。

蛋白質が行う波長制御という「視覚の不思議」を解明するには、上記のような (1) モデル実験に加えて、(2) 視物

Figure 4. Clay mimics color tuning of rhodopsins. In this study, we showed that the protonated RSB-11 exhibits various colors when adsorbed onto the clay, montmorillonite, and the absorption spectra cover the entire visible ranges in clays from three different mining places ($\lambda_{\max}$ at 479 nm for USA, 503 nm for Japan and 532 nm for China)⁸. Thus, silicate-based clay can mimic the carbon-based protein for color tuning of the chromophore in our vision.

質の構造解析, さらには (3) 立体構造をもとにした理論計算が必須となる。特に構造情報は必須であるが, これまでに得られている結晶構造はウシやイカから大量の試料調製が可能な明暗視のロドプシンだけである。色覚視物質の場合, 試料調製が困難であることから構造解析はもとより, 分光学的な解析もきわめて限られていた。我々は 21 年前に二千枚以上のニワトリ網膜から赤感受性視物質を調製することで色覚視物質の初期過程を直接, 捉えることに成功した一方⁹, 10 年前にはニワトリ赤感受性視物質の赤外分光を報告している¹⁰。後者は色覚視物質における蛋白質側の構造情報を捉えた最初の論文であるが, 天然の試料ではアミノ酸変異などが不可能であり構造解析を深めることができなかった。そこで培養細胞を用いて霊長類が赤と緑を識別する色覚視物質を発現し, 低温赤外分光解析を用いた研究を開始した。可視吸収スペクトルの極大波長を測定するためには 0.01 mg の蛋白質量で十分であるが, 赤外分光計測のための 1 回分の試料は 0.3 mg 必要であり, これは培養プレート 300 枚に相当する。X 線結晶構造解析や NMR に必要な試料と比較すると圧倒的に少ない量での計測が可能であるが, それでも 1 回の測定に 300 枚分の培養プレートを

Figure 5. Old world primates, including humans, acquired green and red pigments by gene duplication, which show ~30 nm difference in the $\lambda_{\max}$ with 15 amino acid sequence difference. This study provides the first structural insight of the color tuning by reporting light-induced FTIR spectral changes of monkey green and red in D₂O¹¹. The FTIR spectra at 77 K were similar to those of rhodopsin in the conventional low frequency region, while being entirely different in the X-H and X-D stretching regions. (a) and (b) show the light-minus-dark difference FTIR spectra of monkey green (green lines), monkey red (red line) and monkey rhodopsin (black line) in the 3630–3150 cm⁻¹ region, which is reproduced from Ref. 11. The spectral differences between green and red open an avenue for understanding of the specific chromophore-protein interactions in color pigments.

要する実験は容易なものではない。担当学生の頑張りとは 77 K で視物質が示すフォトクロミックな性質（繰り返しデータ積算が可能）により, 初めてサルと緑感受性色覚視物質の赤外分光解析を実現することができた (Figure 5)¹¹。蛋白質に結合した水分子の解析や変異体試料の実験が進行中であり, このような構造情報は波長制御機構の理解に不可欠である。

なお, 理論計算については構造のなかった時代には Kakitani らの先駆的な仕事¹²があり, 最近ではロドプシンの立体構造に基づいた量子化学計算が活発に行われていることを記しておきたい (例として本誌における Hasegawa の総説¹³参照)。私自身はロドプシンのホモロジーモデリングがどこまで色覚視物質に適用できるかについて慎重な検討が必要であると考えているが, 理論と実験の切磋琢磨により「色を見分ける」メカニズムが解明されることを期待したい。

2.2 視物質型ロドプシンの光反応

視覚における光反応の研究が, Wald や Yoshizawa らによって開始されたとき, 多くの化学者の関心を集めたのはなぜロドプシンが 11-*cis* 型のレチナールを発色団とするかという問題であった。13 位のメチル基と 10 位の水素原子が立体障害を起こす 11-*cis* レチナールは熱的に不安定であり, そのため市販されていない。私たちがロドプシンの実験をする場合は, 市販の all-*trans* 型レチナールを照射し, 生成する異性体混合物から液体クロマトグラフで 11-*cis* 型を分離しなければならない。ところが, 蛋白質の内部では 11-*cis* 型はきわめて安定である (不安定だと熱雑音が増加する)。一方, 光を吸収すると収率よく (量子収率 0.67) 反応が起こり, 光情報変換が実現する^{1,2}。

ロドプシンにおける高い効率の反応が, 我々の感度の高い視覚の分子論的な基盤となっている。ロドプシンにおける特異な光反応の性質は低温分光法などさまざまな研究手法によって研究されてきたが, 初期過程がどのような反応であり, どのような時間領域で起こっているのか, といった最も根元的な問いは超短パルスを用いた超高速分光によって明らかになった¹⁴⁻¹⁷。特にフェムト秒レーザーパルスは, ロドプシンの電子励起状態における異性化反応過程を直接捉えることを可能にした。一方, 発色団が光異性化したロドプシンは, より遅い時間スケールで蛋白質の構造を変化させ, 細胞質側の膜表面領域で GTP 結合蛋白質を活性化させる (Figure 6)。レチナールの光異性化を信号入力とすると, GTP 結合蛋白質の活性化が信号出力である。

私は大学院に進学した 1984 年に視物質の超高速分光を開始した。今から考えると 25 ピコ秒のレーザーで 2 桁以上速い異性化過程を捉えようとしていたわけで, 無謀な試みであったと言えるかもしれない。しかしながら, 幸い優れた共同研究者に恵まれ, 京大・分子研・理研と短いレーザーパルスを追い求める中で, 「視覚の初期過程がレチナールの

Figure 6. Schematic drawing of visual excitation of rhodopsin, where two spectroscopic methods of mine, ultrafast spectroscopy and low-temperature FTIR spectroscopy, and our findings by these methods are summarized.

11-*cis* 型から all-*trans* 型への異性化反応であること、蛋白質は反応効率を最適化していること」を明らかにすることができた。この間の経緯については既報の総説^{2,14-17}で紹介しているのでそちらを参照していただきたいが、特に記すべきこととして、異性化をブロックした 11-*cis* 型固定の度合いによりダイナミクスが異なること (=異性化が初発反応である)¹⁸、ロドプシンの励起状態ダイナミクスにはフェムト秒だけでなくピコ秒の緩和成分も存在すること (=多次元的な異性化座標が反応性を決める)¹⁹、溶液中ではフェムト秒成分の割合が小さいこと (=フェムト秒のダイナミクスが効率よい異性化をもたらす)²⁰が挙げられる。一方、フェムト秒分光により異性化産物の側に振動のコヒーレンスが観測された²¹ことから、励起状態から異性化座標に沿って conical intersection を経由した反応が起こることが示唆されてきたが、最近になって近赤外領域のプロープ光を用いたフェムト秒分光によりこのダイナミクスが実時間で捉えられていることを紹介しておきたい²²。

ロドプシンは G 蛋白質を活性化することで信号を伝達する G 蛋白質共役型受容体 (GPCR; G-protein coupled receptor) の 1 つであり、その中でも最も理解の進んだ蛋白質とすることができる²³。GPCR が創薬の最大のターゲットである現状を考えると、「光化学」とは別の面でのロドプシン研究の重要性が浮き彫りになってくる。ロドプシンは光励起後、フォト、バソ、ルミ、メタ I、メタ II と呼ばれる吸

収波長の異なる中間体を生成するが、発色団がプロトン了解離したメタ II 中間体が G 蛋白質を活性化する (Figure 6)。活性化のメカニズムを明らかにするため、さまざまな手法を用いた研究が行われているが、メタ II の段階でヘリックスが rigid-body motion (剛体的な動き) を起こす結果、細胞質側で G 蛋白質と相互作用できる部位が露出するという認識が一般的である²⁴。我々は赤外分光を用いた構造変化の解析をロドプシンの活性化過程に対して適用してきたが²⁵、その構造変化はレチナールや蛋白質の二次構造だけでなく内部結合水²⁶の水素結合変化にまで及ぶとともに、分子内だけでなく G 蛋白質との複合体形成に伴う構造変化²⁷やレチナールとヒドロキシルアミンの反応²⁸など、分子間相互作用における構造解析も実現している。このような構造解析により、光を吸収して all-*trans* 型へと異性化したロドプシンがどのように G 蛋白質を活性化できるのか、その全貌が明らかになると期待される。

2.3 視物質型ロドプシンの熱雑音

既述したとおり、視覚の感度の高さはよく知られている事実である。特に薄明かりのもとではたらく桿体視細胞は超高感度な光センサーであり、わずか 1 個の光子でも電気信号を出すことができるとされている。11-*cis* 型レチナールは暗中でロドプシンが勝手に活性化しないよう不活性化状態に構造を安定化する (インバースアゴニストと呼ばれる)

Figure 7. Reaction coordinate of the activation of bovine rhodopsin (Rho). (Left) Enthalpy reaction coordinate of light-dependent Rho activation. Note that photo-isomerization occurs with negligible changes in the retinal shape, while Meta II is the active state. (Right) Apparent enthalpy reaction coordinate of Rho dark activation. Note the differences between the apparent activation enthalpy of Rho activation in the dark deduced from the dark events (solid green line), and the expected value for a dark activation involving the formation of a Batho-like intermediate (dashed green line). This figure is reproduced from Ref. 30.

と考えられている。実際に、X線結晶構造解析を見ると 11-*cis* 型レチナールは見事に蛋白質の結合ポケットの中に埋め込まれており⁶, 200 kJ/mol を超える光のエネルギー (のみ) が活性化をもたらすのは道理に思える。しかしながら、この項では実はそうではない (=ロドプシンはもっと感度がよいはずなのにそうではない), という『熱雑音のパラドックス』について記したい。

電気生理実験によれば、光がなくても視細胞が興奮する Dark Event という現象があるが、その応答は光センサーであるロドプシン分子に由来することが知られていた²⁹。熱雑音の原因となるこの現象は、光なしにロドプシンが活性化される結果、光の場合と同様に G 蛋白質を活性化するのである。電気生理実験における温度依存性から活性化エンタルピーと速度定数がそれぞれ 80–110 kJ/mol と 10^{-11} s^{-1} (36 °C) と見積もられた。興味深いことに、ロドプシン中でレチナール分子の熱異性化反応が光異性化と同じ反応座標で起こるとすれば、Figure 7 のように 180 kJ/mol を超える活性化エンタルピーになるはずであり、観測される頻度ももっと低くなるはずである。なぜ現実には観測される熱雑音は異性化座標から予測される半分程度の活性化エンタルピーを示し、我々の現実の視覚はそれほど感度が低い (!) のであろうか? 私が「ロドプシン最後のミステリー」と呼ぶ熱雑音の起源や分子メカニズムはずっと不明のままであったが、最近、我々は熱雑音の起源に迫ることのできる実験データおよびこれを用いたモデル化を行った³⁰。

我々は以前、レチナール結合部位に存在する Thr118 の OH 伸縮振動を帰属することに成功し、OH 基が重水中でも H/D 交換しないことを報告している³¹。同じ頃、発表された結晶構造を見ても Thr118 は外部から隔離されており (Figure 8), 水などの水素結合チャネルも存在しないため⁶,

Figure 8. (Upper panel) Structure of bovine rhodopsin, with details of the Thr118 environment and the retinal binding pocket. (Lower panel) Proposed two-step model for the thermal isomerization of the 11-*cis* retinal in rhodopsin, leading to a light-independent activation of Rho. A protein fluctuation transiently “opens” the retinal binding pocket (RBP) allowing for retinal isomerization free from opsin constraints (solvent-like environment). Upon closure of the RBP, the isomerized all-*trans* chromophore acts as an agonist, leading to activation of the receptor. This figure is modified from Ref. 30.

H/D 交換しないという実験事実はきわめて妥当に思われた。ところが、ロドプシンを 50–70 °C といった高温に置くと、重水中で変性することなくゆっくりと H/D 交換が起こることを見出したのである³⁰。温度依存性から見積もった H/D 交換反応の活性化エンタルピーは $95 \pm 16 \text{ kJ/mol}$ となったが、これは蛋白質が閉構造と Thr118 の近傍に水分子が接近

できる開構造との間の構造転移に由来する活性化パラメータと解釈できる。一方、我々は 11-*cis* 型レチナールプロトン化シッフ塩基の熱異性を溶液中で測定し、 94 ± 3 kJ/mol という活性化エンタルピーの値を得たので、これらの値を用いて Figure 8 に示すロドプシンの熱的活性化モデルを提案することができた。

このモデルによれば、ロドプシンという蛋白質は熱揺らぎによりダイナミックに閉構造と開構造を転移させるが、レチナールが溶液中に近い環境にさらされる開構造でのみ熱異性が起こる。電気生理実験の結果をほぼ定量的に説明できたこのモデルが教えてくれるところは、蛋白質は結晶構造に示されるような最安定構造だけをとるのではなく、熱揺らぎによって構造を転移させるダイナミックなものだという描像である。色覚を担う錐体視細胞は桿体視細胞と比較して熱雑音が多いことが知られており、我々はこのような測定を色覚視物質に発展させることでモデルの正しさをさらに示してゆきたいと考えている。最後にこの研究は熱雑音をターゲットにして始めたものではないことを付記しておきたい。当時、助教であった古谷博士（現分子研准教授）がウシロドプシンの内部結合水を研究する過程で、蛋白質内部に埋め込まれていて交換が容易ではない水分子の可能性を吟味するため、試料を重水中で高温にさらしたことが出発点であった。その結果、新たに同位体シフトを示す水分子のバンドは全く観測されず、そのかわり Thr118 の OH 基が重水素化する事実を見つけ、これが熱雑音発生のメカニズムを説明できるモデルの構築へとつながった。丁寧な分光観察の中から生まれたこのような予想外の発見や発展は、研究の醍醐味と言えるかもしれない。

3. 微生物型ロドプシンの分子科学

3.1 ささまざまな機能をもつ微生物型ロドプシン

11-*cis* 型ロドプシンを発色団とする視物質ロドプシンに対して、微生物型ロドプシンは all-*trans* 型レチナールを発色団としてもつ。両者にアミノ酸の相同性はなく進化的な起源は異なると考えられているが、いずれも 7 回膜貫通型のヘリックスから構成され多くの共通点を有している。視物質ロドプシンが水溶性の G 蛋白質を活性化することによる光情報伝達という唯一の機能をもつものに対して、微生物型ロドプシンは光センサーだけでなくイオンポンプによって光エネルギー変換の機能も持っている (Figure 9)。

微生物型ロドプシンの中で最初に発見されたのが有名なバクテリオロドプシン (BR) であり、塩濃度が飽和するような極限環境で育成できる高度好塩菌の紫膜から 1971 年に発見された³²。BR は光駆動外向きプロトンポンプとして機能し、生成されたプロトンの濃度勾配が ATP 合成のために利用される (Figure 9)。続いて 1977 年にハロロドプシン (HR; 内向きクロライドポンプ)³³、1982 年にセンサリーロドプシン I (SRI; 正の走光性センサー)³⁴、1985 年にフォボ

Figure 9. Various functions of microbial rhodopsins. These rhodopsins were originally found in Archaea, but it was recently known that Eubacteria and Eucaryotes also have them. Purple arrow represents active transport, indicating possible transport against the gradient of ions, and thus the process corresponds to light-energy conversion. Orange arrow represents the information transfer pathway in the signal transduction. In the case of light-gated ion-channel (middle), the ion transport is passive, namely according to the gradient of ions, and thus this process corresponds to light-signal transduction rather than light-energy conversion.

ロドプシン (pR またはセンサリーロドプシン II, SRII; 負の走光性センサー)³⁵ が発見され、高度好塩菌は 4 種類の異なる機能をもったロドプシンを保有することが明らかとなった。ポンプという新たな機能に加えて、2 種類のセンサリーロドプシンは膜結合型の伝達蛋白質を活性化することで情報伝達を行うことが明らかになり、視物質ロドプシンとは異なった光信号変換機構が存在することがわかった (Figure 9)。この中でドイツ人によって発見された BR 以外の 3 種類の発見においては、向畑、小島、津田、加茂（敬称略）ら日本人研究者の貢献が多かったことを特記しておきたい。吉澤グループが世界をリードしてきた視物質ロドプシンの研究と合わせ、このような歴史と伝統が日本のロドプシン研究に息づいており、その上に我々の研究があることを忘れてはならない。

生物は真核生物、古細菌、真正細菌の 3 種類に分類されるが、BR などを有する高度好塩菌は古細菌に属するため、これらの蛋白質群は古細菌型ロドプシン (Archaeal rhodopsins) と呼ばれていた。面白い蛋白質であることは認められていたものの、塩辛い湖に生息する古細菌のみがもつ膜蛋白質であるためその存在はきわめてマイナーであった。この状況を一変させたのはゲノム科学の進展である。21 世紀に入り、ヒトゲノムを解読した Venter らが「次は海だ」とばかり海洋性バクテリアのゲノムを片っ端から解析していったところ、驚いたことに続々と BR のような蛋白質が見つかってきたのである³⁶。これらは最初に発見されたバクテリアの名前をとってプロテオロドプシン (PR)³⁷ と総称されるが、その数は今や 5 千種類を超えている。PR の遺伝子を大腸菌で発現すると BR と同様にプロトンポンプ機能を示すことから³⁷、PR は光エネルギー変換を担っていると考えられているが、この事実は重要である。なぜならば、これらのバクテリアは食物連鎖の最下位に位置し、分解者として従属的な栄養摂取のみを行ってきたとこれまで考えられてきたからである。地球温暖化が叫ばれる現在、太陽エ

エネルギーがどれだけ地球で利用されているか正確に見積もることの重要性が認識されているが、真正細菌の海洋性バクテリアから続々と発見される PR を見るにつけ、地球規模でのエネルギー利用について再計算の必要性を強く感じている。ただし、ここで注意したいのは PR のプロトンポンプ機能がこれまで大腸菌でのみ測定されているという点である。地球規模での正しい推定のためには、より生理的な環境で調べることを忘れてはならず、現に PR は光エネルギー変換ではなく光情報変換に機能しているという可能性も示唆されている³⁸。

2003 年に淡水性の真正細菌 *Anabaena* から発見されたロドプシン (*Anabaena* sensory rhodopsin; ASR)³⁹ も実にユニークな蛋白質である。なぜならばそれまでに知られていた古細菌の光センサーはすべて膜結合型の伝達蛋白質を活性化することによって情報変換を行っていたのであるが、ASR の伝達蛋白質は視物質ロドプシンのように水溶性だったのである (Figure 9)。また微生物型ロドプシンは *all-trans* 型だけでなく 13-*cis*, 15-*syn* 型レチナール (*all-trans* 型の 2 つの二重結合を自転車ペダルのように異性化させた形) も結合でき、機能的に重要なのは前者のみであることが知られていたが^{1,2}, ASR については *all-trans* 型と 13-*cis*, 15-*syn* 型との間のフォトクロミックなセンサーであるという提案がされていた。そこで我々が ASR のフォトクロミズムを詳細に調べたところ、異性化後は 100% の収率で別の異性体へと転換することがわかった⁴⁰。これは全く予想外の光化学として驚くべき結果であった。すなわち BR などは *all-trans* 型が光を吸収すると 13-*cis*, 15-*anti* 型へと (13 位の二重結合が 1 つ) 異性化する結果、プロトンポンプなどの機能が発現し、その緩和過程で 100% が元の *all-trans* 型に戻る (Figure 2)。一方、ASR の *all-trans* 型が光を吸収すると 13-*cis*, 15-*anti* 型へと同様に異性化するが、その緩和過程で 100% が 13-*cis*, 15-*syn* 型へと転移したのである。ASR は他の微生物型ロドプシンとよく似た立体構造⁴¹ をもっているが、類似の構造を持ちながら BR などと 100% 異なるフォトクロミズムを実現できるのか、興味深い点である。

このような新規ロドプシンの中で最大の驚きはチャンネルロドプシン (ChR) の発見と最近の神経生物学への応用であろう。私はそれまで、講演などで「光駆動のチャンネルはないのか?」「プロトン以外の陽イオンは運べないのか?」という質問を受けると、次項で示す BR についての (専門家としての) 経験から「天然にも存在しないし人工的にデザインするのも難しい」と言い切っていた。ところが 2002 年に緑藻のクラミドモナスから発見された ChR は BR, HR のようなポンプではなく、濃度勾配に従ってナトリウムなどの陽イオンを輸送するチャンネルであることが明らかになったのである (Figure 9)⁴²。陽イオンの経路は今のところ不明であるが、その一方で ChR が「光操作」のツールとして神経生物学に革命をもたらそうとしていることは特筆で

きる^{43,44}。GFP (Green Fluorescent Protein) が「光観察」のツールとして生物学に革命をもたらした 2008 年のノーベル化学賞が与えられたのは記憶に新しいところであるが、「光らせて見る (光観察)」ことの次に「光で操作する」ことが大きな期待をされているのだ。ライフサイエンスの大きな課題として脳神経の複雑なネットワークをどのように理解するかという問題が挙げられるが、光学 (Optics) と遺伝学 (Genetics) を組み合わせた Optogenetics という新しい分野の主演として ChR が登場した。マウスの神経細胞に ChR を発現させ、光ファイバーなどを用いて光照射すると、ChR のイオン輸送に由来する神経興奮を積極的に起こすことが可能となったのである。この技術が開発された当時は、ChR のようなチャンネルと違って 1 個の光子で 1 個のイオンしか輸送できない光駆動イオンポンプは応用が困難であると考えられていたが、クロライドポンプである HR⁴⁵ に続いて BR などのプロトンポンプ⁴⁶ も応用が可能であることが明らかとなった。受動輸送か能動輸送かに関わらず、機能を維持した形で神経細胞に発現し、光でイオンを輸送できることが Optogenetics に必要であると認識されつつある。このように微生物型ロドプシンがもつイオン輸送の能力は脳神経科学への応用においてホットな話題であるが、疎水的な蛋白質内部を通るイオンの輸送は分子科学としても実に興味深い現象である。そこで最も理解の進んでいる BR を対象として、そのプロトンポンプの分子機構研究の例を次に紹介する。

3.2 バクテリオロドプシンの光駆動プロトンポンプ

分子ポンプは濃度勾配に逆らってイオンを能動輸送することができる。結果的に系のエントロピーを減少させる能動輸送という不思議な現象は、蛋白質分子内でどのようにして実現するのであろうか? 一般に、ポンプのメカニズムを理解するためには、蛋白質の立体構造を決定し、イオンの輸送経路を同定し、方向性が決定されるしくみ (スイッチ機構) を蛋白質の構造変化と関連して説明する必要がある。最近になって次々と重要な分子ポンプ蛋白質の立体構造が決定されているにも関わらず、スイッチ機構は依然として全くのブラックボックスである。このような現状の下、地上最小のプロトンポンプである BR は、詳細な立体構造と光による反応ステップ解析の有利さのゆえに、メカニズムの理解が最も進んでいるポンプ分子といえる^{1,2,47-49}。

既述のとおり高度好塩菌は、光駆動性プロトンポンプである BR と光駆動性クロライドイオンポンプである HR をもつ。光のエネルギーは、これらの能動輸送によりプロトンの濃度勾配や膜電位として電気化学エネルギーへと変換される結果、電子移動を使わず「ポンプ」による光合成が実現する。BR の場合、光を吸収すると J, K, L, M, N, O と名付けられた色の異なる中間体を経由する 10 ミリ秒程度の

光反応サイクルの間に、細胞質側から細胞外側にプロトン能動輸送する。中性付近では、Figure 10 の番号で示した順番に起こる 5 回のプロトン移動によってポンプが実現する。このようなプロトンの経路の研究は、主に赤外分光法によって研究された。特に大きな威力を発揮したのは、プロトン化カルボン酸 ($-\text{COOH}$) の $\text{C}=\text{O}$ 伸縮振動の解析であり、同位体置換試料を用いて振動バンドが帰属され、また変異蛋白質を利用して部位が同定された^{48,49}。こうして、BR は、すべての分子ポンプの中で初めてかつ現在のところ唯一、イオンの輸送経路が決定された研究例となったのである。

BR のプロトン輸送は時間的、空間的に精妙な制御によって起こるわけだが、変異蛋白質を用いた解析は意外な事実を浮き彫りにした。即ちプロトン放出基を構成する Glu204, Glu194, プロトン取込み基である Asp96 を非解離性残基に置換してもプロトンポンプ活性は保たれていたのである^{48,49}。この事実は、プロトン放出経路とプロトン取込み経路にそれぞれ存在するプロトン結合基は、本質的にはポンプ能に

必要ないことを示している。これらの残基は方向性を決定する「スイッチ」の構成部品ではないのだ。ただし、これらの変異蛋白質の光反応サイクルは天然のものに比べて 30 倍程度遅くなる⁴⁹。BR は 1 光子あたり 1 プロトンを輸送する効率のよいポンプだが、このような遅い反応サイクルでは光エネルギー変換の効率ははなはだ悪くなる。こうして、この 2 つのアミノ酸残基は細菌が光を利用して生きていくためには重要だが、ポンプという分子機械にとっては本質的ではないことが明らかになった。

一方、シッフ塩基の細胞外側より存在する Asp85 と Asp212 を非解離性残基に換えると、ポンプ活性は失われた⁵⁰。さらに我々は Asp85 を HR において対応するアミノ酸である Thr に置換すると、高い塩濃度の下ではクロライドイオンを細胞外側から細胞質側へ（プロトンポンプの反対方向）と輸送することがわかった (Figure 11)⁵¹。BR と HR のアミノ酸の一致度は 25% であり、基本的に異なる蛋白質である。にもかかわらず、BR が 1 アミノ酸残基の置換によりクロライドポンプに転換したという事実は、ポンプとしての方

Figure 10. Structure and photocycle of BR. Proton pump is the result of five proton transfers, which are spatially and temporally well controlled. The K intermediate appears after the primary photoisomerization from all-*trans* to 13-*cis* retinal, and thermal isomerization from the 13-*cis* to all-*trans* form occurs in the N-to-O transition.

Figure 11. Functional conversion of BR. The amino acid identity of BR (proton pump) and HR (chloride pump) is ~25%, so that they have been probably optimized into each function during evolution. Nevertheless, upon replacement of a single amino acid at position 85 of BR (Asp to Thr), BR was converted into chloride pump⁵¹. This observation suggests the common transport mechanism and the ionic specificity determined at the Schiff base region.

向性がレチナールシッフ塩基の部分 (=スイッチ) で決定されていることを強く示唆するものである。

BR が簡単にクロライドポンプに変換できたことから、HR も Thr を Asp に変異させればプロトンポンプに変換できるだろう、と思われるかもしれない。しかしながら、この変異では HR はプロトンポンプにならない⁵²。我々は最近、さらに 5 カ所の変異を追加した六重変異体を作製し HR のプロトンポンプ化を試みたが、それも成功していない (未発表)。HR はアジド (N_3^-) の存在下でプロトンを外向きにポンプすることは知られているが⁵²、変異によって HR をプロトンポンプに機能転換した例は未だにない。プロトンポンプからクロライドポンプをデザインすることは容易であったが、その逆はきわめて困難なのである。このような非対称な機能転換の原因は未だに不明であるが、我々は以下に示す水分子の水素結合解析をもとに新たな提案を行っている。その紹介に移る前に、BR と HR の機能転換に加えて、BR 内での 2 つのアスパラギン酸の非対称性にも触れておきたい (Figure 3)。非解離性残基を Asp85 と Asp212 の部位に導入するとポンプ活性は失われるが、D85T/S ではクロライド濃度が高い場合に内向きのクロライドポンプになることを紹介した。興味深いことに、D212N はクロライド濃度が高い場合、天然のポンプ活性 (外向きプロトンポンプ) が復活したのである⁵³。この事実は、レチナールのシッフ塩基から等距離に存在する Asp85 と Asp212 が非対称な役割を担っていることを示唆するとともに、ポンプの過程で Asp85 だけにプロトンが渡る事実に対して暗示的であるが、これについても赤外分光解析の結果をもとに考察を与えた。

3.3 赤外分光法を用いた水分子の構造解析

以上のように、われわれは BR から多くのことを学んできた。構造を知り、プロトンの輸送経路を知り、スイッチはどこにあるかを知った。スイッチ部分の構造で特に興味深いのは、プロトン供与体であるシッフ塩基 (N-H) は、受けとり手である Asp85 の方を向いている点である (Figure 3)。異性化のような「向きを変える反応」によってプロトン移動のパートナーが新たに向き合うのではなく、最初から向き合っているのである。なぜ、そのような構造から光を受けるとプロトン移動が可能になるのだろうか？ また、対称的な構造をもちながら、なぜプロトンは Asp212 ではなく Asp85 を選ぶのであろうか？

このような謎を解くためには、Figure 3 の活性中心に張り巡らされた水素結合ネットワークの変化を明らかにしなければならない。我々はそのため、光誘起赤外差スペクトル分光法を利用した研究を展開している⁵⁴。赤外分光法はもとも蛋白質の計測に相性が悪かった。それは蛋白質を包む環境としての水分子が大きな赤外吸収をもつため、蛋白質自身の信号がマスクされてしまうためである。このため、

高精度のフーリエ変換赤外 (FTIR) 分光器が開発されても、赤外線領域の豊かな振動情報は、水素結合ネットワークなど原子レベルでの構造解析のため有効に活用されていないのが現状である。しかしながら、BR などの光受容蛋白質は水和フィルム (乾燥フィルムを適度に湿らせたもの) で正常な光反応を示すことから、試料中の水分子の量をできるだけ減らして測定することができる。具体的に、BR 1 分子あたり 1000 個以下の水分子という条件においても、正常な反応が起こる。さらに、光誘起の差スペクトルとして変化成分だけを抽出することで詳細な構造変化を解析できることから、機能発現の過程で変化する水分子を研究することが可能になった。筆者は、1998 年に水分子の吸収が含まれる中赤外の全振動数領域 ($4000\text{--}800\text{ cm}^{-1}$) におけるスペクトル変化の測定を、生体分子として初めてバクテリオロドプシンに対して実現した (Figure 12)⁵⁵。

我々は特に水分子の解析に関しては重水中での測定を用いている^{56–58}。これは O-D 伸縮の方が ^{18}O による同位体シフトが大きいこと、重水素置換しない X-H 振動を分離できること、さらに BR は重水中で重水素をポンプすることからプロトンポンプに関与する水分子は重水素化されたと考えたためである。77 K での光誘起差スペクトルの $2800\text{--}2000\text{ cm}^{-1}$ に現れる信号を、 D_2O と D_2^{18}O で比較したところ、レチナールの光異性化反応に伴って、水分子に由来する 6 個の O-D 伸縮振動を観測した。気体中のように水素結合を形成しない水の O-D 伸縮振動は 2700 cm^{-1} 付近に現れる (対称および非対称伸縮)。一方、液体や蛋白質中といった凝縮系では水素結合の形成に伴って低い振動数に伸縮振動が現れるが、蛋白質の内部に結合した水分子には水素結合の自由度が限られている可能性がある⁵⁵。実験結果は 2690 cm^{-1} といった水素結合を形成しない領域の水に加えて、 2171 cm^{-1} というきわめて強い水素結合環境にある水分子を観測した。シッフ塩基近傍には負電荷が存在するのでこれらに水和した水分子と予想することができるが、量子化学計算の結果もそれを支持していた⁵⁹。我々はこれを実験的に確かめるために、十種類を超える系統的なアミノ酸変異を用いて水分子の振動バンドの帰属を試みた結果、Figure 13 に示すとおり、全ての O-D 伸縮振動はシッフ塩基近傍の 3 個の水分子に由来することがわかった^{60,61}。いずれの水分子も 2 つの伸縮振動数が大きく分離しており、シッフ塩基領域に結合した水の水素結合環境の特異性を示しているが、特に興味深いのは、シッフ塩基の水素結合アクセプターとなる水分子である。この水分子は、その振動数から Asp85 と強く相互作用する (2171 cm^{-1}) 一方、Asp212 との水素結合は弱い (2636 cm^{-1}) ことがわかった。対称的に見える構造の中で、水が非対称に水和していることが明らかになったのである。このことは、対称的な構造をもちながら、なぜプロトンが Asp212 ではなく Asp85 に移動するのかという問題について本質的であると考えられる。我々は、

Figure 12. Experimental set-up and typical data for light-induced difference FTIR spectroscopy at low temperatures. Here polarized measurement is applied to highly oriented BR molecules in the sample, which can determine the angle of dipole moments of vibrations to the membrane normal⁵⁵.

Figure 13. Schematic drawing of the assignment of the water molecules in the Schiff base region of BR. This figure is reproduced from Ref. 61.

実際にプロトン移動が起こる中間体に対する水分子の構造解析をもとに、この水分子の Asp85 から Asp212 への水分子のスイッチがプロトン移動の原因であるというメカニズムに関するモデルを提唱している⁶²。

このような赤外分光解析を BR の変異体や種々のロドプシンに対して行う中で、興味深い事実が明らかになってきた。すなわち、強い水素結合を形成した水分子がプロトンポンプ機能のあるロドプシンだけにあるらしいという経験則が得られたのである。これが何を意味するか不明であったが、この 10 年間、新たに発見されたロドプシンなどに対して精密な構造解析を次々に適用し、水分子の水素結合に関する情報を集めた。具体的には BR^{61,63} に加えて、新たに発見されたプロトンポンプである PR^{64,65}, GR⁶⁶, LR⁶⁷, 光センサーにも関わらず伝達蛋白質が存在しないとプロトンポンプとして機能する *SrSRI*⁶⁸, *pSRII*⁶⁹, 光センサーである ASR^{70, 71}, NR⁷² や視物質ロドプシンである bovine Rh²⁶, squid Rh⁷³, クロライドポンプである *sHR*⁷⁴, *pHR*⁷⁵, さらに

はクロライドポンプになった D85S(Cl)⁻BR⁷⁶, プロトンポンプとして機能する *pHR*(N₃)⁷⁷, D212N(Cl)⁻BR⁷⁸ などの測定を系統的に行ったのである。結果は驚くべきものだった。Figure 14 にはこれらの蛋白質において最も低波数側に現れた (= 水素結合の強い) 水分子の O-D 伸縮振動数を示したが、図において、紫がプロトンポンプ、緑がクロライドポンプ、赤がセンサー、灰色が機能をもたない蛋白質である。一見してわかるように、プロトンポンプ機能を有するロドプシンはすべて強い水素結合を形成した 2400 cm⁻¹ より低い振動数の水分子をもっていたのである。一方、クロライドポンプや光センサーとして機能する蛋白質に結合した水分子はそのような強い水素結合をもたないことがわかった。

なお、Figure 14 に示した水の信号の同定は決して容易ではないことを明記しておきたい。吸光度の変化としては 10⁻⁴ 程度 (サブミリ OD) かそれ以下に及ぶ場合もあり、そのスケールにおいて信頼できる計測を行うためには水以外の信号が D₂O と D₂¹⁸O で重なる必要がある。このため実験条件

Figure 14. In the light-induced difference FTIR spectra of various rhodopsins at 77 K, the lowest frequency among the observed water O-D stretching vibrations is plotted. Purple plots represent the results of proton pump, while red and green plots are those of sensor and chloride pump, respectively. The proteins of dark gray plots have no function. Light gray spectrum shows the water O-D stretching vibration, and only proton-pumping rhodopsins possess strongly hydrogen-bonded waters (O-D stretch at $< 2400\text{ cm}^{-1}$).

の最適化とデータの積算が欠かせないが、それに加えて赤外分光経験者であれば強い水素結合の水があるかどうかを判定する $2400\text{--}2300\text{ cm}^{-1}$ の領域には炭酸ガスの吸収があることに気が付かれるかもしれない。分光器内部は CO_2 を除去した乾燥空気でパージしているのだが、サブミリ OD 程度の変化を観測しようとする、実験室内だけでなく廊下を歩く人の有無で炭酸ガスの吸収が増減することがある。それでも軽水よりは重水の方が水の帰属がしやすいため O-D 伸縮振動を精査するわけだが、「勝負実験」をする神取研の学生さんはしばしば午前 2～3 時に測定をしていた。「草木も眠る丑三つ時」とはよく言ったものである。

さて、プロトンポンプ機能と強い水素結合を形成した水分子との間の正の相関はどのような意味をもつのだろうか？ 観測した水分子の位置を同定したのは現時点でも BR だけであり⁶¹、その意味では最も低波数に現れる水がどこに存在するのか、BR 以外のロドプシンについては不明である。しかしながら、構造変化が蛋白質全体に及んでいない 77 K での測定であることを考慮すると、低波数の水がシッフ塩基領域に存在すると考えるのは妥当であろう。特に、プロトンポンプ蛋白質の場合は明確な機能との相関が見られたため、水素結合の強い水が BR と同じ起源をもつという考察はきわめて妥当に思われる。BR の場合、最も強い水素結合を形成した水分子は、Figure 13 に示すように最初のプロトン移動のドナーとアクセプターを橋渡しした水であり⁶¹、おそらくプロトンポンプ活性をもったロドプシンは同様にイオン対を橋渡しする水に由来するのであろう。機能相関の意味について考えるとき、「レチナールの異性化反応によって低波数領域の水の振動はすべて高波数シフトする」という結果が重要である。この事実は、水の水素結合による自由エネルギーが異性化によって大きく減じることを意味しており、蛋白質中での光エネルギーの取り込み機構に関与しているらしいことがわかった。すなわち、ロドプシンなど光受容蛋白質にとって、吸収した光のエネル

ギーが緩和して熱に変換してしまっただけでは仕事をすることができないため、ピコ秒程度の時間領域で電子移動や異性化などの反応と共役して蛋白質内部にエネルギーを貯える必要がある^{1,2}。プロトンをポンプするロドプシンは水の強い水素結合を利用してシッフ塩基部位の構造を安定化するとともに、光異性化に伴って水素結合構造を不安定化することでエネルギー貯蔵に関わることが示唆されたのである。実際に Hayashi らの QM/MM 計算は BR における我々の振動スペクトルをよく再現するとともに、異性化反応によって初期中間体に取り込まれる全エネルギー 67 kJ/mol のうち 46 kJ/mol がシッフ塩基領域での水素結合の不安定化によるものであることを明らかにした⁷⁹。ロドプシンは蛋白質内部という限定された部分での異性化によりレチナールのねじれとして光エネルギーを貯えるとこれまで考えられてきた。これは視物質型ロドプシンにはよく当てはまる一方、微生物型ロドプシンのプロトンポンプには、水素結合相互作用の方が寄与が大きいことが明らかになったのである^{1,2}。

微生物型ロドプシンの起源はプロトンポンプであると考えられているが⁸⁰、だとすれば先祖型ロドプシンにも強い水素結合の水によるシッフ塩基部分の安定化機構が存在していたと推測される。一方、クロライドポンプや光センサーのためには水の強い水素結合は不要であるため、進化の過程で別の最適化構造を構築したのであろう。このような議論は天然の蛋白質だけでなく、非対称な機能転換を示す BR と HR の変異体に対しても適用することが可能である。微生物型ロドプシンは Figure 13 に示すように 2 つの正電荷と 2 つの負電荷から構成されるレチナールシッフ塩基領域の電気四重極構造が重要であると考えられるが、それは BR の Asp85 や Asp212 を変異により中性化すると機能がなくなるという事実がサポートしている⁵⁰。D85T/S がクロライドやプロマイドをポンプできるという事実は^{51,76}、活性中心であるシッフ塩基領域に電気四重極構造を形成することがハライドポンプにとって重要であり、結合さえすれ

Figure 15. (Left, Upper) X-ray structure of D85S(Br) BR. The D-to-S mutation at position 85 abolishes the proton-pumping function of BR, whereas halide binding results in conversion to an inward halide pump. (Left, Lower) The D-to-N mutation at position 212 abolishes the proton-pumping function of BR, whereas halide binding restores the proton-pumping activity. Although there is no X-ray structure for D212N(Cl⁻) BR, our FTIR study suggests that chloride does not bind to the acceptor position of the Schiff base. Instead, chloride-binding restores the hydrogen-bonding network containing a strongly hydrogen-bonded water that bridges the ion pair. (Right) Light-induced difference FTIR spectra of the wild-type (a) and D212N (b-e) at 2380–2020 cm⁻¹ and 77 K. Red and blue spectra correspond to the measurements in D₂O and D₂¹⁸O, respectively, and green tagged bands originate from O-D stretch of water. Strongly hydrogen-bonded water molecules (a) all disappear by mutation (b), whereas water bands newly appear by halide binding (c-e). This figure is modified from Ref. 78.

ばハライドポンプ機能が発現するようだ (Figure 15)。HR の場合における逆方向の変異 (*s*HR の T111D, *p*HR の T126D) がプロトンポンプにならない⁵² 理由は、水分子を含んだ水素結合構造の最適化が達成されていないからと解釈できる^{74,75}。実際に、プロトンポンプ機能をもたない *p*HR の T126D や六重変異体には強い水素結合を形成した水分子が存在しないことがわかっている (未発表)。このようにプロトンポンプのためには距離と方向に関わる水素結合のネットワークを最適化する必要があるようだ。

同様の議論はクロライドの結合により非対称な機能発現を示す BR の Asp85 と Asp212 の変異体に対してもあてはまる^{76,78}。BR に対する赤外分光解析によれば Schiff 塩基の水素結合アクセプターとなる水分子は、Asp85 と強く相互作用する一方、Asp212 との水素結合は弱い⁶¹、これらの変異体に対してハライドを加えると、水の水素結合アクセプターを失った Asp85 の変異体の場合、ハライドが Schiff 塩基と結合するのに対して⁷⁶、Asp212 の変異体では別の部位に結合して強い水素結合を形成した水が復活することがわかった⁷⁸。実際に Figure 15 に示したスペクトルは、D212N の変異により完全に消滅した水の信号がハライドの結合により <2,400 cm⁻¹ に新たに現れることを示している⁷⁸。同時にプロトンポンプ機能が復活することから、強い水素結合を形成した水分子の存在とプロトンポンプ機能との間

には強い相関があることがよくわかる。蛋白質全体と比較するとこのような水分子の結合部位はきわめて局所的であるが、その水素結合構造がプロトンポンプ機能を決めているらしい。

水分子は蛋白質の環境となって折り畳みやダイナミクスを制御するとともに、ときには蛋白質の内部に入って蛋白質の機能に直接的に関与する^{57,81}。このとき、集団的にはたらく水とは異なり、1 個 1 個の水の特殊なはたらきが重要な意味をもってくる。我々の一連の赤外分光解析により、ロドプシンという蛋白質に結合した内部結合水の特異なはたらきを明らかにすることができた。本稿では低温法を用いた水の赤外分光解析に絞って紹介したが、BR の内部結合水は室温での時間分解赤外分光解析によっても捉えることができる^{82,83}。位置情報を与える X 線結晶構造解析、遷移状態での水素結合変化を取り扱うことのできる理論計算と組み合わせることで、今後より明確に水分子のはたらきが解明されるものと期待される。また赤外分光法の発展という意味では、時間分解法による室温での水の解析に加えて、低温法と同位体標識を組み合わせたレチナルや蛋白質側の構造情報の解析⁸⁴⁻⁸⁹、全反射赤外分光法を用いた水溶液中での構造解析⁹⁰ などにより微生物型ロドプシンに対する理解が深まっていることを付記しておきたい。

4. おわりに

本稿では25年以上かけて繰り返しひろげてきたロドプシンに対する我々の分光学的挑戦を紹介した。私は大学院生から助手までは超高速分光法を、助手から現在に至るまでは赤外分光法を主要な実験手法として、一貫してロドプシンを対象とした研究を行ってきた。特に試料を含めた測定系を最適化することにより、他では得られないような構造機能相関に関わるデータを得ることを常に目指している。生体分子の構造解析を行う研究者の究極の目標は自らが得た構造情報により生物機能を説明することであるが、視物質型ロドプシンの熱雑音や微生物型ロドプシンのプロトンポンプ活性を決定する水分子の研究などはそれらに該当する研究例と言えるかもしれない。

また自分の研究室でロドプシン試料の調製を行うようになったため、試料の提供者としても、最先端の物理化学的解析を進めているグループとの共同研究も進みつつある。実際にHRの超高速分光^{91,92}、BRのピコ秒ラマン分光⁹³・高速原子間力顕微鏡観察^{94,95}・テラヘルツ分光⁹⁶などにより新しい知見が次々に生まれている。また変異蛋白質を自分たちのアイデアでデザインできるようになったため、BRをクロライドポンプに機能転換⁵¹させて以来となる新規機能の創成にも挑戦している。HRをプロトンポンプに機能転換する変異体作製は未だに成功していないが、2009年には光センサーであるASRに対する1アミノ酸の変異により世界で初めて内向きのプロトンポンプを創成することに成功した⁹⁷。また種々の微生物型ロドプシンに視物質ロドプシンの細胞質側ループを組み込むことで、光依存的にG蛋白質を活性化する微生物型ロドプシンの作製も試みている⁹⁸。私の夢はこのような研究により「ロドプシンを究める」ことであるが、しかし、ロドプシンという分子は深くて遠い。国内外の共同研究者や神取研のメンバーとともに、その謎に少しでも迫ることができたらと願っている。

筆者は京大・生物物理の吉澤透教授のもとでロドプシンと出会ったが、吉澤先生は今も私が最も尊敬し、敬愛する研究者である。超高速分光は、大学院生のとき吉澤研で七田芳則先生に指導を受けた。また博士研究員として分子研の吉原経太郎先生、理研の雀部博之先生のもとで実験をさせていただき、京大の助手となってからはレーザー総研の又賀昇先生と一緒に実験をさせていただいた。赤外分光に関しては、助手として京大・生物物理の前田章夫先生のもとで開始した。現在に至る私の研究はこれらの方々への導きによるものである。加えて本稿で紹介した筆者らの仕事は、引用文献中の原著論文に現れる多くの方々との共同研究の成果であり、心より感謝いたします。名工大での成果に関しては、初代の助教である古谷祐詞さん、私のもとで学位を取得した柴田幹大さん、川鍋陽さんら意欲あふれる神取研のメンバーに感謝します。

引用文献

- (1) Kandori, H. In *cis-trans Isomerization in Biochemistry*, Dugave, C., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2006; pp 53–75.

- (2) Kandori, H. In *Supramolecular Effects on Photochemical and Photophysical Processes*, Ramamurthy, V.; Inoue, Y., Eds.; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, 2011, pp 571–595.
- (3) Luecke, H.; Schobert, B.; Richter, H.-T.; Cartailier, J. P.; Lanyi, J. K. *J. Mol. Biol.* **1999**, *291*, 899–911.
- (4) Kolbe, M.; Besir, H.; Essen, L.-O.; Oesterhelt, D. *Science* **2000**, *288*, 1390–1396.
- (5) Luecke, H.; Schobert, B.; Lanyi, J. K.; Spudich, E. N.; Spudich, J. L. *Science* **2001**, *293*, 1499–1503.
- (6) Palczewski, K.; Kumasaka, T.; Hori, T.; Behnke, C. A.; Motoshima, H.; Fox, B. A.; Le Trong, I.; Teller, D. C.; Okada, T.; Stenkamp, R. E.; Yamamoto, M.; Miyano, M. *Science* **2000**, *289*, 739–745.
- (7) Andersen, L. H.; Nielsen, I. B.; Kristensen, M. B.; El Ghazaly, M. O. A.; Haacke, S.; Nielsen, M. B.; Petersen, M. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 12347–12350.
- (8) Furutani, Y.; Ido, K.; Sasaki, M.; Ogawa, M.; Kandori, H. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2007**, *46*, 8010–8012.
- (9) Kandori, H.; Mizukami, T.; Okada, T.; Imamoto, Y.; Fukada, Y.; Shichida, Y.; Yoshizawa, T. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1990**, *87*, 8908–8912.
- (10) Hirano, T.; Imai, H.; Kandori, H.; Shichida, Y. *Biochemistry* **2001**, *40*, 1385–1392.
- (11) Katayama, K.; Furutani, Y.; Imai, H.; Kandori, H. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2010**, *49*, 891–894.
- (12) Kakitani, H.; Kakitani, T.; Rodman, H.; Honig, B. *Photochem. Photobiol.* **1985**, *41*, 471–479.
- (13) Hasegawa, J. *Mol. Sci.* **2010**, *4*, A0031.
- (14) Yoshizawa, T.; Kandori, H. In *Progress in Retinal Research*, Osborne, N.; Chader, G., Eds.; Pergamon Press: Oxford, **1992**, pp 33–55.
- (15) 神取秀樹, 七田芳則, 化学総説 **2000**, *44*, 176–186.
- (16) Kandori, H.; Shichida, Y.; Yoshizawa, T. *Biochemistry (Moscow)* **2001**, *66*, 1197–1209.
- (17) 神取秀樹, レーザー研究 **2003**, *31*, 184–189.
- (18) Kandori, H.; Matuoka, S.; Shichida, Y.; Yoshizawa, T.; Ito, M.; Tsukida, K.; Balogh-Nair, V.; Nakanishi, K. *Biochemistry* **1989**, *28*, 6460–6467.
- (19) Kandori, H.; Furutani, Y.; Nishimura, S.; Shichida, Y.; Chosrowjan, H.; Shibata, Y.; Mataga, N. *Chem. Phys. Lett.* **2001**, *334*, 271–276.
- (20) Kandori, H.; Katsuta, Y.; Ito, M.; Sasabe, H. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, *117*, 2669–2670.
- (21) Wang, Q.; Schoenlein, R. W.; Peteanu, L. A.; Mathies, R. A.; Shank, C. V. *Science* **1994**, *266*, 422–424.
- (22) Polli, D.; Altoè, P.; Weingart, O.; Spillane, K. M.; Manzoni, C.; Brida, D.; Tomasello, G.; Orlandi, G.; Kukura, P.; Mathies, R. A.; Garavelli, M.; Cerullo, G. *Nature* **2010**, *467*, 440–443.
- (23) Shichida, Y.; Imai, H. *CMLS, Cell. Mol. Life Sci.* **1998**, *54*, 1299–1315.
- (24) Hofmann, K. P.; Scheerer, P.; Hildebrand, P. W.; Choe, H. W.; Park, J. H.; Heck, M.; Ernst, O. P. *Trends Biochem. Sci.* **2009**, *34*, 540–552.
- (25) Kandori, H.; Maeda, A. *Biochemistry* **1995**, *34*, 14220–14229.
- (26) Furutani, Y.; Shichida, Y.; Kandori, H. *Biochemistry* **2003**, *42*,

- 9619–9625.
- (27) Nishimura, S.; Sasaki, J.; Kandori, H.; Matsuda, T.; Fukada, Y.; Maeda, A. *Biochemistry* **1996**, *35*, 13267–13271.
  - (28) Katayama, K.; Furutani, Y.; Kandori, H. *J. Phys. Chem. B* **2010**, *114*, 9039–9046.
  - (29) Baylor, D. A.; Nunn, B. J.; Schnapf, J. L. *J. Physiol.* **1984**, *357*, 575–607.
  - (30) Lórenz-Fonfría, V. A.; Furutani, Y.; Ota, T.; Ido, K.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 5693–5703.
  - (31) Nagata, T.; Oura, T.; Terakita, A.; Kandori, H.; Shichida, Y. *J. Phys. Chem. A* **2002**, *106*, 1969–1975.
  - (32) Oesterhelt, D.; Stoekenius, W. *Nature New Biol.* **1971**, *233*, 149–152.
  - (33) Matsuno-Yagi, A.; Mukohata, Y. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **1977**, *78*, 237–243.
  - (34) Bogomolni, R. A.; Spudich, J. L. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1982**, *79*, 6250–6254.
  - (35) Takahashi, T.; Tomioka, H.; Kamo, N.; Kobatake, Y. *FEMS Microbiol. Lett.* **1985**, *28*, 161–164.
  - (36) Venter, J. C.; Remington, K.; Heidelberg, J. F.; Halpern, A. L.; Rusch, D.; Eisen, J. A.; Wu, D.; Paulsen, I.; Nelson, K. E.; Nelson, W.; Fouts, D. E.; Levy, S.; Knap, A. H.; Lomas, M. W.; Nealson, K.; White, O.; Peterson, J.; Hoffman, J.; Parsons, R.; Baden-Tillson, H.; Pfannkoch, C.; Rogers, Y. H.; Smith, H. O. *Science* **2004**, *304*, 66–74.
  - (37) Béjà, O.; Aravind, L.; Koonin, E. V.; Suzuki, M. T.; Hadd, A.; Nguyen, L. P.; Jovanovich, S. B.; Gates, C. M.; Feldman, R. A.; Spudich, J. L.; Spudich, E. N.; DeLong, E. F. *Science* **2000**, *289*, 1902–1906.
  - (38) Fuhrman, J. A.; Schwalbach, M. S.; Stingl, U. *Nature Rev. Microbiol.* **2008**, *6*, 488–494.
  - (39) Jung, K. H.; Trivedi, V. D.; Spudich, J. L. *Mol. Microbiol.* **2003**, *47*, 1513–1522.
  - (40) Kawanabe, A.; Furutani, Y.; Jung, K. H.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 8644–8649.
  - (41) Vogeley, L.; Sineschekov, O. A.; Trivedi, V. D.; Sasaki, J.; Spudich, J. L.; Luecke, H. *Science* **2004**, *306*, 1390–1393.
  - (42) Nagel, G.; Ollig, D.; Fuhrmann, M.; Kateriya, S.; Musti, A. M.; Bamberg, E.; Hegemann, P. *Science* **2002**, *296*, 2395–2398.
  - (43) Boyden, E. S.; Zhang, F.; Bamberg, E.; Nagel, G.; Deisseroth, K. *Nature Neurosci.* **2005**, *8*, 1263–1268.
  - (44) Deisseroth, K. *Nature Methods* **2011**, *8*, 26–29.
  - (45) Zhang, F.; Wang, L. P.; Brauner, M.; Liewald, J. F.; Kay, K.; Watzke, N.; Wood, P. G.; Bamberg, E.; Nagel, G.; Gottschalk, A.; Deisseroth, K. *Nature* **2007**, *446*, 633–639.
  - (46) Chow, B. Y.; Han, X.; Dobry, A. S.; Qian, X.; Chuong, A. S.; Li, M.; Henninger, M. A.; Belfort, G. M.; Lin, Y.; Monahan, P. E.; Boyden, E. S. *Nature* **2010**, *463*, 98–102.
  - (47) 山崎洋一, 神取秀樹, ニューバイオフィジックス第3巻 ポンプとトランスポーター ; 共立出版 : 東京, **1999**, pp 109–123.
  - (48) 神取秀樹, バイオサイエンスの新世紀第7巻 生体膜のエネルギー装置 ; 共立出版 : 東京, **2000**, pp 194–206.
  - (49) 神取秀樹, 日本物理学会誌 **2001**, *56*, 75–82.
  - (50) Mogi, T.; Stern, L. J.; Marti, T.; Chao, B. H.; Khorana, H. G. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1988**, *85*, 4148–4152.
  - (51) Sasaki, J.; Brown, L. S.; Chon, Y.-S.; Kandori, H.; Maeda, A.; Needleman, R.; Lanyi, J. K. *Science* **1995**, *269*, 73–75.
  - (52) Váró, G.; Brown, L. S.; Needleman, R.; Lanyi, J. K. *Biochemistry* **1996**, *35*, 6604–6611.
  - (53) Moltke, S.; Krebs, M. P.; Mollaaghababa, R.; Khorana, H. G.; Heyn, M. P. *Biophys. J.* **1995**, *69*, 2074–2083.
  - (54) 古谷祐詞, 神取秀樹, 蛋白質科学会アーカイブズ **2008**, #036.
  - (55) Kandori, H.; Kinoshita, N.; Shichida, Y.; Maeda, A. *J. Phys. Chem. B* **1998**, *102*, 7899–7905.
  - (56) Kandori, H.; Shichida, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 11745–11746.
  - (57) Kandori, H. *Biochim. Biophys. Acta* **2000**, *1460*, 177–191.
  - (58) Kandori, H. *Biochim. Biophys. Acta* **2004**, *1658*, 72–79.
  - (59) Hayashi, S.; Ohmine, I. *J. Phys. Chem. B* **2000**, *104*, 10678–10691.
  - (60) Shibata, M.; Tanimoto, T.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 13312–13313.
  - (61) Shibata, M.; Kandori, H. *Biochemistry* **2005**, *44*, 7406–7413.
  - (62) Tanimoto, T.; Furutani, Y.; Kandori, H. *Biochemistry* **2003**, *42*, 2300–2306.
  - (63) Mizuide, N.; Shibata, M.; Friedman, N.; Sheves, M.; Belenky, M.; Herzfeld, J.; Kandori, H. *Biochemistry* **2006**, *45*, 10674–10681.
  - (64) Furutani, Y.; Ikeda, D.; Shibata, M.; Kandori, H. *Chem. Phys.* **2006**, *324*, 705–708.
  - (65) Ikeda, D.; Furutani, Y.; Kandori, H. *Biochemistry* **2007**, *46*, 5365–5373.
  - (66) Hashimoto, K.; Choi, A. R.; Furutani, Y.; Jung, K.-H.; Kandori, H. *Biochemistry* **2010**, *49*, 3343–3350.
  - (67) Sumii, M.; Furutani, Y.; Waschuk, S. A.; Brown, L. S.; Kandori, H. *Biochemistry* **2005**, *44*, 15159–15166.
  - (68) Suzuki, D.; Sudo, Y.; Furutani, Y.; Takahashi, H.; Homma, M.; Kandori, H. *Biochemistry* **2008**, *47*, 12750–12759.
  - (69) Kandori, H.; Furutani, Y.; Shimono, K.; Shichida, Y.; Kamo, N. *Biochemistry* **2001**, *40*, 15693–15698.
  - (70) Furutani, Y.; Kawanabe, A.; Jung, K. H.; Kandori, H. *Biochemistry* **2005**, *44*, 12287–12296.
  - (71) Kawanabe, A.; Furutani, Y.; Jung, K.-H.; Kandori, H. *Biochemistry* **2006**, *45*, 4362–4370.
  - (72) Furutani, Y.; Bezerra Jr, A. G.; Waschuk, S.; Sumii, M.; Brown, L. S.; Kandori, H. *Biochemistry* **2004**, *43*, 9636–9646.
  - (73) Ota, T.; Furutani, Y.; Terakita, A.; Shichida, Y.; Kandori, H. *Biochemistry* **2006**, *45*, 2845–2851.
  - (74) Shibata, M.; Muneda, N.; Ihara, K.; Sasaki, T.; Demura, M.; Kandori, H. *Chem. Phys. Lett.* **2004**, *392*, 330–333.
  - (75) Shibata, M.; Muneda, N.; Sasaki, T.; Shimono, K.; Kamo, N.; Demura, M.; Kandori, H. *Biochemistry* **2005**, *44*, 12279–12286.
  - (76) Shibata, M.; Ihara, K.; Kandori, H. *Biochemistry* **2006**, *45*, 10633–10640.
  - (77) Muneda, N.; Shibata, M.; Demura, M.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 6294–6295.
  - (78) Shibata, M.; Yoshitsugu, M.; Mizuide, N.; Ihara, K.; Kandori, H. *Biochemistry* **2007**, *46*, 7525–7535.
  - (79) Hayashi, S.; Tajkhorshid, E.; Kandori, H.; Schulten, K. *J. Am.*

- Chem. Soc.* **2004**, *126*, 10516–10517.
- (80) Sharma, A. K.; Spudich, J. L.; Doolittle, W. F. *Trends. Microbiol.* **2006**, *14*, 463–469.
- (81) 神取秀樹, 現代化学 **2005**, *414*, 51–57.
- (82) Lórenz-Fonfría, V. A.; Furutani, Y.; Kandori, H. *Biochemistry* **2008**, *47*, 4071–4081.
- (83) Lórenz-Fonfría, V. A.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 5891–5901.
- (84) Kandori, H.; Kinoshita, N.; Yamazaki, Y.; Maeda, A.; Shichida, Y.; Needleman, R.; Lanyi, J. K.; Bizounok, M.; Herzfeld, J.; Raap, J.; Lugtenburg, J. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **2000**, *97*, 4643–4648.
- (85) Kandori, H.; Yamazaki, Y.; Shichida, Y.; Raap, J.; Lugtenburg, J.; Belenky, M.; Herzfeld, J. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **2001**, *98*, 1571–1576.
- (86) Kandori, H.; Belenky, M.; Herzfeld, J. *Biochemistry* **2002**, *41*, 6026–6031.
- (87) Tanimoto, T.; Shibata, M.; Belenky, M.; Herzfeld, J.; Kandori, H. *Biochemistry* **2004**, *43*, 9439–9447.
- (88) Sudo, Y.; Furutani, Y.; Wada, A.; Ito, M.; Kamo, N.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 16036–16037.
- (89) Ito, M.; Sudo, Y.; Furutani, Y.; Okitsu, T.; Wada, A.; Homma, M.; Spudich, J. L.; Kandori, H. *Biochemistry* **2008**, *47*, 6208–6215.
- (90) Kitade, Y.; Furutani, Y.; Kamo, N.; Kandori, H. *Biochemistry* **2009**, *48*, 1595–1603.
- (91) Nakamura, T.; Takeuchi, S.; Shibata, M.; Demura, M.; Kandori, H.; Tahara, T. *J. Phys. Chem B* **2008**, *112*, 12795–12800.
- (92) Nakashima, K.; Nakamura, T.; Takeuchi, S.; Shibata, M.; Demura, M.; Tahara, T.; Kandori, H. *J. Phys. Chem. B* **2009**, *113*, 8429–8434.
- (93) Mizuno, M.; Shibata, M.; Yamada, J.; Kandori, H.; Mizutani, Y. *J. Phys. Chem. B* **2009**, *113*, 12121–12128.
- (94) Shibata, M.; Yamashita, H.; Uchihashi, T.; Kandori, H.; Ando, T. *Nature Nanotech.* **2010**, *5*, 208–212.
- (95) Shibata, M.; Uchihashi, T.; Yamashita, H.; Kandori, H.; Ando, T. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, *50*, 4410–4413.
- (96) Kawaguchi, S.; Kambara, O.; Shibata, M.; Kandori, H.; Tominaga, K. *Phys Chem Chem Phys.* **2010**, *12*, 10255–10262.
- (97) Kawanabe, A.; Furutani, Y.; Jung, K. H.; Kandori, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 16439–16444.
- (98) Nakatsuma, A.; Yamashita, T.; Sasaki, K.; Kawanabe, A.; Inoue, K.; Furutani, Y.; Shichida, Y.; Kandori, H. *Biophys. J.* **2011**, *100*, 1874–1882.
- (99) Furutani, Y.; Shibata, M.; Kandori, H. *Photochem. Photobiol. Sci.* **2005**, *4*, 661–666.

(受理日 2011年3月9日)

神取 秀樹 (かんどり ひでき)

所属：名古屋工業大学大学院工学研究科未来材料創成工学専攻 教授

専門分野：生物物理化学, 生体分子光科学

連絡先：〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町

電子メール：kandori@nitech.ac.jp

研究室 URL：http://www.ach.nitech.ac.jp/~physchem/kandori/index_j.html