飼料から分離した *Fusarium* 代謝産物の遺伝毒性

荒川京子¹, 田中憲穂², 高鳥浩介³, 澤田拓士⁴

¹ 国立感染症研究所寄生動物部 (162-8640 東京都新宿区戸山 1-23-1)

² 食品薬品安全センター秦野研究所遺伝毒性部 (257-8523 神奈川県秦野市落合 729-5)

³ 国立食品医薬品衛生研究所衛生微生物部 (158-8501 東京都世田谷区上用賀 1-18-1)

⁴ 日本獣医生命科学大学獣医学部獣医微生物学教室 (180-8602 東京都武蔵野市境南町 1-7-1)

要 旨

飼料から分離した 8 種 53 株の *Fusarium* の培養抽出物について, *Salmonella* を用いた変異原性試験を実施したところ, 5 種 13 株の培養物から強い変異原性を検出した. これらは同一物質と推定されたので, 特に強い変異原性を示した菌株について, さらにヒト末梢血リンパ球を用いる染色体異常試験と, マウスを用いる優性致死試験を実施した. その結果, ヒト末梢血リンパ球に対しては染色分体型の異常を誘発し, マウスに対しては後期精子細胞から成熟精子の時期に優性致死を誘発することが確認され, *Fusarium* 培養物中に含まれる物質はヒトならびに哺乳動物に対して遺伝毒性を誘発する可能性が示唆された.

キーワード: *Fusarium*, *Salmonella*, 変異原性, Ames テスト, 染色体異常, 優性致死

(Received: November 10, 2005, Accepted: April 18, 2006)

緒 言

Fusarium 属は多種多様なマイコトキシンを産生することで知られており, その毒性発現についても多様性を示している¹⁻⁶⁾. 著者らは家畜の飼料から分離した *Fusarium* についてウサギの皮膚刺激試験によりマイコトキシン産生性を調べ, 既知の *Fusarium* マイコトキシンのほかに, 強い皮膚刺激性を示す未知のマイコトキシンを検出したが⁷⁾, このことから特定されていないマイコトキシンがまだ多く存在する可能性が示唆された. そこで, これまでに著者らが分離同定した *Fusarium* について, 穀物を基質として培養した培養抽出物を調製し *Salmonella* を用いる変異原性試験により遺伝毒性の有無を検討した. *Salmonella* 検定菌に対してもっとも強い変異原性を示した培養抽出物については, さらにヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験により, 染色体異常誘発性の確認を試みた. また, マウスを用いた優性致死試験^{8,9)}を実施して優性致死の誘発性を検討した. 優性致死とは, 哺乳動物の配偶子すなわち精子または卵子の何れかに染色体異常などの遺伝的变化が生じた場合, その配偶子と受精したヘテロ接合型の受精卵が, 胎仔へと発生する過程で死んでしまう現象 (優性致死突然変異) を言う. 体細胞を用いる染色体異常試験は発ガン物質の検出を主たる目的とするのに対し, 優性致死試験は配偶子に生じた染色体異常を *in vivo* の系で検出することのできる遺伝毒性試験である. これらの試験の結果から, 今回新たに検出された *Fusarium* 由来の変異原性物質について, ヒトならびに哺乳動物に対する遺伝的影響について考察をおこなった.

実験方法

供試真菌 家畜飼料から分離した⁷⁾ *Fusarium graminearum* 25 株, *F. nivale* 7 株, *F. tricinctum* 3 株, *F. semitectum* 1 株, *F. oxysporum* 1 株, *F. sporotrichioides* 1 株, *F. poae* 1 株, *Fusarium* spp. 14 株の合計 53 株の *Fusarium* 株を用いた。各菌株の粗抽出液の調製は、以下の通りである。すなわち、エンバク 10 g と蒸留水 15 ml を 100 ml の容量のモルトン栓付き三角コルベンに入れて高圧蒸気滅菌したのち、供試真菌の孢子浮遊液を適量加え、12 で 14 ~ 21 日間培養したものを 1,2-dichloroethane で抽出し、その抽出液を濃縮して粗抽出液とした。

さらに *Salmonella* を用いる変異原性試験においてもっとも強い変異原性を示した *F. graminearum* TF-39 株 (以下 TF-39 株) については、白米 100 g を基質として培養し、下記の手順により調製した抽出物 (以下 *Fusarium* 代謝物) を平板混入試験、染色体異常試験ならびに優性致死試験に用いた。培養、抽出の操作手順は以下によった。すなわち、白米 100 g を水に浸潤させたのち 500 ml の容量のモルトン栓付き角型コルベンに入れて高圧蒸気滅菌したのち、供試真菌の孢子浮遊液を適量加え、25 で 10 日間培養したものを 1,2-dichloroethane で抽出した。抽出液を濃縮して n-hexane : 蒸留水 (1:1) を 100 ml 加えて振盪し、得られた水層に酢酸エチルを加えて振盪し、有機層に得られた抽出物を減圧濃縮した。得られた濃縮物を Celite カラムクロマトグラフィーによりクロロホルム : n-hexane : メタノール : 水 (15 : 60 : 28 : 12) で展開し、濃縮物がカラムの先端に達した時点から抽出溶媒を 1,2-dichloroethane に交換した。フラクションコレクターで分取した分画から、下記に述べるスポットテストで変異原性陽性となった画分のみ集めて減圧濃縮し、*Fusarium* 代謝物とした。

***Salmonella* を用いる変異原性試験** B.N. Ames から分与を受けた *Salmonella typhimurium* TA98 および TA100 を検定菌として用い、Ames らの方法¹⁰⁾ に若干の改良を加えたスポットテストと平板混入試験を行った。スポットテストは、直径 90mm のシャーレに最少寒天培地を流し固めた上に各々の検定菌液を流し広げ、シャーレの中央部に直径 8 mm の円形濾紙を置いて dimethylsulfoxide (DMSO) で 5 mg/ml になるよう希釈した粗抽出物を滴下し、37 で 48 時間培養して濾紙の周囲にリング状に出現した変異コロニー数を対照群と比較して判定した。TF 39 株の培養抽出物である *Fusarium* 代謝物については以下に述べる平板混入試験を行った。*Fusarium* 代謝物と検定菌液およびラット肝由来のマイクロソーム (S9) を混和して最少寒天培地に流し固めた S9 添加群と、S9 を加えずに *Fusarium* 代謝物と検定菌液のみを混合して最少寒天培地に流し固めた S9 無添加群をとり、37 で 48 時間培養したのち出現した変異コロニー数を算定した。

薄層クロマトグラフィー (TLC) 変異原性試験 Kieselgel G プレート を 1 × 20 cm に裁断してスポットテストで陽性結果の得られた粗抽出物を各々 1 µl スポットし、ベンゼン : アセトン (3 : 2) で展開した。TLC プレート上の変異原の位置を調べるために、最少寒天培地上に TA100 の検定菌液を均一に流した角型シャーレ (10 × 20 cm) 上にシリカゲル面を下にして TLC プレートをのせ、37 で 2 日間培養して、変異コロニーが出現したバンドの位置を確認した。標準マイコトキシンとして zearalenone (Sigma) ならびに trichotecene 系マイコトキシンである T-2 toxin, nivaleenol, neosolaniol, diacetoxyscirpenol, fusarenon-X, deoxynivalenol (いずれも Sigma) を用いた。

染色体異常試験 ヒトの静脈血を採取し、常法に従って¹¹⁾ 白血球層を分離し、培養シャーレに 3×10^4 細胞 / ml となるよう播種した。*Fusarium* 代謝物は DMSO で希釈し、希釈液は各プレートあたり 0.5 % となるよう添加した。試験に用いた *Fusarium* 代謝物の処理濃度は予備試験において細胞毒性を示した濃度を規準に、16 ng/ml, 53 ng/ml, 160 ng/ml, 530 ng/ml の 4 用量を設定した。

各用量について培養プレートは2枚とした。陰性対照群には等量のDMSOを加えた。被験物質の処理時間は4時間とし、処理後被験物質を取り除いて新しいHanks培養液を加え、37℃で48時間培養を行った。培養終了後、常法にしたがって¹¹⁾染色体標本を作製し、ギムザ染色を行った。顕微鏡下で観察可能な分裂中期像を有するリンパ球細胞を、各用量につき100個観察し、染色体異常を有する細胞数を算定した。構造異常はギャップ、切断、fragment、その他の異常、の4種に分類し記録した。

優性致死試験 試験に用いるマウスには、排卵数が多くかつその数に個体差が少ないことが求められることから、この条件を満たす近交系F1雑種であるBDF1(C57BL/6xDBA/2)の9週令の雌雄マウス(SLC)を用いた。*Fusarium*代謝物は1%カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC-Na, 和光純薬工業株)溶液にて2 mg/mlおよび5 mg/mlとなるよう懸濁液を調製し、40 mg/kgと100 mg/kgの2用量を設定して、1群あたり20頭の雄マウス(体重約25 g)に各々の調製液0.5 mlを5日間連続経口投与した。溶媒対照群には1%CMC-Na溶液の0.5 mlを処理群と同一要領で投与した。陽性対照群として20頭の雄マウスに、オリーブオイルに溶解した7,12-dimethylbenz(a)anthracene(DMBA, Eastman Kodak, U.S.A.)を500 mg/kgとなるよう1回経口投与した。DMBA群への投与は*Fusarium*代謝物の5回目の投与時にあわせて行った。

投与後、各々の雄マウスに未交配の雌マウスを4日間同居させて交配させ、最終投与日を0日として37日目までこれを繰り返した。交配を確認した雌マウスは交配後13日目に、子宮内胎仔の観察を行い1)胎盤数、2)生存胎仔数、3)死亡胎仔数を記録し、精子形成過程の各ステージについて得られた値の平均値と溶媒対照群についてDunnett法により統計分析を行った。上記3項目の何れかについて対照群との間に危険率5%($p < 0.05$)で有意差が認められ、かつ優性致死率を下記の数式に従って算出し、その値が20%を超える場合は⁹⁾その週に該当する精子形成のステージで優性致死が誘発されたものと判定した。

$$\text{優性致死率(\%)} = \left(1 - \frac{\text{処理群の生存胎仔数}}{\text{溶媒対照群の生存胎仔数}} \right) \times 100$$

結 果

Salmonella を用いる変異原性試験 スポットテストにおいて、53株の*Fusarium*粗抽出物のうち、13株の粗抽出物が、TA100株のS9添加群において変異原性を示した。内訳は*F. graminearum* 25株のうち7株、*F. nivale*は7株中2株、*F. tricinctum*は3株中2株、*F. semitectum*は1株中1株、*F. oxysporum*は1株中1株、に変異原性が認められたが、*F. sporotrichioides*、*F. poae*、*F. spp.*は陰性であった。TA100に対して強い変異原性を示した粗抽出物は4株を除いてTA98に対しても変異原性を示した(Table 1)。変異原性陽性となった13株の*Fusarium*の中で最も強い変異原性を示したTF-39株について白米を基質として培養した*Fusarium*代謝物を調製し、TA100を用いたS9添加平板混入法を実施したところ、最大値として約6,000の変異コロニーが計測された(Fig. 1)。

TLCおよびTLC変異原性試験においては、いずれの*Fusarium*粗抽出物も変異原の存在するバンドのRf値(Rate of flow)は0.30～0.35の範囲内にあり、365nm光下で蛍光を持たなかった。また7種の標準マイコトキシンを同一条件で展開したが、いずれも*Fusarium*粗抽出物の変異原性を示したバンドに相当するRf値を示すものではなく、*Salmonella*に対して変異原性を示すものもなかった。

染色体異常試験 *Fusarium*代謝物を16 ng/mlから530 ng/mlまでの4用量で処理した細胞は、

Table 1 Results of spot test on *Fusarium* extracts

Species	Strain No.	TA100		TA98	
		- S•9	+ S•9	- S•9	+ S•9
<i>F. graminearum</i>	TF-18		+		+
<i>F. graminearum</i>	TF-37	++	++		++
<i>F. graminearum</i>	TF-39	++	++	+	++
<i>F. graminearum</i>	TF-43		+		
<i>F. graminearum</i>	TF-48		+		+
<i>F. graminearum</i>	TF-50	++	++	+	+
<i>F. graminearum</i>	TF-53	++	++		
<i>F. tricinctum</i>	TF-24	++	++		++
<i>F. tricinctum</i>	TF-26	++	++		++
<i>F. nivale</i>	TF- 1		+		
<i>F. nivale</i>	TF- 2	+	++		
<i>F. semitectum</i>	TF-45	++	++		+
<i>F. oxysporum</i>	TF-22	+	++		++

+: twice or more of negative control value, ++: 1000 or more of induced revertants.

Fig. 1. Detection of mutagenic activity of *Fusarium graminearum* extract on *Salmonella typhimurium* TA100. : with metabolic activation (+ S•9), : without metabolic activation (- S•9)

用量に依存して細胞分裂像の観察できる細胞の割合（分裂指数：Mitotic index）が低下し，最高用量である 530 ng/ml では分裂像を得ることができなかった（Table 2）．染色体異常は低用量の 53 ng/ml から出現が認められ，観察された染色体異常は切断が 3,160 ng/ml の用量ではギャップと切断が各々 5 と 13 であった．なお，いずれの用量においても染色体の異数性，倍数性などの数的誘発は認められなかった．

優性致死試験 結果を Table 3 に示した．*Fusarium* 代謝物の投与量を 40 mg/kg と 100 mg/kg の 2 用量に設定して試験を行ったところ，100 mg/kg 投与群において投与後 6 - 9 日（1 週目）のステージで着床数と生存胎仔数が対照群に比べて有意（ $p < 0.05$ ）に減少した．また優性致死率も 100 mg/ml 投与群では 21.71 % を示し，陽性判定基準である優性致死率 20 % 値を上回った．しかし，投与後 19 - 22 日（3 週目）のステージおよび 34 - 37 日（5 週目）のステージではいずれの投

Table 2 Chromosome aberrations in human lymphocytes treated with *Fusarium graminearum* extract

Concentration (ng/ml)	Number of cells analyzed	Cells with aberrations (%)	Types and number of aberrations observed				Mitotic index (%)
			gap	break	fragment	other	
0	100	2			1	1	12.2
16	100	2	1	1			8.8
53	100	4	1	3		1	5.2
160	100	19	5	13			3.9
530	No mitosis						0.0

Table 3 Dominant lethal test with *Fusarium graminearum* extract to male mice

Mating period (day)	Dose (mg/kg)	No. of pregnant females / No. of females mated	Corpora lutea	Implants	Living implants	Dominant lethality (%) ^a
			per pregnant female (Mean ± S.D.)			
6-9	0	17/20	10.88 ± 1.11	10.71 ± 1.10	10.41 ± 1.28	-
	40	13/14	10.08 ± 1.12	8.77 ± 3.27	8.62 ± 3.20	17.20
	100	13/18	10.46 ± 1.76	8.54 ± 3.91 ^b	8.15 ± 4.14 ^b	21.71
	DMBA 250	19/24	9.76 ± 1.06	8.21 ± 2.18 ^c	6.84 ± 2.54 ^c	34.29
19-22	0	19/20	10.16 ± 1.01	10.11 ± 0.99	9.63 ± 1.16	-
	40	12/14	9.83 ± 1.27	9.25 ± 1.29 ^b	9.00 ± 1.65	6.54
	100	12/18	10.83 ± 1.34	10.58 ± 1.31	10.00 ± 1.35	-3.84
	DMBA 250	19/24	10.26 ± 1.05	9.89 ± 1.41	9.42 ± 1.64	2.18
34-37	0	14/20	10.93 ± 0.92	10.36 ± 1.60	10.00 ± 1.84	-
	40	13/14	10.54 ± 1.20	9.23 ± 2.13	8.85 ± 2.38	11.50
	100	16/18	10.19 ± 0.83	9.63 ± 2.22	9.25 ± 2.14	7.50
	DMBA 250	21/24	10.33 ± 1.39	9.62 ± 2.27	8.62 ± 2.22	13.80

a: Dominant lethality (%) = $1 - \frac{\text{Living implants in treated group}}{\text{Living implants in control group}} \times 100$

b and c: Significantly different from control at $p < 0.05$ and $p < 0.01$, respectively

与群も対照群との有意差は認められなかった。一方、陽性対照として用いた DMBA は、投与後 6 - 9 日（1 週目）のステージでのみ着床数と生存胎仔数が対照群に対して有意（ $p < 0.01$ ）に減少し、優性致死率も 34.29 % と高い数値を示した。

考 察

Fusarium は、多種多様なマイコトキシンを産生することが知られており、またこれらによる中毒性疾患の発生件数も多く、マイコトキシン産生真菌として重要視されている。今回、*Salmonella* を用いる変異原性試験により 53 株中 13 株の *Fusarium* の培養粗抽出物から変異原性物質が検出され、いずれも検定菌である TA100 株に対して強い変異原性を示したことから、これら粗抽出物に存在する変異原性物質は主として塩基置換型の変異を誘発し、哺乳動物の代謝系によって変異活性が高くなることが示された。TLC 変異原性試験の結果から、13 株の粗抽出物から検出された変異原性物質

はいずれも同一物質あるいは類似物質と考えられ、また供試菌株総数の約 25 % に検出されたことから *Fusarium* 属においては特殊な代謝物ではないと推測された。しかし、これまで *Fusarium* からは様々な化学構造をもつマイコトキシンが検出されているが、*Fusarium* 由来の既知物質において *S. typhimurium* を用いる試験系で変異原性を示したものは知られていない¹²⁻¹⁴⁾。一方、1988 年に *F. moniliforme* (別名: *F. verticilloides*) から新たなマイコトキシンとして fumonisin が分離されたが¹⁵⁾、これはウマの白質脳軟化症¹⁶⁾、ブタの肺水腫¹⁷⁾を誘発するほか、肝細胞に対して発ガンプロモーター¹⁵⁾として肝ガンを誘発することが報告される¹⁸⁾など強い遺伝子障害性をもつことから、著者らが検出した変異原性マイコトキシンは fumonisin と推測された。しかし、fumonisin はラット肝細胞を用いる染色体異常試験、ならびに *in vivo* 小核試験など真核生物体細胞を対象とした試験では陽性を示したが¹⁹⁾、*Salmonella* を用いる変異原性試験ではいずれも陰性^{19, 20)}となっている。また、fumonisin はおもに南アフリカ、アフリカ東部、中国、USA、イタリア北部で検出¹⁸⁾され、その後 Rheeder²¹⁾によって fumonisin 産生株が詳細に調べられているが、その産生菌は主に *F. moniliforme* とされ、今回変異原性マイコトキシンの産生が認められた *F. graminearum*, *F. tricinctum*, *F. nivale*, *F. semitectum* 等からの産生は確認されていない。したがって、今回 *Fusarium* から検出された変異原性物質は fumonisin には該当しないと考えられた。一方、*Salmonella* に対して変異原性を有する既知のマイコトキシンとして aflatoxin や sterigmatocystin 等があるが、これらのマイコトキシンが *Fusarium* から検出されたという報告はなく、また TLC の結果からも、今回検出した変異原には該当しなかった。したがって、今回 *Fusarium* 粗抽出物から検出された変異原性マイコトキシンは既知の物質ではないと推測された。

この *Fusarium* 代謝物は *Salmonella* に対して強い変異原性を示したが、*Salmonella* を用いる変異原性試験の結果は必ずしもヒトをはじめとする哺乳動物に対する毒性を反映するものではない。そこで、ヒト末梢血リンパ球を用いる染色体異常を実施し、ヒトに対する影響を確認したところ強い細胞分裂阻害作用を示し、かつ染色体異常を誘発した。*Fusarium* 代謝物が示したこの強い毒性は *Streptomyces caespitosus* の二次代謝物であり制ガン剤と知られているマイトマイシン (MC) に匹敵するものであるが、MC の場合も DNA 合成を阻止し、DNA にクロスリンクすることにより染色体異常を生じる。またアルキル化剤等の化学物質によって誘発される染色体異常はその大部分が染色分体型の異常であるが、*Fusarium* 代謝物によって誘発されたギャップ、切断も、染色分体型の異常であった。以上のことから *Fusarium* 代謝物はヒトの体細胞の DNA に対しても障害性を有することが示された。

さらに、哺乳動物に対する遺伝毒性を確認するためにマウスを用いる優性致死試験を実施した。優性致死性の検出には、雄に被験物質を投与したのち無処理の雌と交配させ、妊娠雌について子宮内の死胚や未着床数の増加を観察する方法が取られる。雄の精巣内では精原細胞、精母細胞、精子細胞を経て精子にいたる精子形成過程が一定の速度で継続して維持されているので、被験物質を 1 回投与した後、1 週間以内の交配で受精に関与する精子は精巣上体あるいは精管内で精子として被験物質に暴露したものであり、また 4 週後の交配時の受精に関与する精子は第二精母細胞期に被験物質に暴露したものと推定できる。また物質によって作用する精子形成期が異なるため、精子から精原細胞までの全ステージに対する作用を捕捉できるよう、被験物質投与直後から 5 ~ 6 週までの期間で交配を行うという方法がとられている。今回、*Fusarium* 代謝物による精子形成期の作用ステージは投与後 1 週目にあったことから、この物質はマウスの後期精子細胞 (late spermatids) 以降の DNA に対して遺伝毒性を示すものと推測された。この後期精子細胞から成熟精子の時期に作用して高率に優性致死を誘発する物質として DMBA や methyl methanesulfonate,

ethyl methansulfonate に代表されるアルキル化剤が知られている^{22, 23)}。この時期の細胞は、核内 DNA と結合している塩基性タンパク質がヒストンからプロタミンへと置き換わる時期であり、また DNA 修復能が発現しない。そのため、これらのアルキル化剤によってプロタミンに含まれる SH 基含有アミノ酸領域の DNA 切断が生じるが、それが修復されないために、高頻度に優性致死を誘発することとなる。*Fusarium* 代謝物による優性致死誘発も同様のメカニズムによるものと推測された。後期精子細胞と成熟精子に生じた DNA 切断は、受精後の前核期に修復を受けるが、この際に DNA 切断の近傍にある切断点同士で接合して転座染色体を生じ、子孫 (F1) に転座を有する個体を生じる可能性がある。これらのことから今回飼料由来の *Fusarium* から抽出した代謝物は哺乳動物の子孫への遺伝毒性を有する可能性が示唆された。

現在農林水産省では、家畜飼料中の deoxynivalenol, zearalenone, について飼料中の許容値を定めるなど、*Fusarium* 由来マイコトキシンの実量規制の実施を始めており、このことは fumonisin 等も含め輸入飼料の *Fusarium* マイコトキシン汚染問題が現在も重要課題であることを示している。このような中で、国内産の飼料に分布する *Fusarium* から新たな遺伝毒性を示すマイコトキシンが検出されたことから、*F. graminearum* をはじめとする *Fusarium* の飼料汚染の制御に、より一層の注意を払う必要があると思われる。

結 論

家畜の飼料から分離された *Fusarium* 8 種 53 株のうち 5 種 13 株の培養粗抽出物に、*Salmonella* に対して遺伝子突然変異を誘発する代謝物の存在が確認された。これら複数の菌株から検出された代謝物はいずれも同一あるいは類似の物質と推測され、ヒトリンパ球対しては染色体異常、マウスに対しては優性致死を誘発することを確認した。以上のことから、*Fusarium* にはこれまでに報告のない遺伝毒性を有する代謝物を産生する株があることが確認された。

引用文献

- 1) Chu, F.S.: Encyclopedia Hum. Biol., **8**, 511-522 (1997)
- 2) El-Nezami, H., Polychronaki, N., Salminen, S., Mykkanen, H.: Appl. Environ. Microbiol., **68**, 3545-3549 (2002)
- 3) Kuiper-Goodman, T., Scott, P.M., Watanabe, H.: Regul. Toxicol. Pharmacol., **7**, 253-306 (1987)
- 4) Lutsky, I., Mor, N., Yagen, B., Joffe, A.Z.: Toxicol. Appl. Pharmacol., **43**, 111-124 (1978)
- 5) Rotter, B.A., Prelusky, D.B., Pestka, J.J.: J. Toxicol. Environ. Health, **48**, 1-34 (1996)
- 6) Stafford, M.E., McLaughlin, C.S.: J. Cell Physiol., **82**, 121-124 (1973)
- 7) 高島浩介, 坂本京子, 大久保薫, 小西辰雄, 弓野克吉: 日畜会報, **51**, 325-330 (1979)
- 8) Ehling, U.H.: Mutation. Res., **13**, 433-436 (1971)
- 9) Vollmar, J.: Arch. Toxicol., **38**, 13-25 (1977)
- 10) Ames, B.N., McCann, J., Yamasaki, E.: Mutation. Res., **31**, 347-364 (1975)
- 11) 外村 晶: 環境変異原実験法, (田島弥太郎他編) pp.135-146 (1980) 講談社サイエンティフィック, 東京.
- 12) Wehner, F.C., Marasas, W.F.O., Thiel, P.G.: Appl. Environ. Microbiol., **35**, 659-662 (1978)
- 13) 上野芳夫: 遺伝, **34**, 14-21 (1980)

- 14) Bennett, J.W., Klich, M.: *Clinic. Microbiol. Rev.*, **16**, 497-516 (2003)
- 15) Gelderblom, W.C., Jaskiewicz, K., Marasas, W.F.O., Thiel, P.G., Horak, R.M., Vleggaar, R., Kriek, N.P.: *Appl. Environ. Microbiol.*, **54**, 1806-1811 (1988)
- 16) Marasas, W.F.O., Kellerman, T.S., Gelderblom, W.C.A., Coetzer, J.A.W., Thiel, P.G., Van der Lugt, J.J.: *Onderstepoort J. Vet. Res.*, **55**, 197-203 (1988)
- 17) Harrison, L.R., Colvin, B.M., Greene, J.T., Newman, L.E., Cole, J.R. Jr.: *J. Vet. Diagn. Invest.*, **2**, 217-221 (1990)
- 18) Marasas, W.F.O.: *Adv. Exp. Med. Biol.*, **392**, 1-17 (1996)
- 19) Aranda, M., Perez-Alzola, L.P., Ellahuene, M.F., Sepulveda, C.: *Mutagenesis*, **15**, 469-471 (2000)
- 20) Knasmüller, S., Bresgen, N., Kassie, F., Mersch-Sundermann, V., Gelderblom, W.C.A., Zohrer, E., Eckl, P.M.: *Mutation Res.*, **391**, 39-48 (1997)
- 21) Rheeder, J.P., Marasas, W.F.O., Vismer, H.F.: *Appl. Environ. Microbiol.*, **68**, 2101-2105 (2002)
- 22) Vogel, E., Leigh, B.: *Mutation Res.*, **29**, 383-396 (1975)
- 23) Murota, T., Shibuya, T., Iwahara, S.: *Mutation Res.*, **91**, 273-277 (1981)

Detection of genetic toxicity in secondary metabolites of *Fusarium* strains isolated from domestic animal feeds

K. ARAKAWA¹, N. TANAKA², K. TAKATORI³ and T. SAWADA⁴ : ¹ Division of Paracitology, National Institute of Infectious Diseases (Toyama 1-23-1, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8640) ² Division of Genetic Toxicology, Hatano Research Institute, Food and Drug Safety Center (Ochiai 729-5, Hadano, Kanagawa 257-8523) ³ Division of Microbiology, National Institute of Health Sciences (Kamiyoga 1-18-1, Setagaya-ku, Tokyo 158-8501) ⁴ Laboratory of Veterinary Microbiology, Nippon Veterinary and Life Science University (Kyonan-cho, 1-7-1, Musashino, Tokyo 180-8602)

Metabolites of 8 species 53 strains of *Fusarium* isolated from domestic animal feeds were tested in *Salmonella* mutagenicity test with and without metabolic activation. Mutagenic activity was detected on crude extracts of 5 species 13 strains of them; *F. graminearum*, *F. nivale*, *F. tricinctum*, *F. semitectum*, and *F. oxysporum*. From the result of thin layer chromatography, it seems that those mutagenic metabolites were the same compound. Moreover, the highest mutagenic activity extract was tested in chromosome aberrations in human lymphocytes and dominant lethal test in mice. It was detected chromatid type aberrations; gap and brake, in human lymphocytes, and induction of dominant lethality on late spermatids and sperms in mice.

Key words : *Fusarium*, *Salmonella*, mutagenicity, Ames test, chromosome aberration test, dominant lethal test