シンポジウム

1. 認知症の病態解明の進歩—認知症と蛋白異常による分類と病態

1) 認知症と蛋白異常—概説

中島 健二

Key words : FUS/TLS, FTLD, 筋萎縮性側索硬化症

はじめに

我が国は急速に高齢社会の到来を迎え、高齢者の増加と共に認知症が急増している(表1). なかでも、Alzheimer病(AD)やLewy小体型認知症(dementia with Lewy bodies: DLB)などの神経変性性の認知症の増加が著しい¹⁻³⁾.

1. 認知症を示す神経変性疾患

認知症には多くの原因疾患があるが、最も多いのはADであり、次いで多いのは血管性認知症、さらに、DLB、前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration: FTLD)が次ぐと考えられている. 認知症の大部分を占める神経変性性認知症(表2)ではその病態機序がいまだに不明で、長く治療法が開発されずに放置されてきた. 治療法のなかったADに対して、コリンエステラーゼ阻害薬の登場は大きな福音をもたらしたが、認知症の進行の停止をもたらす根治的治療法(dis-

ease modifying therapy)はまだ登場していない.

2. 認知症における蛋白異常

最近の基礎研究の進歩により、原因不明とされてきた認知症の原因・病態に関連する蛋白に関する検討が進み、これらの認知症疾患の原因に関連すると考えられる蛋白にアプローチしていく研究は、認知症の根治的治療法の開発に至るものと期待される. また、これらの蛋白に関連したバイオマーカーの開発が進められることにより、早期診断の発展も期待されている.

3. Alzheimer病に関連する蛋白異常

ADの神経病理学的変化として老人斑や神経原線維変化がある. アミロイドβ蛋白(Aβ)は脳血管アミロイドや老人斑の主要構成成分として知られる. Aβの脳内沈着はADの早期からみられ、アミロイド仮説に基づいて治療法が検討されている. 一方、神経原線維変化の構成成分である

鳥取大学脳神経医科学講座脳神経内科学分野

108th Scientific Meeting of the Japanese Society of Internal Medicine: Symposium: 1. Progress in dementia research—Dementia disorders and protein; 1) Overview.

Kenji Nakashima: Division of Neurology, Department of Brain and Neurosciences, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University, Japan.

表 1. 地域悉皆調査による認知症有病率（文献 1 より）

地域	対象	対象者数	入院/入所者の調査	調査年	有病率	VaD/AD
福岡県久山町	65 歳以上	887	記載無し	1985	6.70%	2.2
香川県三木町	65 歳以上	3,754	無	1987	4.10%	1.02
新潟県大和町	65 歳以上	3,485	有	1991	8.20%	5.7
和歌山県花園村	65 歳以上	201	有	1995	8.50%	0.86
新潟県糸魚川市	65 歳以上	7,847	記載無し	1997	6.20%	0.3
愛媛県中山町	65 歳以上	1,438	有	1997-1998	4.80%	1.34
京都府網野町	65 歳以上	3,175	記載無し	1998	3.80%	0.48
宮城県田尻町	65 歳以上	1,685	記載無し	1998	8.50%	—
鳥取県大山町	65 歳以上	1,823	有	2000	7.40%	0.76
島根県海士町	65 歳以上	943	有	2008	11.00%	0.24

AD：Alzheimer病, VaD：血管性認知症

表 2. 認知症を示す神経変性疾患

Alzheimer病
Lewy小体型認知症/認知症を伴うParkinson病
前頭側頭型認知症
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症
Huntington病
多系統萎縮症
嗜銀顆粒性認知症
神経原線維変化型老年認知症
その他

表 3. 家族性ALS

ALS1	21q22	SOD1
ALS2	2q33	Alsin
ALS3	18q21	
ALS4	9q34	Senataxin
ALS5	15q15-q22	
ALS6	16q21	FUS/TLS
ALS7	20p13	
ALS8	20q13.33	VAPB
ALS9	14q11.2	Angiogenin
ALS10	1p36.22	TDP-43
ALS11	6q21	FIG4
ALS12	10p13	Optineurin
その他		

タウ蛋白は、ADのみならずFTLD、進行性核上性麻痺 (progressive supranuclear palsy：PSP)、大脳皮質基底核変性症 (corticobasal degeneration：CBD) などにも関連する (表 2)。

4. Lewy小体型認知症/認知症を伴う Parkinson病

Lewy小体の主要構成成分である α シヌクレインの異常蓄積は、Parkinson病 (PD) やDLBのみならず多系統萎縮症やHallervorden-Spatz病などでもみられ、これらは α シヌクレイノパチーと総称される。

5. 前頭側頭葉変性症

前頭・側頭葉の萎縮を呈し特異な言語・精神症状を示す疾患としてPick病が報告され⁴⁾、脳の前方部に変性を有する非AD型の認知症疾患を包括的に捉えるようになって前頭側頭型認知症 (frontotemporal dementia：FTD) の概念が確立されていった。1994年にFTDの診断基準が提唱され、非Alzheimer型の脳の前方部に原発性の変性を示す変性性認知症性疾患を包括的に捉えるようになった⁵⁾。FTDは、前頭葉変性型 (FLD type)、Pick型、運動ニューロン病型 (MND type) に分類された。その後、FTD、意味性認知症

表 4. FTLDの最近の分類（文献 1, 12 より）

FTLD-Tau	3R Tau	Pick 病 MAPT変異を伴うFTLD
	4R Tau	進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症 認知症を伴う多系統萎縮症 嗜銀顆粒性認知症 MAPT変異を伴うFTLD
	3/4 Tau	神経原性変化型認知症 MAPT変異を伴うFTLD
FTLD-TDP		孤発性のFTLD-TDP/FTLD-U GRN変異を伴うFTLD TARDBBP変異を伴うFTLD VCP変異を伴うFTLD 9 番染色体に連鎖するFTLD
FTLD-FUS		神経細胞性中間径フィラメント封入体 非典型的なFTLD-U 好塩基性封入体病 FUS変異を伴うFTLD
FTLD-UPS		CHMP2B変異を伴うFTLD
FTLD：前頭側頭葉変性症, TDP：TAR DNA結合蛋白, FUS：fused in sarcoma, UPS：ユビキチン-プロテアソーム系, 3R, 4R, 3/4R Tau：3, 4, 3/4 微小管結合リピートを含有するタウのアイソフォーム, MAPT：微小管関連蛋白タウ遺伝子, FTLD-U：ユビキチン陽性封入体を有する前頭側頭葉変性症で、現在ではFTLD-TDPと呼ばれる, GRN：progranulin遺伝子, TARDBBP：TDP-43 遺伝子, VCP：valosin含有蛋白遺伝子, FUS：fused in sarcoma遺伝子, CHMP2B：荷電多発空胞体蛋白 2B遺伝子		

(semantic dementia：SD), 進行性非流暢性失語 (progressive non-fluent aphasia：PA) を含む前頭葉側頭葉に変性を示す包括的な概念として FTLD が提唱され, 1998 年にはその臨床的診断基準も示された⁶⁾.

6. FTLDにおける蛋白異常—FUS/TLS

FTLDの一群にタウ陽性封入体がみられる群がある。タウ陰性でユビキチン陽性の封入体を示すものがFTLD-U群で, このユビキチン陽性封入体の主要構成成分としてTDP-43 が同定された⁷⁾. さらに, 2009 年になって家族性筋萎縮性側索硬

化症 (家族性ALS) の病因遺伝子 (表 3) の一つとしてfused in sarcoma/translated in liposarcoma (FUS/TLS) が報告された^{8, 9)}. このFUS/TLSは 16 番染色体にあり, 孤発性ALSでも変異の報告がある. TDP-43 と同様にDNA/RNA代謝に関与するとされ, 転写の制御やRNAスプライシング, RNA輸送などに関与すると考えられている. このFUS/TLSが非定型FTLD-U, 神経細胞性中間径線維封入体病, 好塩基性封入体病などに関連する可能性が指摘されている^{10, 11)}. FUS/TLSに関するこれらの報告に基づき, FTLDの新たな分類 (表 4) も提唱されている¹²⁾.

一方, FTDにおけるFUS mutationの報告は稀

とされている¹³⁾。52歳で発症したbehavioural variant FTDにおいてFUS遺伝子のMet254Val mutationが報告されている^{13, 14)}。この例は、PET (positron emission tomography)で前頭葉、側頭葉のuptake低下を認めているが、両親は生存していて無症状であり、この変異がFTDの原因となっているかどうかについてはさらなる検討が必要と考えられている^{13, 14)}。

おわりに

認知症における蛋白異常に関する研究は、大きく進歩している。さらに、蛋白異常研究から根治的治療法開発への発展が期待される。

著者のCOI (conflicts of interest) 開示：本論文発表内容に関連して特に申告なし

文 献

- 1) 日本神経学会“認知症疾患治療ガイドライン”作成委員会：認知症疾患治療ガイドライン 2010. 医学書院, 東京, 2010.
- 2) Wada-Isoe K, et al: Prevalence of dementia in the rural island town of Ama-cho, Japan. *Neuroepidemiology* 32: 101-106, 2009.
- 3) 日本認知症学会編：認知症テキストブック. 中外医学社, 東京, 2008.
- 4) Pick A: Über einen weiteren Symptomenkomplex im

Rahmen der Dementia senilis, bedingt durch umschriebene stärkere Hirnatrophie (gemischte Apraxie). *Msschr Psychiatr Neurol* 19: 97-108, 1906.

- 5) The Lund and Manchester Groups: Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 57: 416-418, 1994.
- 6) Neary D, et al: Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria. *Neurology* 51: 546-554, 1998.
- 7) Arai T, et al: TDP-43 is a component of ubiquitin-positive tau-negative inclusions in frontotemporal lobar degeneration and amyotrophic lateral sclerosis. *Biochem Biophys Res Com* 351: 602-611, 2006.
- 8) Kwiatkowski TJ Jr, et al: Mutations in the FUS/TLS gene on chromosome 16 cause familial amyotrophic lateral sclerosis. *Science* 323: 1205-1208, 2009.
- 9) Vance C, et al: Mutations in FUS, an RNA processing protein, cause familial amyotrophic lateral sclerosis type 6. *Science* 323: 1208-1211, 2009.
- 10) Neumann M, et al: A new subtype of frontal lobar degeneration with FUS pathology. *Brain* 132: 2922-2931, 2009.
- 11) Mackenzie IRA, et al: Nomenclature for neuropathologic subtypes of frontotemporal lobar degeneration: consensus recommendations. *Acta Neuropathol* 117: 15-18, 2009.
- 12) Cairns NJ, Ghoshal N: FUS: a new actor on the frontotemporal lobar degeneration stage. *Neurology* 74: 354-356, 2010.
- 13) MacKenzie IRA, et al: TDP-43 and FUS in amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. *Lancet Neurology* 9: 995-1007, 2010.
- 14) Van Langenhove T, et al: Genetic contribution of FUS to frontotemporal lobar degeneration. *Neurology* 74: 366-371, 2010.