脳血管障害の最新の診断法と治療の最前線

寺山 靖夫

Key words 脳血管障害, 診断法, 最新治療

はじめに

脳卒中死亡率は、医療の進歩に伴い年々低下し、最近では、悪性腫瘍、心血管疾患ならびに肺炎に次いで、我が国の死亡率の第4位にまで低下している（図1）¹⁾。

このことは、脳卒中が単純に死に至る悪性疾患ではなくなったことを意味するのではなく、逆に、後遺症を残し、または寝たきりとなり、患者本人とその家族に大きな負担を強いる、さらに重大な疾患となったことを意味する。脳卒中は、死亡率では語れない疾患である。

一方、脳梗塞の治療の進歩は著しく、超急性期脳梗塞に対するt-PA（tissue plasminogen activator）静注による血栓溶解療法に加え、最近では、血管閉塞部までカテーテルを挿入し、各種のデバイスを用いて血栓を除去し、再開通を図る画期的な脳血管内治療の有効性が示され、我が国でも頻繁に行われるようになった。

しかし、このような最新治療の有効性は、平均60～65歳の患者を対象にして行われた臨床

試験のエビデンスに基づくものであり（表）²⁾，超高齢社会の代表とも言える我が国の実情にはそぐわない。Uyttenboogaartらによれば、80歳以上の脳梗塞患者においては、t-PA及び血栓回収術後の転帰は、80歳未満の患者に比べて極めて不良で、自立した生活可能な患者の割合が極端に減っている（図2）³⁾。

これに従えば、我が国では、この先進治療の恩恵を受ける80歳以上の高齢者は全脳卒中患者の2～5%に満たないことになる。

このことは、我が国における人口の高齢化がt-PAや血栓回収術等の先進治療の恩恵を受けることのない高齢患者を増やし、また、地域の過疎化は、適応がありながらその恩恵を享受することができない患者を増やし、結果的に、最新治療の恩恵を受けることなく、大きな後遺症を残しつつ、寝たきりとなる患者が年々増加する危険性があることを示している（図3, 4）⁴⁾。

このような状況のなかで、現在、脳卒中、特に脳梗塞においては、罹患後も元の仕事に復帰して自立した生活ができる者は44%に限られ、

湘南慶育病院脳神経センター

Programs for Continuing Medical Education : A session ; 3. The state-of-the-art instruments for acute stroke diagnostics and therapy.
Yasuo Terayama : Neurological Center, Shonan Keiiku Hospital, Japan.

図1 主な死因別にみた死亡率の年次推移 (文献1)

表 血栓回収術の国際臨床試験と被検者の年齢 (文献2)

Characteristics	SYNTHESIS, 2013		MR RESCUE, 2013		IMS III, 2013		MR CLEAN, 2015	
	Endovascular (n=181)	Standard (n=181)	Endovascular (n=64)	Standard (n=54)	Endovascular (n=434)	Standard (n=222)	Endovascular (n=233)	Standard (n=267)
Age, mean (SD) or median (IQR), y	66 (11)	67 (11)	64.2 (12.8)	67.1 (16.5)	69 (23-89)	(23-84)	65.8 (54.5-76.0)	65.7 (55.5-76.4)
Risk factors, No. (%)								
Women	75 (41.4)	78 (43.1)	34 (53.1)	27 (50.0)	216 (49.8)	100 (45.0)	98 (42.1)	110 (41.2)
Hypertension	102 (56.4)	105 (58.0)	54 (84.4)	41 (75.9)	319 (73.5)	171 (77.0)	98 (42.1)	129 (48.3)
Atrial fibrillation	14 (7.7)	29 (16.0)	16 (25.0)	20 (37.0)	153 (35.3)	70 (31.5)	66 (28.3)	69 (25.8)

mRS scores at 3 months				
Patients <80 yrs	0-1 36.1%	2-3 29.7%	4-5 21.6%	6 12.6%
Patients ≥80 yrs	0-1 16.1%	2-3 9.7%	4-5 29.0%	6 45.2%

図2 年齢別t-PA及び血栓回収術後の転帰の違い (文献3)

残りは、日常生活を送るうえで何らかのサポートが必要な状態に陥っているのが現状である⁵⁾。

最近の脳卒中先進診療の進歩はめざましいが、脳卒中の克服には、やはり発症予防が先進

治療に勝る最良の治療とされる理由がここにある。そして、その主役は内科である。

近年の画像診断技術の発展により、脳血管障害、特に脳梗塞のさまざまな病態が可視化され、解明されつつある。高血圧、脂質異常症、糖尿病ならびに喫煙等の脳梗塞発症の危険因子が動脈硬化を発症・進展させる過程を画像で非侵襲的に観察することが可能になり、一次予防の重要性がさらに強調されるようになった。また、二次予防においても、病態とそれを裏付ける画像所見に基づいた有効な治療によって患者予後がこれまで以上に改善してきている。

図3 要介護及び要支援者数の年次推移 (文献4)

図4 65歳以上の寝たきり患者に占める脳血管疾患の割合

現在では、脳梗塞の発症原因となる心臓から脳内血管に至る血管の状態を観察するための精度の高い画像診断機器が数多く開発され(図5), これらにより、脳梗塞を引き起こした責任血管を無侵襲で同定し、観察することが可能になり、責任部位の同定率が2000年には20%程度であったものが、現在では70~80%まで向上

しているという報告がある。

特に無症候性頸動脈狭窄、頭蓋内動脈病変の診断には、超高磁場MRI (magnetic resonance imaging) によるMRプラークイメージングや血管壁イメージングの手法が活かされ、治療に結び付く新たな知見が得られている。ここでは、これらの病変に対する最新の診断法を紹介する。

1. 無症候性頸動脈狭窄の診断

頸動脈狭窄の診断と評価は、各種検査による狭窄率に基づき行われ (NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) 法, ECST (European Carotid Surgery Trial) 法), 症候性頸動脈狭窄の治療方針の決定には有用で確立された方法である。

しかし、無症候性プラークの転帰は、狭窄率だけでは決定できず、その治療方針の決定には、破綻しやすいプラークの性状・形態・成分の詳細な評価が重要である。無症候性プラークの性状・形態・成分の評価には、従来の超音波

図5 脳血管病変の診断機器の進歩

ACA : anterior cerebral artery, MCA : middle cerebral artery, PCA : posterior cerebral artery, ICA : internal carotid artery, CCA : common carotid artery, TEE : transesophageal echocardiography, TTE : transthoracic echocardiography.

三次元超音波エコー法

二次元超音波エコー法

図6 三次元超音波検査法と二次元超音波検査法（Bモード）

検査法に加え，三次元頸動脈超音波検査（図6）⁶⁾，MRプラークイメージング（図7）^{7,8)}，superb micro-vascular imaging (SMI) 法（図8）⁹⁾等が用いられる。

2. 頭蓋内動脈病変—穿通枝動脈領域梗塞と small vessel disease

従来，頭蓋内動脈狭窄の評価は，MRA（MR angiography），CTA（computed tomography angiography：CT angiography）ならびにDSA（digital subtraction angiography）等に基づいていたが，これらは造影剤による血管内腔のシルエット像

MRIによる
プラークの描出

■ fibrous tissue
■ lipid/necrosis
■ hemorrhage

図7 MRI plaque imaging

図8 superb micro-vascular imaging (SMI) (文献9)

図9 左放線冠のラクナ梗塞患者にみられた左中大脳動脈のMRIプラーク像

図10 7T穿通枝正常例

lacunar vessel pathology – current concepts

図11 ラクナ梗塞の血管病理像 (文献11, 12)

から血管内腔の状態を間接的に評価する所見であり、直接血管壁病変を描出する方法は確立されていなかった。近年、MRプラークイメージングを応用した頭蓋内血管壁イメージングが注目されている。中大脳動脈水平部等の頭蓋内主幹動脈プラーク病変の存在診断に加え、形状や信号強度、造影増強効果等による質的診断が可能で、頭蓋内動脈解離、血管炎ならびにRCVS

(reversible cerebral vasoconstriction syndrome) 等の特徴的所見を捉えることが可能である。また、超高磁場7T-MRIはレンズ核線条体動脈等の穿通枝動脈の評価も可能であり、頭蓋内動脈病変の有力な診断ツールとなる可能性が高い。

ヒトのあらゆる行動に関わる運動系（錐体路・錐体外路系）が、今にも切れそうな細い穿通枝動脈によって制御されていることは驚きで

あるが、7T-MRIにより、この穿通枝は我々の想像以上の機能と構造を有していることがわかってきた。

脳内穿通枝の動脈硬化に起因する虚血性疾患として、BAD (branch atheromatous disease) がある。BADは、ラクナ梗塞と同様に、軽度の神経脱落症状から始まり、脳画像上も初期はラクナ梗塞とほとんど変わらないが、ラクナ梗塞と異なり、抗血小板薬や降圧薬等の治療には抵抗

性で、症状が徐々に増悪する。3T-MRIを利用したT1 cube画像は、中大脳動脈レベルの脳内血管のプラークを明瞭に描出することが可能で、BADとラクナ梗塞の鑑別も可能になった(図9)¹⁰⁾。また、7T-MRIにより、分岐部粥腫や穿通枝分岐部の描出が可能となり、そこには、想像以上の病理的变化が存在することが明らかになっている(図10)。

ラクナ梗塞は、最近、内皮細胞の透過性の亢進による血液成分の周辺脳組織への漏出がそのメカニズムの1つとして認識されるに至り、その概念が変わりつつある(図11)^{11, 12)}。7T-MRIからもそれを裏付ける新たな知見が得られている(図12)¹³⁾。穿通枝動脈領域における血液成分の漏出は微小出血(microbleeds)として認識され(図13)、これに対する抗血栓療法の可否が今も議論されており、糖尿病と脂質コントロールの重要性が示されている。

7T-MRIによるラクナ梗塞像
(3D-TOF MRA+3D-FLAIR)

図12 7T-MRIによるラクナ梗塞患者の梗塞像と穿通枝

おわりに

脳梗塞の治療の進歩は著しく、超急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法に加え、血管閉塞部に各種のデバイスを用いた画期的な脳血管内治療

ラクナ梗塞とmicrobleeds

図13 脳微小出血 (microbleeds) とsmall vessel disease

が頻繁に行われている。しかし、高齢化はt-PAや血栓回収術等の先進治療の恩恵を受けられない高齢患者を増やし、地域の過疎化は、適応があっても恩恵を享受することができない患者を増やし、結果的に、大きな後遺症を残して寝たきりとなる患者が年々増加している。

脳血管障害の治療には、前述の画像診断学に加え、高血圧症、不整脈、糖尿病、脂質異常症、

慢性腎疾患、血液凝固学ならびに血管病学等の内科的知識は必須であり、これらの集学的な連携による発症予防が先進治療に勝る治療の最前線と言える。

著者のCOI (conflicts of interest) 開示：寺山靖夫；講演料（第一三共、バイエル薬品、ブリストル・マイヤーズスクイブ、ベーリンガーインゲルハイム）、研究費・助成金（ベーリンガーインゲルハイム）

文献

- 1) 厚生労働省：平成23年人口動態統計月報年計（概数）の概況。
- 2) Badhiwala JH, et al: Endovascular thrombectomy for acute ischemic stroke: a meta-analysis. *JAMA* 314: 1832-1843, 2015.
- 3) Uyttenboogaart M, et al: Routine thrombolysis with intravenous tissue plasminogen activator in acute ischaemic stroke patients aged 80 years or older: a single centre experience. *Age Ageing* 36: 577-579, 2007.
- 4) 厚生労働省：介護保険事業状況報告。
- 5) 佐伯 寛, 蜂須賀研二：脳卒中後の復職—近年の研究の国際動向について—。総合リハ 39: 385-390, 2011.
- 6) 森 潔史, 他：3次元超音波検査法を用いた頸動脈プラークに対するフルバスタチンの治療評価。 *Neurosonology* 22: 74-78, 2009.
- 7) Saito A, et al: Carotid plaque signal differences among four kinds of T1-weighted magnetic resonance imaging techniques: a histopathological correlation study. *Neuroradiology* 54: 1187-1194, 2012A.
- 8) Narumi S, et al: Prediction of carotid plaque characteristics using non-gated MR imaging: correlation with endarterectomy specimens. *AJNR Am J Neuroradiol* 34: 191-197, 2013.
- 9) 小野寺奈緒, 他：造影頸動脈超音波検査で造影剤のプラークへの著明な流入を認めた頸動脈狭窄症の1例。 *Neurosonology* 29: 191-195, 2016.
- 10) Natori T, et al: Evaluating middle cerebral artery atherosclerotic lesions in acute ischemic stroke using magnetic resonance T1-weighted 3-dimensional vessel wall imaging. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 23: 706-711, 2014.
- 11) Davis SM, Donnan GA: Why lacunar syndromes are different and important. *Stroke* 35: 1780-1781, 2004.
- 12) Wardlaw, et al: Is breakdown of the blood-brain barrier responsible for lacunar stroke, leukoaraiosis, and dementia? *Stroke* 34: 806-812, 2003.
- 13) Suzuki T, et al: Evaluating recanalization of relevant lenticulostriate arteries in acute ischemic stroke using high-resolution MRA at 7T. *Int J Stroke* 19, 2020. [Epub ahead of print]