ラウンドテーブルディスカッション

諸疾患時の脂質代謝異常

（2） 糖尿病と脂質代謝異常

大阪市立大学教授

和田 正 久

ROUNDTABLE DISCUSSION:

（2） PLASMA LIPIDS AND DIABETES MELLITUS

Masahisa WADA M.D.

Osaka City University Medical School, Osaka

I. 緒 言

糖尿病の代謝異常の代表的なものは尿糖の出現と血糖の上昇であるが、本症の治療に際しては従来血糖値や尿糖量が重視されすぎた感もないではない。Joslin¹⁾らは糖尿病患者において発見当初より厳格な糖代謝調節を行なうとともに、標準体重附近に体重を維持するなどの点に注意すれば長年月を経過しても著明な合併症を起さず、良好な状態を持続しうるものの少なくないことを指摘し、いわゆる厳格な代謝調節の重要性を強調している。

本症治療上糖代謝異常の是正や体重調節の大切なことに異論を唱えるものではないが、糖代謝異常の比較的軽度ないわゆる軽症の糖尿病患者でも血管病変その他の慢性合併症をみるものが多いことなどの事実、糖代謝調節をどの程度厳重に行なうべきか、糖代謝以外の面でも調節の基準をもつべきでないかといった問題を提起するものといえよう。

血管病変を合併した糖尿病ではしからざるものに比して血清コレステロール値が高いと報告され²⁾、血管合併症の対策と関連して血中脂質の異常が目されるようになった。その後本症患者で

はエステル型脂肪酸³⁾や遊離脂肪酸⁴⁾、中性脂肪⁵⁾の血中濃度も上昇していることが認められた。これらの成績は冠硬化性心疾患の進行に高コレステロール血症が関係していることを示唆する諸家の成績⁶⁾などと考え合せて、糖尿病患者の治療に際しても糖質代謝異常の是正と平行して血中脂質の正常化をはかることが必要ではないかという考え方を起させる。

糖尿病患者にインスリン治療を行なうと、高コレステロール血症や高脂血症の改善されることが多いが、食餌療法のみの場合や内服剤を用いるときには、血糖値の是正に拘わらず血中脂質の是正が平行しないこともしばしばである。

他方アロキサン糖尿病動物ではコレステロール飼育でかえつて粥状硬化症の起こりにくいことが知られているが⁷⁾、糖尿病患者に粥状硬化症などの血管病変合併率の高いことは、死因にこれら血管病変が大きな役割を占めていること¹⁾⁸⁾からもうかがえることである。

以上糖尿病患者における脂質代謝異常については、1) 脂質代謝異常、ことに血中脂質の異常は本症の血管病変にどの程度関連しているか、2) 関連があるとした場合、血中脂質のなかで何が代

表としてとるのに適当か、3)脂質代謝異常は正という観点からみたとき従来の治療法、ことに代謝調節基準に修正を加えるべきか否かといった問題があることになる。

Stoneらは糖尿病患者に低コレステロール高糖質食を長期間与えてもインスリン需要量は増加せず血清コレステロールの低下正常化傾向をみたと述べ⁹⁾、糖質制限高脂肪食を基礎とする従来の食餌療法について再検討する必要があることを示した。もつともNewらは血管合併症を有する糖尿病患者としからざるものを比較したとき、血漿コレステロール値より血漿中性脂肪値の方に差が著明であつたとしている¹⁰⁾。血中コレステロール濃度は高脂肪食、ことに動物脂肪の多い食餌で上昇し、必須脂肪酸摂取量の多い場合に低下するとされている¹¹⁾、中性脂肪は糖質の多い食餌で上昇するとみられている¹²⁾ので、両者のいずれが血管合併症に重要な役割を演じているかによって、本症の食餌療法も異なつて来るべきである。日本人の食餌は一般に糖質が多く、脂肪の比率が少ないから、欧米人の成績がそのままあてはまらない可能性も考えられる。そこでわたくしは主として血漿コレステロールと中性脂肪について本症の合併症との関連などを比較検討した。

II. 実験方法ならびに成績

1. 測定法. 早朝空腹時に採血、血漿を分離し、総コレステロールはZak-Henly法¹³⁾¹⁴⁾、中性脂肪はvan Handel and Zilversmit法¹⁵⁾で測定した。脂肪酸の分析はFolch法¹⁶⁾によつて抽出した後薄層クロマトグラフィーで分離したものについて、島津I B型(水素炎イオン化デテクター)を用いてガスクロマイグラフィーを行なつた。なお血糖値の測定は静脈血を用いSomogyi-Nelson法¹⁷⁾によつた。

2. 検査対象. 非糖尿病患者としては明らかな心疾患、腎疾患、肝疾患などを有しないものを取り、糖尿病患者は大阪大学第一内科糖尿病クリニックの患者を検査対象とした。

3. 年齢・体重と血漿脂質. 40才台と50才以

第1図. Plasma cholesterol and age.

第2図. Plasma triglycerides and age.

第3図. Plasma cholesterol and body weight.

第4図. Plasma triglycerides and body weight.

上の比較では非糖尿病、糖尿病の両群とも50才以上のものにコレステロール値の高い傾向があつたが、39才以下の比較的若い糖尿病では40才台の患者に比してコレステロール値が高かつた。中性脂肪についても平均値は40才以後で加齢とともに上昇する傾向が糖尿病群でみられたが、39才以下のものでは40才台よりも高値であつた。糖尿病と非糖尿病の比較では同年代のものでコレステロール値に關し有意の差があるといひ難いが、中性脂肪については両群の間に差が認められた(第1, 2図)。

体重との関係では肥満群のコレステロール値がやゝ高い程度であつたに對し、中性脂肪では非糖尿病、糖尿病両群とも肥満度と平行して増加する傾向が認められた(第3, 4図)。

4. 合併症と血漿脂質。非糖尿病、糖尿病両群とも眼底血管變化の著しいものにコレステロール値の高い傾向があつたが、かかる傾向は中性脂肪で更に顯著であつた(第5, 6図)。同様な傾向はPSP試験についても認められた(第7, 8図)。

非糖尿病群では心電図で心筋障害のあるとみられるものがかかる異常のないものに比してコレス

テロール値の高い傾向があつたが、糖尿病群では明らかな差はなかつた。他方中性脂肪については心電図異常の有無によつて差は認められなかつた(第9, 10図)。収縮期血圧ないし拡張期血圧と血漿

第7図. Plasma cholesterol and PSP in diabetics.

第8図. Plasma triglycerides and PSP in diabetics.

第5図. Plasma cholesterol and funduscopy changes.

第6図. Plasma triglycerides and funduscopy changes.

第9図. Plasma cholesterol and EKG.

第10図. Plasma triglycerides and EKG.

コレステロール値の関係については、糖尿病群で拡張期血圧100 mmHg以上に高かった他、大きな差はなかつた。また中性脂肪については非糖尿病群で収縮期血圧180mmHg以上のものと拡張期血圧100mmHg以上のものに高値をみたが、その他のものでは特記すべき差をみなかつた。

5. 血漿脂質の脂肪酸構成。血漿コレステロールエステルと中性脂肪の脂肪酸構成を検索した

第11図. Fatty acid composition of plasma cholesterol ester.

第12図. Fatty acid composition of plasma triglycerides.

第13図. Plasma lipids and fasting blood sugar in diabetics.

第14図. Effect of ethyl linolate treatment on plasma cholesterol in diabetics.

第15図. Effect of ethyl linolate treatment on plasma triglycerides in diabetics.

成績では両者とも糖尿病，非糖尿病両群の間に明らかな差を認めなかつた（第11，12図）。

6. 治療による変動. 空腹時血糖値との相関をみると，血漿コレステロール，中性脂肪のいずれについても明らかな相関はなかつた（第13図）。リノール酸エチル20ml/dを連日2～4月間内服させたところ，投与前血漿コレステロール値の高かつたものでは低下正常化する傾向をみた（第14図）。他方中性脂肪では大多数の例で低下傾向をみたが，投与すると4カ月後位には再度上昇する傾向があつた（第15図）。なお少数例ながら脂肪摂取量を一定とし，糖質量を増加させた場合の影響をみたところ，糖質の増加に伴ない中性脂肪の増加することを認めた。

III. 考 案

インスリンが糖尿病の治療に用いられる迄の時代において，血中のコレステロールや脂肪の値が高かつたことは糖代謝の異常が充分是正できなかつたことと関連があるとみられる。実際本症患者にインスリン治療を行なうと，血糖値の是正につれて脂質の面でも異常が少なくなることは前述したとおりである。このことと関連して39才以下の群で血漿コレステロールおよび中性脂肪値の高いものが少なくなかつたことは，これらのものいわゆる重症者の少なくないことを示すとともに，糖代謝異常是正の不十分なものがあることを暗示している。このように糖尿病患者の治療前の脂質値と治療中の値を比較することにより糖代謝異常の是正の程度をうかがう場合がしばしばあり，本症の代謝調節の補助的な指標の一つとして利用しうるものと思われる。逆に血糖値，尿糖，ケトン体，体重などからみて良好な調節状態にあるとみられる患者で明らかに高いコレステロールや中性脂肪の値を認めたときは，食餌の影響と同時に本態性高脂血症などの可能性についても考慮すべきであろう。

糖尿病の慢性合併症，ことに血管病変の進展に脂質代謝異常がどの程度の役割を演じるかを今回の成績から論じることとは無理である。

この問題の解決にはまず数年間血漿脂質の動向を追求めた患者群について，血管障害の進展がどの様であるかを観察する必要がある。

しかしかりに血漿脂質値の比較的高かつた群に血管病変の進展が著明であつたとしても，高脂血症ないし高コレステロール血症がどのような役割を演じたかは別の問題である。わが国の糖尿病患者では血管病変の程度が軽いことを示唆する成績がいくつかあるが¹⁸⁾¹⁹⁾，欧米の成績と比較するという点からいえば，population surveyに基づいた調査を行なうことが望ましいであろう。わたくしの成績では眼底所見ないしPSP試験異常のものや血圧の高いものにコレステロール，中性脂肪値の高い傾向があつたが，この点はNewらの成績¹⁰⁾の差が代謝調節の良否によるものか，食餌の影響がどの程度あるかなど。同一例について経過を追つて観察することも必要であろう。Newらは本症が発見されてから長年月をへたものと，しからざるものとで脂質値に大差をみながつたとしているが¹⁰⁾，検査の時期までの既往の治療，調節状態の良否との関連についても検討することが望ましい。

またコレステロールと中性脂肪のいずれが重要であるかについては，両者の値に解離のみられる例を求めて追求めるとか，食餌の影響などで中性脂肪の比較的高い例などについて長期の観察を行なうべきであろう。しかしコレステロールが従来冠動脈硬化との関連に注目されているに対し，高脂血症では血液凝固との関連などにも注意を要すると考えられる点から，それぞれ多少とも異なつた意義を有することも考えられる。

いずれにしても糖尿病患者の血漿脂質値は補助的な代謝調節基準の一つとして，今後更に詳細な研究の行なわれることが望ましい。

協同研究者

吉川 巖，繁田 幸男，森脇 健，刈田 全世
中村 幸二，岸本 道也，安藤 幸来，星 充
七里 元亮，多田 俊夫，高岸八重子，康 敏 煥
井上 通敏

文 献

- 1) Joslin, E.P., Root, H.P., White, R. and Marble, A.: Treatment of diabetes mellitus. Lea and Febiger, Philadelphia, 1959. —2) Barach, J.H. and Lowy, A.D.: Diabetes 1, 441, 1952. —3) Hirsch, E.F.: Ann. intern. Med. 41, 546, 1954. —4) Bierman, E.L., Dole, V.P. and Roberts, T.N.: Diabetes 6, 475, 1957. —5) Adlersberg, D.: Diabetes mellitus. Thieme, Stuttgart, p. 61, 1959. —6) Keys, A.: Atherosclerosis and its origin. Academic Press, N.Y. p. 263, 1963. —7) Duff, G.L.: J. exp. Med. 86, 611, 1949. —8) 吉田常雄: 糖尿病, 4, 3, 1961. —9) Stone, D.B. and Connor, W.E.: Diabetes 12, 127, 1963. —10) New, M.I., Roberts, T.N., Bierman, E.L. and Reader, G.G.: Diabetes 12, 208, 1963. —11) Keys, A.: J. Chron. Dis. 4, 57, 1956. —12) Albrink, M.J. and Neuwirth, R.S.: J. clin. Invest. 39, 441, 1960. —13) Zak, B.: Amer. J. clin. Path. 27, 583, 1957. —14) Henly, A.A.: Analyst 82, 286, 1957. —15) van Handel, E. and Zilversmit, D.B.: J. Lab. clin. Med. 50, 152, 1957. —16) Folch, J., Lees, M. and Stanley, G. H.S.: J. biol. Chem. 226, 497, 1957. —17) Nelson, N.: J. biol. Chem. 153, 375, 1944. —18) 和田道寛: 大阪大学医学雑誌, 11, 2299, 1959. —19) 宮地徹, 建石竜平: 糖尿病, 4, 11, 1961.