第71回日本内科学会講演会（1974年）

特 別 講 演

老年者の腫瘍*

老人総合研究所

太田 邦夫

SENESCENCE AND TUMORS

Kunio OOTA, M.D.

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

1. 緒 言

世界における人口の老年化傾向についての関心の中でも、日本人の人口構成の近年における急速な変化は類のないものであり、したがって老年人口の主要死因中第二位をしめるといわれる悪性新生物については、注目があつめられるのは当然である。巷間に癌年令という言葉があり、発癌と加齢との間には何か内在する必然関係が存在するとの印象は深い。これにかんしては幾多の学説が存在するが、その裏付となる事実、如何に整理されているかについて検討してみると、以下に述べる如く必ずしも満足すべき状態にあるとはいえない。本小論においては、成可く事実整理の現状を述べて、多くの仮説的解釈をさけることとする。

癌の本態観、癌発生の機構にかんする諸説は山積し、他方老化、加齢についても多方面からの仮説が提出されている。これらを都合よく選択して、見かけのよい解釈をつくり上げる段階は今や過去のものとなり、確実な所見が要求されていると思われる。殊に腫瘍は病理学的な概念であり、細胞増生を主体とするものであるからには、ヒトの加齢に関係した病理学的な材料の整理が、加齢と老年者の腫瘍との問題の解明に先ず第一に必要なと考えられる。

2. 材 料

以上のような検討の資料となる人体材料には、1. 死亡統計、2. 剖検材料、3. 手術材料、4. その他があり、他方には実験動物から得られた知見が利用出来る。しかし、これらを検討して行くと、甚だ多数の困難点が内在している。

a. 死亡統計： 全地域の死亡診断書に基礎をおく死亡統計は、多くの疫学的討議の出発点となっている。日本における厚生省の死因分類統計は、少なく共過去 100年に近い確度の高い戸籍の存在と、高度に発達したといわれる医療の水準とによつて、国際的にも信用の高いものであるが（図6）、正直にいうと死亡診断書の内容にも、医療普及の限界や国民的な先入感などによる偏差の影響を免れないばかりでなく、医学的解析の正確度にも望むべき多くのものが残されている。少数の解析的報告、なかんずく原爆被害調査委員会（ABCC）の1967年の報告によると、或る種の臓器腫瘍の主死因としての診断名の信憑性は、剖検所見と照合すると40%に満たぬことから、全体を推すことが出来よう。まして、副所見としての腫瘍や、早期癌はこの種の統計から論じることが出来ない憾みがある。他方、死亡統計は地域全人口について、経年次的な粗大観察には適している、高い医学水準のもとに完備、利用され

* 本講演は1974年4月3日東京都千代田区霞ヶ関
国立教育会館虎の門ホールにて行なわれた。

るべきものと考えられる。

b. 剖検材料： 理想的な状態の許では、主要死因のみならず、臨床水準に達しない腫瘍までも、各主要臓器に平等に検出出来るものであるから、不慮死例までも含めると、加齢と腫瘍との関係の解析には絶好の資料となりうるはずである (Kruckenmeyer)。もし過去 100 年間にわたつて、全人口的な資料がそろつていたとすれば、経年的な動向をも知り得て、人類将来の医学対策全体に大きな貢献が期待出来たはずのものであるが、不幸にしてわれわれは、未曾有の時代に面して、これを持つていないのに気付く、というのが実情である。

北欧の一国では地域全人口中の死亡の 70% 以上を剖検所見から逐うことが出来るといわれるが、現在の日本では年間全死亡の 3~4% が剖検されているにすぎず、また、剖検システムの不備から報告者によつて、所見の精粗は極めて区々である。それにしても、日本病理学会がその全会員の努力によつて過去 15 年間にわたつて積み上げた、約 250,000 症例の所見を集録した日本病理剖検輯報は、甚だ特徴ある資料を提供する。

c. 手術材料： これは最も高度にかつ集中された病理組織学的検索をうけるものであつて、適当な処理のもとには、各臓器毎に腫瘍発生の母地条件までも検討する手がかりを与えうるのであるが、剖検材料と共に、むしろそれ以上の素材選択が行なわれて、知見を全人口に反映することに困難を与える。かつまた、局処の腫瘍病変と全身の所見との関連についての知見を欠く短所がある。しかし、国際的に最も簡易で重要な腫瘍統計上の指針を与えると考えられている腫瘍登録 (cancer registry) は、基盤をここにおくものである。

d. 実験材料： 加齢と癌化の相関を実験動物で見極めることは困難である。自然発生癌が加齢に並行して認められるという最近の Peters et al. (1972), Gardner et al. (1973) の報告があるが、実験発癌については、Whitmire et al. (1972),

Teller et al. (1967), Vesselinovitch et al. (1971) の報告に拘らず結論が一定していない。一方 *in vitro transformation* が老化細胞に起こり易いことが認められているのは注目される。

ヒトに対して行なわれた単一かつ最大の発癌実験ともいうべきものに、広島・長崎の原子爆弾症の追跡研究があり、既に 30 年に及ぼうとしている。Bizzozero et al. (1966) の報告によると、この唯一回の物理学的発癌要因への曝露の効果は、白血病の発生にかんする限り、曝露の時の年齢と全く無関係であつた。この結論は、脊椎症のために X 線照射を受けた人の中からの白血病発生頻度にかんする Stewart et al. の報告のそれとは全く相反していることが注目される。

3. 主な統計材料からの示唆

a. まず厚生省死亡統計の死因としてのすべての種類の癌について見ると、各年齢階級 (5 年) 毎の対人口 100,000 比で、二峰性の曲線が得られる。第一の幼年期の小さな峰についてはここに論じない。高年齢に向うと、ほぼ 80 才前後の明らかな高い峰をこえと、男女性共に下降線を辿る如く見える。ただし、この部分を 1950, 1960, 1971 年と 10 年毎の曲線で比較すると、下降率は次第に減少していることに注目される (図 1)。これは胃癌についても、肺癌についていえるところ、殊に子宮癌では顕著である。子宮癌については、明瞭な cohort 効果が出ているが、その原因は明らかでない。注目すべきは、数種の臓器の癌では年齢と共に確実に上昇する出現頻度を呈していることである。皮膚、泌尿器、前立腺などがそれに相当する (表 1)。内分泌などの年齢特異性、診断技術なども考慮すべきであろう。

ここでは Doll が cohort 効果としての環境癌原因の変遷のみならず、高年齢者に対する医療普及の不満足性を考慮する必要のあることを指摘したことのみを述べておこう。

Doll は 1966~1970 年に発表した解析で、最高年齢階級における下降部を無視し、各臓器毎の癌頻度と年齢とを両対数であらわすと、図 2 の如く直

(厚生省の発表による)

図1. 全がん・年齢別がん死亡率(昭和25, 35, 46年)

表1. 年齢と共に頻度が上昇して止まる臓器癌

Age	Ca Skin	Ca Prost	Ca Urin Bladder	Ca Kidney
	M	M	M	M
0-4			0.1	0.4
5-9			0	0
10-14			0	0
15-19	0		0	0.1
20-24	0.1		0	0
25-29	0.1		0	0
30-34	0.1		0.1	0
35-39	0.2		0.2	0.2
40-44	0.3	0.1	0.3	0.7
45-49	0.6	0.2	0.7	0.8
50-54	0.6	0.5	1.8	1.6
55-59	2.0	1.6	3.1	3.3
60-64	2.7	4.8	7.7	5.3
65-69	3.7	12.5	13.0	5.2
70-74	5.3	20.7	19.4	5.8
75-79	7.9	34.8	32.7	5.8
80-84	15.0	47.2	37.0	7.1
85+	22.1	48.4	58.9	8.4

Death Certificate Statistics
(per 100,000 population) 1971

線であらわされる関係があること、多数の臓器癌のしめすこれらの直線は、ほぼ平行する近似の傾斜をもつこと、前立腺癌のみは発生開始年齢が

図2. 6種の臓器癌についての年齢・頻度図(両対数でしめす---R. Doll 1968 による).

そく、かつ傾斜度がとびはなれて大きいことなどを認めている。また、これらの事実から、発癌頻度 I は、次の簡単な方程式を満足する形で与えられるとした。すなわち

$$I = b(t-w)^k$$

ただし、 t は臨床的な癌の診断年齢、 w は予想される癌原因に曝露されなかつた年数と、発癌から臨床診断にいたる年数(およそ潜伏期に該当する)の和であり、 b は曝露量にかんする、 k はpower of yearにかんする常数である。この方程式は、先に述べた前立腺のような特殊な年齢条件にある癌や、喫煙および禁煙歴をもつたヒトの肺癌について再検討した結果も、Dollの作業仮説を満足するものと考えられている。

死亡統計や臨床統計に基づく、癌と年齢との関係にかんするDollの解析は、ヒトの化学発癌について、極めて基本的な知識や重要な示唆を与えるものと考えられるが、放射線、virusなどによる発癌にかんしての考察は未だ不完全であると思われる。

b. 剖検材料所見について: Waldenström は、全人口の90%以上が唯一の地域総合病院で死亡し、かつその80%が剖検されるSwedenのMalmö市での骨髓腫等の剖検統計を提出しているが(図3)、それによると、骨髓腫の頻度曲線は、最高年齢層での下降を示さず、持続的な上昇をみせてい

図3. Malmö および Sweden における骨髄腫, リンパ性白血病, リンパ肉腫の胃癌の年令曲線 (剖検でたしかめられたもの—Waldenström 1968)

る。

人体病理学者は剖検によって、与えられた臓器材料を公平に、可成り精密に検討する機会が与えられている。年令別の剖検統計を一般人口の死亡統計と対比して、その代表性を検討する研究は、古く Chicagoにおいて Saxton (1950), 東京において森 (1957) の業績に見られる。森の約 5,000 例の東大剖検例では、高令人口の比率が極めて小さく、この問題を論ずるのに著しい不足を感じさせる。これに反して、前に述べた日本病理剖検輯報では、全国の剖検症例が収集されていて、例えば 1968 年の一カ年間のみで、90 才以上に 64 例を教えることが出来、かつ癌死亡の頻度も高く、有意な最高年令での下降傾向を示していないことに気づかれる。

表2. 日本病理剖検輯報1968中の90才以上の老年者の癌

Annual Report of Pathological Autopsies			
Japan 1968			
Total		25,000	
No. of cases over 90	Cancer		
Male	22	10	
Female	42	10	

表3. 日本病理剖検輯報 (1966~1970) に基づく年令別胃癌出現頻度表

Age	Cancer Stomach			
	Male		Female	
	Total No Autopsy	Ca Stomach	Total No Autopsy	Ca Stomach
30 - 34	2177	195 (8.9)	1721	234 (13.6)
35 - 39	2713	301 (11.1)	2066	274 (13.2)
40 - 44	3396	367 (10.8)	2632	349 (13.2)
45 - 49	3799	498 (13.1)	2974	356 (12.0)
50 - 54	5271	784 (14.9)	3580	425 (11.9)
55 - 59	7789	1050 (13.4)	3976	471 (11.8)
60 - 64	7081	1218 (15.9)	4055	481 (11.8)
65 - 69	7222	1180 (16.3)	3801	482 (12.7)
70 - 74	4504	829 (18.4)	3012	335 (11.1)
75 - 79	2825	422 (14.9)	1995	160 (8.0)
80 - 84	1034	145 (14.0)	1101	88 (8.0)
85 - 89	376	38 (10.1)	416	28 (6.7)
90 - 94	84	6 (7.1)	124	3 (2.4)
95 - 99	18	3 (16.7)	31	2 (6.4)

表4. 日本病理剖検輯報 (1966~1970) に基づく男・女性胆路癌年令別出現頻度表

Cancer Death
Annual Pathological Autopsies, JAPAN
1966 - 1970

Age	Ca. Gall-bladder & Bile Ducts	
	Male	Female
30 - 34	0.4	0.5
35 - 39	0.5	0.7
40 - 44	0.5	1.1
45 - 49	1.2	2.7
50 - 54	1.4	1.8
55 - 59	1.5	3.6
60 - 64	2.2	4.6
65 - 69	2.4	5.2
70 - 74	3.5	5.4
75 - 79	3.8	5.5
80 - 84	3.3	4.8
85 - 89	4.2	2.3
90 - 94	5.5	1.8
95 - 99		

1966年から1970年の5年間の日本剖検輯報登録症例中、30才以上の男性48,289例、女性31,484例、合計は80,000例について、さらに詳細に見ると、表3に示す如く、胃癌死の%は60才以上の各年令階級毎に大きな変動を示さないのに反して、胆路の癌では、女性が75~79才で峰をつくつてのち下降するのに対し、男性では、持続的な上昇を示している(図7)。また重複癌症例においても高年層での上昇が見られる(表5)。

表5. 日本病理剖検輯報 (1966~1970) に基づく
男性重複癌の年齢別頻度表

Multiple Cancer - Male			
Age	Total No. Autopsies	Multiple Ca. No	%
30 - 34	2177	3	0.1
35 - 39	2713	8	0.3
40 - 44	3396	12	0.4
45 - 49	3799	33	0.8
50 - 54	5271	52	1.0
55 - 59	7789	82	1.1
60 - 64	7681	153	2.0
65 - 69	7222	133	1.8
70 - 74	4504	127	2.8
75 - 79	2825	76	2.6
80 - 84	1034	24	2.3
85 - 89	376	9	2.4
90 - 94	84	3	3.5
95 - 99	18	2	11.1

剖検材料は上のように、少なく共一部で死亡診断書統計と異なつた傾向を示す場合があることが認められるが、Saxton, 森, 以後の解析は至つて少ない。また剖検の大多数が医科大学附属病院または区域大病院や専門病院で行なわれるために、素材には二重、三重の選択が加つていることを考慮せざるを得ないという大きな制約がある。日本にはMalmoの例に匹敵する地域中央病院の剖検材料がない。ABCCで、原爆被爆人口の長期追跡を目標にした研究が行なわれているが、予め対照として考えられる非被爆者、遠距離被爆者をふくめ

表6. ABCC-H, ST 100剖検 (1961~1970) にあ
られた臓器癌の年齢階級出現頻度 (by courtesy of
Dr. A. Steer)

Male					
Ca.	No.	Age			
		- 44	45 - 59	60 - 74	75 -
Esoph	29	0	0	19 (2.6)	10 (2.1)
Stomach	174	7 (7.4)	23 (13.1)	100 (13.7)	44 (9.3)
Liver	47	1 (1.1)	7 (4.0)	28 (3.8)	11 (2.3)
Bile-Duct					
Lung	92	1 (1.1)	9 (5.1)	57 (7.8)	25 (5.3)
Leukemia	8	5 (5.3)	1 (0.6)	2 (0.3)	0 (0)
Lymphoma	11	1 (1.1)	1 (0.6)	6 (0.8)	3 (0.6)
T-2	97	2 (2.1)	7 (4.0)	42 (5.7)	46 (9.7)
T-1 - n	589	23 (24.5)	61 (34.7)	322 (44.0)	183 (38.7)
n	886	71 (75.5)	115 (65.3)	410 (56.0)	290 (61.3)
T-1	1475	94	176	732	473

T-1 = Total no. of autopsies

T-2 = includes ca in situ, latent and occult ca, and also possibly malignant lesions

n = no malignancy

た標品選定を行なつた上で、30年にわたつてこれを追跡し、また死亡者の剖検率も可成り高く(18~56%)維持されているので、今日の課題には高く評価されるべき資料となると思われる。ABCCのA. Steer博士の特別の配慮で検討することの出来た未公開資料によると、表6に掲げる予定の臓器癌の年齢別頻度は、可成りバラツキがあり、全癌、胃癌、肺癌、食道癌などについては、60~74才の峰が存在するように見える。またABCCのTechnical Report (TR11-71)から、1965~1970年

表7. ABCC-Hにおける男性剖検材料中の良性、悪性腫瘍の年齢別頻度
(日本病理剖検輯報1965~1970による)

Male							
Age	No. Autopsies	No Tumor	Benign Tumor	Malign. Tumor	Malign. + Benign	Early Ca	Multiple Ca
40 - 59	51	28 (54.8)	4	19 (37.2)	2	2 (10.5)	0
60 - 64	67	28 (41.8)	12	27 (40.3)	5	6 (22.2)	0
65 - 69	101	36 (35.6)	12	53 (52.4)	15	6 (11.3)	0
70 - 74	116	43 (37.0)	25	48 (41.4)	13	4 (8.3)	2
75 - 79	108	53 (49.0)	11	44 (40.8)	9	14 (31.8)	3
80 - 84	78	29 (37.1)	12	37 (34.6)	8	8 (21.6)	2
85 - 89	48	21 (43.8)	9	14 (29.1)	6	2 (14.3)	0
90 - 94	9	3 (33.3)	4	2 (22.2)	0	1 (50.0)	1
95 - 99	0	0	0	0	0	0	0
	460	185	73	198	51	35	8

表 8. 東京都養育院附属病院女性剖検例 (1 ~ 1,500) における腫瘍の年齢別頻度

Female							
Age	No Autopsy	No Tumor	Benign Tumor	Malign. Tumor	Malign. + Benign	Early Ca.	Multiple Ca.
65 - 69	35	24	5	6(17.1)	1	0(0)	0
70 - 74	99	63	10	26(26.3)	5	0(0)	1
75 - 79	140	89	23	28(20.0)	5	4(14.3)	1
80 - 84	186	112	30	44(23.7)	13	8(18.2)	1
85 - 89	94	55	20	19(34.5)	2	1(5.3)	0
90 - 94	36	20	9	7(19.4)	0	0(0)	0
95 - 99	5	3	2	0(0)	0	0(0)	0
Total	595	366	99	130	26	13	3

の6年間の男性剖検 600例について、良性、悪性腫瘍、早期、多発癌などの出現頻度を検討すると、65才以上では著しい傾向が見られず、80才以後では癌死に下降の趨勢がある結果になっている(表7)。

前述のSteer博士の未公開資料(表6)では、しかし、上皮内癌、潜伏癌、良悪性境界病変をふくむ早期癌群(T2)が、年齢と共に明らかに上昇する傾向を示すことは、甚だ注目される。

高齢者層が、長期在園のうちに疾患死する施設における所見が、一般老年者を代表するか否かについては、各方面から疑問が提出されるところであるが、東京における浴風園および東京都養育院附属病院からの報告は材料として貴重なものをふくむと考えられる。女性の癌については、養育院の全癌頻度(表8)は浴風園のそれ(表9)よりもはるかに高いが、早期癌は浴風園が高いこと、更に男性では養育院に早期癌の頻度が高い結果と

なるなど、単純に資料の差のみとはいいい切れず、検索の施設毎、臓器毎の精粗を問題にすべき点が見出された。因みに良性腫瘍の頻度は両施設の女性ではほぼ同様であつた。

浴風園の約 950例の男女症例での臓器癌の分布は表10の如くで、胃、肺、胆路、食道、脾、膀胱、子宮の順で低くなつてゆくのが分かる。注目すべき点として、また、(i) 頻度の高い癌では、同時に死因とならない副所見としての癌の発見率が高く、(ii) 他方、腎癌の如きは主死因となる頻度が極めて低いのに、高齢層で偶発所見として発見される癌の頻度が高く、その臓器特異性と年齢との関係を示唆するものがあり、(iii) 特に浴風園で、胃、前立腺、副腎等の過形成乃至良性腫瘍の頻度が高い傾向が見られた、ことを追記する。

以上の如く、剖検材料は、死亡統計ではえられない幾多の貴重な所見を提供し、年齢と癌の発生にかんする情報源として貴重であるが、さらに高

表 9. 浴風園女性剖検例 (#2402~#3363) における腫瘍の年齢別頻度

Female							
Age	No. Autopsy	No Tumor	Benign Tumor	Malign. Tumor	Malign. + Benign	Early Ca	Multiple Ca
65 - 69	43	34 (79.0)	4 (9.3)	5 (11.6)	0	0	0
70 - 74	103	77 (74.7)	8 (7.7)	18 (17.5)	1	1 (5.5)	1
75 - 79	164	121 (73.8)	17 (10.4)	26 (15.9)	2	3 (11.6)	1
80 - 84	173	129 (74.6)	27 (16.7)	17 (9.8)	2	5 (29.4)	0
85 - 89	120	79 (65.8)	20 (16.7)	21 (17.5)	1	12 (57.1)	0
90 - 94	40	26 (65.0)	8 (20.0)	6 (15.0)	1	2 (33.3)	0
95 - 99	8	6 (75.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	0	1 (10.0)	0
Total	651	472	85	94	7	24	2

表10. 浴風園の65才以上の男女剖検例における臓器癌の分布（日本病理剖検輯報に基づく）

	Ca		Benign Neoplasia & Hyperplasia
	Main Cause	Accessory	
Esoph	7	4	0
Stom	41	12	38
Colon-Rect	11	0	19
Liver	3	1	0
Panc	7	0	0
Bile Duct-Bladder	12	0	0
Lung	28	4	0
Kidney	2	3	1
Urin Bladder	4	1	0
Prostate	1	0	37
Uterus	4	1	16
Breast	2	0	0
Thyroid	1	1	11
Adrenal	0	0	22
Nerve-Menin	1 gi	0	3 menin

い水準での平等でかつ精密な検索と記録，それらの情報の確実な回収方法や統計的処理法を，臨床医学の各科の協力の下にすすめる必要が感じられる。この際その背景として，若年層，成人層についても同様の情報がそろえられる必要があることは勿論である。

現在の材料からは大要次の要約が可能であろうが，なお決定的な証左には欠けている。

- 加齢と共に多くの臓器の癌死亡の出現は増大する。
- 加齢と共に早期癌の出現が増大する。
- 加齢と共に良性腫瘍乃至過形成の頻度も増大する。
- 良性，悪性を通じて各発達期の腫瘍の重複出現の機会が増大する。
- ただし現在の情報の確度には望むべきものが極めて多い。

c. 手術材料等の所見：手術材料は死亡統計，剖検等からの資料に比べて，高い選択をうけているが，広く各科の組織検索材料を取扱う病理学者としては，それらから大むね次のような印象をうけている。

i. 或る種の癌は老年者に限って見られ，幼年・青年・成年の各層には極めて希である。代表的なものとしては皮膚癌，前立腺癌，胆路癌をあ

げることが出来る。これに反して，老年層に希な癌，他の年齢にも共通して見られる癌があることはいうまでもない。

ii. 高年者の癌には分化度が高く，限局性の発育形式をとり，転移が少ないものが多い。これと関連して手術予後の比較的よいものが多い印象がある。

iii. 高年者の癌には，臨床的経過に比して深達度の浅いものがあり，発育速度がおそいことを示唆するものがある。

iv. 老年者で以上のような特徴を備えた癌を見る症例においては，癌性病変の背景として，萎縮，化生，過形成，良性腫瘍などの共存を見ることが多い。

しかし，他方高年者においても組織型，発育形式，転移率等において，全く若年の人に見られるものと差異を認めない癌が可成り高い率で出現することはいう迄もないので，上の印象を直ちに一般化することは出来ないことは強調しておきたい。他方これらの印象は，従来臨床家が手術そのものの危険性，合併症併発の可能性などを考えて，老年者の腫瘍の積極的治療を諦めていた傾向に，重要な反省を促す機会ともなりうるものである。例えばBussey (1968) の示す如く，直腸癌の手術生存率は高年者に大である（図4）。

図4. 直腸癌の術後生存率と年齢との関係 (Bussey 1968 による St. Mark's Hospital での 3,595 症例に基づく)

4. 考 案

a. 発癌機構と老年者の腫瘍について

発癌の本態を遺伝情報発現の障害と考える学説は、可成り広い支持をうけている。その中には、遺伝情報源である遺伝子そのものの障害並びに、伝達過程における障害の二面がある。加齢によつて招来される老化現象の本態については、なお諸説が並行して存在するのが実情であるが、遺伝情報発現の障害と考える仮説も存在する。殊に放射線障害を通じて、この両者の現象を結びつけようとする学説には可成りの魅力が感じられている。

癌と呼ばれる生物学的な特異現象は、従来単一性格をもつものとして理解する努力の許にあつたが、他方1972年の日本医学会総会の席において太田がのべた如く、少なく共2種類以上の発生上の性格を異にするものの、包括的名称であると考えられる方向にも、根拠が見出されるように思われる。すなわち、virusをもつて、化学的および物理学的発癌のすべてを含めて説明し去ろうとする傾向には、現在強い抵抗が生じているのである。

化学的原因による癌の発生機構については、1947年のRusch, Berenblum, Rousらがおのおの独立して提出した発癌の2段階説が認められている。すなわち、特異的な起癌機構 (initiation) によつて、癌細胞は成立するが、その増殖には他の刺激、すなわち一般に育癌機構 (promotion) が必要であるとするのである。後者が欠けている場合には、癌は単に睡眠癌細胞(dormant cell)に止まり発育しない。

太田は起癌機構は全くde novoにも作用するが、一般にはむしろそれが有利に働くような準備状態(preparatory stage) 存在があるなと考えている。萎縮-過形成状態、化生、再生などがそれである。また癌の発育の段階においては、癌細胞間の淘汰、免疫学的選択、内分泌学的な規制などの機構が存在すると考えられるようになっていく。さらに発癌刺激については、Druckrey, 中原以来、刺激の相加・相乗機構 (summation) の存在が多く

表11. 癌発達の各相

の支持をうけている。この事は先にのべたDollの疫学的観察が、長期持続的な発癌刺激の曝露と関係しているとの結論を導いた点からも、ヒトの発癌の発生にかんして真であろうと考えられる。動物実験では、遠藤、杉村らの生化学者によるisozyme patternの不可逆的变化の証明が、その見方を更に強固にしている。しかし、実験癌学者のいう発癌早期の刺激相加状態と、太田の準備状態との関係については、今後の知見にまっところが多い(表11)。

b. 発癌準備状態と老年者の腫瘍

発癌に準備状態が必要であると仮定すると、このような準備状態はいずれにしても長期にわたる非特異的或いは特異的刺激を必要とするという意味で、加齢との関係が密接となり、老年者の腫瘍発生の増加に大きな意味を有することとなるのは自明であり、老年者に特異的な多発癌、進行癌と早期癌の共存の説明に有利な支持を与える。さらに良性腫瘍の多発、頻度の増加も、この方向での説明が可能となる。

腫瘍の組織型が、もし発癌準備状態の組織性格によつて規定されるのであればとすると、老年者の腫瘍は、老年者に多い母地組織の非腫瘍性変化を反映するものであつてよい。最近多くの病理学者

図5. 年齢別にみた癌組織型の比と腸上皮化生の程度の比 (中村恭一, 1972)

が、このような事実が存在することを認める傾向にある。例えば、肺の扁平上皮癌は気管支上皮の扁平上皮化生の素地に生じ、胃の腸上皮型腺癌は、胃粘膜上皮の腸上皮化生の上にはじめて成立する、との考え方である。

胃において、LaurenとJärviは癌の大部分が腸型 (intestinal type) とびまん型 (diffuse type) に分類出来、これらはそれぞれ特徴のある病態を示すとし、Correa, Sugano-Nakamuraらもこれを支持している。中村は胃粘膜における腸上皮化生の出現および分布と、腸型胃癌発現の年齢的および胃粘膜内分布との間に、極めて密接な関係があることを証明している。この意味では、老年者に多い高分化型腸上皮型腺癌の発生準備母地としての、胃粘膜の老年性組織変化の持つ意義が大きいと考えられる。しかし他方、びまん型胃癌についてはなお大きな問題が残っており、そこにも腸型上皮の marker としての leucyl aminopeptidase や alkaline phosphatase が 50% の症例に証明されるので、胃癌発生が同時に上皮性格の化生的表現変化を伴う可能性が高く、腸上皮化生の準備状態とは無関係に腸上皮型胃癌が発生しうることを示している。同様の議論は、肺のいわゆる扁平上皮癌についても成立することを附記して置く。

腫瘍発生にある種の準備状態が必要であり、かつその準備状態の成立に長年月を有し、したがつ

て、成立した腫瘍が老年者に多く、可成りな特徴的存在としてみとめられる例は、その他にも多い。ここでは骨肉腫の母地としての Paget 病、神経鞘肉腫の母地としての Recklinghausen 病、腸ポリポージス、火傷癌、骨髄癌などの瘢痕状態、或いは肝癌母地としての肝硬変症を例示しておく。

c. 潜伏癌および上皮内癌：老年者にこれらの広義の早期癌が累積してくることは、前述の資料からまず明らかと思われる。その発現の要因には下記の二つの事項を考慮せねばならない。

i. 老年者は血管損傷を主軸とし、肺炎の如き軽微な感染症を補助としておきる一種の突発死に見舞われる機会が多い。そのために、もしこのような偶発性の“早期死亡”が起きない場合には当然充分発育すべき癌が、発達途上の状態で無症状のままに剖検で発見される。

ii. 大腸癌の手術材料所見などから見られるように、老年者では腫瘍発育、増殖の速度がおそく、老年期に発生した癌が、宿主の life span 内に致死的水準の量にまで達しなかつた、可能性を考えるべき場合がある。

前者については、殆ど議論の余地はないと思われる。またこれは発癌の準備段階説や、相加説を支持するものと考えられる。

後者にかんしては、なお資料が不足している。たとえば、実験動物においても、老年層で腫瘍増殖が一般に低速度であるという証左は極めて乏しいといわねばならない。前述の発癌過程の表に示した免疫の問題にしても、むしろ事実の説明を困難にする面が多い。老年における個体代謝一般をも含めての検討が必要であろう。

d. 良性腫瘍の諸問題：ABC Cや浴風園の資料からは、目標を限定した場合、老年者においては良性腫瘍の加齢に伴う増加が見られる。

良性腫瘍の本態の理解は、悪性腫瘍のそれに比べて甚だ低い。本論文における資料中でも、非腫瘍性過形成をふくんだものが多い。なかんずく消化管ポリープを良性腫瘍に一括して取扱うなどは将来知見の解析をさらに困難にする一因となるの

表12. いわゆる良性腫瘍

1. 過誤腫（組織奇形）
2. 反応性過形成
3. 真の良性腫瘍
4. 低悪性度悪性腫瘍
5. その他

表13. 男性大腸腺腫中の悪性変化（St. Mark's Hospital の手術材料による）（武藤1974）

MALE				
Age	Tubular Adenoma	Papillary Adenoma	Villous Adenoma	Total
0 - 9	0	0 ()	0 ()	0 ()
10 - 19	0	0 ()	0 ()	0 ()
20 - 29	5 (1)	0 ()	0 ()	5 (1) 20.0
30 - 39	49 (2)	3 (0)	1 (1)	53 (3) 5.7
40 - 49	184 (14)	14 (4)	10 (3)	208 (21) 10.1
50 - 59	348 (20)	58 (18)	30 (12)	436 (50) 11.5
60 - 69	435 (30)	83 (25)	38 (22)	556 (77) 13.8
70 - 79	247 (29)	53 (17)	33 (15)	333 (61) 18.3
80 - 89	32 (3)	7 (1)	11 (7)	50 (11) 22.0
90 - 99	0 (0)	1 (1)		1 (1) 100.0
	1301 (99)	219 (66)	123 (60)	1418 (225) 15.9

で、速かに組織学的分類を普及させる必要がある（表12）。

良性腫瘍を悪性腫瘍の中で最も悪性度が低く、発育速度のおそい極限型と考えると、この型の腫瘍の老年期における蓄積は悪性腫瘍早期段階と共に理解出来るが、果してこの仮定を一般的に認めるか否かについてはなお問題がある。

実験腫瘍においては、その細胞の変異が起きる事が証明されている。良性腫瘍の悪性転化はヒトにおいても認められるが、一般にその頻度は特別の場合を除いて、極めて小さい。しかし、消化管腺腫の悪性化は広く知られている如くで、武藤がLondonのSt. Mark's Hospitalの材料で検討したところでは（表13）、腺腫の三つの組織型では異型増殖性の強い型の出現頻度が高年齢で上昇する。また佐藤の東北大学剖検例 1,000例についての検索結果の未発表資料でも同様の時間および明らかな腺腫内癌化の高年齢での頻発が認められる。この意味では、“良性腫瘍段階”を通じた悪性腫瘍の出現は、加齢と密接に並行する。

e. 腫瘍増殖の全身的規制と老年： 腫瘍増殖が体液を通じて全身的規制をうけることは最近、

代謝、内分泌および免疫の三方向から解析されている。

i. 内分泌規制： 明らかなホルモン依存を示す臓器の癌は、女性では閉経期に左右されることが多い。その意味で加齢との関係は間接的である。一部の乳癌は閉経前では強いestrogen低下や、androgen投与により抑制をうけ、反対に高年齢者の乳癌ではestrogenで抑制されるものがある。前立腺癌は高年齢でも抗androgen治療で、少なく共一時的に強い抑制をうけるものが多い。癌細胞のホルモン受容機構と癌の増殖にかんしては近い将来の解明が期待出来る。

高年齢者の下垂体材料を予備的に調査した結果では、10～20%の高率に、下垂体腺上皮細胞の腫瘍乃至腫瘍様増殖が見られる。その多くはいわゆるmicroadenoma（微小腺腔）の形態をとるか、周囲腺組織との境界が明らかでない小増殖巣にすぎない。最近の文献でもこのような所見は支持されている。ただし、この所見が高年齢における相互間分泌規制の乱れの表現であるのか、または下垂体に独立した単なる増殖現象にすぎないかは、今のところ決定出来ない。

ii. 免疫学的規制： 一方では前述の如く発癌過程における免疫学的監視の問題があり、他方では老年における免疫能の一般的低下の問題があつて、理論的に興味深いところであるが、なお不明の点も多く、簡単な結論は導き出せない。殊に後者にかんしての知見は学者によつて一定の成績がない。実験動物ではCeladaの如く、高令動物で抗原に対する反応が低下すると主張するものがある。

この点は老年者における腫瘍増殖の低下の説明に便利な仮説とはいえない。腫瘍に対する宿主免疫位の局处的表現については、よく知られているとはいいい得ない。腫瘍周囲のリンパ・プラズマ球性反応、或いは白血球浸潤をふくめて考慮されているのが現状であろう。演者の経験では、若年者の早期胃癌中に著しいリンパ球反応を呈するものがある反面、91才の老人の前立腺癌にも、強い同

様の反応を呈するものを見ている。胃癌ではその高分化型腺癌に管内感染を思わせる烈しい周腫瘍性の白血球浸潤が頻発する。いずれにしても、老年者腫瘍にかんして免疫学的規制を論ずるには知見が甚だ不足している状態といつてよい。

5. 結 語

1. 腫瘍にかんしてはその本態について、可成り確実な諸学説があつて、現在一定の方向への帰着が予期出来るようになってきているが、老化については未だ学説の主流が安定せず、理論的に両者を等価に対比して論ずることは、現段階では困難である。

2. 化学的および物理的要因によると思われる発癌では、癌の発生は癌原因への曝露に依存し、その頻度は曝露の濃度と時間の関数として決定される。

3. また、窮極像としての発癌にいたるまでには諸段階があつて、非特異性・可逆性の準備段階をふくめて考える必要がある。

4. 実験とことなりヒトの発癌がその生活条件の下で起きる場合の、癌要因の濃度は極めて低いから、長い曝露時間が予想されるし、その意味で必然性をもつ加齢の要素を考えることが、老年者の腫瘍の理解に不可欠となる。Dollの方程式は端的にこれを表わしている。

5. 老年者は若年者とことなり、むしろ偶発的な軽微の原因で死亡するケースが多いので、精密な検索によれば、発達した癌のみならず、早期癌、潜伏癌、境界病変等の出現頻度が高いことが認められる。

6. 更に老年者では腫瘍発生の準備段階が認められることが多い。

7. 老年者に多く認められる良性腫瘍も、悪性腫瘍の発生母地としての役割をもつものがあることに注目される。この事は良性腫瘍の本態や、腫瘍発生後の変異の出現などの重要な示唆をふくんでいる。

8. 老年者の腫瘍は、その組織型では分化度が高く、浸潤性に乏しいものがあり、一部では、発癌母地の準備状態を反映するものがある。現在の知識ではこれを老年者腫瘍に一般化することは出来ないが、一方これらの知見は老年者の腫瘍の積極的治療を促す根拠となりうるものである。

9. 老年における内分泌的、免疫的規制と腫瘍の発生および発育の問題については、なお興味がある点が多いが、現時点でにわかに、これらに結論を下すべき証左は欠けている。

10. これらの検討を通じて痛感されるのは老化にかんしても、老年者の腫瘍にかんしても、疫学的検討に堪える基礎dataの整理が誠に不完全であることで、殊に剖検資料の系統的検索と成績の蓄積が、将来に渉る地味な努力の目標として第一に望ましいことである。またこの事は、日本人の老化の実態、将来の日本の医療の方向づけのためにも必要である。

文 献

- 1) 太田(邦): 日本医学会第18回総会記録。 —2) 太田(邦): 日老医誌, 8: 152~156, 1972. —3) Teller, M. N.: Adv. Gerontol. Res. 4: 25~43, 1972. —4) Kruckemeyer, K.: Ärztl. Prax. 23/63: 2993~2996, 1971. —5) Waldenström, J.: Cancer & Ageing 1968, p. 155~163. —6) Bussey, H.J. R.: ebd. p. 203~214. —7) Doll, R., Cook, P.J. & Fellingham, J.A.: Internatl. J. Cancer 4: 93, 1969. —8) Doll, R.: Cancer & Ageing, 1968, p. 15~35. —9) Peters, R.L. et al.: Internatl. J. Cancer 10: 273~282, 1972. —10) Whidmine, C.E. et al.: J. Natl. Cancer Inst. 49: 1411~1416, 1972. —11) Vesselinovitch, S.D. et al.: Cancer Res. 31: 2133~2142, 1971. —12) Gardner, M.B. et al.: J. Natl. Cancer Inst. 50: 719~734, 1973. —13) Teller, M.N. & Eilbert, M.: J. Natl. Cancer Inst. 39: 231, 1967. —14) 森(亘): 日病会誌。 —15) Stewart, A. et al.: Brit. Med. J. 5086: 149~1508, 1958. —16) Court-Brown et al.: Res. Med. J. 5474: 1327, 1965. —17) 亀山(正): 綜合臨床, 23: 447, 1974. —18) 厚生省人口動態統計1972.