物理有機化学

—シンポジウム—

物理有機化学 (Physical Organic Chemistry) は歴史的には非常に若く、学問的にまとめられたのは 1940 年, Hammett の成書 (Physical Organic Chemistry) をもって嚆矢とする。位置的には、物理化学と有機化学の境界領域の学問分野であり、内容的には、有機構造論および反応論を中心としたものである。また、方法的には、量子化学的ならびに統計力学的研究といった理論 (計算) 的方法から各種の有機化学的ならびに物理化学的実験方法——とくに最近における IR, UV, NMR, ESR といった分光学的測定法の発展による進歩——が用いられる。

世界における物理有機化学研究論文の急増に対処して、“Chemical Abstracts” が Physical Organic Chemistry なる項目を新たに設けたのは 1963 年である。年を同じくして、アメリカ合衆国ではブランデス大学の Cohen 教授、カリホルニア大学の Streitwieser 教授ならびにペンシルバニア州立大学のタフト教授の編集になる “Progress in Physical Organic Chemistry” (年刊) の、また、欧州ではロンドン大学の Gold 博士の編集になる “Advances in Physical Organic Chemistry” (年刊) のともに創刊号が発行され、物理有機化学に関心をもつ研究者に大きな便益を与えると共に、一般の化学者にも新たな時代の到来を認識させたのである。

本シンポジウムは、このような世界的背景の上に、物理有機化学における最近の “vivid” な諸問題について現状を紹介すると共に、独創的研究報文をこれに配したものであって、この方面の今後の進歩にはもちろん、その成果を待望している有機工業化学の諸分野の発展にも少なからず貢献するものと信ずる。

本シンポジウムの企画、編集にあたっては、福井謙一、吉田善一両氏の一方ならぬ御尽力を得た。ここに深く感謝する次第である。

工業化学雑誌編集委員会

—総 説—

化学結合論の進歩

長 倉 三 郎^{*1}

1 ま え が き

化学結合論の最近の進歩は極めて広範囲にわたっているので、その全容をつくすことは容易でない。実験的な面から化学結合の実体をとらえるという面からみても、分子内の原子配置決定における精度の向上や、磁気共鳴吸収など新しい実験方法の開発による新知識の蓄積、分子の振動スペクトル解析による力の定数や分子内ポテンシャルに関する知識の精密化などここ数年の間に目覚ましい進歩が認められる¹⁾。

また化学結合研究の対象が安定な分子やイオンから、不安定な化学種や分子の励起状態に拡大されたことも注目すべきことといえてよい。これは、閃光分光法、衝撃波法、高速走査分光法、低温凍結法など実験法の進歩に負う所が大きいが、他方分子軌道法をはじめ理論的研究方法の進歩も不安定な化学種の研究の進歩に大

きな役割を果たしている。不安定化学種の結合の研究は化学反応の機構を理解する上から重要な意義をもっているばかりでなく、新しい型の結合——従来の化学結合の常識から外れている点で異常な原子価と呼ばれることもある——が見出される点で、実験的にも理論的にも将来一層の発展が期待される興味深い研究分野である²⁾。

以上二つの面は化学結合論の進歩を論ずる上で見逃すことのできない重要な点であるが、しかし最近の傾向として最も注目すべきことは、分子軌道法の考え方が化学者の間に目覚しく普及しかつ利用されるようになったことではないかと考える。元来化学の研究者は Heitler-London 流の考え方、すなわち分子内の各原子はそれぞれ固有な原子価電子をもっており、それらを原子間で交換しあって結合ができるという考え方に永い間親しんでいた関係もあって、分子全体に広がった分子軌道の中を原子価電子が運動するという分子軌道法の考え方は化学者には判りにくいものと考えられていた。しかしここ数年の間に若い研究者の間では事態が

^{*1} Saburo NAGAKURA 東京大学物性研究所：東京都港区麻布新亀土町。

急速に変わりつつあるように感じられる。分子軌道法の計算をとりあつた専門書がわが国でいくつか発行され³⁾、有機化学の研究者に広く読まれるような事態は 10 年前にはほとんど予想できなかったことといってよい。こうした現状からみて、ここでは分子軌道法の進歩を中心に記述を進めたいと思う。

2 非経験的分子軌道法と半経験的分子軌道法

分子軌道法の基本的な考え方については、ここでふれる必要はないであろう⁴⁾。Dirac がいみじくも “In principle the whole of chemistry is contained in the laws of quantum mechanics” と指摘したように、化学結合の問題も、たとえば、Schrödinger の波動方程式を解くことによって完全に理解できるはずである。しかし幸か不幸か一般の多電子系に対して Schrödinger の波動方程式は厳密には解けない。このことが化学結合の理論的取扱いを複雑にしたことはいうまでもない。すなわち化学結合の実体でできるだけ即したモデルを作り、それを基にして近似的な解を求めざるをえないわけであるが、その出発点となるモデルのとり方や近似の程度によって化学結合のいろいろな近似理論が生まれるわけである。現在までに知られている近似理論はきわめて多いが、原子価結合法と分子軌道法の二つに大別されることはよく知られている⁵⁾。もちろんこうした近似理論は、できるだけ正確で化学結合の実体を定量的に現わすものであることが望ましい。また化学の研究者にとっては複雑な系に対しても比較的簡単に適用できることや、またある場合には多少精度を犠牲にしても全般的な見通しがきき、かつ従来の化学結合の考え方との関連のつき易い理論体系が望ましい場合もある。こうしたいろいろな目的を一つの近似理論で満たすことは現状では残念ながら不可能であるから、それぞれの目的に応じていくつかの近似理論を使いわけることが必要である。逆にいえば、一口に分子軌道法といっても、いくつかの目的に合うようにいろいろな近似法が提出されている。ここで個々の近似理論について詳しく説明する余裕はないが、表にまとめて記せば次のようになる⁶⁾。

半経験 的方法	1.	簡単な 1 電子近似の分子軌道法 (LCAO 近似のもの、自由電子模型などを含む)
	2.	Pariser-Parr 法 (電子配置間相互作用を含む)
	3.	Pariser-Parr-Pople 法 (昆氏によって適用された方法もこの中に含まれるので Pariser-Parr-Pople-Kon の方法というべきかもしれない。この方法は現在複雑な π 電子系に最も広く適用されており、電子計算機のプログラムも各所で作られている)
	4.	組合せ分子の方法 (複雑なしかもヘテロ原子を含む π 電子系の電子スペクトルの理論として勝れたものと考えられる)
非経験 的方法	1'.	Goeppert-Mayer, Sklar の理論
	2'.	LCAO SCF 法 (原子軌道として Slater 軌道以外のものを使う場合も含む)
	3'.	その他の方法 (電子相関をうまくとり入れるための理論たとえば Löwdin の alternant orbital を使う方法や非 LCAO 理論などを含む)

上にまとめた表は大まかな分類を示したものであって、それぞれの分類の中にいくつかの方法が含まれている。たとえば簡単な 1 電子近似の分子軌道法といっても、その中には最も簡単な初期の Hückel の分子軌道法から各原子の電荷に対してクーロン積

分などのパラメーターを補正して電荷分布に関して自己無撞着な分子軌道を求める方法たとえば ω -法⁷⁾に至るまでいくつかの方法が含まれている。また電子配置間相互作用 (CI) を考える場合にも、考慮する励起電子配置の種類によって計算の精度と難易は著しく異なっている。

上にあげたようないろいろな方法があるが、半経験的方法^{*2)}について一般的にいえる最近の傾向の一つは電子計算機の性能向上と普及によって、簡単な Hückel 法はもちろん比較的精度の高い近似理論が複雑な系に対しても容易に適用できるようになったことである^{*3)}。この意味で、分子軌道法の応用面における電子計算機の役割はきわめて大きく、また今後その重要性は益々増すものと考えられる。

もう一つの顕著な傾向は、半経験的な方法における大胆な近似やパラメーターを非経験的方法の立場から正当化し、あわせて半経験的方法の信頼度を高めるとともに、その限界を明らかにしようとする動きである。たとえば、信頼度の高い半経験的方法として Pariser-Parr-Pople 法⁸⁾が現在よく使われているが、その方法の特色であるいわゆる zero-differential-overlap の近似の正当さを Löwdin の直交化原子軌道⁹⁾を使って明らかにしようとする試みが二、三の研究者によって行なわれている¹⁰⁾。同じく、Pariser-Parr-Pople 法の特色である 1 中心クーロン反発積分に関する近似—すなわち同一原子軌道に属している二つの電子間のクーロン反発エネルギーをイオン化ポテンシャルと電子親和力の差で置き換える近似—を非経験的な計算の立場から検討する試みも行なわれている。この後の目的のためには分子軌道を作る基礎となる原子軌道をできるだけ正確なものにすること^{*4)}および多電子系における電子相関のエネルギーをできるだけ正確に見積ることが必要となり、事実このような方向に向って最近具体的にいくつかの成果が得られている¹⁰⁾。

分子軌道法が進歩した結果¹¹⁾、目的に応じて適切な近似計算法を選ぶならば信頼度の高い理論の結果が得られるようになっていくが、ここではその一つの例として、ベンジル陽イオンの計算結果について簡単に述べることにする。

ベンジル陽イオンおよびそのメチル誘導体の π 電子構造を Pariser-Parr-Pople 法で計算し、1 電子励起および 2 電子励起によって生ずる合計 12 個の励起電子配置の配置間相互作用に対す

*2) 非経験的方法について認められる最近の傾向についてはここではふれないが、分子軌道を構成する原子軌道を改良する方向 (たとえばガウス関数で展開する方法など) と電子間の相関を考慮する方法の改善の二つの方向に向かっていくように思われる。詳細についてはたとえば 6b 参照。

*3) Hückel 法による計算は複雑な分子についても非常に簡単に行なえるようになった。その結果については C. A. Coulson, A. Streitwieser, Jr., “Dictionary of π -Electron Calculations”, Pergamon Press, Oxford (1965); A. Streitwieser, Jr., J. I. Brauman, “Supplemental Tables of Molecular Orbital Calculations”, Pergamon Press, Oxford (1965) など参照。また Pariser-Parr-Pople 法を複雑な π 電子系に適用することも電子計算機の発達によって可能となった。たとえばボルフィオンおよびその誘導体の計算が東工大小林助教授らによって行なわれている。たとえば従来使われていた Slater 型の原子軌道の代りに解析的な SCF-原子軌道を使う方法。これによって 1 中心クーロン積分の計算値は 2 eV 程度改善される。

*4) たとえば従来使われていた Slater 型の原子軌道の代りに解析的な SCF-原子軌道を使う方法。これによって 1 中心クーロン積分の計算値は 2 eV 程度改善される。

る寄与も考慮して、遷移エネルギー ΔE および遷移に対する振動子強度 f を計算すると表1のようになる¹²⁾。ここではそれぞれの陽イオンに対してエネルギーの低い二つの遷移に対する値を示してある。

この表からそれぞれの陽イオンに対して $450 \text{ m}\mu$ (2.8 eV) 付近と $300 \text{ m}\mu$ (4.7 eV) 付近とに二本の吸収帯が現われるべきこと、しかも振動子強度の値からいって、短波長側の吸収帯の強度は長波長側のものよりも 6~9 位強いことが期待される。

ベンジル陽イオン自身についての Symons らの電子スペクトルの測定結果によれば $460 \text{ m}\mu$ に一本の吸収帯が見出されており、短波長側の強い吸収帯が見出されていなかった¹³⁾。われわれはこのような実験と理論との不一致から Symons らの実験結果に疑問をいだき、ベンジル陽イオンおよびそのメチル誘導が生成されと思われる種々の混合系(たとえば塩化ベンジル-塩化アルミニウム- CH_2Cl_2 系など)について Symons らの結果を再検討した。すなわち低温および常温での電子スペクトルの測定、低温での核磁気共鳴吸収の測定などをくり返した結果、Symons らの求めた電子吸収帯はベンジル陽イオンがさらに反応して生じた生成物の吸収帯であること、メチル基の超共役効果または立体効果で安定化したメチル誘導体では期待される位置に、予想通りの強度比をもって2本の吸収帯が出現することが明らかになった。一例として α, α -ジメチルベンジル陽イオンの電子スペクトルの測定結果を図1に示す。

上にあげた研究は分子軌道法の計算が実験結果の再検討を促がし、新しい結論に導いた一つの例である。このような例からわかるように不安定な化学種の研究においては、その同定という点か

表1 ベンジル陽イオンおよびそのメチル誘導体の遷移エネルギーと振動子強度の計算結果

イオン	PhC ⁺ H ₂		PhC ⁺ H(Me)		PhC ⁺ (Me) ₂		2,4,6-(Me) ₃ -PhC ⁺ H ₂		2,4,6-(Me) ₃ -PhC ⁺ (Me) ₂	
$\Delta E(\text{eV})$	2.860	4.278	3.159	4.436	3.436	4.631	2.840	4.289	3.364	4.568
f	0.065	0.425	0.037	0.522	0.069	0.570	0.095	0.547	0.099	0.686

らも分子軌道法による理論的研究が重要な意義をもっている。その場合、ベンジル陽イオンのように偶数個の π 電子からなる系の場合には問題が少ないが^{*5}、不對電子をもつ系の場合には最近いろいろな試みがなされているにもかかわらず、方法論的にまだ多くの問題が残されている¹⁴⁾。分子内の不對電子密度またはスピン密度と電子スピン共鳴吸収の超微細構造の結合定数との関係など理論的にも実験的にも最近活発に研究の行なわれている問題とも関連があるので¹⁵⁾、 σ 電子系の取扱い^{*6}と共に今後の発展が望まれる分野である。

3. 分子軌道法と結合の諸性質

分子軌道法の理論が著しく進んだ現状において、その結論と従来われわれ化学者がもっていた化学結合の概念——たとえば結合の強さ、結合の極性、混成、結合の加成性^{*7} など——との関連を考察することは、化学結合の概念を厳密化し定量化してゆく上にも、また化学結合の概念の適用性を拡大して、分子の構造と反応性との関連を考えるためにも重要である。

重なり積分を無視した簡単な Hückel の1電子近似の分子軌道法の範囲内で結合の強さや長さおよび結合の極性などを分子軌道関数と結びつける量として、結合次数や電子密度が定義されている^{8,9)}。これらの量と反応性を示すパラメーターである自由原子価とをあわせて図に示した分子図が、分子の性質を理解する上に有用であり、従来の構造式の代りに分子図を用いた方がよいと主張する研究者もいることはよく知られている。ここではさらに進んだ分子軌道理論によって求められた結果を理解する方法として Mulliken によって提出された population analysis の方法について簡単に説明しておく¹⁶⁾。

初めに2原子 k および l からなる分子について考えよう。2原子分子の分子軌道関数

$$\phi = C_r \chi_r + C_s \chi_s \quad (1)$$

*5 ヘテロ原子を含む系に対して Pariser-Parr-Pople 法を適用する場合にはまだ若干問題が残っている。それは主としてパラメーターのとり方に関するもので、近いうちに解決する可能性があるが、電子分布の不均一からくる電荷に対してパラメーターをいかに補正するかということはかなり難しい問題である。この問題についてはたとえば Brown らの提出した VESCF 法が一つの解決法となっている (R. D. Brown, M. L. Heffernan, *Trans. Faraday Soc.*, 54, 757 (1958); *Australian J. Chem.*, 13, 38 (1960))。

*6 複雑な σ 電子系に対して分子軌道法を適用することは化学者にとって重要な問題であるが、その解決は今後に残されているといつてよい。最近この方面の研究は活発になっており、わが国でも京大福井、米沢阿教授らおよび茨城大浜野助教授らによって行なわれている。

*7 結合の加成性すなわち各結合に固有な量の和として分子全体の性質が表わされるという考え方と、分子軌道法との関連は、理論化学者にとって、興味深い問題の一つである。Lennard-Jones らの equivalent orbital の方法はこの方向への一つの解決策を与えたものといつてよい。この点については文献 6b) および 11) 参照。またこの問題については大野、化学と工業, 18, 1269 (1965) 参照。

図1 α, α -ジメチル塩化ベンジルの $\text{AlCl}_3 + \text{CH}_2\text{Cl}_2$ 中の電子スペクトル

A: 低温 B: 室温

縦軸は α, α -ジメチル塩化ベンジルがすべて陽イオンに変わったという仮定のもとに求められた見掛けの分子吸光係数

に N 個 (一般には 2 個) の電子を入れる
と

$$N\phi^2 = NC_r^2\chi_r^2 + 2NC_rC_sS_{rs}(\chi_r\chi_s/S_{rs}) + NC_s^2\chi_s^2 \quad (2)$$

$$N = NC_r^2 + 2NC_rC_sS_{rs} + NC_s^2 \quad (3)$$

が得られる。(2) および (3) 式の S_{rs} は原子軌道 χ_r と χ_s 間の重なり積分で

あるが, Mulliken によれば (2) 式の右辺の第 1 項 NC_r^2 と第 3 項 NC_s^2 をそれぞれ原子 k および l の net atomic population と呼び, 第 2 項 $2NC_rC_sS_{rs}$ を overlap population と呼ぶ。

第 2 項 $2NC_rC_sS_{rs}$ は二つの原子軌道 χ_r と χ_s にまたがる項で, 元来それぞれの原子軌道には割りふれない項であるが, これを等分して, それぞれの net atomic population に加えたもの, すなわち,

$$\left. \begin{aligned} N(k) &= N(C_r^2 + C_rC_sS_{rs}) \\ N(l) &= N(C_s^2 + C_rC_sS_{rs}) \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

をそれぞれ原子 k および l の gross atomic population と定義する。

上の定義を一般化して多原子分子の i 番目の分子軌道を ϕ_i , その中に $N(i)$ 個の電子が入っている場合には, overlap population は次のように定義される。

$$\left. \begin{aligned} n(i; r_k s_l) &= 2N(i)C_{ir_k}C_{is_l}S_{r_k s_l} \\ n(i; k, l) &= \sum_r \sum_s n(i; r_k s_l) \\ n(r_k, s_l) &= \sum_i n(i; r_k s_l) \\ n(k, l) &= \sum_i \sum_r n(i; r_k s_l) \\ n(i) &= \sum_{r_k, s_l} n(i; r_k s_l) \\ n &= \sum_i n(i) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

n は total overlap population, $n(i; r_k s_l)$, $n(i; k, l)$, $n(r_k, s_l)$, $n(k, l)$, $n(i)$ などは partial overlap population や subtotal overlap population と呼ばれ, total overlap population の構成単位となる。たとえば $n(k, l)$ は k 原子と l 原子間のすべての結合についての overlap population の和であり, k, l 両原子間の全結合の強さを表わす指数となる。 $n(i; r_k s_l)$ は i 番目の分子軌道に関する overlap population で, しかも k 原子の r 軌道と l 原子の s 軌道間の overlap population を表わす量であり, $n(i; k, l)$ は i 番目の分子軌道における k, l 両原子間の overlap population である。同様にして $n(r_k, s_l)$, $n(i)$ の意義も理解できるであろう。また atomic population についても 2 原子分子の場合の定義を多原子分子に拡張して使用できるが, 詳細は省略する。

overlap population は結合次数と同様に, 結合の強さに対応するものであって, その値が正であれば結合性の存在することを, 負であれば反結合性の存在することを示している。具体的に CO 分子を例にとって説明しよう。Mulliken の論文から CO 分子の種々の overlap population の値をとると表 2 のようになる⁴⁾。この表で, 4 個の $1s$ 電子を除く 10 個の電子の入る分子軌道を 3σ , 4σ , 1π , 5σ などの記号で表わしているが, それぞれの軌道のエネルギーは -43.37 , -20.01 , -15.97 , -13.37 eV と計算されており, これらの軌道の中では 3σ 軌道が一番安定で, 5σ が一番不安定な軌道となる。 $n(i; r_k s_l)$, $n(r_k, s_l)$, $n(i)$,

表 2 CO の overlap population の計算値

$\phi_i \backslash \chi_{rk}, \chi_{sl}$	partial population $n(i; r_k s_l)$						$n(i)$
	$2s_o, 2s_c$	$2s_o, 2p\sigma_c$	$2p\sigma_o, 2p_c$	$2p\sigma_o, 2p\sigma_c$	$2p\pi_o, 2p\pi_c$		
3σ	0.296	0.294	0.078	0.064			0.732
4σ	-0.574	-0.232	0.376	0.124			-0.308
$1\pi^a$					0.654		0.654
5σ	0.186	-0.274	-0.146	0.174			-0.060
$n(r_k, s_l)$	-0.092	-0.212	0.308	0.362	0.654		$n=1.018$

a): この軌道は 2 重に縮重している。

n などの overlap population の記号の意義については (5) 式を参照されたい。

上の表でみると, 6 個の電子の入っている 3 個の σ 分子軌道に関する overlap population の和は 0.364 で, 全 overlap population 1.018 の約 1/3 になる。一方, 4 個の電子の入っている π 分子軌道の overlap population は 0.654 で, 全 overlap population の 2/3 になる。このことは, 1 本の σ 結合と 2 本の π 結合からなる三重結合が C 原子と O 原子との間に存在するという考え方を支持しているようにみえる。

上にあげた CO の overlap population についての説明に加えて, atomic population の計算結果をまとめて図に示すと図 2 のようになる。

図 2 一酸化炭素, 窒素, アセチレン分子の population analysis の結果

図 2 にはアセチレン, N_2 などの結果も示してある。この図で CO や N_2 , アセチレンの $C \equiv C$ 結合などについて 3 本の線のうち中央に書いたものが σ 結合, 上下に示したものが π 結合で, それぞれの数値は各結合の overlap population を表わしている。CO 分子の場合に矢印がついているのはそれぞれの結合について電子の移動する方向を示す。すなわち CO の σ 結合では電子は炭素の方にひかれており, π 結合では酸素の方にひかれていることを示す。CO 分子全体としては酸素原子の方へ電子がひかれており, 炭素原子は 0.11e だけ正電荷を, 酸素原子は 0.11e だけ負電荷をとっていることを示す。この電荷の量は, それぞれの原子の total gross atomic population $N(k)$ の計算値と自由な原子の電子数の差として求められたもので, Mulliken はこれを gross atomic charge と呼んでいる。各原子のそれぞれの原子軌道に関する atomic population の値は図には書きこめないから, 図の下に式で示してある。CO の場合には炭素の $2s$, $2p\sigma$, $2p\pi$ 軌道に, それぞれ 1.68e, 0.96e, 1.25e の電子が存在し, 酸素の $2s$, $2p\sigma$, $2p\pi$ 軌道にそれぞれ 1.84e, 1.52e, 2.75e の電子が存在することを示している。これらの atomic population の値と自由な原子の電子配置とを比較すれば, C, O 両原子とも結合形成の際に $2s$ 軌道から $2p$ 軌道へ昇位 (promotion) の起っていることがわかる。

上の図から CO, N₂ 両分子については1本の σ 結合と2本の π 結合からなる三重結合が二つの原子間に存在するという考え方が、これらの分子の結合の状態をよく表わしていることがわかる。なお、アセチレンの overlap population で数値の次に (K) と示してあるのは炭素の 1s 電子軌道の関係した overlap population の値を示していることを意味する。アセチレン分子では H 原子の gross atomic charge は $+0.21e$ となり、かなり大きな陽電荷をもっていることがわかる。また自由な炭素原子の電子配置 $2s^2 2p^2$ と図2に示したアセチレンの炭素の各原子軌道の gross atomic population の値とを比較すると自由な炭素原子の 2s 軌道の電子がほぼ1個 2p σ 軌道に昇位してアセチレンの結合をつくっていることがわかる。このことはアセチレンの炭素原子が sp 混成により σ 結合をつくっていることとよく対応する。

上の図の説明から, Mulliken の population analysis の方法が化学結合の理解に重要な意義をもち、従来の構造式で現わし得なかった結合の本質をある程度明快にかつ定量的に示してあげることがわかる。とくに、大型電子計算機の発達によって SCF-LCAO MO をはじめ精度の高い計算がかなり複雑な分子についても行なわれるようになれば、population analysis の方法の意義はますます大きくなるであろう。

4 芳香族性¹⁷⁾

芳香族性については π 電子の非局在化による安定化エネルギーの大小、 π 電子の自由電子性に基づく環電流効果 (NMR の化学シフトの大きさなどに現われる)、結合交替の問題、付加または開環反応に対する安定性の問題などを通して実験および理論の両面から論議されている。このように芳香族性については古くから議論が行なわれていたが、特に最近新しい型の芳香族化合物の合成が行なわれるようになって¹⁸⁾、ますます芳香族性の本質についての論議が盛んになっている。しかし現在でも、なにを芳香族性の基準にとるべきかについては、定まった見解はなく、漠然とした形で議論が行なわれているように思われる。今後は芳香族性を表わす種々の概念の間の関連性について定量的または半定量的に十分検討されることが望ましいと考える。ここでは芳香族性が分子軌道法的立場から、どのように理解されているかという点を中心にして簡単に説明する。

Hückel によって提唱された $4n+2$ の規則、すなわち $4n+2$ 個の π 電子を環内に含む系が安定であるという法則が古くから知られている。事実ベンゼン、ナフタリンなどが安定であるのに平面形のシクロオクタテトラエンは存在しないという事実やまた最近合成された大環状共役炭化水素について 10, 14, 18 員環など $4n+2$ の規則を満足するものは比較的安定なのに、12, 16, 20, 24 員環などには不安定なものが多い事実もこの規則によって説明される。

分子軌道法の立場からベンゼン、ナフタリンなどの $4n+2$ 員環炭化水素とシクロオクタテトラエンのような $4n$ 員環炭化水素を比べてみると、図3に模式的に示すような分子軌道がそれぞれに対して求められる。すなわち前者に対しては安定な状態として結合性軌道がみだされた閉殻構造ができるのに、後者に対してはエネルギー零の二重に縮重した軌道に1個ずつ電子の入った三重項状態が生ずる。このことから、 $4n$ 員環は $4n+2$ 員環に比べて不安定な状態にあることが推定される。

図3 $4n$ 員環および $4n+2$ 員環炭化水素の分子軌道

実際に上の図に示した電子配置をもつ環状ポリエンがそれぞれ同員数の鎖状ポリエンに比べて安定化するエネルギーを Hückel の分子軌道法で計算すると、 $4n+2$ 員環の方が $4n$ 員環より大きいことが示される。

さらに簡単には鎖状ポリエンについて求めた炭素原子 r, s 間の π 結合次数 p_{rs} および結合-結合分極率 $\pi_{rs,rs}$ を基にして環形成による安定化の問題を議論することができる。一例としてヘキサトリエンをとると、 p_{rs} および $\pi_{rs,rs}$ の値は表3のように求められる¹⁹⁾。いま r 番目の炭素原子と s 番目の炭素原子の間に π 結合ができて環形成の行なわれた場合のエネルギーの変化 ΔE は近似的に

$$\Delta E = 2p_{rs}d\beta_{rs} + \pi_{rs,rs}(d\beta_{rs})^2 + \dots \quad (6)$$

で表わされる。環形成の際の r, s 炭素原子間の共鳴エネルギーの変化 $d\beta_{rs}$ を β に等しいとおけば、上式から 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 炭素原子間の結合形成によってそれぞれ表3に示すようなエネルギー変化が求められる。

表3 ヘキサトリエンの p_{rs} と $\pi_{rs,rs}$ と環形成によるエネルギー変化

r, s	p_{rs}	$\pi_{rs,rs}$	ΔE (β の単位)	形 成 物
1 2	0.8711	0.1238	—	—
1 3	0	0.2631	0.2636	$C=CH-CH=CH_2$
1 4	-0.3377	0.3453	-0.4301	$C-CH=CH_2$
1 5	0	0.5115	0.5115	$C=CH_2$
1 6	0.3014	0.5956	1.1985

表3の結果から、ベンゼンの場合が最も安定化のエネルギーが大きく、フルベンが次に安定なこと、四員環形成の場合には、 P_{14} が負のため、環形成によって、かえって不安定になることがわかる。

以上は簡単な Hückel の分子軌道法またはそれに準じた方法による結論であるが、Dewar らは²⁰⁾ さらに進んだ半経験的方法すなわち Pariser-Parr-Pople 法によって多数の環状ポリエンの共鳴エネルギーを求めた。その結果は $4n+2$ の法則が満たされていることを示している。しかし環が大きくなり 30 員環程度になると $4n+2$ の法則を満足するものでも不安定となり、芳香族性をもたなくなることが期待できる。実験的にどの程度環が大きくなると芳香族性をもたなくなることとは今後検討すべき問題であろう。

化学結合の進歩の跡を、たとえ分子軌道法的な立場から眺めることに制限しても、総括的にたどることは困難な問題であることを改めて痛感しているが、最近の J. Chem. Phys. の Mulliken 教授の記念号に Slater 教授の書いた論文の次の末尾の言葉を借りて終りにしたいと思う。

"It is appropriate to close by pointing out that the study of the chemical bond, though it has made great strides since the middle 1920's, is still far from completion and the next great step should be the application of already-existing techniques to an extensive study of the electronic structure of polyatomic molecules.

一文 献一

- 1) この問題については、たとえば 森野, 化学と工業, 17, 905 (1964) 参照.
- 2) 化学と工業, 17, No. 9(1964), 「分子構造と化学反応」特集号にこの分野の研究の現状についての紹介がある.
- 3) たとえば, a) 東, 馬場, "量子有機化学", 朝倉 (1956), なおこの著書の内容を新しくしたものが, 最近 Interscience Pub. Inc. から出版された. K. Higasi, H. Baba, A. Rembaum, "Quantum Organic Chemistry", Interscience Pub. Inc., New York (1965); b) 京大福井研究室共同執筆, "量子化学入門" 上下, 化学同人 (1963, 1964); c) 湯川, 三川, 伊藤訳, "分子軌道法計算入門", 広川書店 (1965); d) 島田, "量子化学的な考え方と計算", 共立出版 (1965); e) 山本, "量子化学入門", 実業図書 (1965) など. 欧米でも分子軌道法の解説書がいくつか出版されている. そのうち有機化学者向けのものは, f) A. Streitwieser, Jr., "Molecular Orbital Theory for Organic Chemists" John Wiley & Sons, New York (1961).
- 4) たとえば, R. S. Mulliken, "What Are the Electrons Really Doing in Molecules?", Technical Report from Laboratory of Molecular Structure and Spectra, The University of Chicago (1959~1960) 参照.
- 5) 二つの方法の区別については, たとえば C. A. Coulson, "Valence", Oxford Univ. Press, Oxford (1951); 邦訳, 関, 千原, 鈴木, "化学結合論", 岩波 (1954); 長倉編, "電子論の基礎と応用", 岩波 (1964) など参照.
- 6) ここにあげた個々の方法の説明については, たとえば, a) 日本化学会編, "実験化学講座続, 電子スペクトル", 丸善 (1965); b) 小谷, 大野, 香山, "Quantum Mechanics of Electronic Structure of Simple Molecules", *Hand*

- buch der Physik*, 37/2 (1961); c) R. G. Parr, "The Quantum Theory of Molecular Electronic Structure", W. A. Benjamin, Inc., New York (1964) および 3a), 3b) 参照. また厳密な計算方法と半経験的方法の特徴, おたがいのあり方, それぞれの限界などについては Pople の簡単にしてわかり易い記述を参照されたい. J. A. Pople, *J. Chem. Phys.*, 43, s 229 (1965) 参照.
- 7) ω 法については 3f), p. 115 参照.
- 8) R. Pariser, R. G. Parr, *J. Chem. Phys.*, 21, 466, 767 (1953); J. A. Pople, *Trans. Faraday Soc.*, 49, 1375 (1953).
- 9) P. O. Löwdin, *J. Chem. Phys.*, 18, 365 (1950).
- 10) Pariser-Parr-Pople 法の検討については P. G. Lykos, *J. Chem. Phys.*, 35, 1249 (1961); I. Fischer-Hjalmars, *J. Chem. Phys.*, 42, 1962 (1965) など参照. なおこの問題の検討は筆者らの研究室で松下, 田中阿氏らによっても行なわれている.
- 11) 非経験的分子軌道法の進歩の概観についてはたとえば, J. C. Slater, *J. Chem. Phys.*, 43, s 11 (1965) 参照.
- 12) I. Hanazaki, S. Nagakura, *Tetrahedron*, 21, 2441 (1965).
- 13) J. A. Grace, M. C. R. Symons, *J. Chem. Soc.*, 958(1959).
- 14) 不対電子をもつ系の分子軌道法については H. C. Longuet-Higgins, J. A. Pople, *Proc. Phys. Soc.*, A 68, 591 (1955); C. C. J. Roothaan, *Rev. Mod. Phys.*, 32, 179 (1960) など参照.
- 15) この問題については, たとえば後藤, 丸山, "ESR の使い方", 共立 (1965) および 3a), 3b) など参照.
- 16) R. S. Mulliken, *J. Chem. Phys.*, 23, 1833, 1841(1955).
- 17) 芳香族性の問題については, たとえば, 化学と工業, 18, No. 10 (1965), 「ベンゼノイド」特集号および T. Nakajima, "Molecular Orbitals in Chemistry, Physics and Biology" edited by P. O. Löwdin and Pullmann, Academic Press, New York (1964), p. 451 参照.
- 18) たとえば北原, 化学と工業, 18, 1330 (1965) 参照.
- 19) 細久治夫氏の計算による.
- 20) M. J. S. Dewar, Sternlicht, *J. Am. Chem. Soc.*, 87, 685, 692 (1965).

分子構造論の問題点—励起分子の構造と反応性

坪 村 宏^{*1}

1 は じ め に

励起分子の構造の研究は決して新しい学問ではなく, すでに, 1930 年代において一応その体系を完成したといえる。しかし近年に至って, 超微細構造の研究に関する実験手法が一層改良され, また, フラッシュ法や低温凍結法等の進歩によって不安定な分子ないしラジカルの励起状態の研究も盛んに行なわれるようになったために, この分野の研究は新たな発展の様相を呈してきた。一方最近有機合成化学の立場からも光化学反応が盛んに用いられるようになり, 励起分子の構造と反応性が一層多くの人によ

って注目されるようになってきた。ここではいくつかの重要な分子について, その励起状態の構造に関する研究の結果を概説し, あわせて励起分子の構造をどの程度理論的に解釈し, かつ予言しうるかという点について論じてみることにしたい。

はじめに基礎的な概念について二, 三, 説明を行なう。励起分子という言葉の意味はかなり広く使われているが, ここではいわゆる電子的励起状態, すなわち基底状態よりも高い電子準位に上った分子の状態をさすものとする。分子が光によって高い励起状態に上げられる過程は非常に速く起こるので, 励起された瞬間においてはこの分子の構造は基底状態のそれと変わらないと考えられる。これを Franck-Condon 原理という。たとえば 2 原子分子 AB についてそのエネルギーを核間距離 R_{AB} に関してプロット

^{*1} Hiroshi Tsubomura 大阪大学基礎工学部化学教室: 豊中市北刀根山。