4 総 括

芳香族カルボン酸類の液体クロマトグラフィーにおいて希アンモニア水添加シリカゲルが充填剤として良好な分離を示した。すなわちフェノール、安息香酸およびサリチル酸の分離が可能であり、定量法としても使用できた。またアミノ安息香酸の *o*, *m*, *p*-3 異性体もこの方法で分離することができたが、*m*-アミノ安息香

酸は溶出できなかった。オキシ安息香酸についてもある程度の分離を行ない得た。またあらかじめカルボン酸の充填剤に対する吸着率を求め、これを比較することにより、分離の結果を予想することができた。

最後にシリカゲルを提供下さった洞海化学工業(株)に感謝いたします。

イ タ コ ン 酸 ジ ア ミ ド の 構 造^{*1}

(昭和 40 年 12 月 10 日 受理)

明 石 博 吉^{*2}

1 緒 言

イタコン酸誘導体に関する研究の一つとして前報¹⁾に引き続き、今回はイタコン酸ジアミドの構造について検討した。イタコン酸ジアミドは Strecker²⁾により、イタコン酸ジメチルにアンモニア水を低温で作用させて得られた mp 195°C の結晶で、その構造は下図の (A) と考えられている。この構造ならば、当然重合および共重合するものと思われるが、石田ら³⁾はこれのラジカル重合、レドックス重合等を試みたが、いずれも重合物は得られなかった。著者もナトリウムまたはカリウム *t*-ブトキシドを触媒に用いての重合や、他のモノマーとの共重合を種々試みたが、いずれも重合および共重合しなかった。したがって、イタコン酸ジアミドの構造は (A) は適当でないと考えた。

従来、イタコン酸ジエステルと脂肪族および芳香族アミンとの反応で、ピロリドン環が生成することが知られている⁴⁾。また Stosius ら⁵⁾は、イタコン酸ジエチルに液体アンモニアを作用させて、2-ピロリドン-4-カルボン酸アミド (mp 217°C) (B) が得られることを、一方、イタコン酸ジエチルの無水エタノール溶液に、アンモニアガスを作用させた場合、ホマスパラギン酸イミド (C) (mp 195°C) が得られることを報告しているが、もし著者の合成したアミドがピロリドン環を形成しているとすれば (B) の構造を有し、融点も Stosius らの報告に一致しなければならないが、融点は 195°C であった。別に Stosius らの報告する (C)

を合成して、混融しても融点降下は認められなかった。しかるに、次に述べる通り著者の合成したイタコン酸ジアミドは、NMR の測定、その他の結果から、どうしても (B) の構造を持つと考えられ、したがって Stosius の報告は誤りであり、エタノール中、アンモニアガスの反応で得られた mp 195°C の無色結晶は (C) の構造ではなくて、(B) の構造、すなわち 2-ピロリドン-4-カルボン酸アミドであることは明らかで、他方の mp 217°C の結晶の構造については再検討を必要とするが、ともかく、イタコン酸ジアミドは (A) の構造ではなく、(B) のピロリドン環を持つ構造であることを間接的ではあるが証明できたので報告する。

2 実験結果および考察

まずイタコン酸ジアミドの二重結合を定量した。アクリルアミドの定量分析に用いられる標準ヨウ素液 (ブロム酸カリウム、ブロムカリウム溶液) による二重結合定量法⁶⁾を用いて測定した結果、全然二重結合の存在は認められなかった。したがって、環状構造をなしていると考えられる。次にイタコン酸ジアミドの IR スペクトル (KBr) を測定した。結果は図 1 に示すように、特性吸収としては 3420, 3220, 1715, 1685, 1635, 1440 および 1295 cm⁻¹ に吸収を有している。このうち、3420 と 3220 cm⁻¹ は、-NH- の伸縮振動による吸収で、1685, 1635 cm⁻¹ は >C=O (アミド) の伸縮振動による吸収と考えられ、1295 は C-N による吸収と考えられる。一方、考えている構造の基本物質であるピロリドンの赤外吸収⁷⁾は、3225 (ν_{NH}), 1690 (ν_{C=O}) および

図 1 イタコン酸ジアミドの IR スペクトル

*1 本報を「イタコン酸の反応およびその応用に関する研究 (第 13 報)」とする。

*2 Hiroyoshi AKASHI 神戸大学工学部工業化学教室：神戸市灘区六甲台町。

1) 明石, 工化, 68, 1162 (1965),

2) O. Strecker, *Chem. Ber.*, 15, 1640 (1882).

3) 石田, 斎藤, 色材協会誌, 35, 377 (1960).

4) C. J. Knuth, P. F. Bruins, *Ind. Eng. Chem.*, 47, 1572 (1955).

5) K. Stosius, E. Philippi, *Monatsh.*, 45, 457 (1925).

6) 宮崎「高分子実験学講座」単量体の合成法 (共立社) p. 171.

7) R. Mecke Jr., R. Mecke Sen, *Chem. Ber.*, 89, 347 (1956).

図2 イタコン酸ジアミドのNMRスペクトル

$1300\text{ cm}^{-1}(\nu_{\text{C}=\text{N}})$ に特性吸収を有し、よく一致している。 $>\text{C}=\text{O}$ 基の吸収が2本認められるのは、一方の酸アミド結合が環を形成して γ -ラクタムになり、その $>\text{C}=\text{O}$ 基の吸収が高波数にずれたものと考えられ、したがって $-\text{NH}-$ 基による吸収も2本認められるものと思われる。

さらにNMRを測定した。イタコン酸ジアミドは水に溶解するので水溶液で測定した。図2に示すように、水を基準でそのppm 5.2 (実際 5.5), その左方 ppm の小さい方に二つのなだらかな山がある (3の前後)。ppm の小さい方の山が少し高い。これは $-\text{NH}_2$ の水素によるピークと考えられ、右の山の低い方が $-\text{NH}-$ の水素によるピークと考えられる。また環を形成せずにビニル基

が残っていれば、4付近にピークがあるはずであるが、全然認められない。次に右の方に $-\text{CH}_2-$ の水素によると考えられるピークが二つ (6.3 と 7.2 付近) および もう一つ小さい山が $-\text{CH}-$ の水素によるピークで、ともに凹凸が多く、これは相互作用を受けているために複雑であると考えられる。もし環を形成していなければ、もっと平坦であるべきである。また $-\text{CH}_3$ 基の水素によるピークが見られない (9 付近)。もし (C) の構造を持つものとするれば、 $-\text{CH}_3$ および $-\text{CH}_2-$ が1個あるはずであり、明らかに (C) の構造でない。

以上要約すると、 $\text{CH}_2=\text{C}$ のピークが認められないこと、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NH}-$ と推定されるピークがあること、 $-\text{CH}_2-$ が2個認められ、カップリングが大であることから、環形成に起因する隣接グルー相互の作用が現われていると推定される。また $-\text{CH}_3$ のピークがないこと。以上の結果から、ピロリドン環を形成していることはほとんど確実と思われ、イタコン酸ジエステルとアンモニア水の反応で得られるイタコン酸ジアミドと考えられている結晶は、2-ピロリドン-4-カルボン酸アミドであることが確認できた。

また、アルコール溶液中でアンモニアガスを作用させても、同一物が得られることが認められた。

(昭和 40 年 4 月 2 日, 日本化学会第 18 年会講演)

本研究にあたり、終始懇切なる御指導をたまわった京大教授小田良平先生 および分析とその解釈に御援助を願った大阪工業試験所内藤技官、ならびに大阪市立工業研究所永井、平島両氏に感謝します。

3-アルキル-s-トリアゾロ[4,3-a]ピリジンの合成^{*1}

(昭和 41 年 2 月 2 日 受理)

高瀬 慎一郎・出村 哲夫^{*2}

1 緒 言

天然油脂から得られるカルボン酸の結晶性誘導体を合成することは、脂肪酸確認の手段となるとともに、これが親水基を供えているものであれば、界面活性剤ともなる。Bicking¹⁾は、カルボン酸と2-ヒドラジノピリジンとの縮合によって、s-トリアゾロ[4,3-a]ピリジンの3-置換体を合成し、鎮静剤として有効であることを述べている。

2-ヒドラジノピリジン (I) の合成には2-アミノピリジンからジアゾニウム塩を経てハロゲン化、つづいてヒドラジノ化が考えられるが、収量はよくない。またピリジンよりN-メチル-2-ピロリドン、2-クロルピリジン、2-ヒドラジノピリジンの順序で合成するのも経路の長いこと、および収量について前法と大差はない。

Kauffmann²⁾はピリジンとナトリウムヒドラジドより1段階で2-ヒドラジノピリジン (I) を収率よく合成したので、(I)と脂肪酸との縮合体を合成し、融点と性状を記しておくことに意義を生じた。

2 実験結果および考察

$\text{C}_8\sim\text{C}_{16}$ の飽和脂肪酸をそれぞれ2-ヒドラジノピリジン (I) と加熱すると、脱水されて縮合と環形成が行なわれ、3-アルキル-s-トリアゾロ[4,3-a]ピリジン (III) を得る (表1)。脂肪酸メチルエステルを用いたときは反応せずに、原料回収に終わる。

(III)の塩酸塩は結晶性で温水にとけるが、加水分解をうけて不

2) Th. Kauffmann et al., *Ann.*, 656, 103 (1962).

*1 本報を「脂肪酸誘導体に関する研究(第8報)」とする。第7報, 高瀬, 日化, 79, 1500 (1958).

*2 Shin-icirō TAKASE, Tetsuo DEMURA 大阪大学教養部: 豊中市柴原.

1) J. B. Bicking, U. S. P. 2,917,511 (1959); *Chem. Abst.*, 54, 8854 (1960).