ることがわかった。ついでいま一つの抗カビ性の尺度である防カビ時間と試料濃度との関係を図 11 に示した。

図 11 の結果も既述の 50% 発カビ阻止濃度の順位結果とほぼ比例した結果を示し、スルホン基数としてはないものか、もしくはモノスルホン化物がよい。また 2 核体モノスルホン酸は 2 核体母体に比べ防カビ力は減少しているが、一方、3 核体モノスルホン酸は 3 核体母体に比べて防カビ力は逆に増加する。また 1 核体ではスルホン化すると減少している。つまり核体数の影響としては、スルホン化されていないものは 2 核体が最高であり、スルホン化されているものでは 3 核体が最高である結果であった。

Marsh²¹⁾ らのスルホン化していない同族体の研究結果では 2 核体よりも 3 核体の防カビ力が減少し、核体数の増加とともに防カビ力は減少する傾向にあると述べているが、今回、他の置換基としてスルホン基を導入することにより、核体数による防カビ力が逆転している点は興味深い。

以上のようにして著者らは抗細菌と防カビ力を有する新種のアニオン界面活性剤を作った。

(昭和 44 年、日本化学会第 22 年会講演)

終りに本実験について終始御懇篤なる御援助賜った日本染化工業株式会社に深甚の謝意を表する。

21) M. Butler, *Ind. Eng. Chem.*, 38, 701 (1946); 41, 2176 (1949).

図 11 防カビ時間におよぼす試料濃度の影響

試料記号 ●:[1], ▲:[2], ○:[3], △:[4]
□:カクテルフェノール, ×:2 核体, ●:3 核体
■:3-クロル-6-ヒドロキシスルホン Na 塩

ピリミドピリミジン誘導体の質量スペクトル^{*1,2}

(昭和 45 年 7 月 21 日 受理)

山田 和 俊・林田慶司郎・飯田 弘 忠^{*3}

興味ある蛍光物質であるピリミドピリミジン誘導体の質量スペクトルを測定し、同位体ピークおよび準安定イオンピークをもとにして、それらのフラグメンテーションの解析を行なった。

2,6-ジエトキシ-4,8-ジアニリノピリミド[5,4d]-ピリミジン誘導体 (I, II) における初期開裂は、環上の炭素を伴った COC_2H_5 脱離が主であり、一方、2,4,6,8-テトラアニリノピリミド[5,4d]-ピリミジン誘導体 (III, IV, V) におけるそれは、置換基だけの $\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ 脱離であることがわかった。また、測定したこれら誘導体に親分子の二価イオンピークおよびそれと同じ m/e をもつ一価イオンピークが認められ、それが開裂経路の一部をなすことを見いだした。

1 緒 言

生化学的に興味の深い核酸誘導体の質量スペクトルについてはかなりの報告がなされている。たとえば後藤らは、ルマジン誘導体について研究し、 HNCO , CO の開裂が主経路であることを明らかにしている¹⁾。また立松らは、プリン誘導体について重水素置換法をもちいてそれらの開裂を論じている²⁾。さらに彼らはオ

キシメチルプテリジンについてその研究を進め、水酸基の置換位置の違いによる開裂の特異性についても言及している³⁾。そのほか、グアニン、アデニンなどについての報告もなされている⁴⁾。

さきに著者の一人は興味ある蛍光物質としてピリミドピリミジン誘導体の合成と物性について述べたが⁵⁾、現在までにピリミドピリミジン骨格についての質量スペクトルの報告がなされていないので、染料関連化合物の質量スペクトル研究の一環として、これら化合物の解析を試み、二、三の知見がえられたので報告する。

2 実 験

2.1 試 料

測定に用いたピリミドピリミジン誘導体は表 1 にあげた 6 種類

3) 立松 晃, 後藤俊夫, 松浦貞郎, 日化, 87, 1226 (1966).

4) Jerry M. Rice, Gerald O. Dudek, *J. Amer. Chem. Soc.*, 89, 2719 (1967).

*1 この報文を「染料関連化合物の質量スペクトル (第 5 報)」とする。

*2 前報, K. Yamada, T. Konakahara, H. Iida, *Bull. Chem. Soc. Japan* (投稿中).

*3 Kazutoshi YAMADA, Keishiro HAYASHIDA, Hirotada IIDA 千葉大学工学部合成化学科: 千葉市弥生町 1.

1) 漆原敏之, 佐藤 弘, 後藤幹保, 日化, 87, 972 (1966); 89, 520 (1968).

2) 立松 晃, 後藤俊夫, 松浦貞郎, 日化, 87, 72 (1966).

表 1 測定に用いたピリミドピリミジン誘導体

No.	X	Y
I	OC ₂ H ₅	NH·C ₆ H ₅
II	OC ₂ H ₅	NH·C ₆ H ₄ ·OCH ₃ (<i>m</i>)
III	NH·C ₆ H ₄ ·Cl(<i>m</i>)	NH·C ₆ H ₄ ·Cl(<i>m</i>)
IV	NH·C ₆ H ₄ ·CH ₃ (<i>m</i>)	NH·C ₆ H ₄ ·CH ₃ (<i>m</i>)
V	NH·C ₆ H ₄ ·CH ₃ (<i>o</i>)	NH·C ₆ H ₄ ·CH ₃ (<i>o</i>)
VI	Cl	Cl

である。

2.2 質量スペクトルの測定条件

日立製二重収束質量分析計 RMU-6 E 型を用い、イオン化電圧 70 eV, 全放射電流 80 μ A で測定した。I, II, III, IV, V, VI は、それぞれ、ソースヒーター温度, [250°C, 300°C, 350°C, 350°C, 340°C, 240°C] における直接導入方式を採用した。

3 結果および考察

3.1 2,6-ジエトキシ-4,8-ジアニリノピリミド [5,4 d]-ピリミジン (I) と、2,6-ジエトキシ-4,8-ジ(*m*-メトキシアニリノ)ピリミド [5,4 d]-ピリミジン (II)

(I) の質量スペクトルの開裂経路は図 1 に示すとおりである。

図からわかるように大きくわけて二つの開裂経路が考えられるが、それらを (A) と (B) とし、それぞれについての経路を追っていくことにする。

(A) の経路は、(1) (*m/e* 402, 基準ピーク) から (2) (*m/e* 345, 21%) へと開裂するパターンである。(1) から (2) への開裂の中間段階として、図に示すようにいくつかの経路が考えられる。すなわち、M⁺ がエチレンを失なって *m/e* 374 (11%)

となり、続いて水素が脱離し *m/e* 373 (34%) となる。つぎに CO を脱離して (2) となるわけであるが (*m*^{*}=319.0), この CO 脱離開裂はルマジン誘導体⁵⁾やプテリン誘導体⁶⁾等の核酸質量スペクトルにおいて認められるものと同じである。また、M⁺ より CH₃ が脱離し (*m*^{*}=372.6), 続いて CH₂ を失なって *m/e* 373 になる開裂もある。あるいは前述の段階を経ないで、直接 COC₂H₅ が脱離して (2) になる経路も考えられ、これは *m*^{*}(=296.1) を観察することによって確かめられた。(2) からは N·C₆H₅ が脱離して (3) (*m/e* 254, 15%) となり、続いて窒素を脱離し、(4) (*m/e* 226, 6.5%) となる。(4) はプロトンを一付加し(試料圧約 5×10⁻⁷ mmHg), そしてアセチレンを脱離して (5) (*m/e* 201, 3%) となる。

さきに著者は、イサチン、インドール類について二価イオンピークを認め、それが開裂経路決定に大きな役割を果たすことを報

図 1

告したが⁷⁾, 今回のピリミドピリミジン誘導体についても二価イオンピークが認められた。すなわち, *m/e* 201 のピークは少し幅広くなっていることと, 後述する *i*-ピークの結果から親分子の二価イオンピークと, (5) のような一価イオンピークとが重なったものと推定される。なお, (5) は相対強度 3% とあまり強くないが, これはすぐエチレンを脱離して, (6) (*m/e* 173, 30%) になるためであると考えられる。

(6) からの開裂は二とおりほど考えられる。第一は *m/e* 373 から (2) への開裂においても見られたと同じく, CO を脱離して (7) (*m/e* 145, 14%) となり, 続いて (8), (9), (10) へと順次開裂する。なお, (7) は HCN を脱離して (12) (*m/e* 118, 12%) にもなる。第二の開裂経路は水素ラジカルがまずとんで, それから CO が脱離して (11) (*m/e* 144, 9.5%) になる経路である。(7) と (11) の相対強度を比べた場合, (7) が 14%, (11) が 9.5% で CO 脱離の方が H 脱離よりも優先 (すなわち, 第一の経路が優先) すると推定される。

(B) の開裂経路はエトキシ基が脱離して (14) (*m/e* 357, 9.5%) になる。(14) はさらにもう一つのエトキシ基のエチレンを脱離して (15) (*m/e* 329, 14%) となる。このように (B) の経

5) 飯田弘忠, 遠藤基雄, 谷内啓悦, 工化, 70, 2308 (1967)。

6) 山上 浩, 桜井 厚, 後藤幹保, 日化, 88, 1320 (1967)。

* この値は排気系の指示値で, イオン化室の圧力はもっと高いものと思われる。

7) 山田和俊, 小中原猛雄, 飯田弘忠, 工化, 73, 980, 985 (1970)。

路では、(A) とちがって、置換基だけの開裂が優先的に起こる。(15) はプロトンを失なって m/e 328 (21%) となるが、この m/e 328 からの開裂は二通りの経路が考えられる。第一は置換基が環上の CN を伴って脱離し、続いて HCN が脱離して (19) (m/e 184, 3.4%) のピリミジン骨格になる経路である。Rice らはピリミジン誘導体の質量スペクトルにおいて CO が脱離することを報告しているが⁹⁾、(19) においてもそれがみられ、CO を脱離して m/e 156 になる。 m/e 328 からの第二の開裂は環上の CN がまず脱離して、つぎに環上の C を含めて $CN \cdot C_6H_4$ が脱離して (17) (m/e 199, 12%) となる経路である。(17) は続いて CN を脱離して m/e 173 (30%) となり、以下 (A) の開裂経路と同様である。 m/e 328 からの第一と第二の開裂において、第一の (18), (19) の相対強度がそれぞれ 4.4%、3.4% に対して、第二の (16), (17) がそれぞれ 9%, 12% であることから、第二の開裂が優先して起こるのではないかと推定される。

以上、(A) と (B) の開裂について述べてきたが、(A) における (2) の相対強度が 21%, (B) における (14) の相対強度が 9.5% であること、および順次開裂のようすからして、(A) 開裂経路の方が、(B) 開裂経路よりも起こり易いと考えられる。なお、 m/e 104 において相対強度 17% のピークが観察されたが、開裂経路に入れるには、脱離方法に無理があると思われるので、図示するに留めた。

(II) の質量スペクトルは (I) の場合と同じ開裂経路を示した。すなわち、大きく分けて二通りの開裂経路があり m/e 462 (図 1 の 1 に相当) から m/e 405 (図 1 の 2 に相当) (10%) への経路と、 m/e 462 から m/e 417 (図 1 の 14 に相当) (10%) への経路とである。また図 1 の 5 に相当するピーク m/e 231 (3%) も観察され、主要な経路の一部をなすことがわかった。

3・2 2,4,6,8-テトラ(*m*-クロロアニリノ)ピリミド [5,4*d*]-ピリミジン (III) と 2,4,6,8-テトラ(*m*-メチルアニリノ)ピリミド [5,4*d*]-ピリミジン (IV) と 2,4,6,8-テトラ(*o*-メチルアニリノ)ピリミド [5,4*d*]-ピリミジン (V)

さきに著者らは、インジゴの質量スペクトル解析のために臭素置換体を用いて、その開裂経路を明らかにしたが⁷⁾、今回は塩素置換体を用いて、2,4,6,8-テトラアニリノピリミド [5,4*d*]-ピリミジン同族体の開裂経路の解析を行なった。塩素置換体として、(III) を用いたが、塩素の同位体ピーク (以下 *i*-ピークと略称) がそれぞれのフラグメントイオンに認められ、開裂経路決定の手段とすることができた。

表 2 は、*i*-ピークの結果をまとめたものである。表において相対強度は各系の中で最も強い *i*-ピークを 100% とし、それぞれ計算した値である。表からわかるように開裂後期のピークに計算値と大きくずれているピークが、二、三みられるが、大部分、とくに開裂初期のピークは予想どおりの値を示している。これをもとにして、(III) の開裂を解析したのが図 2 である。

図からわかるように、まず (1) (m/e 640, 1.4%; m/e 638,

表 2 塩素の同位体ピーク (Quintet)

4 Cl*	Calc. Rel. Abundance(%)	Obs. % (m/e)** (1)***
4^{37}Cl	0.88	(640) 1.38
$3^{37}\text{Cl}1^{35}\text{Cl}$	10.50	(638) 13.75
$2^{37}\text{Cl}2^{35}\text{Cl}$	48.62	(636) 52.23
$3^{37}\text{Cl}3^{35}\text{Cl}$	100.00	(634) 100.00
4^{35}Cl	77.21	(632) 72.85

3 Cl	Calc. Rel. Abundance(%)	Obs. % (m/e) (2)	Obs. % (m/e) (3)
3^{37}Cl	3.40	(603) 5.77	(512) 4.55
$2^{37}\text{Cl}1^{35}\text{Cl}$	31.49	(601) 46.15	(510) 36.36
$3^{37}\text{Cl}2^{35}\text{Cl}$	97.19	(599) 92.31	(508) 86.36
3^{35}Cl	100.00	(597) 100.00	(506) 100.00

2 Cl	Calc. Rel. Abundance(%)	Obs. % (m/e) (6)	Obs. % (m/e) (4)	Obs. % (m/e) (7)	Obs. % (m/e) (5)
2^{37}Cl	10.49	(373) 22.22	(358) 22.22	(347) 20.00	(320) 10.53
$3^{37}\text{Cl}1^{35}\text{Cl}$	64.79	(371) 66.67	(356) 66.67	(345) 60.00	(318) 84.21
2^{35}Cl	100.00	(369) 100.00	(354) 100.00	(343) 100.00	(316) 100.00

1Cl	Calc. Rel. Abundance(%)	Obs. % (m/e) (8)	Obs. % (m/e) (9)	Obs. % (m/e) (11)	Obs. % (m/e) (10)	Obs. % (m/e) (12)	Obs. % (m/e) (13)
3^{37}Cl	32.40	(283) 37.50	(192) 133.33	(180) 50.00	(154) 60.00	(129) 37.93	(113) 32.50
3^{35}Cl	100.00	(281) 100.00	(190) 100.00	(178) 100.00	(152) 100.00	(127) 100.00	(111) 100.00

* 4 Cl は 1 イオン中に塩素元素が 4 原子含まれていることを示す。

** 表中 () 内は m/e の値を示し、その下は相対強度を示す。

*** 図 2 における番号を示す。

図 2

14%; m/e 636, 52%; m/e 634, 100%; m/e 632, 73%) から塩素を失なって、(2) (m/e 603, 0.5%; m/e 601, 4%; m/e 599, 8%; m/e 597, 9%) になり、続いて置換基の $NH \cdot C_6H_4$ が脱離して、(3) (m/e 512, 0.3%; m/e 510, 2.7%; m/e 508, 6.5%; m/e 506, 7.6%) になる。この場合環上の CN を伴って開裂することも予想されるが、それに相当するピークは m/e 486, 0.08%; m/e 484, 0.3%; m/e 482, 0.7%; m/e 480, 0.7

8) Jerry M. Rice, Gerald O. Dudek, Michael Barber, J. Amer. Chem. Soc., 87, 4569 (1965).

% で無視できる強さであった。したがって最初の開裂は置換基だけの脱離であると結論できる。つきにおこる開裂では、環上の CN あるいは C を伴って開裂することがわかった。すなわち、(3) から (4) (m/e 358, 0.7%; m/e 356, 2%; m/e 354, 3%) への開裂と、(3) から (6) (m/e 373, 0.7%; m/e 371, 2%; m/e 369, 3%) への開裂と、二通りの経路があり、前者においては、 $\text{NC}\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{Cl}(m)$ を脱離し、つぎに CCN を脱離して (5) (m/e 320, 0.7%; m/e 318, 5.5%; m/e 316, 6.5%) となる。後者は、環上の C のみを伴って脱離して (6) のような 5 員環をつくる。(6) はさらに CN, HCN を続けて脱離し (5) になる。(4), (6) の相対強度は同じであることから、同時におこる開裂であると推定できる。 m/e 320, 318, 316 のピークは i -ピークとその強度およびピークが少し幅広いことから親分子の二価イオンピーク (m/e 320, 0.7%; m/e 319, 2.4%; m/e 318, 5.5%; m/e 317, 8%; m/e 316, 6.5%) と、図のようなイオンピーク (5) とが重なったものと推定される。なお二価イオンピークであることは m/e 317 が相対強度 8% と、他のピークに比べて大きくでていることから支持される。

相対強度は 3・1 に比べてやや強いが、これは 3・1 がエチレンを脱離しやすいのに比べて、(5) の場合はアニリンの置換によって安定になっているからだと考えられる。(5) は表 2 に示したように、 i -ピークの観察からもその存在を確かめることができた。(5) は塩素を脱離して (8) (m/e 283, 1%; m/e 281, 3%) になり、つぎに二つの経路を経て (10) (m/e 154, 3%; m/e 152, 5%) になる。第一の経路は置換基 $\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ だけが脱離して (9) (m/e 192, 4%; m/e 190, 3%) に開裂していくものである。第二は、環上の炭素を伴って開裂するものであり、(11) (m/e 180, 1.4%; m/e 178, 2.7%) のような 4 員環をつくり、つぎに CN を脱離して (10) になる経路である。第一と第二の開裂はそれらの相対強度から、同時におこっていると思われる。(10) は図示のとおり、(12) (m/e 129, 2.4%; m/e 127, 3.8%) (13) (m/e 113, 4.5%; m/e 111, 14%) へと開裂している。

(N), (V) の開裂は、上記の塩素置換体の開裂経路をもとにして解析した結果、同じ経路を示すことがわかった。表 3 にそれらの m/e と相対強度、および図 2 において相当するピークの番号とを示す。

表 3 (N), (V) の m/e と相対強度

m/e	552	551	537	446	329	314	303	276	170	158	133	132	91
(N) の相対強度	39	100	0.5	4.6	3.6	3.0	1.0	17	2.2	3.0	4.0	3.2	14
(V) の相対強度	42	100	7.0	37	3.4	4.0	1.0	34	5.4	3.0	6.7	4.7	21
図 2 で相当する番号	(1)	(2)	(3)	(6)	(4)	(7)	(5)	(9)	(11)		(10)	(12)	

表 3 からわかるように (N) と (V) の質量スペクトルは同じ m/e にフラグメントイオンピークが見られ、その相対強度も、 m/e 537, m/e 446, m/e 276 を除いては大体一致している。 m/e 537 において (N) の相対強度が 0.5% であるのに対して、(V) のそれが 7% であるのは、前者が最初の開裂において、メチルラジカルの脱離がほとんどおこらずに、直接 $\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{CH}_3(m)$ が脱離している ($m^*=362.2$) ことを意味するのであろう。後者においても $\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{CH}_3(o)$ が直接脱離していることが、 $m^* (=362.2)$ の観察によって確かめられたが、この場合は、メチルラジカルの開裂と平行しておこっていると考えの方が良さそうである。

m/e 446 においては (V) の相対強度が 37% であるのくらべ、(N) の相対強度は 4.6% と弱い。この理由としてメチル基の立体障害の大小によるものと考えられるが、これらのデータより結論づけるには無理があると思われる。 m/e 276 は (III) の結果より親分子の二価イオンピークと、図 2 の (5) に相当する一価イオンピークとが重なっていると推定でき、そして (III) において相当するピークと類似したピークを (N), (V) の両方に認めることができた。その相対強度はともに今まで述べてきた化合物のそれよりもはるかに強く、とくに (V) の場合は 34% の強いピークが見られる。これら二つの安定性は恐らくメチルアニリンの置換により、フラグメントイオンが安定になっているからであろう。

3・3 2,4,6,8-ラトラクロルピリミド [5,4d]-ピリミジン (VI)

(III) に引き続いて (VI) の i -ピークを表 4 に、それにもとづいた開裂経路の解析結果を図 3 にそれぞれ示す。

表 4 に示したように、 i -ピークは計算値とほぼ一致した。(III) と同様に、これらの結果は開裂経路決定の手段とすることができると考えた。

(VI) の初期開裂は図 2, 図 3 からわかるように (III), (N), (V) の開裂と類似している。すなわち、(VI) はまず、置換基の塩素を脱離して ($m^*=202.6$), (2) (m/e 239, 0.6%; m/e 237, 28%; m/e 235, 83%; m/e 233, 86%) になり、つぎに環上の CN を伴って (3) (m/e 176, 1%; m/e 174, 6%; m/e 172, 9%) になる。これらの経路は図 2 における (1) から (4) への開裂と同じ経路を示していることがわかる。(3) からの開裂には二

表 4 塩素の同位体ピーク (Quintet)

4 Cl*	Calc. Rel. Abundance(%)	Obs. %(<i>m/e</i>)** (1)***			
4 ³⁷ Cl	0.88	(276) 1.29			
3 ³⁷ Cl 3 ³⁵ Cl	10.50	(274) 10.96			
2 ³⁷ Cl 2 ³⁵ Cl	48.62	(272) 47.74			
3 ⁷ Cl 3 ³⁵ Cl	100.00	(270) 100.00			
4 ³⁵ Cl	77.21	(268) 76.77			
Quartet					
3 Cl	Calc. Rel. Abundance (%)	Obs. % (<i>m/e</i>) (2)			
3 ³⁷ Cl	3.40	(239) 4.48			
2 ³⁷ Cl 3 ⁶ Cl	31.49	(237) 32.90			
3 ⁷ Cl 2 ³⁵ Cl	97.19	(235) 96.27			
3 ³⁵ Cl	100.00	(233) 100.00			
Triplet					
2 Cl	Calc. Rel. Abundance (%)	Obs. % (<i>m/e</i>) (3)	Obs. % (<i>m/e</i>) (8)	Obs. % (<i>m/e</i>) (4)	Obs. % (<i>m/e</i>) (12)
2 ³⁷ Cl	10.49	(176) 10.71	(150) 11.11	(138) 11.11	(124) 11.67
3 ⁷ Cl 3 ⁵ Cl	64.79	(174) 64.29	(148) 66.67	(136) 61.11	(122) 65.00
2 ³⁵ Cl	100.00	(172) 100.00	(146) 100.00	(134) 100.00	(120) 100.00
Doublet					
1 Cl	Calc. Rel. Abundance (%)	Obs. % (<i>m/e</i>) (10)	Obs. % (<i>m/e</i>) (11)	Obs. % (<i>m/e</i>) (5)	Obs. % (<i>m/e</i>) (6)
3 ⁷ Cl	32.40	(113) 34.09	(87) 36.27	(75) 29.76	(49) 32.08
3 ⁵ Cl	100.00	(111) 100.00	(85) 100.00	(73) 100.00	(47) 100.00

* 4 Cl 1 はイオン中に塩素元素が 4 原子含まれていることを示す。

** 表中 () 内は m/e の値を示し、その下は相対強度を示す。

*** 図 3 における番号を示す。