回復することを確かめた。中性塩分解能の回復の程度は完全ではなく新品樹脂の状態には戻らない。その原因が還元が不十分であるためか、または他の要因によるものかについてはさらに究明を要するものと思われる。

この研究にあたり、赤外線吸収スペクトルの解析について終始懇切な御指導を賜った、東京大学理学部の島内武彦教授に厚く感謝する。

クロロホルムの熱分解生成物、とくにヘキサクロルブタジエン

(昭和34年10月8日受理)

藤 野 明†

ふるく Besson¹⁾ は白金-軽石を充てんした赤熱ガラス管にヨウ素をふくむクロロホルム蒸気を反復して通じ、反応生成物として四塩化炭素、テトラクロルエチレン、ヘキサクロルエタン、ヘキサクロルベンゼンのほかに高沸点留分として bp 210°C の無色の液体 (I) がおよそ 8% 収率で得られることを報告している。このものは C_4Cl_6 の組成が与えられているが、その構造はあきらかにされていない。そのうち Lessig²⁾, Verhoek³⁾, Semeluk⁴⁾ がクロロホルムの高温気相分解の研究を行なっているが、いずれにおいても I の生成についてはふれるところがなかった。

著者は 500°~700°C においてこの分解反応を行ない、530~650°C で低収率ながら生成する I をしらべた。500°C ではその生成はみとめられず、また 700°C では分解炭化がいちじるしく、I が生成してもきわめてわずかである。

I には赤外線吸収スペクトルでは 6.22μ (m) および 6.41μ (s) の特徴ある 2 本の吸収帯が存在し、ジエン構造が推定されるが、クロロホルム中臭素を付加せず、酸、アルカリに対してきわめて安定である。このものがヘキサクロルブタジエン⁵⁾であることを標品との赤外線吸収スペクトルによる同定によって確かめた。

実験方法としては、ななめに位置した加熱鉄管中に上部からクロロホルムを滴下しながら不活性ガスを流通し、下部に流出生成物をうる方法 (流下法) と、垂直に立てた加熱磁製管下でクロロホルムを加熱還流し、上部からの留出物を冷却凝結させて連続的

表 2 循環法による熱分解

反応温度 (°C)	最終液温 (°C)	(I) の収率 (%)	反応温度 (°C)	最終液温 (°C)	(I) の収率 (%)
550	150	1.2	650	148	4.4
600	120	2.4	700 ^{a)}	120	1.1

注 a) $\pm 20^\circ\text{C}$, ほかは $\pm 10^\circ\text{C}$

に原料中に送り返し、還流容器中の液体が一定温度に達するまで循環分解をくり返す方法 (循環法) を用いた。

両方法による実験条件と I の収率を表 1, 2 にしめす。

I の収率は流下法の方が循環法にまさり、前者では最適温度が 550°~580°C の付近にあることがわかる。この温度範囲においても、滴下時間、すなわち流通蒸気の高温保持時間が重要な条件である。

この熱分解反応ではテトラクロルエチレンがつねに主生成物であるが、このものをクロロホルムのかわりに滴下しても I が得られなかった (580°C)。

ちなみに四塩化炭素を循環法によって分解したが、I の生成はまったくみられなかった。

実 験

1. 流下法

鉄管反応管: 内径 3.8 cm, 長さ 80 cm, 電気炉挿入部分は中央の 60 cm, 熱電対は斜下部より中央に挿入, その指示温度を反応温度とした。

クロロホルムは毎回 300 g を用いた。反応がおわったのち受器内に蒸着しているヘキサクロルベンゼン, ヘキサクロルエタンを除き, 留出物, 洗液 (ベンゼン) を合して炭酸水素ナトリウム水溶液で洗い, 水蒸気蒸留する。留出液を分離し, ベンゼン抽出, 分離油と合わせ塩化カルシウムで乾燥, 溶媒留去後蒸留する。bp 200°~215°C の留分を減圧蒸留で精製する。bp₁₅ 90°~92°C

2. 循環法

磁製反応管: 内口径 2.5 cm, 長さ 60 cm, 電気炉挿入部分は中央の 25 cm, 熱電対は上部から挿入, 反応管上部には還流用の特殊ヘッドを接続した。反応がおわったのち容器を冷却放置して析出する結晶部分をろ別し, ろ液について 1 と同様の後処理を行なう。クロロホルムの使用量毎回 300 g。

表 1 流下法による熱分解

反応温度 (°C)	滴下時間 (min)	(I) の収率 (%)	反応温度 (°C)	滴下時間 (min)	(I) の収率 (%)
500	290	—	580	300	14.6
530	280	8.4	600	160	6.7
550	150	2.3	650	200	6.1
550	295	15.6	700	100	—
580	150	8.1			

注 a) いずれも $\pm 10^\circ\text{C}$

† 大阪市立大学理学部, 大阪市

1) M. A. Besson, *Compt. rend.* 116, 102 (1893).

2) E. T. Lessig, *J. Phys. Chem.* 36, 2325 (1932).

3) F. H. Verhoek, *Trans. Faraday Soc.* 31, 1521 (1935).

4) G. P. Semeluk, R. B. Bernstein, *J. Am. Chem. Soc.* 76, 3793 (1954).

5) O. Fruhwirth, *Ber.* 74B, 1700 (1941).

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1171~1173 (1960)

Studies on Sulfur-containing Heterocyclic Compounds. XI. Reaction of 3-Aminorhodanine Derivatives with Aniline or Phenylhydrazine

by Hiromoto UEDA and Masaki OHTA

The reaction of 3-aminorhodanine derivatives with aniline or phenylhydrazine was studied. Thioglycolic anilide derivatives were obtained by the reaction of aniline and 3-amino- and 3-acetylaminorhodanine through the aminolysis of the amide linkage. 1,4-Diphenylthiosemicarbazide was obtained by the reaction of 3-anilino-rhodanine and aniline in ethanol, while 2-phenylhydrazono-3-phenyl-4-thiazolidone was obtained by the same reactants in acetic acid. In the case of 3-anilino-5-benzalrhodanine, ring opening did not occur with aniline and 2-phenylimino derivative was obtained. The reaction of 3-aminorhodanine derivatives and phenylhydrazine gave 2-phenylhydrazono-4-thiazolidone derivatives.

Laboratory of Organic Chemistry, Tokyo Institute of Technology; Meguro-ku, Tokyo, Japan

Notes

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1174 (1960)

Recovery of ^{110m}Ag from its Waste Solution by Coprecipitation with Cupric Sulfides.

by Kiyoshi KUDO

From radioactive waste solutions ^{110m}Ag of ca. $10^{-3} \mu\text{C./ml.}$, most of Ag (ca. 97%) has been coprecipitated with Cu as sulfides, residual activity being ca. $10^{-5} \mu\text{C./ml.}$ The actual procedure is as follows. H_2S is passed through 10 ml of a radioactive waste solution which contains a suitable amount of Cu^{2+} and is acidified to about 0.3N in HCl. After being heated the solution is kept standing for 30 minutes and then filtered. The filtrate is evaporated to dryness and its radioactivity is determined by a Lauritsen electroscope. By repeated procedures, the recovery yield is increased up to 99%.

Chemical Institute, Faculty of Science, Tohoku University; Sendai-shi, Miyagi, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1175~1176 (1960)

On the Rehabilitation of Degraded Anion Exchange Resins

by Takao YAMAMOTO*, Teruyuki KANIE and Kazunobu KODAMA

The degraded anion exchange resins have the characteristic absorption bands of carboxyl radicals in their infrared spectrum (T. Yamamoto, T. Kanie and K. Kodama, *Nippon Kagaku Zasshi*, 81, 673 (1960)). The authors have shown that the reduction of these anion exchange resins with hydrazine or sodium sulfite rehabilitates their salt splitting capacities, resulting in the disappearance of the absorption bands of carboxyl radicals.

*Kurita Industrial Co., Ltd.; Oyodo-ku, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1176 (1960)

Hexachlorobutadiene, the Pyrolytic Product of Chloroform

by Akira FUJINO

The Besson's perchloro-compound, $\text{C}_4\text{Cl}_6(\text{I})$ which was produced by the pyrolysis of chloroform at $530\sim 700^\circ\text{C}$ through the flow-down and the circulating method, was found to be hexachlorobutadiene. The former method favored the production of I and the optimum temperature was $550\sim 580^\circ\text{C}$.

The Institute of Polytechnics, Osaka City University; Kita-ku, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1177 (1960)

The Relationship between Radium Content and Hydrogen Ion Concentration of Mineral Spring Waters in Japan

by Takeshi SUGIHARA

Among the mineral springs having pH values larger than 5, it has been found that there is a negative correlation between pH's and the logarithmic values of radium content, this is, the correlation coefficient of -0.691 for the 122 samples, which is highly significant. Therefore, it may lead to a general rule, so far as the waters of all the mineral springs in Japan are concerned, there is a negative correlation between them.

Balneological Institute, Okayama University; Misasa-cho Tottori Japan

Letter to the editor

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1178 (1960)

On the Abnormal Infrared Absorption Bands of Crystalline Guanine

Kiroku KOMATSU and Sei HACHISU

Infrared absorption spectra of guanine are measured with various specimens prepared by three different methods: (1) KBr tablet; (2) evaporated film on a NaCl plate; (3) lamellar crystals arranged on NaCl plate. Absorption bands $910\sim 855 \text{ cm}^{-1}$ and $780\sim 765 \text{ cm}^{-1}$ which are observed in the specimen(1) diminish and sharpen respectively in specimen(2), and in specimen(3) they completely disappear when the NaCl plate is set perpendicular to the incident beam and reappear and become intense with increase of inclination of plate to the incident beam. From the above, it was concluded that the transition moments of these bands are perpendicular to the face of the lamellar crystal.

Institute for Applied Optics; Shinjuku-ku, Tokyo, Japan