5-イミダゾロンに関する研究 (第1~2報)

(昭和35年2月12日受理)

下村 脩・江口 昇 次

(第1報) 1, 2, 4-トリ置換-5-イミダゾロンの合成ならびに

その紫外線吸収スペクトル

2-メチル-4-ベンジリデン-5-オキサゾロン(I)に種々のアミン類を作用させてアミドとし、このアミドを脱水閉環して1-置換-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロンをえたが、1-フェニル置換体の場合にはアミドを経由するよりも、オキサゾロン(I)とアニリンの直接反応による方が、はるかに容易に合成できることを知った。また、2位へのメチル基以外のアルキル基の導入、4位のイソプロピリデン基の導入、ならびに合成した14種のトリ置換-5-イミダゾロンの紫外線吸収スペクトルについても検討した。

1 緒 言

2,4-ジ置換-5-イミダゾロンについては古くから研究されて、Ekeley¹⁾ら²⁾は2-フェニル-4-ベンジリデン置換体の誘導体を種々合成し、またLehr³⁾ら⁴⁾は48種にのぼるジアルキル置換体を合成してその催眠剤としての作用を調べている。しかし1,2,4-トリ置換体としては、いままでに2-フェニル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロンの1位にメチル、エチル、フェニル、ベンジルおよびエトキシカルボニルメチルなどの数種の基を置換した化合物⁵⁾が知られているにすぎない。この種の環が天然物中から発見されたという報告はまれであるが、最近海ホタルルシフェリンの構造中にこの環があることが推定されている⁶⁾。その合成法としてはアズラクトン法の他にBrunken⁷⁾およびBach⁸⁾によって報告されたオルトエステル類による方法があるが、著者らはアズラクトンから種々のトリ置換-5-イミダゾロンの合成を試みた結果十数種の新化合物を合成することができた。またこれらの5-イミダゾロンの紫外線吸収スペクトルを調べ、若干の知見を得ることができたが、5-イミダゾロンの紫外線吸収スペクトルは海ホタルルシフェリンの発色系との関連においても興味ある問題である。

2 アズラクトン法による合成

Ch. Gränacher⁹⁾は2-フェニル-4-ベンジリデン-5-オキサゾロンをグリシンエチルエステル、エチルアミンなどのアミン類とともにアルコール中で煮沸して α -ベンゾイルアミノケイ皮酸のアミドを得、このアミドを減圧下で170°~200°Cに加熱して1-置換-2-フェニル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロンを合成している。著者らは同様の方法を2-メチル-4-ベンジリデン-5-オキサゾロン(I)について適用して、1位にメチル、エチル、ブチル、フェネチルまたはインドリルエチルなどの置換基を有する2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン(II)を得ることができ

た(表1, No.1~No.5)。

この場合、2位にフェニル基をもつときと大体同条件で反応させたが、2位にメチル基をもつときの方がアミド化も環化もともに反応がいくぶん容易で反応時間を短縮することができた*1。

1-フェニル置換体の合成法としては、対応するアニリドを減圧下で融点以上に加熱する方法⁹⁾、およびアニリドにオキシ塩化リンを作用させる方法¹⁰⁾が知られている。著者らは2-メチル-4-ベンジリデン-5-オキサゾロン(I)を原料とし、アニリン、*p*-トルイジン、*p*-ジメチルアミノアニリン、*p*-アニシジン、*p*-アミノアセトフェノン、*p*-アミノ安息香酸エチル、*p*-ニトロアニリンおよび β -ナフチルアミンを用いてそれぞれ対応するイミダゾロンの合成を試みたがその結果、オキサゾロン(I)とこれらのアニリン誘導体を常圧で100°~200°Cに加熱するだけで、容易にしかもアニリドを経由するよりも収量よく合成できることを知った(表1, No.7~No.14)。たとえばアニリンの場合、アルコール中でオキサゾロン(I)とアニリンを煮沸すれば α -アセチルアミノケイ皮酸アニリド(IV)が得られる。このアニリド(IV)を1-フェニル-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン(V)に変えるには、オキシ塩化リンで処理するか(収量が劣る)または減圧下で205°Cに加熱することが必要であるが、オキサゾロン(I)とアニリンから直接イミダゾロン(V)をつくるには単に130°~140°Cに加熱するだけで十分であった。

*1 1位にメチル基を導入するときには例外的にいくぶん高温を要した。

6) K. S. Narang, J. N. Ray, J. Chem. Soc. 1931, 976.

† 長崎大学薬学部, 長崎市昭和町

†† 名古屋大学理学部化学教室, 名古屋市千種区不老町

1) J. B. Ekeley, A. R. Ronzio, J. Am. Chem. Soc. 57, 1353 (1935);

J. B. Ekeley, J. L. Elliott, *ibid.* 58, 163 (1936).2) H. Lehr, S. Karlam, M. W. Goldberg, *ibid.* 75, 3640 (1953).3) Ch. Gränacher, M. Mahler, *Helv. Chim. Acta* 10, 246 (1927);Ch. Gränacher, G. Gulbas, *ibid.* 10, 819 (1927).

4) Y. Hirata, O. Shimomura, S. Eguchi, "Tetrahedron Letters"

No. 5, p. 4 (1959).

5) J. Brunken, G. Bach, *Ber.* 89, 1363 (1956).

表 1 1,2-ジ置換-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン

化合物 番号 No.	置 換 基 ^{a)} R ₁	基 ^{a)} R ₂	アミドの 融点 (°C)	イミダゾロンの ^{b)} 合 成 条 件	イミダゾロ ンの 融点 (°C)	$\lambda_{\max}^{\text{CH}_3\text{OH}}$ (log ϵ) (m μ)	収率 (%)
1	CH ₃ -	CH ₃ -	198~200	210°~220°C, 30 min	109	348 (4.25)	38
2	C ₂ H ₅ -	CH ₃ -	168~170	180°~190°C, 30 min	155(分解) ^{c)}		63
3	CH ₃ ·(CH ₂) ₃ -	CH ₃ -	139~140	180°~190°C, 30 min	72	350 (4.28)	80
4	-CH ₂ ·CH ₂ -	CH ₃ -	145	170°~180°C, 30 min	116	351 (4.32)	83
5	-CH ₂ ·CH ₂ -	CH ₃ -	171~172	180°~185°C, 30 min	186~187		78
6	-CH ₂ ·CH ₂ -	N·(CH ₂) ₃ -	180(分解)	180°~190°C, 30 min	137	355 (4.25)	83
7	-	CH ₃ -	196	140°C, 10 min	143~145	349 (4.35)	80
8	CH ₃ - -	CH ₃ -	201~202	130°~140°C, 10 min	132	350 (4.33)	70
9	-	CH ₃ -	—	{ エタノール 15 min 中煮沸,	200~201	343 (4.43)	73
10	CH ₃ O- -	CH ₃ -	—	{ エタノール 20 min 中煮沸,	160	344 (4.30)	65
11	CH ₃ ·CO- -	CH ₃ -	—	{ トルエン 15 min 中煮沸,	169~171	349 (4.35)	60
12	C ₂ H ₅ O·CO- -	CH ₃ -	—	150°~160°C, 5 min	197~198	349 (4.37)	72
13	NO ₂ - -	CH ₃ -	234~239	200°C, 30 min	199~204	349 (4.37)	25
14	-	CH ₃ -	195~198	140°C, 10 min	153~154	348 (4.33)	70

注 a) -CH=C-CO-N(R₁)(R₂) b) No. 1~6 はアミドから, また No. 7~14 はオキサゾロンから直接合成したときの条件.
温度は油浴の温度. c) 塩酸塩.

一般にアニリドを経由するときよりも数十度低い反応温度で, 数分の1の反応時間で, かつ収量よく合成することができた。なお 1-アルキル置換体を合成する場合にはこのような現象はみられず, オキサゾロン (I) と脂肪族アミン類を加熱すれば 1 行程の操作でイミダゾロンをうることはできる*2がアミドを経由する場合と比較して反応条件の緩和は得られなかった。

オキサゾロン (I) とアニリン誘導体をアルコール中で煮沸した場合, アニリン, *p*-トルイジンおよび β -ナフチルアミンに対してはアニリドを与えたが, *p*-ジメチルアミノアニリンおよび *p*-アニシジンのときは直接イミダゾロンが得られ, また *p*-アミノアセトフェノン, *p*-アミノ安息香酸エチルおよび *p*-ニトロアニリンはこの条件では反応せず原料を回収した。*p*-アミノアセトフェノンおよび *p*-アミノ安息香酸エチルの場合には反応温度を高めることによりイミダゾロンを得ることができたが, 反応をアニリドの段階で止めることはできなかった。*p*-ニトロアニリンの場合にはオキサゾロン (I) と 180°C に加熱して始めてアニリドを得ることができた。

2-(γ -フタルアミノプロピル)-4-ベンジリデン-5-オキサゾ

ロン (V) を合成し, これにフェネチルアミンを作用させてアミド体を得, さらに加熱環化して 1-フェネチル-2(γ -フタルアミノプロピル)-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (VII) を得ることができた。この事実からそれぞれ適当なオキサゾロンを原料につかうことによって, 2 位に種々の基を導入した 4-ベンジリデン-5-イミダゾロンを合成できると考えられる。

2-フェニル-4-イソプロピリデン-5-オキサゾロン (VIII) にエチルアミン, ブチルアミンおよびフェネチルアミンを反応させてそれぞれのアミドをえ, このアミドを減圧下で 210°~220°C に加熱したがイミダゾロンを得ることはできなかった。ブチルアミドおよびフェネチルアミドの場合に反応物は橙色を呈したが原料の大部分を回収し, エチルアミド (IX) の場合は揮発成分の蒸留を認め反応残留物は原料のオキサゾロン (VIII) と考えられる。またアニリンを反応させて得たアニリド (X) に環化の目的でオキシ塩化リンを作用させたときにも, イミダゾロンを得ることができ

*2 170°~200°C に 30 分間加熱, 収量は劣る。

原料のオキサゾロン (VII) を回収した。

3 紫外線吸収スペクトル

Lehr ら²⁾は 2-アルキル-4-アルキリデン-5-イミダゾロンが特徴のある紫外線吸収を示すことを報告している ($\lambda_{\text{max}}^{\text{EtOH}}$ 230m μ および 290 m μ)。著者らの合成した十数種の 4-ベンジリデン-5-イミダゾロン類の場合はメタノール中で 235 m μ 付近と 290 m μ 付近の 2 カ所のほかに、350 m μ 付近に前 2 者より強い吸収極大 (ϵ = 約 20000) を示した (表 1)。一般にこれらの化合物は吸収の形がよく似ているが、置換基に強い吸収のある基を含んでいるときには、290 m μ 付近の吸収極大はいくぶん変化する。たとえば 1-(*p*-ジメチルアミノフェニル) 置換体では 265m μ に吸収極大を示した。図 1 に二、三の例をあげた。

- a: 1-フェニル-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 7)
 b: 1-*n*-ブチル-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 3)
 c: 1-フェネチル-2-(γ -フタルアミノ)プロピル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 6)

図 1 紫外線吸収スペクトル (溶媒: メタノール)

350 m μ 付近の吸収極大波長は 0.1N 塩酸 および 0.1N 水酸化ナトリウム中でほとんど変化しないが濃硫酸中では約 20 m μ 深色移動する。1,2,4-トリ置換体の場合に 0.1N 水酸化ナトリウム中で変化しないことは、1 位に置換基をもたないイミダゾロンが 0.1N 水酸化ナトリウム中で深色移動する点と明瞭な相違を示し、これらの識別に利用することができる (表 2)。またこの相違は 1 位に置換基をもたないときにはエノール化できるということで説明できる。

表 2 1-置換体と 1-非置換体との相違

置 換 基 ^{a)}				$\lambda_{\text{max}}^{\text{CH}_3\text{OH}}$ (m μ)	$\lambda_{\text{max}}^{0.1\text{N NaOH}}$ (m μ)
R ₁	R ₂	R ₃	R ₄		
CH ₃ ·(CH ₂) ₃ -	CH ₃ -	C ₆ H ₅ -	H-	350	350
C ₆ H ₅ -	CH ₃ -	C ₆ H ₅ -	H-	349	350
C ₂ H ₅ O·CO·CH ₂ -	C ₆ H ₅ -	C ₆ H ₅ -	H-	365	369
H-	CH ₃ -	C ₆ H ₅ -	H-	342	370
H-	C ₆ H ₅ -	C ₆ H ₅ -	H-	375	403
H-	C ₂ H ₅ -	CH ₃ -	CH ₃ -	290	325
H-	C ₆ H ₅ -	CH ₃ -	CH ₃ -	318	354

4 実験の部

4.1 1-アルキル-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 1~5)

4.1.1 アミド: 2-メチル-4-ベンジリデン-5-オキサゾロン (I) 約 5g に 10 倍量のアルコールと約 1.2mol 量のメチルアミン (40% 溶液), エチルアミン (33% 溶液), ブチルアミン, フェネチルアミンまたは β -インドリルエチルアミンを加えて 10~15 分間煮沸したのち水約 5cc を加えて減圧濃縮するとアミドが析出する。これをろ集し、80% アルコールから再結晶して無色の結晶を得た。収率 70~75%。

	結晶形	N 分析値 (%)	N 計算値 (%)
メチルアミド (C ₁₂ H ₁₄ O ₂ N ₂)	粉 末	12.69	12.84
エチルアミド (C ₁₃ H ₁₆ O ₂ N ₂)	針 状	12.08	12.06
ブチルアミド (C ₁₅ H ₂₀ O ₂ N ₂)	サイコロ状	10.80	10.76
フェネチルアミド (C ₁₉ H ₂₀ O ₂ N ₂)	サイコロ状	8.99	9.08
β -インドリルエチルアミド (C ₂₁ H ₂₁ O ₂ N ₂)	柱 状	12.12	12.10

4.1.2 イミダゾロン: 前項で得られたアミドに沸とう石数片を加えアスピレーターで減圧にしながら油浴で表 1 に示した条件に加熱すると反応生成物は暗赤色を呈する。冷後最初メタノールから、つぎにアルコールから再結晶して黄色の結晶を得た。エチル誘導体の場合は結晶化しにくかったので、当量の塩酸を加えて塩酸塩にしてから、メタノール-エーテルで再結晶した。

1 位置換基	結晶形	N 分析値 (%)	N 計算値 (%)
メチル (C ₁₂ H ₁₂ ON ₂)	針 状	13.82	13.99
エチル (C ₁₃ H ₁₄ ON ₂ ·HCl)	針 状	11.08	11.17
ブチル (C ₁₅ H ₁₈ ON ₂)	柱 状	11.42	11.56
フェネチル (C ₁₉ H ₁₈ ON ₂)	サイコロ状	9.48	9.65
β -インドリルエチル (C ₂₁ H ₁₉ ON ₂)	柱 状	12.74	12.76

4.2 1-フェネチル-2-(γ -フタルアミノプロピル)-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 6)

4.2.1 γ -フタルアミノ酸: γ -アミノ酸を当量の無水フタル酸とともに 170~180°C に 15 分間加熱し、冷後生成物を水から再結晶した。無色針状結晶。mp 115~117°C。収率 97%。

4.2.2 γ -フタルアミノブチルグリシン: γ -フタルアミノ酸 63g に塩化チオニル 150cc を加え 40°C でふりまぜ、ガス

の発生が終ってから減圧で過剰の塩化チオニルを留去するとあめ状の物質が得られる。この酸塩化物をクロロホルム 100 cc にとかし、これをグリシン 25 g, 水 150 cc, 氷 100 g および炭酸水素ナトリウム 80 g の混合物中にふりまぜながら滴下し、さらに炭酸ガスの発生がやむまで約 30 分間ふりまぜつづける。つぎに塩酸で酸性にし、クロロホルムを減圧で除去したのち冷却して放置すると結晶が析出する。これをロ集し、エーテルで洗い、アセトン少量を含む水から再結晶した。無色針状結晶。mp 174°~176°C。収量 47 g。

分析値 N 9.68%

$C_{14}H_{14}O_5N_2$ としての計算値 N 9.65%

4.2.3 2-(γ -フタルアミノプロピル)-4-ベンジリデン-5-オキサゾロン: γ -フタルアミノプロピルグリシン 10 g, 無水酢酸ナトリウム 2 g, ベンズアルデヒド 5 cc および無水酢酸 50 cc の混合物を 70°C の水浴中で 5 時間加熱したのち、減圧で半量に濃縮し、水 30 cc を加えて冷所に放置する。析出した黄色結晶塊をロ取し、水およびエーテルで洗って淡黄色針状結晶 4 g を得た。mp 125°~126°C。

分析値 N 7.65%

$C_{21}H_{16}O_4N_2$ としての計算値 N 7.77%

4.2.4 アミド: 前項で得たオキサゾロン化合物 8 g をアルコール 200 cc およびフェネチルアミン 3 cc とともに 5 分間煮沸したのち冷却する。析出物をロ集して、無色針状結晶 9 g を得た。mp 180°C。

4.2.5 イミダゾロン: 前項で得たアミドを 180°~190°C で 4.1.2 と同様に処理し、生成物をメタノール-アセトン混液から再結晶した。微黄色針状結晶。

分析値 N 8.81%

$C_{29}H_{25}O_3N_3$ としての計算値 N 9.07%

4.3 1-フェニル-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 7)

4.3.1 アニリド: オキサゾロン (I) 10 g, アルコール 70 cc およびアニリン 5 cc を 4.1.1 と同様に処理し、最後にメタノールから再結晶して無色針状結晶 8 g を得た。

分析値 N 9.91%

$C_{17}H_{16}O_2N_2$ としての計算値 N 9.99%

4.3.2 オキシ塩化リンによる環化: アニリド 7 g を 50 cc のオキシ塩化リンにとかし、約 80°C の湯浴中で 5 分間ぐらい加温すると黄色になる。減圧でオキシ塩化リンの大部分を除去したのち氷水中に注加し、炭酸水素ナトリウムで中和してから水層を傾斜して除き、残留物をメタノールから再結晶した。黄色柱状結晶。mp 142°~144°C。収率 47%。

分析値 N 10.42%

$C_{17}H_{14}ON_2$ としての計算値 N 10.68%

4.3.3 加熱脱水による環化: アニリドをアスピレーター減圧下に 205°C の油浴中で 15 分間加熱し、生成物を冷後メタノールから再結晶して黄色柱状または板状の結晶を得た。mp 143°~145°C。収率 70%。

4.3.4 オキサゾロンとアニリンとから直接イミダゾロンの合成: オキサゾロン (I) 0.9 g とアニリン 0.5 cc をまぜ、沸とう石 1 片を入れて 140°C の油浴中で 10 分間加熱すると暗赤色となる。冷後生成物をメタノールから再結晶して黄色柱状または板状

の結晶を得た。mp 143°~145°C。収率 80%。

4.4 1-(*p*-置換フェニルあるいは β -ナフチル)-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロン (表 1, No. 8~14)

4.4.1 アニリド類: オキサゾロン (I) 0.9 g に *p*-トルイジンあるいは β -ナフチルアミンの等 mol 量およびアルコール 10 cc を加え 10 分間煮沸したのち、冷却し析出物をロ集してメタノールから再結晶した。またアニリン類として *p*-ニトロアニリンを用いたときは、オキサゾロンとの混合物を直接 170°~180°C に 5 分間加熱し、冷後メタノールから再結晶した。*p*-メチルアニリドは無色針状結晶。 β -ナフチルアミドは無色リン片状結晶。*p*-ニトロアニリドは淡黄色針状結晶。

4.4.2 イミダゾロン類: オキサゾロン (I) 約 0.9 g にアニリン類を等 mol 量混合して表 1 の条件に加熱し^{*3}、冷後生成物を 1-(*p*-トルイル), 1-(*p*-メトキシフェニル), 1-(*p*-アセチルフェニル) および 1-(β -ナフチル) 置換体の場合はメタノールから再結晶し、その他の置換体の場合にはメタノール-ベンゼン混液から再結晶した。いずれも黄色の針状あるいは柱状の結晶。

1-置換基(分子式)	N 分析値 (%)	N 計算値 (%)
<i>p</i> -トルイル($C_{18}H_{16}ON_2$)	10.18	10.14
<i>p</i> -ジメチルアミノフェニル($C_{18}H_{18}ON_2$)	13.80	13.76
<i>p</i> -メトキシフェニル($C_{18}H_{16}O_2N_2$)	9.70	9.58
<i>p</i> -アセチルフェニル($C_{19}H_{16}O_2N_2$)	9.16	9.21
<i>p</i> -エトキシカルボニルフェニル ($C_{20}H_{18}O_3N_2$)	8.34	8.38
<i>p</i> -ニトロフェニル($C_{17}H_{13}O_3N_3$)	13.43	13.68
β -ナフチル($C_{21}H_{16}ON_2$)	8.91	8.97

4.5 α -ベンゾイルアミノ- β -メチルクロトン酸アミド類

4.5.1 合成: 2-フェニル-4-イソプロピリデン-5-オキサゾロン (VIII) 1 g にアルコール 15 cc およびアミン類 (33% エチルアミン 0.8 cc, ブチルアミン 0.6 cc, フェネチルアミン 0.7 cc またはアニリン 0.5 cc) を加えて 10 分間 (アニリンのときは 40 分間) 還流し、冷後析出した結晶をロ集してアルコールから再結晶した。いずれも無色針状結晶。収率 70~80%。

	融点 (°C)	N 分析値 (%)	N 計算値 (%)
エチルアミド($C_{14}H_{18}O_2N_2$)	213	11.47	11.37
ブチルアミド($C_{16}H_{22}O_2N_2$)	194	10.13	10.21
フェネチルアミド($C_{20}H_{22}O_2N_2$)	198	8.91	8.69
アニリド($C_{18}H_{18}O_2N_2$)	270以上	9.49	9.52

4.5.2 エチルアミドの減圧下における加熱: エチルアミド 2 g をアスピレーター減圧下で油浴温度 230°C でいったん熔融したのち、210°~220°C で 20 分間加熱し、放冷後アルコールから再結晶した。無色針状結晶。mp 98°C。収量 0.3 g。紫外線吸収スペクトルはオキサゾロン (VIII) と一致した。

分析値 N 7.12%

$C_{12}H_{11}O_2N$ としての計算値 N 6.96%

4.5.3 アニリドのオキシ塩化リン処理: アニリドを 4.3.2 と同条件で処理し、炭酸水素ナトリウムで中和することなく析出物をロ集してアルコールから再結晶した。無色針状結晶。mp 97°C。

*3 溶媒を使用したときは約 10 cc 用いた。ただし溶媒を使用しなくても反応温度を高めれば (130°~140°C) 良好な収量を得ることができる。

収量 アニリド 2g から 0.7g。紫外線吸収スペクトルはオキサ
ゾロン (Ⅷ) と一致した。

分析値 N 7.20%

$C_{12}H_{11}O_2N$ としての計算値 N 6.96%

(第2報) 5-イミダゾロン類の接触還元ならびに生成物の pK_a'

4-ベンジリデン-5-イミダゾロン類および 4-イソプロピリデン-5-イミダゾロン類をメタノール中で Adams の酸化白金あるいはパラジウム黒を触媒として接触還元した。酸化白金を用いた場合には 1mol の水素による還元生成物 (以下 1mol 還元物と呼ぶ) を結晶状に得ることはできなかったが, 2mol 還元物 (5-イミダゾリドン) は 15 種の化合物を塩酸塩結晶として得ることができた。パラジウム黒を用いた場合には 1mol の水素を吸収したのち還元が停止し, 1-フェニル-2-メチル-4-ベンジリデン-5-イミダゾロンからは mp 82°~84°C の結晶を得た。また, 得られた 15 種のイミダゾリドンの pK_a' を測定して, その結果から 5-イミダゾリドン環の pK_a' におよぼす種々の置換基の影響についての考察を試みた。

1 緒 言

4-ベンジリデン-5-イミダゾロン類の還元についてはいままで
に, 二の例についてナトリウムアマルガム法¹⁾および接触還元
法²⁾の報告があり, またその還元反応はつぎのように 2 段階に進
むものと考えられている。

ナトリウムアマルガムによる還元は定量的な還元には不適当であ
ると考えられるので, 著者らは接触還元法を用いた。また 4-不
飽和-5-イミダゾロン (I) は一般にごく弱い塩基であるが, 還
元して 5-イミダゾロン (II) あるいは 5-イミダゾリドン (III)
になると塩基性が増大すると考えられるのであわせて pK_a' 値に
についても検討した。

2 1mol 還元

4-ベンジリデン-5-イミダゾロンあるいは 4-イソプロピリデン-
5-イミダゾロンを Adams の酸化白金を触媒としてメタノール
中で還元した場合, 最初は水素の吸収が非常にすみやかで, 大体
10~40 分で 1mol の水素を吸収したが, つぎの 1mol の吸収
にはかなり長時間 (3~6 時間) を要し, それ以上はほとんど吸
収しなかった。数種の 5-イミダゾロン^{*1} について, 1mol の水
素を吸収させたのち, 濃縮, 精製して II 式の構造に相当する物
質を結晶状あるいは純粋な状態で得ようとしたが成功しなかつ
た^{*2}。これは式の構造の物質が低融点で, かつかなり不安定であ
るためにように考えられる。Kjaer²⁾ は 2-フェニル-4-ベンジリ
デン-5-イミダゾロンから 2-フェニル-4-ベンジル-5-イミダゾ

4.5 紫外線吸収スペクトル

Beckman DU 型分光光度計で測定した。

ンを結晶状に得ているが, この場合には 2-フェニル置換のため
にかなり安定化しており, また融点も例外的に高いからであろう
と思われる。

パラジウム黒を触媒に用いた場合には水素 1mol を吸収させ
るのに 2~5 時間を要したが, それ以後はほとんど水素の吸収が
認められなかった。この場合 1-フェニル-2-メチル-4-ベンジリ
デン-5-イミダゾロンからは II 式に相当する物質, 1-フェニル-2-
メチル-4-ベンジル-5-イミダゾロンと考えられる mp 82°~84°C
の結晶^{*3}を得た。

3 2mol 還元: 5-イミダゾリドン

5-イミダゾロン (I) に, メタノール中で Adams の酸化白金
を触媒として 2mol の水素を吸収させると 5-イミダゾリドン
(II) が得られる。このものは遊離塩基は大い低融点の物質で
結晶化することが困難であるが, 塩酸塩にすると容易に結晶とし
て得ることができる。合成した 15 種の 5-イミダゾリドン類を
表 1 に示した。

4 pK_a' について

4-不飽和-5-イミダゾロン (I), その 1mol 還元体 (II) およ
び 2mol 還元体 (5-イミダゾリドン, III) の pK_a' を二, 三の例
について比較測定したところ, つぎのような結果を得た。

$C_6H_5-CH=C-CO$ N N-CH ₂ ·COOC ₂ H ₅ CH ₃ 1 以下 ^{*4}	$C_6H_5-CH=C-CO$ N N-C ₆ H ₅ CH ₃ 1 以下
(Ⅳ) Ⅳの 1mol 還元体 3.40	(Ⅴ) Ⅴの 1mol 還元体 3.20
5-イミダゾリドン 3.75	5-イミダゾリドン 3.55
$(CH_3)_2C=C-CO$ N N CH ₃ 3.70	
(Ⅵ) Ⅵの 1mol 還元体 4.75	
5-イミダゾリドン 4.80	

すなわち, 4-不飽和-5-イミダゾロン類は還元により pK_a' がか
なり増大するが, 1mol 還元体と 5-イミダゾリドンとの差は比

1) D. L. Williams, F. L. Symonds, J. B. Ekeley, A. R. Ronzine, *J. Am. Chem. Soc.* **67**, 1157 (1945).

2) A. Kjaer, *Acta Chem. Scand.* **7**, 889 (1953).

*1 I 式において $R_1=H-$, $CH_3-(CH_2)_3-$, C_6H_5- および $(CH_3)_2N-C_6H_5-$ (p), $R_2=CH_3-$, $R_3=C_6H_5-$, $R_4=H-$

*2 精製せずにそのまま紫外線吸収スペクトルを測定したところ, メタノール中
では 300 mμ 付近またはそれより長波長部にほとんど吸収を認めなかった
が, 0.1N NaOH 中では 290 mμ 付近に吸収を示した。

*3 λ_{max}^{MeOH} 220 mμ, $\lambda_{max}^{0.1N NaOH-20\% MeOH}$ 224 mμ および 290 mμ
(log ε 3.82).

*4 滴定法では測定できなかった。Ⅴにおいても同様。

4. Organic Chemistry and Biological Chemistry

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1424~1431 (1960)

Stereochemistry of α -Amino Alcohols and Related Compounds. V~VI.

by Toshiyasu ISHIMARU

V. Inversion of 1, 2-Diphenyl-2-acylamino-1-ethanols (*N*-acyl DAE) Through Oxazoline. Part 1. Reaction of *N*-acetyl DAE and *N*-formyl DAE with Thionyl Chloride (pp. 1424~1428)

Inversion of *N*-acyl DAE through oxazoline was studied. *N*-Acetyl DAE of both *N*-CH₃ and nor series underwent inversion (*erythro* $\rightleftharpoons$ *threo*) in good yield, when they were reacted with thionyl chloride followed by hydrolysis. By analogous treatment *erythro* *N*-formyl DAE of *N*-CH₃ series underwent ca. 50% inversion but *threo* of nor series failed. Mechanism of cyclization and correlation between cyclization process and steric hindrance were discussed.

VI. Intramolecular Cyclization of DAE. Part 1. Urea Fusion (pp. 1428~1431)

DAE and their ureids were fused with urea. *Erythro* and *threo* DAE of nor series and *threo* DAE of *N*-CH₃ series were cyclized to give oxazolidones, maintaining their configuration. On heating with alkali oxazolidones gave amines of the same series from which they were synthesized. *Erythro* DAE of *N*-CH₃ series was cyclized to imidazolidone with a loss of hydroxyl group joined to C₁ as in *N*→O acetyl migration. The difference of reaction between *erythro* (nor) and *erythro* (*N*-CH₃) and the configurations of the products were discussed.

Department of Pharmacology, Faculty Medicine, Kumamoto University: Kumamoto-shi, Kumamoto, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1431~1433 (1960)

Studies on Compounds Related to Indole. IV. The Reaction of Phosphorous Pentachloride with Ethyl Indole-2-carboxylate

by Masao KUNORI

The reaction of ethyl 3-chloroindole-2-carboxylate(I) with phosphorous pentachloride(II) was studied. (I) reacted readily with bromine to give ethyl 3-chloro-5-bromoindole-2-carboxylate (m.p. 190~192°C). When (I) was treated with (II) in the presence of usual organic solvent (for example, chloroform), formation of dichloro-derivative was not observed, and (I) was recovered almost quantitatively. (I) gave, however, ethyl 3,6-dichloroindole-2-carboxylate (III, m. p. 196~197°C) by heating with (II) without any solvent. When (III) was hydrolysed, subjected to oxidative destruction and then deaminated by diazo-reaction, *p*-chlorobenzoic acid was obtained, and thus the structure of the dichloro-derivative (III) was confirmed.

Department of Chemistry, College of Education, Tohoku University: Sendai-shi, Miyagi, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1434~1439 (1960)

Studies on 5-Imidazolone. I~II.

by Osamu SHIMOMURA* and Shoji EGUCHI

I. Syntheses and Ultra-violet Absorption Spectra of 1, 2, 4-Trisubstituted-5-imidazolones (pp. 1434~1438)

2-Methyl-4-benzylidene-5-oxazolone(I) was converted into α -acetyl-amino-cinnamides by boiling with amines in alcohol, and the amides were converted into corresponding 1-substituted-2-methyl-4-benzylidene-5-imidazolones by heating at 170~220°C under reduced pressure. Substituents at the 1 position of imidazolones are Me (m.p. 109°C), Et(hydrochloride, m.p. 155°C: decomp.), Bu(m.p. 72°C), phenethyl(m.p. 116°C) and β -indolylethyl (m.p. 186~187°C). 1-Phenethyl-2-(γ -phthalylamino) propyl-4-benzylidene-5-imidazolone(m.p. 137°C) was obtained from corresponding oxazolone and phenethylamine through the amide, but this method failed with 1,2-disubstituted-4-isopropylidene-5-imidazolone. 1-Phenyl derivative(m.p. 143~145°C) was prepared by the same process from I and aniline through the anilide by heating it at 205°C under reduced pressure, while I and aniline reacted directly even at 130~140°C under normal pressure and gave good yield. Thus, several 1-(*p*-substituted phenyl) derivatives were easily prepared by direct reaction of I and *p*-substituted anilines at relatively low temperature. *p*-Substituents in those imidazolones and their melting points are: Me(132°C), N(Me)₂(200~201°C), OMe(160°C), COMe (169~171°C), COOEt(197~198°C) and NO₂(199~204°C). U.V. absorption spectra of those trisubstituted imidazolones showed characteristic absorption. $\lambda_{\text{max}}^{\text{MeOH}}$ ca. 235 m μ , ca. 290 m μ and ca. 350 m μ (log ϵ ca. 4.3).

II. Catalytic Reduction of 5-Imidazolones and *pKa'* of the Products (pp. 1438~1439)

Ten 4-benzylidene-5-imidazolones and five 4-isopropylidene-5-imidazolones were hydrogenated in MeOH with Pd-black catalyst or Adams' PtO₂ catalyst. When Pd-black was used, original imidazolones did not absorb more than 1 mol. H₂, and 1-phenyl-2-methyl-4-benzylidene-5-imidazolone alone gave a crystalline product (m.p. 82~84°C). When Adams' PtO₂ was used, hydrogenation products by 1 mol. H₂ were not obtained in crystalline state, while the products by 2 mol. H₂ gave crystalline 5-imidazolidone hydrochlorides easily. *pKa*'s of the hydrogenation products were larger than those of original imidazolones, and most of 15 imidazolidones prepared in this study showed *pKa*'s between 3 and 5.

* Faculty of Pharmacy, Nagasaki University; Nagasaki-shi, Nagasaki, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1440~1444 (1960)

Studies on Nucleosides and Nucleotides. VII~VIII.

by Tetsuo SATO, Tosisada SIMADATE and Yoshiharu ISHIDO

VII. A New Method for Synthesis of Purine-Ribonucleosides. Part. I (pp. 1440~1442)

7- β -D-Ribofuranosyltheophylline was prepared in good yield by melting a mixture of theophylline(I) and 1,2,3,5-tetra-*O*-acetyl- β -D-ribofuranose(II) in the presence of *p*-toluenesulfonic acid as a catalyst for about 15 minutes in vacuo and followed by deacetylation with methanolic ammonia. Then, 2',3',5'-tri-*O*-acetyl-7- β -D-ribofuranosyltheophylline was shown to be convertible to I and II by