ヌクレオシドおよびヌクレオチドに関する研究 (第7~8報)

(昭和35年2月23日受理)

佐藤徹雄・島立利貞・石戸良治†

(第7報)¹⁾ プリンリボヌクレオシド類の新合成法 (その1)

プリンリボヌクレオシド類の新しい簡易な合成法を発見した。それはフェニルグリコシド類の合成法の一つとして知られる Helferich 法²⁾を応用するものである。

テオフィリン (I) と 1,2,3,5-テトラ-O-アセチル-β-D-リボフラノース (II) を *p*-トルエンスルホン酸の存在で、短時間減圧下に加熱溶融したのち脱アセチルして、7-β-D-リボフラノシルテオフィリン (IV) を好収量で得た。また、IV をアセチル化して得た 2',3',5'-トリ-O-アセチル-7-β-D-リボフラノシルテオフィリン (III) を酢酸にとかし、同じ触媒の存在で還流して I および II を回収した。すなわち、この反応は可逆反応である。

この方法により、2-メチルチオアデニン、2,8-ジクロルアデニン、2,6,8-トリクロルプリンのリボシドの合成を試みた。生成物はいずれも β-リボシドで、α-体は得られなかった。

プリンヌクレオシド類の合成法としては、プリン誘導体の金属塩に糖の 1-ハロゲン誘導体を縮合する Davoll ら³⁾の方法が広く行なわれている。

そのほか、イミダゾール誘導体に糖を付加し、そのイミダゾール核をプリンに導く方法⁴⁾、ならびにピリミジン誘導体に糖を付加し、ピリミジン核をプリンに導く方法⁵⁾があるが、これらは反応経路が長く、収率も低いため、一般には利用されない。

そして Davoll らの方法も、糖の 1-ハロゲン誘導体のようなきわめて不安定な中間体を用いるところに大きな欠点がある。

天然に見いだされるヌクレオシド類の多くは、D-リボフラノシドであって、その合成上の中間体となる 1-ブロム-、ならびに 1-クロル-D-リボフラノース誘導体は、知られているかぎりでは、すべて不安定なシロップ状の物質として得られるものばかりで、保存はもとより精製もほとんど不可能である。そこで、このような不安定な中間体を用いることなしにヌクレオシド類を合成する方法を見いだすため、種々の反応を検討した結果、フェニルグリコシド類の合成法として知られる Helferich 法²⁾を応用する、きわめて簡易な方法を発見した。

すなわち、プリン誘導体と 1,2,3,5-テトラ-O-アセチル-β-D-リボフラノース (I) を *p*-トルエンスルホン酸の存在で加熱溶融すれば、そのプリンの β-D-リボフラノシドが得られる。

まずテオフィリン (I) では I と混合し、少量の *p*-トルエンスルホン酸を加えて短時間加熱溶融し、冷却後メタノール性アンモニアで脱アセチルしたところ、7-β-D-リボフラノシルテオフィリン (IV) が好収量で得られた。なおこのさい、中間体である 2',3',5'-トリ-O-アセチル-7-β-D-リボフラノシルテオフィリン (III) は結晶性が悪いので単離しなかった。

矢戸⁶⁾は Helferich 法でフェニル・グリコシド類を合成する

さい、減圧下に反応を行なうときは、収率を高め、反応時間を短縮することができると報告している。

著者らも、同じように水流ポンプによる減圧で、遊離してくる酢酸を除きながら反応を進め、収量の増加することを認めた。

また、IV をアセチル化することにより新たに合成した III を酢酸にとかし、同じ触媒の存在で還流したところ、I および II が得られた。すなわち、この反応は可逆反応である。

つぎに、この反応を利用して 2-メチルチオアデニン (V)、2,8-ジクロルアデニン (VI) にそれぞれ I を縮合し、脱アセチルして 2-メチルチオアデノシン (9-β-D-リボフラノシル-2-メチルチオアデニン) (VII) ならびに 2,8-ジクロルアデノシン (9-β-D-リボフラノシル-2,8-ジクロルアデニン) (VIII) を得た。また、2,6,8-トリクロルプリン (IX) に I を縮合して、2',3',5'-トリ-O-アセチル-9-β-D-リボフラノシル-2,6,8-トリクロルプリン (X) を得た。

この VII はアデノシン⁷⁾の、また VIII はアデノシンおよびグアノシンの合成上の中間体として重要な物質である。

反応条件については、表 1 に示したが、用いられるプリンによって、縮合反応のさいの溶融状態にかなりの相違が認められ、それぞれの最適条件は個々に検討する必要がある。しかし一般には触媒の量を増すにつれて、また反応温度を高くするにつれて、反応速度は増大するが、同時に I の分解も促進されるのが観察される。

なお、これらの反応を溶媒中に行なうことを考え、種々の溶剤を選び条件を変えて試みたが、収率その他の点で溶融による方法

7) J. Davoll, B. A. Lowy, *J. Am. Chem. Soc.* **74**, 1563 (1952).

8) 島立, 吉村, 佐藤, *日化* **70**, 208 (1957).

† 東京工業大学有機化学教室, 東京都目黒区大岡山

1) 前報 (第6報), 金沢, *日化* **81**, 1299 (1960).

2) B. Helferich, E. Schmitz-Hillebrecht, *Ber.* **66**, 378 (1933); **67**, 1667 (1934); **68**, 790 (1935).

3) E. Fischer, B. Helferich, *ibid.* **47**, 210 (1914); J. Davoll, B. Lythgoe, A. R. Todd, *J. Chem. Soc.* **1948**, 967; J. Davoll, B. A. Lowy, *J. Am. Chem. Soc.* **73**, 1650 (1951).

4) G. A. Howard, A. C. McLean, G. T. Newford, F. S. Spring, A. R. Todd, *J. Chem. Soc.* **1949**, 232.

5) G. W. Kenner, C. W. Taylor, A. R. Todd, *ibid.* **1949**, 1620.

6) 矢戸, *工化* **38**, 456 (1936).

表 1

プリン誘導体	(g)	糖 (I) (g)	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{H}$ (g)	反応温度 (浴温) (°C)	反応 時間 (min)	生成 物	収 量 (I 基準の収率) (g) (%)	比旋光度 $[\alpha]_D^{25}$	融 点 (°C)
テオフィリン(II)	2.0	3.2	0.05	130~140	15	IV	2.3 (74)	+29.0° (c 1.01, 水)	187
2-メチルチオ アデニン(V)	2.0	3.2	0.05	170~180	20	VII	0.8 (26)	-2.5° (c 0.30, 0.1N 塩酸)	225
2,8-ジクロル アデニン(VI)	2.2	3.2	0.05	130	10	VIII	0.1 (3)	-346° (c 0.02, 0.1N 塩酸)	232(分解)
2,6,8-トリクロル プリン(IX)	2.4	3.2	0.05	130~140	15	X ^{a)}	1.9 (40)	-3.9° (c 0.80, クロロホルム)	166~167

注 a) Xはトリアセチル誘導体である。

にはおよばず、結局溶媒をとくに利用する積極的理由を認めることはできなかった。

表1に示した生成物については、いずれも既知の方法^{9)7)~9)}で合成したものと混融試験、比旋光度の比較などを行なって確認した。

さて、Helferich法でフェニルグリコシドを合成する場合、糖のアセチル誘導体は α -体を用いても、 β -体を用いても、 α -および β -グリコシドの混合物を生成するが、塩化亜鉛を触媒とするときは主として α -グリコシドを、また

-トルエンスルホン酸では主として β -グリコシドを生成するのが一般とされている。

しかし、これらプリンとIの縮合反応では、生成物はいずれも β -リボシドで、その α -異性体と考えられるものは単離されていない。

以上の結果から、この合成法を、従来の糖のハロゲン誘導体を利用する方法と比較すれば、収率の点では、IVの場合はまさっているが、VII、Xでは同程度であり、VIIIではおとっている。しかし操作の簡易な点において、はなはだ有利であることはいうまでもない。

1 実験の部

1.1 7- β -D-リボフラノシルテオフィリン(IV)(表1参照)

テオフィリン(II) 2.0 g と 1,2,3,5-テトラ-O-アセチル- β -D-リボフラノース(I)¹⁰⁾ 3.2 g をナス型フラスコにとり、油浴で加熱する。120°~130°C(浴温)で溶融する。これに

-トルエンスルホン酸 0.05 g を加え、ガラス棒でかきまぜる。このとき酢酸臭が認められる。これを減圧濃縮の要領で水流ポンプにつないで減圧にし、油浴の温度を 130°~140°C とする。

この間、はげしくあわだち、次第に褐色に着色する。15 分反応して浴を去り、放冷する。これを無水メタノール約 50 cc にかす。別に、乾燥アンモニアを 0°C で飽和したメタノール約 50 cc を用意し、両液を一緒にして、氷冷して、1 夜放置する。

これを減圧下に濃縮してほとんど乾固し、残留物を水から再結晶する。得られた結晶(IV)は活性炭を用いてふたたび水から再結晶し乾燥する。白色針状結晶, mp 187°C, 収量 2.3 g (74%)。

分析値 N 17.88%

$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_6\text{N}_4$ としての計算値 N 17.94%

なお、この結晶は既知の化合物 IV⁹⁾ (mp 187°C) と混融試験を行なっても融点の降下は認められない。また、比旋光度も一致した。

1.2 2-メチルチオアデノシン(VII) 2,8-ジクロルアデノシン(VIII)ならびに 2',3',5'-トリ-O-アセチル-9- β -D-リボフラノシル-2,6,8-トリクロルプリン(X)

VIIおよびVIIIは表1に示した条件にしたがって、上記のIIの場合と同じようにして合成した。

いずれも既知のもの(VII⁹⁾ mp 225°C, VIII⁹⁾ mp 232°C(分解))と混融試験を行なっても融点の降下は認められない。比旋光度も一致した(表1参照)。

VII 分析値 N 22.18%

$\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_5\text{S}$ としての計算値 N 22.35%

VIII 分析値 N 20.93%

$\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{Cl}_2\text{N}_5$ としての計算値 N 20.84%

Xについては、表1に示した条件にしたがって加熱溶融したのち、放冷し、約 20 cc の無水メタノールにかき氷冷する。析出した結晶を吸引ろ別し、活性炭を用いてメタノールから再結晶し乾燥する。白色針状結晶。既知のもの⁹⁾ (mp 166°~167°C) と混融試験を行なっても融点の降下は認められない。比旋光度も一致した(表1参照)。

9) G. A. Howard, B. Lythgoe, A. R. Todd, *J. Chem. Soc.* 1947, 1052.

10) H. Zinner, *Ber.* 83, 153 (1950).

分析値 N 11.85%

 $C_{16}H_{15}O_7N_4Cl_3$ としての計算値 N 11.63%

なお、Xを常法にしたがって脱アセチルしたが、予想に反し単一物が得られなかった。

1.3 2',3',5'-トリ-O-アセチル-7-β-D-リボフラノシルテオフィリン (III)

Ⅳ 6.8 g を乾燥ピリジン 100 cc にとかし、室温で無水酢酸 9.5 cc を加え約 1 時間、ひきつき 45°~55°C で約 1 時間かきまぜる。これを氷水約 300 cc にそそぎ、クロロホルムで数回抽出する。抽出液は一緒にして水、5% 硫酸水溶液、5% 炭酸水素ナトリウム水溶液、水の順にそれぞれ数回ずつ洗い、塩化カルシウムで乾燥する。この溶液を減圧下に濃縮し、得られたシロップに少量のメタノールを加えて氷冷すれば、結晶が析出する。吸収口別し、活性炭を用いてメタノールから再結晶し、乾燥する。白色針状結晶。mp 110°C。収量 5.3 g (55%)。

分析値 C 49.21%, H 4.95%, N 13.05%

 $C_{18}H_{22}O_9N_4$ としての

計算値 C 49.30%, H 4.83%, N 12.78%

1.4 III の加酢酸分解

Ⅲ 4 g を *p*-トルエンスルホン酸 0.2 g とともに氷酢酸 40 cc

にとかし、45 分還流する。これを氷水約 200 cc にそそぎ、クロロホルムで数回抽出する。抽出液は一緒にして 2 回水洗し、洗液は抽出残液と一緒にする。

この水溶液は減圧下に濃縮して約 50 cc にし、水酸化ナトリウムを加えてアルカリ性にする。これに酢酸鉛 3.5 g を水にとかし加えると、テオフィリン (Ⅱ) の鉛塩が沈殿する。遠心分離して数回水洗し、約 20 cc の水に懸濁して硫化水素ガスを通ずる。この溶液を数分間煮沸してから活性炭を加えて吸引口過し、ろ液を減圧下にほとんど乾固するまで濃縮する。残留物 (Ⅰ) は活性炭を用いてエタノールから再結晶し、乾燥する。mp 262°C。収量 1.1 g (6.7%)。既知のものと混融試験を行なって確認した。

また、クロロホルム抽出液については、5% 炭酸水素ナトリウム水溶液、水の順にそれぞれ数回ずつ洗い、塩化カルシウムで乾燥する。これを減圧下に濃縮して得られるシロップ状の物質に、少量のメタノールを加えてとかし、ふたたび減圧下に濃縮すれば、白い結晶 I が析出する。メタノールから再結晶する。mp 82°C。収量 2.1 g (72%)。既知¹⁰⁾のものと混融試験を行なって確認した。

最後に分析を担当された近藤朝士氏に御礼申し上げます。

(1958 年 9 月、日本化学会東北地方大会講演)

(第 8 報)¹⁾ プリンリボヌクレオシド類の新合成法 (その 2)

前報¹⁾では 1,2,3,5-テトラ-O-アセチル-β-D-リボフラノース (Ⅰ) とプリンを、*p*-トルエンスルホン酸の存在で縮合する方法について述べたが、メチル-2,3,5-トリ-O-アセチル-β-D-リボフラノシド (Ⅱ) を新たに合成し、同じ方法でプリンに対する縮合を試みたが、反応性に乏しく、到底目的に適さないことがわかった。しかしⅡを、無水酢酸を含む酢酸あるいは無水酢酸中で、同じ触媒の存在で処理することにより、その O-メチル基が O-アセチル基に置換してⅠとなることを見いだした。そして、この反応を利用するテオフィリン・リボシドの合成を行なった。

つぎに、1-O-アセチル-2,3,5-トリ-O-ベンゾイル-β-D-リボフラノース (Ⅵ)、1,2,3,5-テトラ-O-ベンゾイル-β-D-リボフラノース (Ⅶ) のテオフィリンに対する縮合を試み、Ⅰ、Ⅱとともにその反応性を比較検討した。その結果、これら糖誘導体のこの縮合法における反応性は、大体糖の還元基の炭素原子につく基によって支配され、その順序は、アセトキシ>ベンゾキシ>メトキシであることがわかった。

プリンリボヌクレオシド類の新らしい合成法として、前報¹⁾では、プリンと 1,2,3,5-テトラ-O-アセチル-β-D-リボフラノース (Ⅰ) を *p*-トルエンスルホン酸の存在で溶融し、直接縮合する方法について述べた。

このⅠについては、二つの合成法^{2,3)}が知られているが、いずれも収率が低い。そこで D-リボフラノース誘導体のうち、できるだけ容易に、しかも収率よく得られるものを用い、同じ方法でプリンとの縮合を行なう目的で、メチル-2,3,5-トリ-O-アセチル-β-D-リボフラノシド (Ⅱ) を合成した。これは、メチル-β-D-リボフラノシド⁴⁾ (Ⅲ) をそのままアセチル化することにより好収量で得られたが、プリンに対する反応性はきわめて悪く、このままではとうていヌクレオシド合成の目的には用いられないことがわかったので、つぎに述べる方法で、プリンとの縮合を試みた。

すなわち、Hudson ら⁵⁾はかつて、メチル・グリコシドを Hel-

ferich 法⁶⁾を応用してフェニル・グリコシドに変える特殊な反応例について報告している。それは、メチル-2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-α-D-グルコピラノースをフェノール、少量の無水酢酸および塩化亜鉛とともに酢酸にとかし、減圧下に数時間加熱することにより、好収量でフェニルグリコシドを得、メトキシ基を直接フェノキシ基に置換したと述べている。

著者らはこれにならい、*p*-トルエンスルホン酸を触媒とし、Ⅱ、テオフィリン (Ⅳ) とともに少量の無水酢酸を含む酢酸にとかし、減圧下で加熱し、酢酸および無水酢酸がほとんど除かれるまで反応し、ついで常法により脱アセチルして、7-β-D-リボフラノシルテオフィリン (Ⅴ) を 25% 前後の収率で得た。

また、この反応は酢酸を用いず、無水酢酸だけで行なっても、ほぼ同程度の結果が得られた。一般にアルドースのグリコシドのアセチル誘導体に、酸触媒の存在で、無水酢酸・酢酸の混液または無水酢酸を作用させるときは、そのアグリコンがアセチル基に置換されることが知られている⁷⁾。このⅤの生成の経路について

1) 前報 (第 7 報)、佐藤、島立、石戸、日化 81, 1440 (1960)。

2) G. A. Howard, B. Lythgoe, A. R. Todd, *J. Chem. Soc.* 1947, 1052.

3) H. Zinner, *Ber.* 83, 153 (1950)。

4) 金沢、大谷、佐藤、日化 80, 517 (1959)。

5) E. M. Montgomery, N. K. Richtmyer, C. S. Hudson, *J. Am. Chem. Soc.* 64, 690 (1942)。

6) B. Helferich, et al., *Ber.* 66, 378 (1933); 67, 1667 (1934); 68, 790 (1935); *Ann.* 514, 228 (1934)。

7) R. M. Hann, C. S. Hudson, *J. Am. Chem. Soc.* 56, 2465 (1934); K. Freudenberg, K. Soff, *Ber.* 70, 264 (1937)。

4. Organic Chemistry and Biological Chemistry

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1424~1431 (1960)

Stereochemistry of α -Amino Alcohols and Related Compounds. V~VI.

by Toshiyasu ISHIMARU

V. Inversion of 1, 2-Diphenyl-2-acylamino-1-ethanols (*N*-acyl DAE) Through Oxazoline. Part 1. Reaction of *N*-acetyl DAE and *N*-formyl DAE with Thionyl Chloride (pp. 1424~1428)

Inversion of *N*-acyl DAE through oxazoline was studied. *N*-Acetyl DAE of both *N*-CH₃ and nor series underwent inversion (*erythro* $\rightleftharpoons$ *threo*) in good yield, when they were reacted with thionyl chloride followed by hydrolysis. By analogous treatment *erythro* *N*-formyl DAE of *N*-CH₃ series underwent ca. 50% inversion but *threo* of nor series failed. Mechanism of cyclization and correlation between cyclization process and steric hindrance were discussed.

VI. Intramolecular Cyclization of DAE. Part 1. Urea Fusion (pp. 1428~1431)

DAE and their ureids were fused with urea. *Erythro* and *threo* DAE of nor series and *threo* DAE of *N*-CH₃ series were cyclized to give oxazolidones, maintaining their configuration. On heating with alkali oxazolidones gave amines of the same series from which they were synthesized. *Erythro* DAE of *N*-CH₃ series was cyclized to imidazolidone with a loss of hydroxyl group joined to C₁ as in *N*→O acetyl migration. The difference of reaction between *erythro* (nor) and *erythro* (*N*-CH₃) and the configurations of the products were discussed.

Department of Pharmacology, Faculty Medicine, Kumamoto University: Kumamoto-shi, Kumamoto, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1431~1433 (1960)

Studies on Compounds Related to Indole. IV. The Reaction of Phosphorous Pentachloride with Ethyl Indole-2-carboxylate

by Masao KUNORI

The reaction of ethyl 3-chloroindole-2-carboxylate(I) with phosphorous pentachloride(II) was studied. (I) reacted readily with bromine to give ethyl 3-chloro-5-bromoindole-2-carboxylate (m.p. 190~192°C). When (I) was treated with (II) in the presence of usual organic solvent (for example, chloroform), formation of dichloro-derivative was not observed, and (I) was recovered almost quantitatively. (I) gave, however, ethyl 3,6-dichloroindole-2-carboxylate (III, m. p. 196~197°C) by heating with (II) without any solvent. When (III) was hydrolysed, subjected to oxidative destruction and then deaminated by diazo-reaction, *p*-chlorobenzoic acid was obtained, and thus the structure of the dichloro-derivative (III) was confirmed.

Department of Chemistry, College of Education, Tohoku University: Sendai-shi, Miyagi, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1434~1439 (1960)

Studies on 5-Imidazolone. I~II.

by Osamu SHIMOMURA* and Shoji EGUCHI

I. Syntheses and Ultra-violet Absorption Spectra of 1, 2, 4-Trisubstituted-5-imidazolones (pp. 1434~1438)

2-Methyl-4-benzylidene-5-oxazolone(I) was converted into α -acetyl-amino-cinnamides by boiling with amines in alcohol, and the amides were converted into corresponding 1-substituted-2-methyl-4-benzylidene-5-imidazolones by heating at 170~220°C under reduced pressure. Substituents at the 1 position of imidazolones are Me (m.p. 109°C), Et(hydrochloride, m.p. 155°C: decomp.), Bu(m.p. 72°C), phenethyl(m.p. 116°C) and β -indolylethyl (m.p. 186~187°C). 1-Phenethyl-2-(γ -phthalylamino) propyl-4-benzylidene-5-imidazolone(m.p. 137°C) was obtained from corresponding oxazolone and phenethylamine through the amide, but this method failed with 1,2-disubstituted-4-isopropylidene-5-imidazolone. 1-Phenyl derivative(m.p. 143~145°C) was prepared by the same process from I and aniline through the anilide by heating it at 205°C under reduced pressure, while I and aniline reacted directly even at 130~140°C under normal pressure and gave good yield. Thus, several 1-(*p*-substituted phenyl) derivatives were easily prepared by direct reaction of I and *p*-substituted anilines at relatively low temperature. *p*-Substituents in those imidazolones and their melting points are: Me(132°C), N(Me)₂(200~201°C), OMe(160°C), COMe (169~171°C), COOEt(197~198°C) and NO₂(199~204°C). U.V. absorption spectra of those trisubstituted imidazolones showed characteristic absorption. $\lambda_{\text{max}}^{\text{MeOH}}$ ca. 235 m μ , ca. 290 m μ and ca. 350 m μ (log ϵ ca. 4.3).

II. Catalytic Reduction of 5-Imidazolones and *pKa'* of the Products (pp. 1438~1439)

Ten 4-benzylidene-5-imidazolones and five 4-isopropylidene-5-imidazolones were hydrogenated in MeOH with Pd-black catalyst or Adams' PtO₂ catalyst. When Pd-black was used, original imidazolones did not absorb more than 1 mol. H₂, and 1-phenyl-2-methyl-4-benzylidene-5-imidazolone alone gave a crystalline product (m.p. 82~84°C). When Adams' PtO₂ was used, hydrogenation products by 1 mol. H₂ were not obtained in crystalline state, while the products by 2 mol. H₂ gave crystalline 5-imidazolidone hydrochlorides easily. *pKa*'s of the hydrogenation products were larger than those of original imidazolones, and most of 15 imidazolidones prepared in this study showed *pKa*'s between 3 and 5.

* Faculty of Pharmacy, Nagasaki University; Nagasaki-shi, Nagasaki, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1440~1444 (1960)

Studies on Nucleosides and Nucleotides. VII~VIII.

by Tetsuo SATO, Tosisada SIMADATE and Yoshiharu ISHIDO

VII. A New Method for Synthesis of Purine-Ribonucleosides. Part. I (pp. 1440~1442)

7- β -D-Ribofuranosyltheophylline was prepared in good yield by melting a mixture of theophylline(I) and 1,2,3,5-tetra-*O*-acetyl- β -D-ribofuranose(II) in the presence of *p*-toluenesulfonic acid as a catalyst for about 15 minutes in vacuo and followed by deacetylation with methanolic ammonia. Then, 2',3',5'-tri-*O*-acetyl-7- β -D-ribofuranosyltheophylline was shown to be convertible to I and II by

refluxing in glacial acetic acid containing the same catalyst. 2-Methylthioadenosine, 2,8-dichloroadenosine and 2',3',5'-tri-*O*-acetyl-9- β -D-ribofuranosyl-2,6,8-trichloropurine were also prepared by the same method, which is analogous to Helferich's method for the synthesis of *O*-phenyl- α and β -glycosides, but the nucleosides obtained had only β -form.

VIII. A New Method for Synthesis of Purine-Ribonucleosides. Part. 2 (pp. 1442~1444)

In our previous report, the method for the synthesis of purine nucleosides by melting a mixture of 1,2,3,5-tetra-*O*-acetyl- β -D-ribofuranose(I) and purines in the presence of *p*-toluenesulfonic acid was described. In the present work, methyl-2,3,5-tri-*O*-acetyl- β -D-ribofuranoside (II) was prepared and reacted with theophylline by the same method, but the yield was very low. By heating (II) and theophylline in acetic acid containing acetic anhydride or in acetic anhydride with *p*-toluene sulfonic acid in vacuo, theophylline riboside was obtained in a better yield. Consequently it was found that, (I) can be prepared by treating (II) with the same catalyst in acetic acid containing acetic anhydride or in acetic anhydride. Then, (I), (II), 1-*O*-acetyl-2,3,5-tri-*O*-benzoyl- β -D-ribofuranose and 1,2,3,5-tetra-*O*-benzoyl- β -D-ribofuranose were condensed respectively with theophylline under the same condition and it was deduced that the reactivity was influenced by the nature of the group attached to the first carbon atom of D-ribose, the order of the reactivity being acetoxy > benzoxy > methoxy.

Laboratory of Organic Chemistry, Tokyo Institute of Technology; Meguro-ku, Tokyo, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1444~1450 (1960)

Studies on the Chemical Components in Matatabi. IV~VI.

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Fujio MURAI, Akio SUZUI, Yasuo BUTSUGAN and Yutaka TERASHIMA

IV. The Conversion of Matatabilactone into Actinidine (pp. 1444~1445)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO and Fujio MURAI

Matatabilactone was correlated to actinidine by converting nepetalinic acid obtained from the former into the latter.

V. The Synthesis and the Optical Resolution of DL-Actinidine (pp. 1445~1447)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Akio SUZUI and Yasuo BUTSUGAN

6,7-Dihydro-4,7-dimethyl-5(H)-2-pyridine (DL-actinidine) (I) was synthesized from ethyl α -(3-methyl-2-oxocyclopentyl) propionate by five steps. (I) was resolved into optically active forms through the mono-salt of dibenzoyltritaric acid. The levorotatory compound was proved to be identical with natural actinidine. 6,7-Dihydro-4-methyl-5(H)-2-pyridine (7-noractinidine) was also prepared.

VI. The Stereochemical Configuration of Actinidine (pp. 1447~1450)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Fujio MURAI, Yasuo BUTSUGAN and Yutaka TERASHIMA

The absolute configuration of natural actinidine was elucidated by preparing (+)-actinidine from (+)-pulegon, the asymmetric center of which has already been shown to belong to D-series. Oxidation of the methyl group binding to the double bond in methyl pulegenate (I) with selenium dioxide under various conditions was unsuccessful. Therefore the following course of synthesis was pursued. (I) was oxidized to methyl 2-methyl-5-oxo-cyclopentane carboxylate (II) and the necessary C₃-moiety was re-introduced into (II) by the condensation of ethyl cyanoacetate and the successive methylation. The structure of the ethyl ester corresponding to (II) was confirmed by preparing it via another route.

Institute of Polytechnics, Osaka City University; Kita-ku, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1450~1452 (1960)

Chlorination with Sulfuryl Chloride. I. Chlorination of Aromatic Aldehydes

by Mannosuke ARAI

The reactions between sulfuryl chloride and aromatic aldehydes in the presence of a small quantity of benzoyl peroxide were studied. Various aromatic aldehydes, i. e. benzaldehyde, *m*-nitro-, *p*-nitro-, *o*-chloro- and *p*-chlorobenzaldehyde and anisaldehyde were respectively converted to corresponding acyl chlorides, but no nuclear substitution product was obtained. *o*-Nitrobenzaldehyde gave no reaction product. From *p*-hydroxybenzaldehyde and vanillin no acylchloride but nuclear substitution products were obtained. The reactions were carried out either without solvent or in carbon tetrachloride and benzene, and the influence of the solvent upon the reaction was proved. Aromatic aldehydes reacted generally with carbon tetrachloride in the presence of benzoyl peroxide to yield acyl chlorides.

Kawauchi College, Tohoku University; Sendai-shi, Miyagi, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1453~1459 (1960)

Studies on Triphosponitrilic Chloride and its Derivatives. VI~VII.

by Masaaki YOKOYAMA

VI. Reaction of Amines with Triphosponitrilic Chloride (pp. 145~1457)

The reactions of triphosponitrilic chloride (P₃N₃Cl₆) with amines are described. The reactions of P₃N₃Cl₆ with primary and secondary amines give *N*-substituted triphosponitrilic amides in the presence of excess of amines. Amine hydrochlorides are obtained as byproducts in the reaction. *N*-substituted triphosponitrilic amides derived from aromatic and heterocyclic amines can be obtained in a crystalline form which are insoluble in water and in organic solvents such as alcohol, hydrocarbon, etc. but are soluble in dioxane or tetrahydrofuran. The products derived from aliphatic amines are very viscous liquids. The reactions of P₃N₃Cl₆ with tertiary amines give salts similar to quaternary ammo-