溶液を氷にそそぎ、以下、前記の 1.3.1 の場合と同じように、クロロホルム抽出をし、メタノールで結晶化させる。mp 82°C。収量 3.6 g (45%)。なお、既知³⁾のものと混融試験を行なって確認した。

1.4 II, I, 1-O-アセチル-2,3,5-トリ-O-ベンゾイル-β-D-リボフラノース (VI) ならびに 1,2,3,5-テトラ-O-ベンゾイル-β-D-リボフラノース (VII) のテオフィリンに対する縮合反応

II 2.90 g (0.01 mol) とテオフィリン 2.00 g (0.011 mol) をナス型フラスコにとり 145°C の油浴で加熱し溶融する。これにカトルエンスルホン酸 0.05 g を加え、ガラス棒で手ばやくかきまぜ、フラスコにはアウフザットを付け、水流ポンプにつないで減圧にし、浴温を一定にたもち加熱する。

15 分反応して浴を去り、放冷し、無水メタノール約 50 cc にとかし、未反応のテオフィリンを吸引口別する。ロ液には 0.1N ナトリウムメチラート・メタノール溶液 50 cc を加えて、30 分

還流する。これを希硫酸で中和し、減圧下に濃縮する。残留物を水から再結晶すれば 7-β-D-リボフラノシルテオフィリンの結晶が析出する。これを活性炭を用いて再結晶し乾燥する。mp 187°C。収量 0.15 g (5%) (表 1 参照)。

また、I 3.18 g, VI 5.04 g ならびに VII 5.66 g (いずれも 0.01 mol) に対し、それぞれテオフィリン、カトルエンスルホン酸を上記の II の場合と同量用い、同じ条件で縮合反応を行なった。

テオフィリンリボシドの収量は、I では 2.17 g (70%)、VI では 1.92 g (62%)、VII では 0.47 g (15%) であった。なお、VI および VII の場合、脱ベンゾイルしたさい生成する安息香酸メチルエステルがテオフィリンリボシドの結晶化を妨げるので、再結晶する前に水を加えて濃縮する操作をくり返して除去した。

最後に分析を担当された近藤朝士氏に御礼申し上げます。

(1959 年 4 月、日本化学会第 12 年会講演)

マ タ タ ビ 成 分 の 化 学 的 研 究 (第 4~6 報)

(昭和 35 年 2 月 29 日 受理)

目 武雄†・藤野 明†・村井不二男†・鈴井明男†・仏願 保男†・寺島 豊†

(第 4 報)¹⁾ マタタビラクトンからアクチニジンの誘導^{*1}

(目 武雄・藤野 明・村井不二男)

マタタビラクトンの酸化によって得られたネペタリン酸からアクチニジンを誘導し、両者を関係づけた。

第 2 報²⁾ および前報¹⁾ においてそれぞれマタタビラクトン (I) とアクチニジン (II) の化学構造についてのべたが、両者はともにおなじ炭素骨格をもち、その相互の関連にふかい興味のもたれるところから I から II への誘導反応を試みた。

すなわち、I を無水クロム酸-ピリジン-錯化合物によって酸化してえられる油状のネペタリン酸 (III)¹⁾ を酸無水物、酸イミド (IV) を経てジクロルピリジン誘導体 (V) とし、このものをパラジウム-活性炭触媒下に接触還元を行なったところ、反応生成物中ピリジン塩基部として少量の油 (VI) が得られた。VI は II とおなじ赤外線吸収スペクトルを示し、ピクラートは mp 141°C ~ 142°C で、I のそれと混融試験、赤外線吸収スペクトルの比較から同定された。

この場合 III としては油状のジカルボン酸が用いられたため、また誘導された II が少量で旋光度の測定が不可能であったため、その立体化学にまで言及できないが、第 3 報において推定した II の構造の正しいことが証明されたことになる。

実 験

1 ネペタリン酸イミド (IV)

油状ネペタリン酸 (III) 760 mg に塩化アセチル 10 cc を加えて水浴上に 1.5 時間加熱還流させる。反応後過剰の塩化アセチ

† 大阪市立大学理学部、大阪市北区

† 食品化学研究所、大阪市北区

*1 速報, T. Sakan, et al., Bull. Chem. Soc. Japan 32, 315 (1959).

1) 前報 (第 3 報), 藤野, 日化 81, 1327 (1960).

2) 村井, 日化 81, 1324 (1960).

ル、酢酸を減圧下に留去すると、ネペタリン酸無水物が得られる。このものはⅢに無水酢酸を作用させてえた無水物¹⁾と同一（赤外線吸収スペクトル）である。無水物を浴温 100°C に加熱し、乾燥アンモニアを通じながら 130°C に 1.5 時間たもつ。さらに 200°C に 30 分間加熱し、冷却後反応生成物を減圧下に蒸留する。bp₄ 100~130°C (浴温), 575 mg, 留出物はただちに結晶化する。mp 75~77°C, 吸湿性つよく、空气中で短時間に潮解する。ふたたび蒸留し、450 mg のⅣが得られた。

2 ジクロルピリジン誘導体 (V)

450 mg のⅣに五塩化リン 1.55 g を加え、室温で塩化水素ガスの発生が止むまで放置する。浴温を 50°C に上昇させ、この温度でガスの放出をみなくなるまで反応させ、さらに 100°C で 1 時間加熱する。冷却後反応混合物に氷水を加えてエーテルで十分抽出する。エーテル溶液を水洗後、無水硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒を留去すると褐色の油 430 mg が得られた。このものの赤外線吸収スペクトルは 6.41 μ (液態) に強い吸収帯がみとめられるが、未反応酸イミド基による吸収帯も存在するため、この油に同一の反応操作をさらに 2 回行なう。このようにしてえた 365 mg

の粗油にアルミナクロマトグラフを行なって不純物を除く、すなわちメタノール-酢酸処理の中性アルミナ 25 g に試料の無水エーテル溶液を用い、展開もエーテルで行なった。この操作で分離された淡黄色の油 310 mg については 6 μ 域における酸イミド吸収帯は消失している。

3 Vの接触還元, アクチニジン

V 310 mg を 10 cc のメタノールに溶かし、塩化パラジウム 60 mg, 活性炭 600 mg, 2.5N 塩酸 3 cc を加え、6 時間でほぼ当量の水素を吸収させる。触媒をろ過後、ロ液から減圧下にメタノールを除去する。触媒への吸着分は希塩酸で十分抽出し、ロ液の残分と合わせてエーテルで未反応の V を抽出除去する。水層を 5% 水酸化ナトリウム水溶液でアルカリ性とし、エーテル抽出する。エーテル溶液を水酸化ナトリウム粒で乾燥後溶媒を留去すると、ほとんど無色の、ピリジン臭をもつ油が得られた。赤外線吸収スペクトルは天然のアクチニジンのそれと一致した。ピクラートは mp 141~142°C, I のピクラート mp 143°C と混融しても融点降下を示さず、かつこれらの赤外線吸収スペクトルも一致している。

(第5報) DL-アクチニジンの合成と光学分割^{*1}

(目 武雄・藤野 明・鈴井 明男・仏願 保男)

α-(3-メチル-2-オキソ-シクロペンチル)-プロピオン酸エチル (Ⅰ) を出発物質として 6,7-ジヒドロ-4,7-ジメチル-5(H)-2-ピリンジン (DL-アクチニジン) (I) を合成し、ジベンゾイル酒石酸モノ塩として光学分割を行ない、天然のアクチニジンと同一のものを得た。また 6,7-ジヒドロ-4-メチル-5(H)-2-ピリンジン (7-ノルアクチニジン) (Ⅱ) も合成した。

第3報²⁾で推定したアクチニジン (I) の化学構造をたしかめるためにその合成をこころみた。

すなわち、α-(3-メチル-2-オキソ-シクロペンチル)-プロピオン酸エチル (Ⅰ) からシアンヒドリン (Ⅱ) を得たのち、ピリジン-塩化チオニルで脱水すると、bp₂ 106~120°C の不飽和エステルニトリル (Ⅳ) が得られる。このものの二重結合の位置が可能性のある 2 種のうちのいずれであるかはあきらかではない。アルカリもしくはアルコキシド溶液と処理することによって両異性体の分離をこころみたが成功しなかった。Ⅳ を水酸化ナトリウム水溶液もしくは濃塩酸とともに加熱し、pH 3~4 において沈殿する部分を精製すると mp 167~168°C の V が得られた。このものは飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、6N 塩酸に可溶であり、空气中に放置すると徐々に黒変する。

V をオキシ塩化リンと処理して得られる生成物をアルミナクロマトグラフで精製すると、対応する二塩化物 (Ⅶ) が油状に得られる。6N 塩酸に不溶である。Ⅶ を塩化パラジウム触媒下に接触還元すると、bp₁₂ 100~106°C の 6,7-ジヒドロ-4,7-ジメチル-5(H)-2-ピリンジン (I) が得られた。ピクラート: mp 142~143°C。I の赤外線吸収スペクトルはアクチニジンのそれと一致する。I をジベンゾイル酒石酸モノ塩²⁾として、無水アルコールからの反復再結晶によって難溶性塩を分別し、このものから遊離塩基を還元すると、天然アクチニジンと比旋光度をほぼおなじくする塩基 (ピクラート: mp 146~147°C) が得られ、同定された。I はネコに対する生理反応も陽性をしめすが、以上の実験によりアクチニジンの化学構造は証明されたと考える。

また構造上近縁関係にある 7-ノルアクチニジン (6,7-ジヒドロ-4-メチル-5(H)-2-ピリンジン) の合成も行なった。この場合には 4-位のメチル基をニトリル基の Stephen 還元および Wolff-Kishner 還元によって生成させる方法を検討した。

*1 速報, T. Sakan, et al., Bull. Chem. Soc. Japan 32, 1157 (1959).

1) 藤野, 日化 81, 1327 (1960).

2) W. von Doering, V. Z. Pasternak, J. Am. Chem. Soc. 72, 143 (1950).

refluxing in glacial acetic acid containing the same catalyst. 2-Methylthioadenosine, 2,8-dichloroadenosine and 2',3',5'-tri-*O*-acetyl-9- β -D-ribofuranosyl-2,6,8-trichloropurine were also prepared by the same method, which is analogous to Helferich's method for the synthesis of *O*-phenyl- α and β -glycosides, but the nucleosides obtained had only β -form.

VIII. A New Method for Synthesis of Purine-Ribonucleosides. Part. 2 (pp. 1442~1444)

In our previous report, the method for the synthesis of purine nucleosides by melting a mixture of 1,2,3,5-tetra-*O*-acetyl- β -D-ribofuranose(I) and purines in the presence of *p*-toluenesulfonic acid was described. In the present work, methyl-2,3,5-tri-*O*-acetyl- β -D-ribofuranoside (II) was prepared and reacted with theophylline by the same method, but the yield was very low. By heating (II) and theophylline in acetic acid containing acetic anhydride or in acetic anhydride with *p*-toluene sulfonic acid in vacuo, theophylline riboside was obtained in a better yield. Consequently it was found that, (I) can be prepared by treating (II) with the same catalyst in acetic acid containing acetic anhydride or in acetic anhydride. Then, (I), (II), 1-*O*-acetyl-2,3,5-tri-*O*-benzoyl- β -D-ribofuranose and 1,2,3,5-tetra-*O*-benzoyl- β -D-ribofuranose were condensed respectively with theophylline under the same condition and it was deduced that the reactivity was influenced by the nature of the group attached to the first carbon atom of D-ribose, the order of the reactivity being acetoxy > benzoxy > methoxy.

Laboratory of Organic Chemistry, Tokyo Institute of Technology; Meguro-ku, Tokyo, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1444~1450 (1960)

Studies on the Chemical Components in Matatabi. IV~VI.

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Fujio MURAI, Akio SUZUI, Yasuo BUTSUGAN and Yutaka TERASHIMA

IV. The Conversion of Matatabilactone into Actinidine (pp. 1444~1445)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO and Fujio MURAI

Matatabilactone was correlated to actinidine by converting nepetalinic acid obtained from the former into the latter.

V. The Synthesis and the Optical Resolution of DL-Actinidine (pp. 1445~1447)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Akio SUZUI and Yasuo BUTSUGAN

6,7-Dihydro-4,7-dimethyl-5(H)-2-pyridine (DL-actinidine) (I) was synthesized from ethyl α -(3-methyl-2-oxocyclopentyl) propionate by five steps. (I) was resolved into optically active forms through the mono-salt of dibenzoyltritaric acid. The levorotatory compound was proved to be identical with natural actinidine. 6,7-Dihydro-4-methyl-5(H)-2-pyridine (7-noractinidine) was also prepared.

VI. The Stereochemical Configuration of Actinidine (pp. 1447~1450)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Fujio MURAI, Yasuo BUTSUGAN and Yutaka TERASHIMA

The absolute configuration of natural actinidine was elucidated by preparing (+)-actinidine from (+)-pulegon, the asymmetric center of which has already been shown to belong to D-series. Oxidation of the methyl group binding to the double bond in methyl pulegenate (I) with selenium dioxide under various conditions was unsuccessful. Therefore the following course of synthesis was pursued. (I) was oxidized to methyl 2-methyl-5-oxo-cyclopentane carboxylate (II) and the necessary C₃-moiety was re-introduced into (II) by the condensation of ethyl cyanoacetate and the successive methylation. The structure of the ethyl ester corresponding to (II) was confirmed by preparing it via another route.

Institute of Polytechnics, Osaka City University; Kita-ku, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1450~1452 (1960)

Chlorination with Sulfuryl Chloride. I. Chlorination of Aromatic Aldehydes

by Mannosuke ARAI

The reactions between sulfuryl chloride and aromatic aldehydes in the presence of a small quantity of benzoyl peroxide were studied. Various aromatic aldehydes, i. e. benzaldehyde, *m*-nitro-, *p*-nitro-, *o*-chloro- and *p*-chlorobenzaldehyde and anisaldehyde were respectively converted to corresponding acyl chlorides, but no nuclear substitution product was obtained. *o*-Nitrobenzaldehyde gave no reaction product. From *p*-hydroxybenzaldehyde and vanillin no acylchloride but nuclear substitution products were obtained. The reactions were carried out either without solvent or in carbon tetrachloride and benzene, and the influence of the solvent upon the reaction was proved. Aromatic aldehydes reacted generally with carbon tetrachloride in the presence of benzoyl peroxide to yield acyl chlorides.

Kawauchi College, Tohoku University; Sendai-shi, Miyagi, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1453~1459 (1960)

Studies on Triphosponitrilic Chloride and its Derivatives. VI~VII.

by Masaaki YOKOYAMA

VI. Reaction of Amines with Triphosponitrilic Chloride (pp. 145~1457)

The reactions of triphosponitrilic chloride (P₃N₃Cl₆) with amines are described. The reactions of P₃N₃Cl₆ with primary and secondary amines give *N*-substituted triphosponitrilic amides in the presence of excess of amines. Amine hydrochlorides are obtained as byproducts in the reaction. *N*-substituted triphosponitrilic amides derived from aromatic and heterocyclic amines can be obtained in a crystalline form which are insoluble in water and in organic solvents such as alcohol, hydrocarbon, etc. but are soluble in dioxane or tetrahydrofuran. The products derived from aliphatic amines are very viscous liquids. The reactions of P₃N₃Cl₆ with tertiary amines give salts similar to quaternary ammo-