ロペンタノン, bp₂ 72°~74°C, 136 g をシアノ酢酸エチル 100 g とともに 28% アンモニア水 400 cc 中で室温で2日間かきまぜる。生成沈殿をろ集, 2N 塩酸でコンゴレッド紙酸性にしてろ過, アルコール, 水で洗う。78.5 g の mp 274°~300°C (分解) の結晶 (Ⅶ) のモノアンモニウム塩が得られた。

分析値 C 56.19%, H 5.96%, N 21.09%

C₉H₁₁O₂N₃ としての

計算値 C 55.95%, H 5.74%, N 21.75%

このものの一部をとり 6N 塩酸とともにしばらくあたためてろ過, アルコール-水 (1:1) で洗う。mp 272°~274°C の白色結晶 (Ⅶ) をうる。

分析値 C 61.32%, H 4.60%, N 15.82%

C₉H₈O₂N₂ としての

計算値 C 61.36%, H 4.58%, N 15.90%

7 1,3-ジクロロ-4-シアノ-6,7-ジヒドロ-5(Ⅱ)-2-ピリンジン

Ⅶ 9.2 g をオキシ塩化リン 20 cc と封管中 180°C で4時間加熱し, 冷却後水中に注ぎエーテル抽出, 抽出溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥, 溶媒を留去すると, mp 96°~97°C の結晶 8.7 g が得られた。アルコールから2回再結晶, mp 101°~102°C とする。赤外線吸収スペクトル: $\nu_{C=N}$ 4.47 μ , $\nu_{C=N}$ 6.43 μ (Nujol)。

分析値 C 50.75%, H 3.14%, N 13.28%

C₉H₆N₂Cl₂ としての

計算値 C 50.70%, H 2.80%, N 13.14%

8 4-シアノ-6,7-ジヒドロ-5(Ⅱ)-2-ピリンジン (Ⅸ)

上のジクロロ化合物 8 g, 酢酸カリウム 8 g, 塩化パラジウム 0.5 g, メタノール 100 cc をオートクレーブ中で 50 気圧の水素で還元, 3.5 時間で水素の吸収が止む。触媒をろ別, メタノールを留去, 炭酸水素ナトリウム水溶液でアルカリ性としエーテル抽

出, エーテル溶液を乾燥 (無水硫酸ナトリウム), 溶媒を留去して減圧蒸留する。bp₄ 101°~106°C の留分はただちに結晶化する。さらに減圧昇華で精製すると mp 45°~46°C (Ⅸ) を与える。赤外線吸収スペクトル: $\nu_{C=N}$ 4.47 μ , $\nu_{C=N}$ 6.33 μ (Nujol)。

分析値 C 74.44%, H 5.74%, N 19.34%

C₉H₈N₂ としての

計算値 C 74.97%, H 5.59%, N 19.43%

9 6,7-ジヒドロ-4-メチル-5(Ⅱ)-2-ピリンジン (DL-7-ノルアクチニジン) (Ⅹ)

無水塩化第一スズ 13.2 g を 50 cc の無水エーテルに加え, 乾燥塩化水素を通じ飽和させる。これにⅨ 2 g を加えさらに6時間塩化水素を通ずる。これに塩酸セミカルバジド 1.7 g の水 80 cc 溶液を加え2時間かきまぜる (100°C)。反応後冷却, 沈殿をろ集水洗すると mp 210°~212°C (分解) のⅩのセミカルバゾン-スズ錯化合物 4.2 g が得られた。このものを 80 cc の水に懸濁し加熱しながら硫化水素を通じ, 硫化スズを完全に沈殿させる。温時ろ過, mp 220°C (分解) の塩酸塩 2.2 g が得られる。アンモニア水で処理し, セミカルバゾンをアルコールから再結晶して mp 240°~241°C のものが得られた。

セミカルバゾン 1.9 g を, ナトリウム 0.9 g と無水アルコール 10 cc からつくったアルコラート中に加えて加熱蒸留する。浴温 180°C にたもつとアルコールは完全に留去される。ついで 220°~280°C の浴温で留去する分を集める。0.4 g。赤外線吸収スペクトル: $\nu_{C=N}$ 6.28 μ , δ_{CH_3} 7.3 μ (液態)。ピクラートを沈殿させアルコールから再結晶すると mp 186°~187°C をしめす。

分析値 C 49.84%, H 4.08%, N 15.75%

C₁₅H₁₄O₇N₄ としての

計算値 C 49.72%, H 3.87%, N 15.47%

(第6報) アクチニジンの立体配置*

(目 武雄・藤野 明・村井不二男・仏願 保男・寺島 豊)

(+)-アクチニジンを (+)-プレゴンから合成した。その結果天然の (-)-アクチニジンは L-系の立体配置をもつことがあきらかになった。

第3報¹⁾および前報にアクチニジン (Ⅰ) の構造と合成についてのべたが, その C₇ の不斉炭素原子に関する立体配置は未決定のままであった。第4報²⁾においてネペタリン酸を経てマタビラクトンからⅠが誘導されたが, Ⅰの C₇ に相当するネペタリン酸のその立体配置は, すでにネペタラクトン系についての McElvain らの

実験によりネペトン酸を経て (+)- α -メチルグルタミン酸に導くことによって L-系であることが証明されている³⁾。Ⅰとマタビラクトンとの構造上の近縁性からすれば, 前者の C₇-配置もおそらく L-系のそれであろうことは容易に推定されるところである。しかし前報においてはこの問題について結論が得られてい

なかったので, ネペタラクトン系との関連とは別個に, (+)-プレゴン (Ⅱ) から出発して, その不斉中心の立体配置をそのまま保有するアクチニジンを合成しようとした。Ⅰの不斉中心の配置はすでに Freudenberg らによって D-系である (+)-メチルコハク酸に関連づけられている⁴⁾。したがって, もし天然の (-)-アクチニジンが L-系であるならば, この合成によって得られる D-アクチニジンは (+)-旋光性を示すはずである。

さてⅠの二臭化物をアルカリで処理するとプレゲン酸 (Ⅲ) を生ずる⁵⁾が, この反応では立体配置が保持されており, しかも生

成物の炭素骨格はⅠとおなじである。そこで著者らはⅢを用いて合成を行なおうとしたが, それについてつぎのような考慮をはらった。

*1 速報, T. Sakan, et al., *Bull. Chem. Soc. Japan* 33, 712 (1960).

1) 藤野, 日化 81, 1327 (1960).

2) 目, 藤野, 村井, 日化 81, 1444 (1960).

3) S. M. McElvain, E. J. Eisenbraun, *J. Am. Chem. Soc.* 77, 1599 (1955).

4) K. Freudenberg, W. Hohmann, *Ann.* 584, 54 (1953).

5) H. Rupe, K. Schäfer, *Helv. Chim. Acta* 11, 466 (1928).

すなわちⅢの平面構造はⅡの二臭化物の転位生成機構からしてもほとんど確実であるとはいへ、合成による証明は現在までになされていない。したがってアクチニジンとの関連をつけるにさき立ってⅢの構造を確認しておく必要がある。そこでやや間接的ではあるが、プレゲン酸エチルのオゾン酸化物 (Va) を推定^{*2}) をまず合成しようとした。

Ruzicka ら⁶⁾の報告にしたがってジケトエステル (V) を合成し、Vの半ジチオケタール (VI) をラネーニッケルによって脱硫還元するとカルボニル基の還元をともなってオキシエステル (VII) が得られ、このもののクロム酸酸化で Va' に相当するケトエステルが生じた。Va と Va' とはそのセミカルバゾンの赤外線吸収スペクトルによって同定される。これによって Va の構造、したがってⅢの平面構造がいちおう証明されたわけである。

つぎにⅢのエステルの二酸化セレン酸化によるイソプロピリデン基への水酸基の導入をこころみだが、この方法は種々条件をかえても成功しなかったため、オゾン酸化物 (Vb) から炭素原子の3個部分の再合成をふくむつぎの経路をとることにした。

ケトエステル (Vb) にシアン酢酸エチルを縮合させて得られるⅧをメチル化してⅨを得、このものを酸で加水分解すると、ジオキシピリジン誘導体 (X), mp 172°~173°C とジカルボン酸 (油状) (XI) とをあたえる。

Ⅸの加水分解のかわり、にナトリウムアルコラートによって脱エトキシカルボニルを行なうと不飽和シアンエステル (XII) が得られる。このさい mp 95°C の結晶を少量副生する。このものにいちおうXIIの式を考えているが確認はしていない。

XII を塩酸で加水分解しても XI とともに X が得られた。これら X を得る2方法にとくに優劣はない。前報の合成でのべたのとおなじ方法で X に塩素化、脱塩素化 (接触還元) 反応を行なって得られるXIVはピクラートとして精製ののち還元すると、天然アクチニジンとおなじ赤外線吸収スペクトルを示し、 $[\alpha]_D^{25} +16.1^\circ$ (ク

ロロホルム) である。これはあきらかに天然品の旋光性と逆符号であり^{*3}, (−)-アクチニジンはしたがって L-系であることが結論される。

実 験

1 プレゲン酸 (III) メチルのオゾン分解 (IVb)

(+)−プレゴンから合成したプレゲン酸メチル 5g の四塩化炭素 50cc 溶液に寒剤冷却下にオゾン を 15 時間通じ、溶媒を減圧下に留去後水 40 cc を加えて加温下にオゾニドを分解する。冷後エーテル抽出しエーテル抽出し、エーテル溶液からさらに氷冷した 10% 水酸化ナトリウム溶液で生成物を抽出する。アルカリ溶液を 10% 酢酸で酸性としエーテル抽出、抽出液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥後エーテルを留去すると粗油 3.8g が得られる。減圧蒸留にふし bp₁₂ 90°~92°C の Vb 3.4g が得られる。塩化鉄反応は紫色を呈する。

分析値 C 61.29%, H 7.91%

C₉H₁₂O₃ としての計算値 C 61.52%, H 7.75%

Vb のセミカルバゾン, mp 176°~177°C。

2 プレゲン酸エチルから (IVa)

プレゲン酸エチルから 1 とおなじような方法で Va, bp₁₀ 95°~96°C をうる。

分析値 C 63.31%, H 8.35%

C₉H₁₄O₃ としての計算値 C 63.51%, H 8.29%

Va のセミカルバゾン, mp 140°~141°C。

分析値 C 52.92%, H 7.75%, N 18.39%

C₁₀H₁₇O₃N₃ としての

計算値 C 52.85%, H 7.54%, N 18.39%

3 3-エトキシカルボニル-4-メチル-シクロペンタン-1,2-ジオン-1-ジチオケタール (VI)

3-エトキシカルボニル-4-メチル-シクロペンタン-1,2-ジオン, 1g とエタンジチオール 0.75g をベンゼン (無水) 30 cc にとかし、無水塩化亜鉛 0.9g を加えて、氷冷下にかきまぜながら乾燥塩化水素をゆるやかに 30 分間通ずる。室温でさらに 2 時間かきまぜたのち反応溶液を氷水で分解する。ベンゼン層をわかし、さらに 2 回ベンゼン抽出し、ベンゼン溶液を水洗乾燥 (無水硫酸ナトリウム) 後、ベンゼンおよび未反応のエタンジチオールを減圧下に除くと粗結晶 1g が得られる。このものをエーテル溶液とし、冷 10% 水酸化ナトリウム水溶液と振り、アルカリに溶ける部分を希硫酸で酸性とし 1 夜放置すると無色の針状結晶 (VII) が

*2 Va を酸分解すると β-メチルアジピン酸が得られることもひとつの根拠である。

6) H. Standinger, L. Ruzicka, *Helv. Chim. Acta* 7, 381 (1924).

*3 $[\alpha]_D$ の値からすると合成 D-体は天然 L-体よりも純粋である。天然 (−)-アクチニジンのピクラートがやや低い融点値を示しているのも微量の不純物の混在によるものであろう。

析出する。希メタノールから再結晶すると mp 63°C となる。塩化鉄反応は淡橙赤色でしだいに紫色となる。

分析値 C 50.53%, H 6.23%, N 24.59%
C₁₁H₁₆O₃S₂ としての

計算値 C 50.77%, H 6.20%, N 24.62%

4 2-オキシ-5-メチル-シクロペンタンカルボン酸エチル(VII)

ジチオケタール (VI) 2.9 g を無水エタノール 100 cc に溶かし、ラネーニッケル 4.5 g とともに水浴上 6 時間加熱還流する。冷却後反応液をロ別、残分をさらに 8 時間おなじ溶媒で連続抽出する。アルコールを留去して得られる油状物をエーテル溶液とし、3 とおなじアルカリ処理を行なう。アルカリ易溶の部分からは生成物は得られない。アルカリ処理後のエーテル溶液を乾燥（無水硫酸ナトリウム）後溶媒を留去すると淡黄褐色の油 (VII) 1.5 g が得られた。塩化鉄反応は陰性であり、赤外線吸収スペクトルでは ν_{OH} 2.89 μ がみとめられる。

5 2-ケト-5-メチル-シクロペンタンカルボン酸エチル(IVa')

VII 1.5 g のピリジン 15 cc 溶液を、無水クロム酸 2.0 g とピリジン 20 cc からつくった錯化合物にかきまぜながら滴下する。1 夜放置し水を加えてエーテルで抽出する。エーテル溶液の乾燥、留去、ピリジンの減圧留去のち得られる油をエーテルにふたたび溶かし、3 の場合とおなじ冷アルカリ抽出を行なう。この部分から塩化鉄反応紫呈色の油 (IVa') 650 mg が得られる。bp₁₁ 130°~140°C (浴温)。

IVa' のセミカルバゾン：Na' 180 mg, 塩酸セミカルバジド 117 mg, 無水酢酸カリウム 104 mg のエタノール-水均一溶液から 80 mg のセミカルバゾンが沈殿する。アルコールから 2 回再結晶して mp 135°~137°C となる。IVa のセミカルバゾンと赤外線吸収スペクトルは同一である。

6 2-メトキシカルボニル-3-メチル-シクロペンテ-1-ニルシアン酢酸エチル (VIII)

カリウム 4.6 g, 無水エタノール 35 cc から得られるアルコールに冷時シアン酢酸エチル 13.2 g を加えてカリウム塩をつくり、これにケトエステル (IVb) 19.8 g を滴下（冷却下）し、1 夜冷却下に放置する。さらに室温に 2 日放置したのち、粘ちような反応溶液を希塩酸で酸性としエーテル抽出する。エーテル溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒を留去、残分の橙赤色油を減圧蒸留にふし、bp₃ ~120°C の未反応物を除いた (9.6 g) のち、縮合物 (VIII) が bp₃ 140°~153°C で 17.5 g 得られた。

7 VIII のメチル化による IX

ナトリウム 1.6 g, 無水エタノール 20 cc から得られるアルコールに VIII 17.5 g を加え、水浴上に 10 分間煮沸するとほとんど完全に白色塊状のナトリウム塩となる。このものを細かく砕きさらに 30 分間煮沸したのちヨウ化メチル 25 g を加え、5 時間還流下に煮沸する。さらに 12 g のヨウ化メチルを加え 3 時間反応させる。冷却後アルコール、未反応のヨウ化メチルを減圧下に留去し、残分の油状物に水を加えてエーテル抽出する。溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去すると油状物 18 g が得られた。減圧蒸留により bp₄ ~130°C, 0.9 g, bp₄ 130°~150°C, 15.2 g (IX) をあたえる。

8 IX の加水分解, 6,7-ジヒドロ-1,3-ジオキシ-4,7-ジメチル-5(H)-2-ピリンジン (X)

IX 10 g に濃塩酸 45 cc, 水 45 cc を加えて 15 時間加熱還流す

る。反応後減圧下に塩酸を除き、かつ十分に濃縮してからエーテル抽出する。エーテル溶液から 10~15% の塩酸で抽出される部分は減圧濃縮後水を加えると X が遊離し塊状物をあたえる。ロ別、乾燥して粗品 2.8 g, さらにエーテル溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液でふって得られる部分からは主成物として X に対応するジカルボン酸部（油状, 4.0 g）が分離される。X はベンゼン-石油エーテルから再結晶, mp 172°~173°C の白色結晶。

分析値 C 67.15%, H 7.51%, N 7.98%

C₁₀H₁₃O₂N としての

計算値 C 67.02%, H 7.31%, N 7.82%

9 α -(2-メトキシカルボニル-3-メチルシクロペンテ-1-ニル)-プロピオンニトリル (XII)

ナトリウム 2.4 g, 無水エタノール 28 cc からつくられたアルコールに冷時シアンジエステル (IX) を加え水浴上で 1 時間加熱し 1 夜室温に放置する。希塩酸で酸性としエーテル抽出、水洗、乾燥（無水硫酸ナトリウム）、溶媒留去後 2 回減圧蒸留する。

bp₃ 115°~120°C (XII), 14.2 g; bp₃ 130°~150°C, 5 g。

XII の分析値 C 68.64%, H 8.05%, N 7.55%

C₁₁H₁₅O₂N としての

計算値 C 68.37%, H 7.82%, N 7.25%

後留分を放置すると結晶化する。石油エーテルから再結晶, mp 95°C (XIII)。

分析値 C 69.76%, H 8.27%

C₁₂H₁₇O₂N としての計算値 C 69.54%, H 8.27%

N 分析値はやや異常である。

10 XII の加水分解による X

XII 11 g を濃塩酸 100 cc, 水 100 cc とともに 16 時間加熱還流する。8 の場合とほぼおなじ操作で油状ジカルボン酸 (X) 5.5 g, ジオキシピリジン誘導体 (X) 3.9 g 得られる。

11 1,3-ジクロル-6,7-ジヒドロ-4,7-ジメチル-5(H)-2-ピリンジン

X 2 g をオキシ塩化リン 4 cc とともに封管中 200°C 付近で 5 時間加熱する。1 夜放置し水中に注ぎ、エーテル抽出、6N 塩酸、水でおのおの抽出液を洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒留去すると残分として油状物が得られる。このものをクロロホルム 10 cc に溶かしアルミナクロマトグラフを行ない、同溶媒で展開して精製した。収量 2 g, 結晶状には得られない。

12 ジクロル誘導体の還元, (+)-アクチニジン (XIV)

ジクロル体 2.2 g, 塩化パラジウム 0.5 g, 酢酸カリウム 2.2 g にメタノール 20 cc を加え、常温常圧で水素を吸収させる。反応後触媒をロ別、メタノールを減圧下に留去し、6N 塩酸に残分を溶解しエーテル抽出によって未反応物を除く。10% 水酸化カリウムでアルカリ性としエーテル抽出、エーテル溶液を水酸化カリウム粒で乾燥、溶媒留去後減圧蒸留する。bp₆ 85°~95°C, 収量 1 g。このものを 10 cc のエタノール中 1.63 g のピクリン酸をふくむアルコール溶液を加えてピクラートを沈殿させる。同溶媒から再結晶, mp 146°~147°C, 2 g。

分析値 C 50.95%, H 4.36%, N 14.91%

C₁₆H₁₆O₇N₄ としての

計算値 C 51.06%, H 4.29%, N 14.89%

ピクラートに水酸化ナトリウム水溶液を加え水蒸気蒸留を行なう。留出物をエーテル抽出、乾燥、溶媒留去後ふたたび減圧蒸留

にふす。bp: 88°~89°C のⅡが得られた。 $[\alpha]_D^{25} +16.1^\circ$ (c 5.52, クロロホルム) であり、その赤外線吸収スペクトルは天然の(一)-

アクチニジンと完全に一致する。

塩化スルフリルによる塩素化 (第1報)

芳香族アルデヒドの塩素化

(昭和35年3月4日受理)

新井 万之助†

芳香族アルデヒドと塩化スルフリルとを過酸化ベンゾイルの存在下で反応させた。ベンズアルデヒド, *m*-ニトロ, *p*-ニトロ, *o*-クロルおよび *p*-クロルベンズアルデヒド, アニスアルデヒドにおいては, アルデヒド基の水素原子が一方的に攻撃されて塩化物のみが生成し, *o*-ニトロベンズアルデヒドでは反応生成物が得られず, いずれも核置換体は得られなかった。またフェノールアルデヒドにおいては, 酸塩化物は生成しないで核置換体のみを生成することを知った。反応は無溶媒, 四塩化炭素中およびベンゼン中に行ない, 溶媒が反応に影響を与えることを見いだした。

またこの反応と関連して, 過酸化ベンゾイル存在下では一般に芳香族アルデヒドは四塩化炭素と反応して酸塩化物を生成することを知った。

緒 言

芳香族アルデヒドのアルデヒド基の水素原子を塩素で置換する反応としては, 古く Wöhler らにより, ベンズアルデヒドに塩素ガスを高温で直接作用させて, 塩化ベンゾイルを得る方法が報告されているが, この方法は *o*-クロル誘導体に応用した例¹⁾があるに過ぎない。また最近, Gimsburg²⁾ は次亜塩素酸 *tert*-ブチルを種々の芳香族アルデヒドに作用させた結果, ベンズアルデヒドおよびアニスアルデヒドから四塩化炭素中で相当する酸塩化物と酸の混合物が得られ, この酸の生成はいったん生成した酸塩化物の一部が副生した *tert*-ブチルアルコールにより酸となったものであろうと述べている。

一方, Durrans³⁾ は無触媒の下で過剰の塩化スルフリルを加え, そのまままたは室温に放置後蒸留して, ベンズアルデヒドからは塩化ベンゾイルを, アニスアルデヒドからは塩素の核置換体であるジクロルアニスアルデヒドを得ている。

山口⁴⁾ は *N*-ブロムサクシニミド (NBS) による各種の芳香族アルデヒドの臭素化を行ない, 相当する酸臭化物の生成を確認し, その反応機構としては, NBS の加熱分解によって生じた臭素原子が, アルデヒド基の水素原子を攻撃して酸臭化物が生成するものと推定している。これと類似の反応が過酸化物の存在下で塩化スルフリルによっても起ることが予想されるので, 著者はこの方法で塩化スルフリルによる芳香族アルデヒドの塩素化を考えた。

研究結果

芳香族アルデヒドとして, ベンズアルデヒド, *o*-, *m*-, および *p*-ニトロベンズアルデヒド, *o*- および *p*-クロルベンズ

アルデヒド, アニスアルデヒドなどの各種の芳香族アルデヒドについて実験を行ない, 生成を予想される酸塩化物は酸アニリドとして分離確認を試みた。

まずこれら芳香族アルデヒドを乾燥四塩化炭素にとかし, 塩化スルフリル (1:1 モル比) を加えて炭酸ガス気中で, 過酸化ベンゾイルを約 10 mg (試料 0.005 mol に対し) 加えて, 油浴温を 85°C 近辺にたもって加熱反応させた。生成した酸塩化物をアニリドに変えて, 収率を求めると表 1 の結果が得られた。

表 1 アルデヒド 1 mol と SO₂Cl₂ 1 mol との反応

試料	CCl ₄	反応時間	酸アニリド収率
(mol)	(cc)	(hr)	(%)
ベンズアルデヒド	0.01	15	48
<i>o</i> -ニトロベンズアルデヒド	0.005	10	48
<i>m</i> -ニトロベンズアルデヒド	0.005	10	48
<i>p</i> -ニトロベンズアルデヒド	0.005	10	48
<i>o</i> -クロルベンズアルデヒド	0.005	10	28
<i>p</i> -クロルベンズアルデヒド	0.005	10	28
アニスアルデヒド	0.005	10	48

酸アニリドを分離した母液からは, 原料のアルデヒドあるいはそれが後処理中に酸化して生成したと考えられる酸 (反応によって生成した酸塩化物がアニリンと反応せずに加水分解して生じた分も含まれる) が得られたのみであった。

この結果からも過酸化物の存在下では, 反応は予想どおり核置換体を生成しないでアルデヒド基の塩素化のみが選択的に行なわれることがわかったので, 酸塩化物の収率を上昇させる目的で, アルデヒド 1 mol に対して塩化スルフリル 2 mol を使用して, 無溶媒, ベンゼン溶媒中および四塩化炭素溶媒中で上と同様な方

† 東北大学川内分校, 仙台市川内

1) F. Wöhler, J. F. Liebig, *Ann.* **3**, 262 (1832).

2) "Org. Syntheses", Col. Vol. **1**, 155 (1941).

3) D. Gimsburg, *J. Am. Chem. Soc.* **73**, 702 (1951).

4) T. H. Durrans, *J. Chem. Soc.* **121**, 44 (1922); **123**, 1424 (1923).

5) 山口, 日化 **77**, 591 (1956); 山口, 足立, 日化 **78**, 487 (1958).

refluxing in glacial acetic acid containing the same catalyst. 2-Methylthioadenosine, 2,8-dichloroadenosine and 2',3',5'-tri-*O*-acetyl-9- β -D-ribofuranosyl-2,6,8-trichloropurine were also prepared by the same method, which is analogous to Helferich's method for the synthesis of *O*-phenyl- α and β -glycosides, but the nucleosides obtained had only β -form.

VIII. A New Method for Synthesis of Purine-Ribonucleosides. Part. 2 (pp. 1442~1444)

In our previous report, the method for the synthesis of purine nucleosides by melting a mixture of 1,2,3,5-tetra-*O*-acetyl- β -D-ribofuranose(I) and purines in the presence of *p*-toluenesulfonic acid was described. In the present work, methyl-2,3,5-tri-*O*-acetyl- β -D-ribofuranoside (II) was prepared and reacted with theophylline by the same method, but the yield was very low. By heating (II) and theophylline in acetic acid containing acetic anhydride or in acetic anhydride with *p*-toluene sulfonic acid in vacuo, theophylline riboside was obtained in a better yield. Consequently it was found that, (I) can be prepared by treating (II) with the same catalyst in acetic acid containing acetic anhydride or in acetic anhydride. Then, (I), (II), 1-*O*-acetyl-2,3,5-tri-*O*-benzoyl- β -D-ribofuranose and 1,2,3,5-tetra-*O*-benzoyl- β -D-ribofuranose were condensed respectively with theophylline under the same condition and it was deduced that the reactivity was influenced by the nature of the group attached to the first carbon atom of D-ribose, the order of the reactivity being acetoxy > benzoxy > methoxy.

Laboratory of Organic Chemistry, Tokyo Institute of Technology; Meguro-ku, Tokyo, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1444~1450 (1960)

Studies on the Chemical Components in Matatabi. IV~VI.

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Fujio MURAI, Akio SUZUI, Yasuo BUTSUGAN and Yutaka TERASHIMA

IV. The Conversion of Matatabilactone into Actinidine (pp. 1444~1445)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO and Fujio MURAI

Matatabilactone was correlated to actinidine by converting nepetalinic acid obtained from the former into the latter.

V. The Synthesis and the Optical Resolution of DL-Actinidine (pp. 1445~1447)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Akio SUZUI and Yasuo BUTSUGAN

6,7-Dihydro-4,7-dimethyl-5(H)-2-pyridine (DL-actinidine) (I) was synthesized from ethyl α -(3-methyl-2-oxocyclopentyl) propionate by five steps. (I) was resolved into optically active forms through the mono-salt of dibenzoyltritaric acid. The levorotatory compound was proved to be identical with natural actinidine. 6,7-Dihydro-4-methyl-5(H)-2-pyridine (7-noractinidine) was also prepared.

VI. The Stereochemical Configuration of Actinidine (pp. 1447~1450)

by Takeo SAKAN, Akira FUJINO, Fujio MURAI, Yasuo BUTSUGAN and Yutaka TERASHIMA

The absolute configuration of natural actinidine was elucidated by preparing (+)-actinidine from (+)-pulegon, the asymmetric center of which has already been shown to belong to D-series. Oxidation of the methyl group binding to the double bond in methyl pulegenate (I) with selenium dioxide under various conditions was unsuccessful. Therefore the following course of synthesis was pursued. (I) was oxidized to methyl 2-methyl-5-oxo-cyclopentane carboxylate (II) and the necessary C₃-moiety was re-introduced into (II) by the condensation of ethyl cyanoacetate and the successive methylation. The structure of the ethyl ester corresponding to (II) was confirmed by preparing it via another route.

Institute of Polytechnics, Osaka City University; Kita-ku, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1450~1452 (1960)

Chlorination with Sulfuryl Chloride. I. Chlorination of Aromatic Aldehydes

by Mannosuke ARAI

The reactions between sulfuryl chloride and aromatic aldehydes in the presence of a small quantity of benzoyl peroxide were studied. Various aromatic aldehydes, i. e. benzaldehyde, *m*-nitro-, *p*-nitro-, *o*-chloro- and *p*-chlorobenzaldehyde and anisaldehyde were respectively converted to corresponding acyl chlorides, but no nuclear substitution product was obtained. *o*-Nitrobenzaldehyde gave no reaction product. From *p*-hydroxybenzaldehyde and vanillin no acylchloride but nuclear substitution products were obtained. The reactions were carried out either without solvent or in carbon tetrachloride and benzene, and the influence of the solvent upon the reaction was proved. Aromatic aldehydes reacted generally with carbon tetrachloride in the presence of benzoyl peroxide to yield acyl chlorides.

Kawauchi College, Tohoku University; Sendai-shi, Miyagi, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1453~1459 (1960)

Studies on Triphosponitrilic Chloride and its Derivatives. VI~VII.

by Masaaki YOKOYAMA

VI. Reaction of Amines with Triphosponitrilic Chloride (pp. 145~1457)

The reactions of triphosponitrilic chloride (P₃N₃Cl₆) with amines are described. The reactions of P₃N₃Cl₆ with primary and secondary amines give *N*-substituted triphosponitrilic amides in the presence of excess of amines. Amine hydrochlorides are obtained as byproducts in the reaction. *N*-substituted triphosponitrilic amides derived from aromatic and heterocyclic amines can be obtained in a crystalline form which are insoluble in water and in organic solvents such as alcohol, hydrocarbon, etc. but are soluble in dioxane or tetrahydrofuran. The products derived from aliphatic amines are very viscous liquids. The reactions of P₃N₃Cl₆ with tertiary amines give salts similar to quaternary ammo-