$$d[\text{RO}_2\cdot]/dt = k_1[\text{R}\cdot][\text{O}_2] - k_2[\text{RO}_2\cdot][\text{RH}] - k_3[\text{RO}_2\cdot]^2 \quad (\text{v})$$

$$d[\text{ROOH}]/dt = k_2[\text{RO}_2\cdot][\text{RH}] - k_4[\text{ROOH}] \quad (\text{vi})$$

したがって, (iv), (v) から

$$k_3[\text{RO}_2\cdot]^2 = k_0[\text{RH}][\text{O}_2] + k_4[\text{ROOH}]$$

ゆえに

$$[\text{RO}_2\cdot] = \sqrt{\omega_0/k_3 + k_4/k_3 \cdot [\text{ROOH}]} \quad (\text{vii})$$

(vii) を (vi) に代入すれば

$$d[\text{ROOH}]/dt = k_2[\text{RH}] \sqrt{\omega_0/k_3 + k_4/k_3 [\text{ROOH}]} - k_4[\text{ROOH}]$$

ヒドロペルオキシド濃度が一定になる状況は右辺の第1項と第2項が等しくなるときであるが, 実験状況では第1項が第2項にくらべて十分大きい。そのときは上式の積分はつぎのようになる。

$$[\text{ROOH}] = k_3/4k_3 \cdot k_2^2 [\text{RH}]^2 t^2 + \sqrt{\omega_0/k_3} \times k_2 [\text{RH}] t$$

$[\text{ROOH}]$ は t の2次関数になり Parabola に近い形をとる。

つぎにヒドロペルオキシドが RH と反応して連鎖のにない手

を生成する場合を考えてみる。

(iv) 式, $d[\text{R}\cdot]/dt = k_0[\text{RH}][\text{O}_2] - k[\text{R}\cdot][\text{O}_2] + k_2[\text{RO}_2\cdot][\text{RH}] + k_4[\text{ROOH}]$ で $k_4[\text{ROOH}]$ のかわりに $k_5[\text{ROOH}]$ を用いればまったく同様に上式を導くことができる。したがって, このような自己触媒の反応を導くためにはヒドロペルオキシドが分解しても, あるいは RH と反応しても, そのいずれでもよい。以上の機作で図1に示されるヒドロペルオキシド生成の過程は定性的に説明される。

終りに本研究を行なうにあたり, 終始御懇切な御教示を賜った北海道大学触媒研究所 孝男教授に感謝の意を表するとともに酸化反応に関する Semenov の著書 “Some problems in Chemical Kinetics and Reactivity” (translated by M. Boudart(1958), Princeton Univ. Press.) および高橋 詢氏の総説 “自動酸化反応の反応機構と結合エネルギー” (油化学, 7, No. 5, 1958) に負うところが多かったことを附記する。

1-ブロム-3-エトキシメチルブタンの合成

(昭和35年3月7日受理)

樋爪十四夫・広津順弘・川崎一郎・金子武夫†

著者らはテルペン類似化合物を合成する場合, C_5 単位を導入する目的に有用と考えられるイソブレン鎖の両末端に官能基をもつ化合物として, 1-ブロム-3-エトキシメチルブタンの合成を試みた。すなわちプロピレンオキシドから既知の方法¹⁾によって好収量で得られる 2-ブロム-1-エトキシプロパンをマロン酸ジエチルと縮合させ²⁾, 縮合物を加水分解脱炭酸後³⁾ ふたたびエステル化して 3-エトキシメチル酪酸メチルに導き, これを水素化リチウムアルミニウムで還元して得られる 3-エトキシメチルブタノールを三臭化リンで臭素化して目的物を得た。

実験の部

2-エトキシカルボニル-3-エトキシメチル酪酸エチル (I)

ナトリウム 11.5 g, マロン酸ジエチル 83.5 g を無水アルコール 200 cc にとかし, 浴温 60°C 前後でかきまぜながら 2-ブロム-1-エトキシプロパン¹⁾ 84 g を滴下して還流下に 20 時間かきまぜをつづける。のち約 200 cc のアルコールを留去し, 残液に水を加えて有機層をわけ, 水層をエーテルで抽出し有機層と抽出液を合わせて水洗後乾燥, 溶媒を留去し残留分を減圧蒸留すると bp₁ 87°~93°C のエステル (I) 85 g が得られる。収率 55.5%。

分析値 C 58.62%, H 9.08%

$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_5$ としての計算値 C 58.51%, H 9.00%

3-エトキシメチル酪酸 (II)

水酸化カリウム 60 g, 水 60 cc を油浴上 110°C にたもちながら上記エステル (I) 66 g を 1 時間かけて滴下し, 3 時間還流下にかきまぜる。反応液に水 60 cc を加えて 60 cc のアルコール-水を留去し, 残留分に 96 g の硫酸を 135 cc の水でうすめたものを徐々に加え 135°~140°C に加熱すると炭酸ガスの発生が起る。3~4 時間還流下にかきまぜてから有機層をわけ水層をエーテルで抽出して有機層と合わせ, 水洗, 乾燥してからエーテルを留去し, 残留分を減圧蒸留すると bp₂ 108°~110°C の酸 (II) 34.1 g が得られる。収率 86%。赤外線吸収スペクトル (液体) 1751 (CO), 2500~3500 (CO_2H), 2860 cm^{-1} ($-\text{O}-\text{CH}_2-$)。

分析値 C 57.73%, H 9.71%

$\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_3$ としての計算値 C 57.51%, H 9.65%

† 大阪大学理学部化学教室, 大阪市北区

1) 宮本, 本庄, 三野, 田中, 立岡, 薬誌 77, 586 (1957).

2) “Org. Syntheses”, Coll. Vol. I, p. 250.

3) “Org. Syntheses”, Coll. Vol. II, p. 416.

3-エトキシメチル酪酸メチル (III)

カルボン酸 (I) 10.5 g をジアゾメタンでエステル化する (*N*-エトロソメチル尿素 20 g を使用)。4 時間室温に放置後蒸留すると bp₁₃ 72°~73°C のエステル (III) 10.7 g が得られる。収率 93%。

分析値 C 59.79%, H 9.96%

C₉H₁₆O₃ としての計算値 C 59.98%, H 10.07%

メタノール-塩酸を使ってエステル化しても同様の結果が得られるが、常圧でエステルとメタノールが共沸するので注意する必要がある。

3-エトキシメチルブタノール (IV)

13 g の水素化アルミニウムリチウムを無水エーテル 500 cc に懸濁し、かきまぜながら 93 g のエステル (II) のエーテル溶液を滴下して 2 時間還流下にかきまぜをつづける。のち過剰の水素化アルミニウムリチウムを酢酸エチルを加えて消費させ 10% 硫酸 100 cc を徐々に加えて有機層をわけ、水層をエーテルで抽出し、

エーテル溶液を集めて乾燥後エーテルを留去、残留分を減圧蒸留すると bp₁₀ 76°~78°C のアルコール (IV) 73 g が得られる。収率 94%。

分析値 C 63.79%, H 12.23%

C₇H₁₆O₂ としての計算値 C 63.59%, H 12.20%

1-ブロム-3-エトキシメチルブタン (V)

73 g のアルコール (IV) とピリジン 10.8 g の混合物に三臭化リン 70 g をかきまぜながら滴下し、1 時間温浴上で加温してから反応液に水を加えてエーテルで抽出し、抽出液を炭酸水素ナトリウム水溶液、つぎに水で洗って乾燥後エーテルを留去し、残留分を減圧蒸留すると bp₁₃ 68°~70°C のブロミド (V) 97 g が得られる。収率 86.3%。

分析値 C 42.98%, H 8.08%

C₇H₁₅OBr としての計算値 C 43.09%, H 7.75%

希土類金属-ジェチレントリアミン五酢酸錯塩の安定度定数

——ランタンおよびセリウム

(昭和 35 年 3 月 8 日 受理)

岩 瀬 秋 雄†

1 緒 言

ジェチレントリアミン五酢酸 (DTPA) が EDTA と同様に、多くの金属イオンと安定な水溶性錯体を形成することはすでに Frost¹⁾, Durham²⁾ らによって認められ、その酸解離定数あるいはアルカリ土類金属および重金属錯体などの生成定数が報告されている。また最近 Schwarzenbach³⁾, Reilley⁴⁾ らによる報告がみられ、ランタンおよびセリウムの生成定数も記載されているが、著者はすでにポーラログラフ法によって測定した結果をここに報告する。

2 実 験

2.1 試 薬

DTPA 溶液 (0.01060 mol/l) はドータイト DTPA を用い、その三ナトリウム塩水溶液を調製し、濃度はカドミウム標準溶液に対する電流滴定によって決定した (120°C で乾燥し、H₅C₁₄H₁₈O₁₀N₃ として精秤した値と一致する)。

ランタンおよびセリウムの硝酸塩溶液 (La: 0.00960, Ce: 0.01034 mol/l) は、それぞれ 99.9% 酸化ランタンならびに硝酸セリウムから調製し、濃度は DTPA によって決定した (EDTA 滴定に準じて行なったが、EDTA による滴定結果とよく一致

する)。

カドミウム標準溶液 (0.01081 mol/l) は金属カドミウム (99.9%) を硝酸塩にして調製し、その他の試薬はすべて特級品を使用した。

2.2 実験条件

電流-電位 (*i*-*E*) 曲線は柳本ペン記録式ポーラログラフを用いて測定し、電解ビンには飽和甘コウ電極対極の H 型セルを使用した。毛细管特性は水銀柱の高さ 64.5 cm において $t=5.7 \text{ sec/drop}$, $m=1.44 \text{ mg/sec}$ (-0.8 V vs. SCE , 0.1N KNO₃ 溶液中), $m^{2/3}t^{1/6}=1.71 \text{ mg}^{2/3} \text{ sec}^{-1/2}$ であった。*pH* は酢酸-酢酸ナトリウム緩衝溶液で 5.0 に規定し、イオン強度 0.10 (KNO₃ を使用), 液温は 20°±0.1°C で測定した。

3 実験結果および考察

3.1 カドミウムおよびカドミウム-DTPA 錯塩のポーラログラム

カドミウム-DTPA 錯塩のポーラログラムを図 1 に示す。

図 1 b 曲線における第 1 波は Cd²⁺ の波で、その半波電位 (*E*_{1/2}) は -0.56 V, 第 2 波は CdY³⁻ (Y³⁻ は DTPA アニオンを表わす) の波で *E*_{1/2} は -1.02 V vs. SCE (*pH* 5.0, ゼラチン 0.002%, 酢酸イオン 8 mmol/l) である。そして CdY³⁻ と共存する場合の Cd²⁺ 波の限界電流は拡散律速によるもので、Cd²⁺ の濃度に比例することを認めた。またランタン⁵⁾ およびセリウム (III)⁶⁾ の還元波はさらに負電位に生ずる。

† 山形大学文理学部, 山形市小白川町

1) A. E. Frost, *Nature* 178, 322 (1956).

2) E. J. Durham, D. P. Ryskiewicz, *J. Am. Chem. Soc.* 80, 4812 (1958).

3) G. Anderegg, P. Nægeli, F. Müller, G. Schwarzenbach, *Helv. Chim. Acta* 42, 827 (1959).

4) C. N. Reilley, *Anal. Chem.* 32, 249 (1960).

5) 岩瀬, 日化 80, 1133 (1959).

6) I. M. Kolthoff, J. J. Lingane, "Polarography" Vol. II, p. 436 (1952).

OH...OH type hydrogen bonding. This fact was interpreted as indicating the existence of the hydrogen bonding of the OH...COOH type in the solid state of this acid. A long spacing of 16.5 Å determined from the X-ray diffraction measurements indicated that this acid possesses a crystal structure, quite different from that of usual fatty acid. Mixed samples, prepared by mixing D-12-hydroxystearic acid with stearic acid and by repeated melting and quenching were subjected to the infrared absorption and X-ray diffraction measurements. These measurements indicated that this acid in its solid state has a very characteristic crystal structure, which makes it difficult to form solid solutions with stearic acid. The behavior at their melting points of these mixed samples also showed that D-12-hydroxystearic acid does not form solid solutions with stearic acid. A model for explaining this fact was proposed. This model accounts also for the conspicuous tendency of forming gel and other characteristics of D-12-hydroxystearic acid.

Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Nagoya University; Chikusa-ku, Nagoya, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1476~1482 (1960)

Condensation Reaction of Aminoalcohols with Imides. V. Condensation of *N,N*-Disubstituted Aminoalcohols Having a Secondary or Tertiary Alcoholic Hydroxyl Group with Imides

by Kazuo NAKAJIMA

A secondary alcoholic hydroxyl group of *N,N*-disubstituted aminoalcohols having the general formula [A] was successfully replaced by an imido group to give a codensation product [A'], at temperatures above 180°C, according to the following scheme:

Following compounds (I)~(VIII) was condensed with succinimide and phthalimide and properties of the resulting condensation products were described.

These condensation products was hydrolysed easily to yield the corresponding diamine derivatives, which may be formulated by replacing the hydroxyl group in (I)~(VIII) by amino.

Condensation of aminoalcohols having a tertiary alcoholic hydroxyl group with succinimide or phthalimide were also tried but it was unsuccessful.

Kyoto Works, Teikoku Chemical Industry Co., Ltd.; Nakagyo-ku, Kyoto, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1483~1485 (1960)

Oxidation of Cetane in Liquid Phase. III. Kinetics and Mechanism

by Shin'ichi KAMIO

Oxidation rate of cetane was investigated under 760 mmHg oxygen pressure by observing the volume of oxygen consumed at 140°, 150° and 180°C. The amount of hydroperoxide formed in the oxidation was also determined by means of Nozaki's method. The rate of absorption of oxygen as well as hydroperoxide formation was found to be autocatalytic as was found in the oxidation of lower hydrocarbons. Initial rate of formation of hydroperoxide was deduced according to the generally accepted chain mechanism. From an analysis of the temperature effect upon the rate of oxidation, the activation energy E_2 of the elementary reaction, $\text{RO}_2 \cdot + \text{RH} \longrightarrow \text{ROOH} + \text{R} \cdot$ was found to be 14.2~16.7 kcal. Autocatalytic nature of the oxidation reaction was interpreted as due to the monomolecular decomposition of hydroperoxide to give $\text{R} \cdot$ which acts as chain carrier. The time dependence of the oxidation during the initial stage was formulated along the reaction scheme given above and it was found that the resulted formula is in accord with the observed rate of oxidation.

Railway Technical Research Institute, J. N. R.; Kunitachi-shi, Tokyo, Japan

Notes

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1485~1486 (1960)

The Synthesis of 1-Bromo-3-ethoxymethylbutane

by Toshio HIZUME, Yoshihiro HIROTSU, Ichiro KAWASAKI and Takeo KANEKO

2-Bromo-3-ethoxypropane was condensed with diethyl malonate. The condensation product, b.p. 87~93°C/1mmHg, was hydrolysed and subsequent decarboxylation gave 3-ethoxymethylbutyric acid (b.p. 108~110°C/6mmHg, 86%). This acid was esterified and then reduced with LiAlH_4 to 3-ethoxymethylbutanol (b.p. 76~78°C/10mmHg, 94%). Bromination of this alcohol with PBr_3 gave 2-Bromo-3-ethoxymethylbutane (b.p. 68~70°C/13mmHg, 86.3%).

Department of Chemistry, Faculty of Science, Osaka University; Kita-ku, Osaka, Japan

Nippon Kagaku Zasshi, 81, 1486~1487 (1960)

The Stability Constants of the Rare Earth Metal Chelates with Diethylenetriaminepentaacetic Acid—Lanthanum and Cerium

by Akio IWASE

La or Ce(III) ions, Cd ions and diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) were mixed in equivalent moles and the equilibrium concentration of Cd^{2+} was measured for this solution polarographically at pH 5, ionic strength $\mu=0.1$ and at 20°C. The values, $\log K_{\text{La}}=19.35$ and $\log K_{\text{Ce}}=20.10$ were obtained as the stability constants.

Department of Chemistry, Faculty of Liberal Art and Science, Yamagata University; Yamagata-shi, Yamagata, Japan