30~40 歳代の進行期・末期変形性股関節症に対する キアリ骨盤骨切り術の成績

境 野 昌 範* 金 澤 武 利* 荘 念 仁* 井 上 明 生*

Results of Chiari's Pelvic Osteotomy for Advanced Coxarthrosis in the Thirties and Forties

Masanori Sakaino*, Taketoshi Kanazawa*, Yomihito So*, and Akio Inoue*

変形性股関節症に対する関節温存手術が好成績を得る条件の一つは年齢である。今回は 30~40 歳代の対象患者に対する成績を調べ、50 歳代の成績と比較する。平成 12 年 6 月以降、当院でキアリ手術（大腿骨外反骨切り術併用）を施行した 204 股関節中、手術時 30~40 歳代の進行・末期例で術後 2 年以上経過したものを対象とした。評価は除痛の可否を重要視し、日整会評価基準の疼痛点 35 以上を「除痛成功」とした。対象の 47 股関節（進行期 24 関節、末期 23 関節）年齢は 30 歳代 11 関節、40 歳代 36 関節で、除痛に成功したのは 43 関節 91% であった。50 歳代の変形性股関節症に対する同様の治療の除痛成功率が約 80% であるのに比べて好成績が得られるのは、若さ以外に、臼蓋形成不全の程度が高度なためと思われる。

An important factor for obtaining good results after Chiari's pelvic osteotomy for adult coxarthrosis is the age of the patient.

We have followed up patients in their thirties and forties (47 hips in advanced stages) for over two years, investigated the results (JOA hip score), and compared with patients in their fifties (60 hips).

Painless hip could be obtained in more than 90% of the patients in their thirties and forties in contrast with about 80% of the patients in their fifties.

Key words : osseous arthritis of the hip (変形性股関節症), Chiari's pelvic osteotomy (キアリ骨盤骨切り術), advanced stage (進行・末期)

は じ め に

私どもの病院には、「人工関節の適応ではあるがあなたはまだ若い」といわれた多くの壮年期の患者さんが、キアリ骨盤骨切り術、以下「キアリ手術」による関節温存を目的に来院される。

変形性股関節症に対する関節温存手術が好成績を得るための条件の一つは年齢であると考えられる。

今回は 30~40 歳代の進行期、末期変形性股関節症に対するキアリ手術の有用性について、除痛が得られたかどうかを指標に検討し、50 歳代の成績と比較した。

対 象

柳川リハビリテーション病院において平成 12 年以降にキアリ手術を施行した進行期、末期変形性股関節症のうち、手術時 30~40 歳代で、術後 2 年以上経過観察し得た症例男性 4 人、女性 41 人、合計 45 人、47 股関節を対象とした。平均年齢は 43 歳で 30 代が 11 例、40 代が 36 例であった。

47 股関節のうち右側 19 股（男性 2 股、女性 17 股）、左側 28 股（男性 3 股、女性 25 股）で、レントゲンにて Stage III が 24 股（男性 3 股、女性 21 股）、Stage IV が 23 股（男性 2 股、女性 21 股）であった。

* 柳川リハビリテーション病院整形外科 Department of Orthopaedic Surgery, Yanagawa Rehabilitation Hospital, Fukuoka, Japan

方 法

47 股関節について、除痛に成功したかどうかを、JOA 股関節機能判定基準の疼痛点で評価し、35 点以上を「除痛に成功した」と評価した。

結 果

JOA 股関節機能判定基準の疼痛点での評価で術前・後の変化をみると、術前 0 点が術後 20 点になった股関節は 1 股、術前 0 点が術後 35 点になった股関節は 5 股、術前 0 点が術後 40 点になった股関節は 5 股、術前 10 点が術後 30 点になった股関節は 2 股、術前 10 点が術後 35 点になった股関節は 16 股、術前 10 点が術後 40 点になった股関節は 4 股、術前 20 点が術後 20 点になった股関節は 1 股、術前 20 点が術後 35 点になった股関節は 6 股、術前 20 点が術後 40 点になった股関節は 7 股であった（表 1）。

術後の疼痛点の評価は、30 歳代では 20 点が 1 股、30 点が 0 股、35 点が 8 股、40 点が 2 股、40 歳代では、20 点 1 股、30 点 2 股、35 点 19 股、40 点 14 股であっ

た。全体的には、20 点が 2 股（男性 1 股、女性 1 股）4.3%，30 点が 2 股（女性 2 股）4.3%，35 点が 27 股

表 1 キアリ手術前・後での疼痛点の変化

30/40 代	症例数
0 → 20 点	1
0 → 35 点	5
0 → 40 点	5
10 → 30 点	2
10 → 35 点	16
10 → 40 点	4
20 → 20 点	1
20 → 35 点	6
20 → 40 点	7
合計	47

表 2 術後の疼痛点評価

JOA 疼痛点	20 点	30 点	35 点	40 点
症例数	2	2	27	16
%	4.3	4.3	57.4	34.0

図 1-a 47yrs. F. Stage IV・Post T.H.R. 10mos.

図 1-b 左側より op.・P.O. 8 wks.・P.O. 3 yrs.

(男性 4 股, 女性 23 股) 57.4%, 40 点が 16 股 (女性 14 股) 34.0% で, 35 点以上は全体では 47 股中 43 股で 91.4% であった (表 2).

症 例

症例 1: 47 歳女性, 両側末期関節症で両側の可動範囲も屈曲 $30\sim 40^\circ$ と悪く, やむをえず右側を人工関節置換したところ 10 ヶ月経過して左側の屈曲が 50° に改善したため (図 1-a), 大腿骨外反骨切り術, hamstrings release 併用のキアリ手術を行った. 術後 8 週で部分荷重歩行開始, 術後 3 年, 疼痛は術前 0 点から術後 40 点へ改善し除痛が得られた (図 1-b).

症例 2: 48 歳女性. 右側進行期関節症に対して, 大腿骨外反骨切り術併用のキアリ手術を施行した (図 2-a). 術後すぐに関節裂隙の開大が得られ, 術後 3 年 1 ヶ月, 疼痛は術前 10 点から術後 40 点へ改善し跛行

も消失した (図 2-b).

症例 3: 36 歳女性. 右側末期関節症に対して, 大腿骨外反骨切り術併用のキアリ手術施行した (図 3-a). 術後 3 年で疼痛は術前の 10 点が術後 10 点へ改善し除痛が得られた (図 3-b).

症例 4: 35 歳女性. 右側末期関節症に対して, 大腿骨外反骨切り術併用のキアリ手術を施行した (図 4-a). 術後 1 年, 疼痛は術前 10 点から術後 35 点へ改善し除痛が得られた (図 4-b).

症例 5: 43 歳女性. 右側末期関節症に対して, 大腿骨外反骨切り術併用のキアリ手術を施行した (図 5-a). 術後 4 週, 29 週, 関節の適合性の経過は良好と判断していたが (図 5-b), 術後 10 ヶ月目に大腿骨の骨切り部の偽関節が判明し再手術を施行した. 儀関節部の骨癒合は得られるも, 術後 1 年 7 ヶ月で, 疼痛は術前 0 点から術後 20 点への改善にとどまっている (図 5-c).

図 2-a 48yrs. F. Stage III

図 2-b 左側より op.・P.O. 3 yrs. 1 mos.

図 3-a 36yrs. F. Stage IV

図 3-b 左側より op.・P.O. 8 wks.・P.O. 3yrs.

図 4-a 35yrs. F. Stage IV

図 4-b 左側より Pre-op. ・ op. ・ P.O. 1 yr.

図 5-a 43yrs. F. Stage IV

図 5-b 左側より P.O. 4 wks. ・ P.O. 29wks.

図 5-c 左側より P.O. 10mos. non-union ・ Post re-op. 8 wks. ・ P.O. 2 y. 9 mos.

考 察

今回、私どもは進行期・末期変形性股関節症に対する関節温存手術として、キアリ手術はどれほど有用かを年齢別に調べた。除痛が得られたかという点に焦点を絞ったのは、キアリ手術は、たとえば ROM を一時的に悪くするなど、総合点では患者の満足度を正確に反映しないと考えたからである。

また、追跡期間が短期であったのは、手術技術がいろいろ改良されたり¹⁾²⁾、併用手術の種類が増えたり、術後の機能訓練の方法が改善、一定化された結果³⁾、安定した結果が得られるようになってからの症例を対象にしたためである。その結果、30～40 歳代では約 91% の患者さんが痛みから解放された。50 歳代の同様の調査では除痛成功率が 80% であったが、年齢によって成功率が異なるというのは、再生能力の差として当然のことかもしれないが、それ以外に、若くして進行期・末期になる患者さんは、dysplasia の程度が強いとか、形態上の異常を多く持っているため、キアリ手術による改善効果がより有効であると思われた。

ま と め

① 30～40 歳代の進行期、末期変形性股関節症に対するキアリ手術の有用性を除痛において検討し、50 歳代の成績と比較検討した。

② 50 歳代の変形性股関節症に対する同様の治療の除痛成功率が約 80% であるのに比べて 30～40 歳代は 91% と好成績が得られた。

③ 30～40 歳代で好成績が得られるのは、若さ以外に、臼蓋形成不全の程度が高度なためキアリ手術による改善効果が大きいことが原因と思われた。

参 考 文 献

- 1) 福田浩子ら：変形性股関節症に対する Chiari 骨盤骨切り術における腸骨翼外開きの意義。Hip Joint, 28 : 197-200, 2002.
- 2) 福田浩子ら：高度臼蓋形成不全例に対するキアリ骨盤骨切り術。Hip Joint, 29 : 175-178, 2003.
- 3) 井上明生ら：キアリ骨盤骨切り術前・後のリハビリテーション。Hip Joint, 29 : 13-17, 2003.