天性股関節脱臼児でも満2年ともなれば歩行を開始することに依るものと思われまゝ。

以上先天性股関節脱臼に於ける大腿骨頭核の変化についての第一報として核の未出現及形態に就て概略報告致しました。

(終りに御指導御校閱を賜りました島教授に深謝致します)

(文 献)

- 1) 浜: 先天性股関節脱臼の成因に関する実験的研究, 日本整形外科学会雑誌, 5巻, 3号 2) 神中: 先天性股関節脱臼, 神中整形外科学: 股関節外科, 日本外科学会雑誌, 36回, 10号 3) 本山: 人胎児股関節の解剖学的所見, 日本整形外科学会雑誌, 5巻, 3号 先天性股関節脱臼の本態及成因に就て, 日本整形外科学会雑誌, 6巻, 1号 4) 名倉: 先天性股関節脱臼の本態に就て, 日本整形外科学会雑誌 17巻, 17号 5) 杉浦: 所謂先天性股関節脱臼の整復後の股関節の変化に就て, 日本整形外科学会雑誌, 2巻, 1号 6) 高木: 先天性股関節脱臼, 日本外科学会雑誌, 36回, 10号

Department of Orthopedic Surgery, Kurume Medical College (Prof. K. Shima).

Changes of the Femoral Head in the Congenital Dislocation of the Hip.

By

Keishun Nishi,

Roentgenographic observations about changes of the femoral head in the congenital dislocation of the hip before the reduction are as follows;

1. Delayed appearance of the ossific center of the femoral head seems to be insignificant for the congenital dislocation of the hip.
2. Dislocated heads of the hip have generally ordinary forms under two years of age, while above two years of age increase remarkably the unordinary.

新鮮開放性骨折の創内骨接合術について

三井三池鋳業所病院外科 塚 本 俊 明

(本稿の大意は第一回西日本整形災害外科集談会に於て発表した)

開放性骨折の治療に当つて、化膿の合併は骨折治癒を著しく障碍するばかりでなく、甚だしい場合には生命すら脅すから、之を防ぎ得れば治療の半に成功したものと言つて良い。Volkmannによると、Listerの制腐法創始以前に於ける長管骨開放性骨折の死亡率は40%にも達しているが、Friedrichの第一期創切除法が応用されるようになってからは、死亡率も化膿も減少し、Riemann, Böhler, Ehalt等は夫々優秀な治療成績を報告している。それでも尙、Ehaltは8.66%の重篤な創障碍に悩まされている。

Böhlerは、受傷後6~8時間以内のものは機械的徹底的創清掃を行つて縫合閉鎖せよと言ひ、その手技を詳しく記載しているが、創内に異物を埋没することは化膿を誘発し易いからとの理由で

血管結紮や断裂組織の縫合も制限し、ましてや異物を以て骨接合を行うようなことは堅く禁じ、創内に於ては骨折の単なる整復動作も行はない。神中、高木、水町諸教授も同様で、我国では是が従来の一般的な治療方針のようである。

然し前田氏は、「著しい化膿の危険の認められないものには手術的療法を行つても大なる危険はない」と言ひ、山岸氏は、「1) 骨欠損のため骨折端が接合していない様とき、2) 牽引或は徒手法により適正な整復が得られないとき、3) 関節附近の骨折で関節成形術が要求される様とき、には観血的接合術が有利である」と述べている。三木教授が各大学、官公立病院その他の整形外科専門医に問合せ状を出し、その回答を纏めて発表された所によると、複雑骨折を観血的に整復して一次縫合を行う人も少くはないが、直に創内で骨接合術を行う人は極く少数のようである。

損傷重大な新鮮開放性骨折では、創閉鎖後に良好な整復位固定を得ることは決して容易な業ではなく、又實際不可能なものもある。この場合、骨折部は既に露出しており、筋自身が挫滅乃至挫断され、そうでなくとも創清掃に先立つて行われる無痛法によつて、整復障碍となる筋の緊張は消失しておるから、直に骨を接合することは容易であり、その上で創を一次閉鎖すれば、転位のない固定性の良い皮下骨折として取扱うことが出来る。転位のないものは創処理に止めること、転位あるものの整復動作や骨接合術操作は愛護的に行い、無用な人工的損傷を避けること等は勿論である。

私共の炭坑病院で取扱う外傷は重篤なものが少なく幸にも新鮮例である。「坑内の創を化膿させるのは創処理が悪いからだ」とは、経験深い先輩から常々教えられており、堀田氏、当院外科坂井氏等の検索でも、坑内の細菌数は好気性、嫌気性共に坑外に比し著しく少いことが実証されている。近年抗生物質の研究は急速に進歩し、ペニシリンの偉力は既に決定的である。挫滅、汚染の甚だしい重症開放性骨折でも新鮮なものなら、機械的清掃を入念に行いペニシリンを使用すれば、創内で骨接合術を行つて一次閉鎖しても大なる危険はなからうと考えられる。山岸氏によると、最近アメリカ軍陣外科に於て早期手術的療法が行われ、見事な成果を挙げているそうである。私も開放性骨折の新鮮例に対し、直に創内骨接合術を行い一次閉鎖して良好な成績を挙げ得たと思うのでその経験を述べ御批判を乞う次第である。

創処理：受傷後何時間迄を新鮮とするかは、未だ経験例が少ないので茲に論じないが、私の取扱つた例は総て6時間以内である。創清掃こそは化膿防止上の基礎的要件であるが、その具体的手技については神中教授の整形外科手術書、Böhler 著 Die Technik der Knochenbruchbehandlung に詳しく記載されており大体之に倣つたので省略し、私の行つた方法を少し追加する。

「ショック」状態の者に対し直にリンゲル氏液、葡萄糖注射液に大量の輸血を行い速な恢復をみる。

断裂組織は総て出来るだけ縫合する。縫合不能の腱欠損部には直に自家腱又は筋膜を移植する。筋肉の挫滅片や汚染部を充分に切除すると大きな欠損を生じて

縫合不能となることはままあるが、機能障碍をおそれて切除が不充分となり化膿するよりも、必要なだけは思い切つて切除するが良いと考へる。このような場合は腱成形術の考を応用し、筋断端は類似機能を持つ他の筋に縫合して、幾分でも機能の恢復を良くするように心掛ける。

多くの場合皮膚縫合は強い緊張に抗して行はねばならぬが、一次閉鎖は是非とも達成したい。このため新しく切開を加へて皮膚縁をずらし、又は減張切開を施す。縫合部の緊張が強過ると末梢が壊死に陥ることがある。

抜糸の問題は一般に余り注意されないが、挫滅創の場合かなり重要である。若し化膿の兆候が現れたら適

宜抜糸して充分な排膿を計り、極力化膿の拡大を防がねばならぬが、縫合部は或程度湿潤するのが普通であり、皮膚縁が一部壊死に陥つたり縫合糸のため切れかかったりすることがあつても、少くとも2～3週以上を経てから抜糸するがよい。さもないと抜糸後、創縁が哆開し、筋膜や腱が露出して壊死に陥ることさえあり、治癒に多大の日数を要するからである。

骨接合術：創清掃が了れば直に骨折の整復、接合術を行うが、骨折の状況に応じて最も簡単な術式を撰ぶ不良な金属は仮骨形成を阻害し化膿誘発の危険があるし、複雑な操作はそれだけ人工的損傷が多くなるから私は専ら刺戟が少く入手の容易な絹糸で簡単な締結又は骨縫合を行い、骨移植を併用したこともある。金属材料を用いた経験はない。

第1表 入院治療した新鮮開放性骨折患者（一次切断を除く）

	例数	化膿	二次切断	原復	職婦
大腿骨	2	0	0	2	
脛骨 腓骨	3	0	0	2	
踵骨	1	0	0	1	
中足、趾骨	7	0	1	7	
上腕骨	5	0	2	3	
前腕骨	2	0	0	2	
中手、指骨	1	0	0	1	
計	21	0	3	18	

臨牀例：昭和24年11月以降26年1月迄の1年2ヶ月間に入院せしめて治療した新鮮開放性骨折患者は21名あり、一見して明瞭な開放性骨折で外創もかなり大きく、汚染甚だしく、治療の困難を思はせるものばかりである（第1表）。その中3名は末梢部壊死のため二次切断を余儀なくされたが、之を含めて全例に化膿を防止し得た。代表的な5症例を挙げると

症例 1：33歳の採炭工。24年11月22日落磐のため受傷し約4時間後収容。頭蓋底骨折を伴い一般状態不良左大腿中央に全周の%を越ゆる挫滅創あり、筋は背側を除く他の大部分が挫断され翻転し、大腿骨は横骨折に近い斜骨折、創は全面炭粉と泥土で著しく汚染。一応は切断を考えたが取敢えず輸血500ccの後、機械的創清掃を入念に行う。この間、興奮状態を呈し脈搏不良となつたので輸血を行いつゝ手術続行。骨に滑止めの目的で鑢きずをつけ絹糸で締結。P. 20 万単位を創内に注入。断裂筋、筋膜を夫々縫合、皮膚縫合して一次閉鎖。術直後も輸血を追加し総量1000cc。狂燥状態

を呈したため骨接合部が再び軽度転位したので鋼線牽引。P. 3 万単位宛3時間毎皮下注射総量233万単位。創は第一次治癒し骨接合部は約8週間後仮骨形成良好で可動性なく、下肢の短縮 1cm。後療法を熱心に行い歩行正坐に支障なく筋力も大である。

症例 2：45歳の仕繰工。26年1月8日落磐のため受創し約4時間後収容。右上腕中央の稍々上方に長さ9cmの挫滅創あり、二頭腕筋、烏喙腕筋、三頭腕筋外頭、三角筋附着縁は挫断、中枢骨折片は創外露出、創は全面多量の炭粉と泥土で汚染。主要血管神経の断裂はない。入念な創清掃。末梢骨折片端が多数の細片に割れているので、軟部組織との連絡をなるべく損傷しないよう注意して寄集め絹糸で一括締結し、その骨片中最大のものを内副子として利用し絹糸で両骨折片を接合。P. 10 万単位を注入。各組織を縫合して一次閉鎖。ギプス繃帯固定。術後前例と同様P注射総量 234 万単位。創は一期癒合したが仮骨形成遅延したので約3ヶ月後腸骨嚢より骨片採取して移植し、約6週で仮骨形成良好。前回埋没した絹糸は著色もせず、炭粉が少し残っていたが化膿巣や不良肉芽は何処にも見なかった。

症例 3：5歳の女児、25年5月24日リヤカーの車輪に右腕を挿込み、右上腕の肘上方に長さ5cmの挫滅創あり、二頭腕筋、上腕筋は挫断、骨欠損を伴う頰上骨折で中枢骨折端は創外露出、創は土砂で汚染、入念な創清掃の後、中枢骨折片端を末梢骨折片の骨髓腔に嵌入させ、断裂組織の縫合、P. 5 万単位注入して一次閉鎖。ギプス繃帯固定。術後 P. 5 万単位宛3時間毎の皮下注射総量18万。一期癒合して退院、家庭の都合で7週目来院時には癒合強固で、後療法により機能障碍なく治癒した。

症例 4：29歳の木挽工。24年10月21日製材機で左膝前面を削取られ、膝蓋骨の末梢%、膝蓋腱の全部を欠損、大腿骨外顆前面にも骨欠損、膝関節腔は開放している。創内骨接合例ではないが、膝蓋腱の代償として直に大腿広筋膜より筋膜片採取して移植した。P注入は5万単位。減張切開を加へ辛うじて一次閉鎖。伸展位ギプス繃帯固定。術後のP注射総量 216万単位。緊張が強かつたので創縁が少し哆開したが化膿することなく治癒し、膝の伸展力恢復し正坐も可能となつた。

症例 5：染料工場の曹達工。25年1月15日ベルトに捲込まれて受傷し約1時間後収容。右上肢の広汎な挫傷、右上腕骨は上、中 $\frac{1}{2}$ 境界部で開放性屈曲骨折、橈骨動脈々搏は触れ難いが爪床に血行を認める。創処理

P.10 万単位注入、創内で骨を絹糸縫合、一次閉鎖して外開位ギプス副子固定。術後のP注射総量 210万単位

位、末梢部が広汎な壊死に陥り第17日目に二次的に切断したが化膿をみなかつた。

結 語

新鮮開放性骨折のかなり重篤な症例に対し、入念な機械的創清掃は化膿防止の基礎要件であり、充分な清掃を果し得れば、ペニシリンを使用することにより、創内で直に骨折の整復動作を行い、或は骨接合術を施して創を一次閉鎖しても大なる危険はなく、殆んど転位のない、固定性の良い皮下骨折として取扱うことが出来る。このことは其の後の治療を容易にし、治療日数の短縮、解剖的に機能的治癒にとつて甚だ有利である。

骨接合材料は総て絹糸を使用し、単純な締結、簡単な骨縫合、稀に骨移植も行つたが、優良な金属を使えば更に良い成績を挙げ得るのではないかと推測される。

文 献

- 1) 山岸：複雑骨折と其の後遺症，南江堂，昭和14年
- 2) 堀田：第三回日本細菌学会九州地方会演説，昭和25年
- 3) 坂井：未発表

追加 西日本重工業長崎造船所病院 辻 重行
患者 25歳 男子 工員
原因及発生状況 25~9~16, カパナーの運転試験中にカプリングボルトにズボンの裾を引かけ、モーターに巻きこまれ右下腿を受傷した。

局所所見 右下腿下部内側に長さ20cm, 巾10cmの創があり筋腱を露出挫滅され、同下腿骨の異常可動性著明であつて、創腔より脛骨々折端が突出し、足関節も創底に露われ、サーチズボンの破片多数が関節腔内に嵌入散在してゐた。

手術所見 創腔特に足関節腔を清拭し、脛骨に対し銀線締結をなし、ペニシリン30万単位を創内に注入し一次的に縫合閉鎖し、ギプス副子を装著した。

経過 翌9~17よりペニシリン150万単位(3万単位宛毎3時間)筋注し、更に1日1回1万単位を創内に注入した。尙4日間はアセトスルファミン、ロヂノン混合液の動注を併用した処 9~20(術後第4日)に至り体温下降し、37度前後となる。其の後はスルファダイアゼン或はアセトスルファミンの静注及びパニールチンの皮下注射により、化膿防止に努めた。手術創は抜糸後一部哆開したが、之は縫合に際し皮膚を過度に緊張したための壊死に因るもので、其の後は良好な経過を取り、11~2 受傷後7週にして、ギプス副子を除去、11~18マツサーヂを開始した処16日後軽度の炎症を認めたため、1週間中止其の後続行したが 26~1~1 再び静止感染の虞があつたので、ペニシリン 120万単位を注射し、炎症消退後は自働運動、次いで歩行練習をなし、3~2退院、5~1より軽作業に就業してゐる。

以上、切断を思はしめた高度の挫滅創に於て、ペニシリン等の化学療法は併用により、骨接合術に成功した1例を追加報告する。

追 加 山口医大 伊 藤 鉄 夫

脛骨中下3分の1部の新鮮開放性横骨折の場合には将来遷延治癒又は、仮関節形成をなす場合が少くない。この場合、腸骨移植を行い、創を閉鎖して良結果を得た2症例がある。

追 加 日田市 原 文 吉

患者は16歳の男児、日田地方で木材運搬に使われている所謂「木馬」(舟型のもの)と木製レールに挟まれ左下腿は膝関節下、20cm部で横断骨折を起し、軟部皮膚及筋は約3分の2周に亘り断裂、約30cm離開してゐました。機械的に清掃並に挫滅軟部を切除し、骨折部は完全に整復した後、軟部の欠損に対しては絹糸による接近縫合を加えました。骨折に対しては、創内に固定物質を使用せず、有窓ギプス繃帯を使用するに止めました。現在術後5週、骨性癒合は堅硬で可動性を認めず、唯露出した脛骨縁には肉芽の発生遅々として進まず、約10日前に脛骨皮質を鑿除しました所急速に肉芽の発生を見、5日前に全創は肉芽で完全に被われるに至りました。近日中に植皮術施行の予定であります。

質 問 国立久留米病院 岩 崎 高 介

経験浅きため、未だ大腿骨折に演者の施された如き絹糸による接合術を行つた経験がないため、実施された絹糸による骨接合術々式及び手術後の療法をお尋ねしたい。

答

塚本俊明

骨接合術式は人工的損傷をなるべく避けるため、簡単な方法を採用する。例へば、斜骨折は締結、横骨折は教科書記載の如き骨縫合、粉碎骨折は骨片を出来るだけ寄せ集めて締結、報告した第2症例では粉碎骨

片中の最大のものを内副子として利用、即ち遊離移植の形式をとる。

創は極力全閉鎖す。皮膚欠損のため、縫合困難なるものは皮膚の成形を行つてでも閉鎖する。後療法は皮下骨折に準ず。(索引又はギプス縛帯)

Department of Surgery, Mitui-Miike Mining Company Hospital.

On the Osteosynthesis of Fresh Compound Fractures in the Wounds.

By

Toshiaki Tukamoto,

Although only debridgment was used hitherto in fresh compound fractures and the manipulations of fragments in the wounds were prohibited, the great advances of antibiotics in recent years made it possible to manipulate the fragments in the wounds.

Twenty-one osteosyntheses of fresh fractures in the wounds were performed by author as follows:

After perfect debridgment was done in all cases within six hours after injuries, ruptured soft tissues were sutured as much as possible and the fragments were fixed by single wiring or bone sutures with silks. In some cases complementary sutures for reducing of the tension of skin were necessary, and they were removed at least after 2 or 3 weeks. Penicillin in doses of about 2 million units was used in every case.

Although in all cases the wounds were considerable large and dirty, no suppuration was encountered after operations.

The author's method is very beneficial for reducing of time of healing and for anatomical and functional healing.

エレベーター墜落による外傷

日鉄二瀬外科医長 平野謙次郎
九大整形外科 上野行雄

昭和26年5月26日飯塚市外日鉄二瀬中央鉱に於てエレベーター事故により新鮮な踵骨々折を始め、主として人体の支柱をなす骨に骨折を生じた多数の患者に相遇する機会を得た。この種の災害の報告は極めて尠く、しかも踵骨を始めとして脊柱及下肢骨の殆んど凡てを網羅し縦軸衝撃による各種骨折を同一事故により多発したるは誠に興味深く、ここに其の大様を報告して御参考に供さんとす。

I 事故発生 の 状 況

本坑は立坑にして地表より坑底までは図I (略) に示す如く337米あり。人車巻揚機を運転中予