投与しか受けていないので、その影響は無視してよいと思う。

これ等血管の変化を Behçet Syndrome の主病因とするか、又は二次的变化とするかは議論の多い所と思われる。しかし、小血管の変化は、neuro-Behçet の場合必発の所見とされているし、又大血管系の動脈瘤、上大静脈閉塞症、心筋梗塞等が多くみられることから、Behçet Syndrome に於ける血管系変化は注目に価する。

本症に合併した関節変化は、支持骨梁の壊死にもとずく関節軟骨板のkollapsによるものと考えられる。しかしながら小さな壊死巣は周囲からの新生骨により完全に置換し修復され得るので、整形外科的治療法としては、その間免荷により関節軟骨のkollapsを防ぐことが大切である。症状の出現した時はすでに関節軟骨の可成りの変化を起しているものであるから、Behçet

Syndrome の患者で関節症状の訴えのある者、殊に体重負荷の大きい下肢関節のX線の検索は充分行う必要がある。即ち、極めて早期に発見し、完全免荷を行うことが、不可逆的関節変化を最小限に防止出来る唯一の方法と考える。

参 考 文 献

- 1) 朝岡：日本眼科学会雑誌。62：4，429，昭33，
- 2) Behçer, H.: Derm. Wschr.: 105, 1152, 1937.
- 3) 萩原：日本眼科学会雑誌。63：7，1505，昭34.
- 4) Kahlstrom, S. C.: Surg. Gynec. & Obstet. 68: 129, 1939.
- 5) Oshima, Y.: Ann. rheum. Dis., 22: 26, 1963.
- 6) 鹿野：日本眼科学会雑誌64：9，2341，昭35，
- 7) Strachan, R. W.: Ann. rheum. Dis., 22: 26, 1963.
- 8) 浦山：日本眼科学会雑誌。64：9，2263，昭35，
- 9) 臨床病理討議会記録，最新医学。19：7，1954，昭39.

痛 風 の 治 療 経 験

長崎原爆病院整形外科

三	原		茂
山	口	重	嘉
安	達	清	治
檜	林	好	隆

Treatment of the Gout

By

S. Mihara, S. Yamaguchi, K. Adachi
& Y. Narabayashi

Orthopaedic Clinic, Nagasaki Atomic Bomb Hospital

近年わが国における痛風の症例が漸次増加する傾向にあることはすでに諸家の報告にみられるところであるが、吾々も当科開設（昭和37年1月）以来現在まで約20例の本症を経験している。本症の診断・治療・病態生理等に関しては御巫博士・東大物療内科・九大整形外科等による啓蒙的な論文によつて充分に理解されていると思われるが、吾々の症例のうちから2,3を引用し治療上の問題点について若干の検討を試みたいと思う。

Smyth, Talbottらの診断基準によるまでもなく関節疾患の診療にあたり本症の存在を常に念頭におくならばその診断は比較的容易であると考えられるにもかかわらず、稀ならず化膿性炎症や関節リウマチ・変形性関節症時に外傷などと誤診される危険があることは事実である。

吾々の症例のなかにも誘因としてネコに足指をかまれたと云う訴えがあつたために化膿性炎症と誤診し、2回目の発作のとき本症の診断を確定した苦い経験が

ある。しかし吾々の大多数の症例は次のよる様に関節リウマチと誤診されて治療をうけていたものであった。

症例1 59才 男 会社役員 (図1)

38年1月新しい靴をはいて出張中、左足母指のMP関節に激烈な疼痛を訴え、某医により関節リウマチと診断され対症的に治療をうけた。その後同年内に3回の疼痛再発あり、両足母指・右足関節・右膝関節等にも波及し、発作時には39°C前後の発熱がみられたと云う。その後39年にもしばしば発作の再発あり、5回目の発作の際当科に紹介され痛風と診断されたものである。

血清尿酸値6.6mg/dl, CRP(6+), RA(-), 白血球5700, 血沈1時間値125。腎機能はいづれも著明に低下し又高血圧がみとめられた。

直ちにコルヒチンの投与を行うと劇的に急性症状は頓挫して歩行可能となつた。その後はアンツーランとデルタブタゾリヂンを併用し現在なお連用中であるが発作の発来はなく、患部にみられた小結節も消失しきわめて順調な経過をたどりつつある。

症例2 32才 男 僧侶 (図2)

約11年前野球練習中右足母指MP関節を捻挫して疼痛を来した。その後2,3回同様に野球練習中右足母指

MP関節を捻挫して、その都度激烈な関節痛になやまされたと云う。初発作2年位してから足関節にも疼痛を訴える様になり、某病院で関節リウマチの診断をうけている。その当時から罹患部位も各所にひろがり又発作回数も年数回程度に及ぶ様になって来たと云う。しかし権威あるクリニックで関節リウマチの診断をうけているために、その後に受診した一般医がすべてリウマチとしての治療に終始していたことは甚だ遺憾と云わざるを得ない。

本年2月頃から再び発作の発来あり、某医で約3カ

- 3) 山本・他：整形外科，15：613，1964.
- 4) 大島：日内会誌，54：291，1965.
- 5) Talbott, J. H.: Postgrad. Med., 5：386，1949.
- 6) Talbott, J. H.: J. B. J. S., 40-A：994，1958.
- 7) Smyth, C. J. et al.: Ann. Int. Med., 50：366，1959.

追 加

熊大整形 木村千仟

吾教室においても最近2年間に痛風症 25 例，痛風疑症 7 例を経験している。このうち若年者（23才）男に起つた痛風症 1 例の治療経験を追加する。患者は入院後 2 回の発作を起こしコルヒチンで消退している。X線上 Bone Cyst の像を思わせるが，試験切除で尿酸結晶を広汎に認めたため痛風と診断し，第 1 中足骨・基節骨の大半を切除し，そこに腸骨片移植を行なった。4 カ月後骨癒合良好である。Colchicine, Anturan, Probenemid など尿酸利尿剤を用いているが，高度の腎機能，肝機能の障害があり，血清尿酸値は尚やや高値を示している。

若年者の痛風は予後不良といわれるが，本症例も経過観察中である。

追 加

久留米大学 山田 牧

診断に際し routine として Murexid Test を行っている。定型的な場合は容易に診断がつくが，中間期の関節炎症状の殆ど認められないような罹患関節の微量の穿刺液で外来で容易に且つ速かに実施出来て便利である。本試験は尿酸塩倍数稀釈定性試験で 5mg/dl 以上であれば陽性に出現する。

急性関節炎発作に Colchicine や Butazolidin 全身投与のみより Predonine の関節内注入を併用した方が関節炎消退に効果的ではないか。

結節性痛風治療において尿酸利尿剤投与にて消失する結節の大きさの限度はどうか。

答

演 者

ステロイドホルモンを局所に使用した方がよいと思います。

又，結節性痛風治療で小さいものでは尿酸利尿剤投与で自然消失する様に思われる。ただし自家融解のみられるもの，骨まで侵襲が及んでいる場合はとつた方がよい様に思う。

発 言

九大整形 山本 真

痛風結節は小さなものは尿酸利尿剤で消失する。従つて大きなものでも手術療法を急ぐ必要はないと思う。Anturan と併用した Phenylbutazone の意味は何か。尿酸利尿剤にはお互に相反作用があるとされているので利尿効果がおちる恐れがある。

答

演 者

山本先生のおつしやる通りサルチレートには Anturan 等に対する抑制作用があると思う，私達が Anturan と Phenylbutazone と併用したのは特別の意味があるのではなく，まだ Anturan, Probenecid が入っていない事から使用していた関係上，ステロイドホルモンを使用するまでもないと思われるため，又何となく患者の違和感というものをとりのぞくために用いたのである。