Walder は (1973), 第 5 回国際高圧学会で, 米国海軍減圧表より, イギリス海軍減圧表使用者の方に骨壊死発生頻度が少ないことを発表し, 骨壊死を発症しない減圧表の作製を提案している.

Puffner (1962) は, 減圧の回数を減少させて一日一回の作業 (現実にはわが国では午前, 午後 2 回行われている) にきりかえることを提案している.

Ⅳ 結 論

欧米では, 多数の報告がある潜函工の骨壊死に関してわが国ではいまだまとまった報告がない. 今回潜函工の骨壊死を手術する機会を得, その病理組織像につ

いて述べ, また同一作業現場の潜函工 10 名の骨のレントゲンの観察を行ったところ, 6 名に骨壊死所見を得た. このことから推しても, わが国でも広く普及している潜函作業従事者に, かなりの頻度に骨病変が存在するのではないかと考えられる. 潜函工の骨壊死は, 発生して後は進行を止めることは極めて困難であり, その病因と予防法の解明は急務であり, われわれも一部言及してみた.

国土総合開発の名のもとに潜函作業は, 将来ますます広く行われることが考えられるが職業者としての骨壊死の問題を決して安易にみなすことはできないと思われる.

^{99m}Tc -リン酸化合物による骨関節シンチグラムの検討

北里大学医学部整形外科

真 角 昭 吾・山 本 真
村 田 稔・有 富 寛

北里大学医学部放射線科

石 井 勝 己

The Clinical Evaluation of ^{99m}Tc -Pyrophosphate Scintigraphy for Skeletal Diseases.

by

S. Masumi, M. Yamamoto, M. Murata
H. Aritomi (Dep. of Orthopedic Surgery),
and K. Ishii (Dep. of Radiology).

School of Medicine, Kitasato University, SAGAMIHARA.

86 cases of several kinds of bone and joint diseases were scanned with ^{99m}Tc -pyrophosphate as bone imaging agent, and evaluated in comparison with clinical and radiological findings.

These include 9 cases of inflammatory disease of bone, 5 cases of rheumatoid arthritis, 11 cases of osteoarthritis of knee, 8 cases of avascular femoral head necrosis, 15 cases of primary bone tumor (benign 10 and malignant 5), 32 patients with cancer and 6 cases of the other diseases.

Using Hitachi dual 5 in. whole body scanner and Nuclear Chicago Pho/gamma camera, bone scans have been carried out routinely 3-5 hours after intravenous administration of 5-10 mCi of ^{99m}Tc -pyrophosphate.

The image obtained with ^{99m}Tc -pyrophosphate is more sensitive and effective than those of ^{85}Sr , ^{87m}Sr and ^{18}F . High concentration of tracer was more clearly demonstrated in the presence of abnormal X-ray views as inflammatory disease, bone necrosis, degenerative

joint disease and malignant bone tumor. However, even in little or no evidence of definite X-ray view, abnormal uptake of ^{99m}Tc could early represent the existence of bone involvement and its extent. With ^{99m}Tc -bone scanning, the beneficial informations were obtained in early diagnosis, activity or process of the diseases.

X線写真が骨疾患の診断や治療に不可欠の手段であるのは申すまでもないが、骨陰影の異常をX線像でとらえるには30~50%の骨質減少が必要とされている。従って radioisotope を用いてより早期に骨の病的過程を診断しようとする方法が進歩してきた。いろいろの γ 核種を投与し、シンチカメラおよびスキャナーで RI-image を描写すると疾患の早期診断に有力な情報がえられ、X線写真以上の利用価値を認める事がある。私共は今回各種骨関節疾患のシンチスキャンニングを行ない、臨床所見、X線所見と比較検討したので報告する。

1. 装置および方法

測定装置は全身スキャンの場合、日立5インチ対向 whole body scanner を使用し、異常部位の局所スキャンを行なう場合には Nuclear Chicago 製の Pho/gamma camera を用いた。所要時間はいずれも20~40分である。

骨親和性の核種として従来 ^{85}Sr や ^{87}mSr が用いられてきたが、半減期や γ 線エネルギーの大きさ、バックグランドなどの点から、最近では ^{18}F 、 ^{99m}Tc などの核種がもっぱら利用される傾向にある。 ^{99m}Tc は142 keV の γ 線エネルギーを有し、半減期は6.04時間と短かく、被曝線量が少ないため、大量投与や反復投与が可能となり、安全に使用される利点がある。

^{99m}Tc 標識リン酸化合物には polyphosphate, diphosphate, pyrophosphate などがあるが、得られるシンチグラムに大差なく、もっぱら ^{99m}Tc -ピロ磷酸を使用した。5~10 mCi の ^{99m}Tc を静注したのち、3~5時間後にスキャンを行なう。ピロ磷酸の血中よりの消失速度は早く、バックグランドの少ない良好なシンチグラムが得られる。

2. 検査対象

癌患者32例、原発性骨腫瘍15例(良性10例、悪性5例)、変形性膝関節症11例、骨の炎症性疾患9例、大腿骨頭壊死8例、関節リウマチ5例、その他6例、合計86例である。

3. 結 果

まず全身スキャンの際の年齢による RI 集積の生理的分布および2, 3の代表的疾患を示す(図1)。

骨発育期では幼若者ほど脊椎、骨盤、四肢関節端とくに骨発育層に著明な集積を認めるので読影上注意を要する。常に左右を比較対照せねばならない。年齢が増すとともに骨への集積は全般的に低下するが、それでも顔面骨、脊椎、骨盤への摂取は幾分多い(図1, a, b)。

Ewing 肉腫、癌の骨転移、関節リウマチの例に見られるごとく(図1, c, d, e), ^{99m}Tc -ピロ磷酸による骨スキャンは病変の全身的スクリーニングに最も適しており、炎症、変性疾患、骨腫瘍の部位や広がり、骨転移の有無をよく表現している。

つぎに骨スキャンによって臨床上有効な情報が得られた疾患を示し検討を加える。

骨髓炎(図2)

初期の急性骨髓炎でX線像ではいまだ異常を認めない。骨スキャンでは大腿下端、脛骨上端に RI の集積著明で、活動性の病巣の範囲が明確に描出されている。もちろん scan のみでは骨腫瘍との鑑別はできないが、他の臨床、検査所見を考慮して炎症と判断した。炎症の鎮静化とともに RI 集積は消褪するので治療過程の観察にはX線所見以上に利用価値がある。しかし骨全体に硬化像を示す慢性骨髓炎でも RI 集積が一部に限局する例もあり、X線像と骨スキャンとは必ずしも一致しない。骨スキャンは過去の“Narbe”とは関係なくむしろ現在の病勢を示すものである。

仮関節(図3)

骨折に関する経験は少ないが、ここに2つの異ったタイプの仮関節を示す。上の例は骨接合術後8カ月目の下腿仮関節でX線写真では骨硬化、骨壊死の所見があり、仮骨形成はない。スキャンではX線変化の広がりとは一致して RI の強い集積がみられ、炎症性の仮関節を暗示する。手術を行うと腐骨を伴う感染性の仮関節であった。下の例は骨接合9カ月後の橈骨仮関節である。内骨膜、外骨膜の広範な破壊のため仮骨形成

a 8才, 正常 b 51才, 正常 c 18才, ユーイン
グ肉腫 d 58才, 癌骨転
移 e 33才, 関節リ
ウマチ

図1 全身スキニング, 正常例と2, 3の疾患

図2 22才, 女, 右大腿骨骨髄炎

は全くおこらず, 骨スキャンでも骨折部にはRI全く集積せず, 無反応性の仮関節といえる. このような無反応性の骨折には早期の骨移植が必要である.

図3 (上) 55才, 男, 左下腿 (炎症性) 仮関節
(下) 44才, 女, 右橈骨 (無反応性) 仮関節

関節リウマチ

X線像で骨関節にまだ変化が認められない時期でも, 関節包, 滑膜の炎症が著しいときには関節周囲骨

のスカン陽性像がえられる。

リウマチ性病変により近隣骨の **turn over** が亢進している事を示している。骨軟骨の破壊が進行してくれば R I の骨への集積も著明となる。

図4の例では手関節にリウマチ性の炎症性破壊が強く手関節全体に高度の集積像を認める。ここで興味があるのはX線上骨変化のない右母指MP関節、左示指MP関節(矢印)に R I 集積を認め(局所にも炎症症状が強い)、一方右示指MP関節にはX線上骨破壊像があるにも拘らず、炎症なく、R I 集積もみない。この事は骨破壊があっても R I 集積がなければ病巣は鎮静化し、X線所見が正常でもスカン陽性であれば活動性と判断され、今後の進行が予想される。

図4 33才，女，多発性関節リウマチ。
右示指 MP に骨破壊あるも R I 集積をみない。

つぎは膝関節リウマチに対して ^{99m}Tc -pertechnetate による関節スカンを行ったものである(図5)。

^{99m}Tc 集積像によって滑液膜の炎症の範囲が明確に描写されている。関節スカンは滑膜炎の範囲や程度を知るとともに、滑膜切除などの治療指針を立て、あるいは治療経過を追跡するうえに役立つ方法と

図5 43才，女，慢性関節リウマチ。
 ^{99m}Tc - O_4 による関節スカンニング

図6 69才，女，両膝変形性関節症。
脛骨内顆に集積著明。

いえる。

変形性膝関節症(図6)

11例15関節に行なった。X線所見の関節裂隙狭窄化、骨硬化に相当して内側部に集積している。大腿内顆より脛骨内顆部により強い集積がみられ、全例ともこの内側型を示していた。前後像でみえる膝蓋周囲の異常集積は patello-femoral の関節症が重なって表現されたもので側面スカンで一層ははっきりと観察しうる。これら関節症に対し hemiarthroplasty を行なった症例の中に、内側脛骨板挿入後、骨軸が外反位と

図7 大腿骨頭壊死

- (上) 26才, 男, 特発性
(中) 65才, 男, 頸部骨折後
(下) 33才, 女, 特発性

なり, 関節外側にR I 集積が増した例, 術後骨軸が外反したにも拘らず, なお内側に異常集積を残している例, さらに脛骨板周囲およびそれに対する大腿内顆面に集積を認める例などがあり, 異物反応や荷重面の移動に対する骨反応を今後追跡する必要がある。

大腿骨骨頭壊死

本症の早期診断に骨スキャンは有力な手段といわれている。私どもの行なった8症例はいずれもすでにX線所見で診断していた例であり, 骨スキャン自体によ

り本症と診断した例はない。

各例とも病期は一樣ではないが, どの時期の壊死でも大腿骨頭に異常なとり込みを認めることができる(図7, 上, 中, 下)。

図7(上)は両側罹患例で, 右はすでにX線診断可能な壊死像を示している。左側はいまだ股関節症状はないが, 骨スキャンで骨頭全般に軽度集積を認め, 断層撮影を追加して壊死と思われる所見をえている。図7(中)は大腿頸部骨折後10数年を経て発症した骨頭壊死である。

X線像で認めうる病変部以外にも広くR I のとり込みがあり, 壊死巣周辺にも広く骨代謝異常が拡大しているものと想像される。図7(下)の例ではX線像でみる骨頭壊死部にはR I 集積が少なく, むしろ骨頭内下側の capital drop——反応性骨増殖部と転子間部に最も強い集積像を認める。以上のごとく骨頭壊死ではどの病期でも ^{99m}Tc -ピロ磷酸のとり込み増加を認めうるが, 集積状況は病期や壊死の範囲, 周囲の骨反応によって必ずしも一定ではない。

一概に壊死といっても, 組織の死滅, 崩壊の方向のみに進むのではなく, 壊死に伴う周囲組織の炎症過程あるいは壊死に対する生体の修復機転が常に進展しているものと思われる。

良性骨腫瘍

エオジン好性肉芽腫, 外骨腫, 軟骨腫, 類骨腫, 線維性ディスプラジー, 骨囊腫, 動脈瘤性骨囊腫など10例の良性骨腫瘍について骨スキャンを行なった。このうち骨囊腫はR I 集積を示さず, 外骨腫も発育期以後の成人例のためか全くとり込みを認めなかった。そのたの良性腫瘍についてはR I とり込みを認めるとはいえ, その集積度はX線像とほぼ同様か, むしろ狭く, 現在のところX線像以上の有用性はない。ただ多発性の良性腫瘍では他の部位の病巣の発見に役立つことがある。

悪性骨腫瘍

私どもは悪性骨腫瘍が疑われる場合にはまづ全身スキャンにより病巣のスクリーニングを行なったのち, 疑わしい部位の局所スキャンをX線像と対比して詳細に検討することになっている。図8は左大腿骨遠位端に発生した骨肉腫で, すでに定型的な骨肉腫のX線所見により診断は容易である。骨スキャンではX線上の骨形成の範囲以上に軟部組織まで広く異常集積像が描画され, 腫瘍の増殖や浸潤範囲の判断に役立っている。

図8 9才, 女, 左大腿骨骨肉腫

従って外科的治療のうえでは切除域の決定や切断高位の1つの指標となりうる。健側の膝関節部への集積は正常像で, growth plate の骨発育によるものである。図2の骨髄炎例でもわかるとおり, スキャン陽性像には疾患特異性はなく, 炎症や腫瘍, 良性～悪性の鑑別はできない。

多発性骨髄腫にはX線所見上, 溶骨性の変化をきたす場合, あるいは単に骨粗鬆性の変化にとどまる場合があるが, とくに後者では普通の osteoporosis と鑑別困難である。図9は多発性骨髄腫の1例である。X線所見陽性部に R I の異常集積をみるほか, osteoporosis しか示さない部にも強いとり込みがあり, またX線所見異常を認めない部にも明らかにスキャン陽性像があり, 病巣発見にはX線写真以上の有効性を発揮している。本例に ^{67}Ga -citrate による腫瘍スキャンも施行してみたが, $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -ピロリン酸による骨スキャンにくらべ, 病巣部への ^{67}Ga の集積度はよくなかった。

骨転移腫瘍

骨スキャンのもっとも有意な利用法の1つは癌骨転移の早期発見である。癌の前病歴ある患者で, 骨スキャンにより一定部位に局限した R I の強い集積像を認める場合には, まず癌の骨転移が疑われ, X線像と対比しながら注意深い追跡が必要である。

一例を示す。図10は前立腺癌手術後の患者で全身の骨関節痛を訴える。X線写真では全脊椎, 骨盤, 仙骨に骨硬化性の転移巣を思わせる像を認める。骨スキャンでも躯幹部の異常な R I 集積はX線像とあわせて転移巣と判断されるが, 両股関節や右肘関節のような著明な集積像はX線所見が陰性でも骨転移を疑わせるに充分である。

以上骨腫瘍, 癌患者についてスキャン陽性率

図9 56才, 女, 多発性骨髄腫

左上: $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -PP による骨スキャン

右上: ^{67}Ga による腫瘍スキャン

図10 59才, 男, 前立腺癌骨転移

をみると, 良性骨腫瘍では10例中8例の陽性であり, 悪性骨腫瘍(骨肉腫2例, ユーイング肉腫1例, 骨髄腫2例)は5例中5例(100%)に陽性であった。このうち骨髄腫の1例はX線所見陰性, 骨スキャン陽性を示している。

癌患者については X線像で骨転移と思われる所見のあるもの12例中スキャン陽性は12例全例(100%)

であった。X線像でいまだ異常の認められない部位に R I の異常集積を認め、骨転移が疑われたのは 20 例中 11 例 (約 50%) であった。

ま と め

骨関節の炎症性疾患、関節リウマチ、変形性関節症、大腿骨頭壊死、骨折、骨腫瘍、癌の骨転移など計 86 例に ^{99m}Tc -ピロ燐酸による骨シンチスキャンニングを行ない、臨床症状、X線写真と比較検討した。

骨スキャンによる R I の集積状況は局所の骨代謝をよく反映し、病変の全身スクリーニング、癌骨転移の早期発見、局所病変の拡がりや病勢の判断、治療指針や経過観察などに有力な情報を提供する診断法であることを認めた。

その集積度は骨の破壊や修復による局所の骨 turn over に密接に関係して変化するものと考えられるが、 ^{99m}Tc で標識したピロ燐酸やポリ燐酸は骨 turn over のリン酸代謝の面をとらえているものであり、Ca, Sr, F の生体内の代謝動態と同一レベルで解釈できるかどうかには疑問が多い。実際にこのようなリン酸化合物が骨塩結晶と強い親和性をもって結合するの、collagen のリン酸化に関与するの、骨集積性を示す機序はなお明らかではない。ただ ^{99m}Tc -ピロ燐酸のとり込みが組織や疾患に特異的なものでないだけに、骨の炎症、変性、腫瘍などの鑑別、良性～悪性の判断は慎重でなければならない。今後組織診との比較検討を含めて、false positive～negative の問題も解決の必要があろう。要するに X線写真が今までの process の到達点を表現しているのに反して、骨スキャンは現時点での生体の reaction を観察していることになり、両者を併せてよりすぐれた情報をつかむことができる。

文 献

- 1) 伊丹康人編：核医学応用の実際。一骨、関節、筋肉一。医学図書出版、昭和48年。
- 2) 川名正直ほか：最近の各種骨スキャン用アイソトープによる骨腫瘍の診断。日医放誌。33: 661-670, 1973.
- 3) Pendergrass, H. P. et al. : The Clinical Use of ^{99m}Tc -Diphosphonate (HEDSPA). Radiology, 107: 557-562, 1973.
- 4) Subramanian, G. et al. : ^{99m}Tc -Labeled Polyphosphate as a Skeletal Imaging Agent. Radiology, 102: 701-704, 1972.
- 5) 山本光祥ほか：加齢者の骨シンチグラム。(1) ^{99m}Tc ポリリン酸による骨シンチグラム。核医学, 9: 561-568, 1972.
- 6) 第13回日本核医学会。核医学, 10(3): 263-269, 235-239, 1973.

追加, 質問 鳥取大学整形外科 前山 巖

^{99m}Tc は骨の吸収添加機転のいかなる過程を直接表現するのでしょうか。

質問 九大整形 光安 元夫

前の発言に関連しますが、 ^{99m}Tc にピロリン酸を付けると骨がとりこみやすいとの事ですが、その機転に対して何かお考えがありましたらお教え下さい。

解答 北里大学 真角 昭吾

① 前山先生に対して

^{99m}Tc で標識する物質によってどこに集積するかは異なる。関節 Scan には ^{99m}Tc pertechnetate を用い、骨 Scan は ^{99m}Tc -ピロリン酸である。ピロ燐酸が骨塩のどの相にとり込まれるかは解っていない。ただ骨の turn over — resorption や accretion の変動を表現しているものと思う。

② 光安先生に対して

ピロ燐酸の骨代謝に関する意義については Fleisch らが述べている石灰化抑制物質—およびピロフォスファターゼ (アルカリフォスファターゼ) の関与位しか理解していない。いづれにしてもリン代謝の面からとらえているものと思う。