シンポジウム—4

骨 肉 腫 の 治 療

術前のアドリマイシン大量間歇動注と
患肢を温存した広汎切除術について

福岡大学整形外科

葉 山 泉・高 岸 直 人

諫 山 照 刀・桜 井 日出也

タケシマ整形外科

竹 嶋 康 弘

Treatment of Osteosarcoma

(Preoperative intermittent arterial infusion of high
dose adriamycin and wide resection of tumor)

by

S. Yoh, N. Takagishi, T. Isayama, H. Sakurai

Faculty of Medicine, Fukuoka University, Japan

Y. Takeshima

Department of Orthopaedic Surgery Takeshima Hospital

Amputation for two cases and wide resection for a case of Osteosarcoma who were decreased tumor growth by preoperative intermittent arterial infusion of high dose adriamycin is described.

It may be effective to prevention against pulmonary metastasis that high dose adriamycin infusion into the central vein or pulmonary artery.

福岡大学病院開設以来の骨軟部腫瘍の入院患者総数は骨腫瘍 86 例、軟部腫瘍 64 例の計 160 例であり、このうち骨肉腫は 6 例である。

これらの治療成績を報告し、現在われわれが行なっている術前の ADM 大量間歇動注法 (one shot 注入) と患肢を温存した広範切除術の可能性について、われわれの考え方を述べたい。

治療法と予後

症例は男女各々 3 名で、年齢は 7 才から 55 才、原発部位は大腿骨 3 例、上腕骨、腸骨、腰椎の各 1 例である。治療法は根治手術を原則としているが、手術不能な脊椎や、初診時すでに広汎な転移が認められたものには放射線治療を施行した。全例に化学療法を併用

しており、うち 3 例には術前の ADM 大量間歇動注を施行した。転移は肺転移 3 例、骨転移 1 例で、転移が認められないのは 2 例にすぎない。生存例は 3 例で、うち 1 例には肺転移が認められる (表 1—上)。

昭和 52 年以降の福大における骨肉腫の化学療法は、国立がんセンター福岡らの VCR, CQ の術前持続動注と ADM の術前間歇動注及び術後の ADM 大量間歇全身投与の変法である。即ち主幹動脈分枝より硬麻チューブを挿入留置し、VCR 1 mg, CQ 3 mg, MDS 600 mg の動注下に生検を施行し、1 週間後の創治癒と組織診断を待って、UK, MDS を併用した ADM 0.8 mg/kg の大量間歇動注 (one shot 注入) を連続 3 回 1 クールを施行。血液像の改善がみられる 3～4 週後の自覚症状の改善と腫瘍の縮小がみられたとこ

ろで根治手術を施行。ADM 動注後より手術までの休薬期間にも VCR, CQ を間歇動注し、術後は ADM の全身大量間歇投与（中心静脈または肺動脈注入）を 2 クール、その後は半量の全身投与（one shot 静注）を 1 カ月間隔で約 1 年間続けることにしている。根治手術は、化学療法効果として腫瘍の縮小がみられたもので、術後の組織欠損の部位、程度により、機能的な四肢の残存が可能と思われる場合には、積極的に患肢を温存した広汎切除術を施行することを原則としている（表 1—下）。

（症例 4）21 才，女，左大腿骨々肉腫（図 1）

5 カ月前に膝関節痛，2 カ月前に同部の腫脹に気付

き，近医を受診し当科を紹介された。初診時は左膝上部内側の腫脹及び運動痛が認められ，単純レ線で大腿骨遠位骨幹端部の骨吸収陰影がみられ，C T では骨髓内の不規則な斑状硬化を伴った腫瘍陰影が骨皮質を破り，前内側及び後側には骨外腫瘍を形成している。VCR 1 mg, CQ 3 mg, MDS 600 mg 動注下の生検にて Osteosarcoma の組織診断を得たので，同量の VCR, CQ, MDS を 2 回，ADM 20 mg 1 回を間歇動注したところで，ADM の大量間歇動注を施行した。即ち MDS 600 mg に続いて ADM 40 mg (0.9 mg/kg) の間歇動注を連続 3 日間 1 クールを施行し手術まで休薬した。入院時の腫瘍部大腿周径 32.5 cm が

症例	性	年齢	原発巣	放 治	化 学 療 法	手 術	転 移	予 後
1	男	42	腸骨	^{60}Co	Ex, VCR	(—)	肺 (0)	死 (1)
2	男	19	腰椎	^{60}Co	VCR, CQ, ADM	(—)	骨 (5)	死 (11)
3	男	14	大腿骨	(—)	ADM	切 断	肺 (21)	死 (24)
4	女	21	大腿骨	(—)	VCR, CQ, ADM*	切 断	(—)	生存 (26)
5	女	55	上腕骨	(—)	VCR, CQ, ADM*	広 切	肺** (6)	生存 (11)
6	女	7	大腿骨	(—)	ADM*, MTX, VCR, CQ	(—) 丸山ワクチン	(—)	生存 (6)

*大量間ケツ動注

**肺切 ()は月

表 1 治療法と予後

ADM 大量間歇動注時には 35 cm と増大していたが、4 週間後の手術時には 31 cm と縮小し、自・他覚症状の改善がみられた。しかし、レ線のみでみる限りでは、骨破壊が進行したので大腿切断術を施行した。腫瘍の横断断面では、骨髓内に充満した、一部に囊腫様変化を伴う海綿様組織が骨皮質を破壊し骨外腫瘤を形成しているものの、骨膜様被膜に包まれており、血管神経束と筋組織を容易に剥離する事ができた。組織学的にも広汎な変性壊死組織が充満しており、生きた腫瘍細胞を認めることができなかった。術後は前述の如き ADM の全身投与を行ない、26 カ月の現在、肺転移もなく生存している。本例は患肢を温存した広汎切除術が可能であったのではないかと考えている。

図1 症例4 組織は左が生検時、右が手術時のもの
(症例5) 55才、女、右上腕骨骨肉腫(図2)

本例は前回の本学会で報告した症例で、VCR, CQ, MDS 動注下の生検と、MDS, UK と併用した ADM 40 mg (0.6 mg/kg) の連続3日間1クールの間歇動注にて、著明な腫瘍の縮小と疼痛の緩解がみられたので、上肢を温存した広汎切除術 Inter scapulo-thoracic resection を施行した。切除標本では、大きな囊腫様変化を伴った変性壊死組織が充満して

り、生きた腫瘍細胞は辺縁に少量認められたのみである。術後の残存肢の機能は良好で、肩の外転、内旋も可能で肘伸展力の低下以外末梢は正常で、書字、食事、着衣動作など殆んど患肢を使用しており、高岸の肩関節機能評価も16から46+αと上昇し、患者もわれわれも満足している。本例は肥満体であり、1回投与量が0.6 mg/kg で、0.8 mg/kg に達しなかった事と、遠方のために術後の ADM 投与が2クールのみで終った事が反省される点で、術後5カ月と8カ月に右肺転移巣が出現した。これに対しては2回にわたり、肺葉部分切除術(S₆)と下葉切除術(S₆, S₈)を施行。術後は Hyper alimentation を応用し、中心静脈に留置したチューブより ADM, MTX, EX を注入している。なお、術後10カ月の現在局所再発は認められない。

(症例6) 7才、女、左大腿骨骨肉腫(図3)

半月前に発症、近医より当科を紹介されたが、某大学整形外科に緊急入院、ADM の大量間歇動注(総量51 mg)後に小児科で MTX の超大量療法(7回、100 mg/kg から 300 mg/kg まで増量)をうけ、腫瘍の縮小と疼痛の緩和をみて一時退院。その後も MTX の超大量療法(2回)をうけたが、腫瘍の増大と疼痛の増強をきたし、切断術を勧められるも拒否。近医にて丸山ワクチンのみ投与をうけていたが病的骨折をおこし緊急入院。入院時は左大腿遠位部の腫脹と疼痛が著明であり、ギプス包帯固定。動脈挿管後に VCR 1 mg, CQ 1~2 mg, MDS 600 mg の間歇動注3回、ADM 16 mg (0.8 mg/kg) の大量間歇動注を3回1クールを施行。3週間後より腫瘍の縮小と自・他覚症状の改善がみられ、4週間には腫瘍部大腿周径は37.4 cm にまで縮小した。この時点で根治手術を勧めたが母親は丸山ワクチンの効果と判断し、以後の化学療法をも拒否しつづけた。しかしそれ以後は再び腫瘍は増大し続け、4週間の間に46 cm に達した。そこでやっと切断術を承諾したのでこれを施行した。現在肺転移は認められない。

ADM 大量間歇動注8週後の切除標本は囊腫様変化を伴う大きな中心性壊死が認められるが、組織学的には生きた腫瘍細胞が広範囲に認められる。

考 察

骨肉腫の治療は根治手術が主体をなしているものの、即時または早期切断術のみでは決して良好な成績

図2 症例5 組織は左が生検時、右が手術時のもの

図3 症例6 組織は手術時のもの

を得ることができない。

術前処置として、放射線療法や化学療法などが併用されているが、ADMとMTXの大量間歇投与法の開発は化学療法への期待を一層強くした観がある。

肺転移の予防として、試験開胸、全肺野照射などの報告があるが、決して有効な手段とは考えられない。上半身動注は理論的にすぐれた方法で、良好な成績が報告されているが、1回限りに終わるという欠点がある。われわれは、Hyperalimentationの手技を応用し、中心静脈または肺動脈に留置したチューブにて高

濃度の抗癌剤を肺動脈に到達させる事を考慮している。この方法は手技が簡単で、頻回投与が可能であるという利点がある。

また、現在われわれが施行しているVCR、CQ及び大量のADMの術前間歇動注法は3例に達しており、全例に腫瘍の縮小と自覚症状の改善がみられ、4週後に手術をした2例では、組織学的にも有効であった事が確認された。ADMの投与量は0.8 mg/kgは必要のようである。この事は骨肉腫に対する患肢を温存した広汎切除術の適応範囲を拡大していくものと思う。

そのためには、早期発見、早期治療が必要である事はもちろん、腫瘍の局在状態を正

確に把握し、術後の骨欠損部の補填法に工夫が必要と思われる。後者に対しては、micro vascular surgeryやceramicの発達が期待されるし、前者にはCT scanの応用が考えられる。CTは骨外腫瘍をも明確に描出し、その局在状態を立体的に認識する事が可能になるので、広汎切除術の術前検査として非常に有用である。われわれは、CT所見による腫瘍の占居部位と浸潤度に組織型を組み合わせる手術難易度分類即ちABC分類を試み、治療方針の決定に役立てている。症例4, 5, 6はそれぞれAB'C, BB'C, CB'C

type であり、症例 4, 5 では血管、神経束の剥離温存が可能と推測される (図 1, 2, 3)。

ま と め

1. 骨肉腫 3 例に対し、術前の ADM 大量間歇動注にて全例に腫瘍の縮小と疼痛の緩和をみた。動注後 4 週で手術した 2 例は組織学的にも化学療法効果が認められた。

2. 2 例に切断術、1 例に患肢を温存した広汎切除術を施行、後者に肺転移を認め肺葉切除を施行、全例局所再発は認められない。全例生存中である。

3. 肺転移予防として ADM の中心静脈または肺動脈注入は有効と思われる。

参 考 文 献

- 1) 赤星義彦: Chronometri Infusor 悪性骨腫瘍の治療への応用, 臨整外, 1: 315-319, 1966.
- 2) Burwell, H. N.: Resection of the Shoulder with Humeral Suspension for Sarcoma Involving the Scapula, J. Bone & Joint Surg. 47-B: 300-303, 1976.
- 3) Etcubanas E. et al.: Adjuvant Chemotherapy for Osteogenic Sarcoma, Cancer Treat. Rep. 62: 283-287, 1978.
- 4) 福間久俊ほか: 骨腫瘍の肺転移, 肺と心: 23: 229-236, 1976.
- 5) 福間久俊ほか: 骨肉腫の治療成績—持続動脈内制癌注入例を中心に—, 一日癌治, 11: 568-569, 1976.
- 6) 増田元彦ほか: 四肢悪性腫瘍に対する動脈内持続注入法, 癌の臨床, 10: 344-, 1964.
- 7) 仁井谷久暢: 抗癌剤と lysome labilizer の併用, 最新医学, 28: 912-919, 1973.
- 8) 大野藤吉: 骨腫瘍の治療—骨肉腫—, 癌と化学療法, 6: 481-491, 1979.
- 9) Rosen, G. et al.: Chemotherapy, En Block Resection, and Prosthetic Bone Replacement in the Treatment of Osteogenic

- Sarcoma, Cancer, 37: 1-11, 1976.
- 10) Rosen, G. et al.: Chemotherapy and Thoractomy for Metastatic Osteogenic Sarcoma, A Model for Adjuvant Chemotherapy and Rationale for the Timing of the Thoracic Surgery, Cancer, 41: 841-849, 1978.
- 11) Rosen, G. et al.: Primary Osteogenic Sorcoma The Rationale for Preoperative Chemotherapy and Delayed Surgery, Cancer, 43: 2163-2177, 1979.
- 12) Salzer, M. et al.: Indication for Radical Resection of Malignant Bone Tumors. Results in Forty-Six Cases, Ital. J. Orthop. Traumatol, 3: 155-166, 1977.
- 13) Shepp, M. et al.: Adjuvant Treatment of Osteogenic Sarcoma with High-Dose Cyclophosphamide, Cancer Treat. Rep. 62: 295-296, 1978.
- 14) Sutow W. W. et al.: Adjuvant Chemotherapy in Primary Treatment of Osteogenic Sarcoma A Southwest Oncology Group Study, Cancer, 36: 1598-1602, 1975.
- 15) Sutow W. W. et al.: Multidrug Adjuvant Chemotherapy for Osteosarcoma: Interim Report of the Southwest Oncology Group Studies, Cancer Treat. Rep. 62: 265-269, 1978.
- 16) 和田武雄ほか: 制癌剤効果の増強, 癌の臨床, 17: 173-177, 1971.
- 17) 葉山泉ほか: 骨軟部腫瘍における Computerized Tomography の応用, 整形外科と災害外科, 27: 161-163, 1978.
- 18) 葉山泉ほか: 骨軟部腫瘍における Computerized Tomography の応用, 日整会誌, 53: 1394-1397, 1979.
- 19) 葉山泉ほか: 悪性骨軟部腫瘍に対する患肢を温存した広汎切除術 (Intercapulo-thoracic resection と Hemipelvic resection の各 1 例), 整形外科と災害外科, 28: 411-414, 1979.
- 20) 葉山泉ほか: 骨軟部腫瘍における CT と超音波の応用, 臨床と研究, 57: 1127-1138, 1980.