脊柱側彎症における背部皮膚温の検討

総合脊損センター整形外科

佐々木 邦 雄・角 田 信 昭

原 田 博 文・谷 村 俊 次

足 達 裕

別府整肢園整形外科

佐 竹 孝 之・岩 田 信 彦

後 藤 元 徳

Thermographic study in idiopathic scoliosis

by

K. Sasaki, N. Tsunoda, H. Harada,
S. Tanimura Y. Adachi

Orthopaedic Surgery, Spinal Injuries Center, Iizuka.

T. Satake, N. Iwata and M. Goto

Orthopaedic surgery, Crippled Children Hospital, Beppu.

Although etiology of idiopathic scoliosis is unknown, we designed to investigate thermography of back in idiopathic scoliosis and discuss its usefulness. Thermographic examination was performed in 142 children. 19 children had straight spines, 24 had functional curves and 99 sustained idiopathic scoliosis. We compared their thermographies and X-ray films of them. We showed criteria of the thermography. We suggested that in screening of spinal deformity thermographic observation was useful and it gave us functional factor in scoliosis.

緒 言

特発性側彎症の原因・予後予測について現時点では明確なものはない。側彎症の治療は Milwaukee brace を代表とする矯正装具, Harrington instrumentation system 等の手術的治療の進歩により積極的に行われている。しかし、治療の重要な面として予防医学の観点をも含めた早期発見へのアプローチも本疾患の性質上大切な事柄である。我が国においては昭和54年より学童の定期健康診断の際、脊柱変形の有無をチェックすることが義務づけられた。早期発見の手段として現在まで、視診、背部隆起測定法、モアレ法が用いられている。我々は第15回側彎症研究会において、構築学的側彎症における背部皮膚温は何等かの形で非対称性を示すことを報告した。本方法は児

童に対する障害もなく、又、比較的多くの人数に対しても使用できるので側彎症のスクリーニングの手段として利用できるのではと考えた。又、本法が背部の血流を反映していることより側彎症における病態を示唆している可能性も考えられた。

今回、同時に撮影したX線学的検討に基づき診断した正常19例、機能性側彎24例、構築性側彎99例における背部皮膚温（以下サーモと略す）を測定し、その分布形態を先に述べた観点（スクリーニングとして利用できるか否か、側彎症の病態をどの様に反映しているか）より検討したので報告する。

1. 目 的

特発性側彎症の治療においては早期発見が重要であり、non-invasive なサーモが変形の発見に有用か否かを求めた。

特発性側弯症の原因についてはいまだ明確なものはないが、本法が主として撮影部位の血流を反映していることより、サーモの分布形態により変形脊柱の如何なる情報、既ち、凸側或は凹側に血流が多いのか、カーブパターンにより差異があるのか、本方法はカーブの予後予測に情報を与えてくれるのか等について検討した。

2. 方法

サーモは室温約 25° にて衣服着脱後 5 分、座位、両上肢下垂位にて撮影した。座位にて行ったのは、骨盤を固定させることにより回旋によるサーモの変化を避ける為である。今回使用したサーモグラフィ装置は日本電子の JTG-MD であり、温度幅は 5 段階に設定した (図 1)。

図 1 回旋によるサーモ像の変化

3. 対象

今回サーモとレ線の比較を行った症例は、当科を脊柱変形を主訴として受診した患者及び、学校健診によりチェックされ別府整肢園を受診した 142 例である (受診例のうち手術を要する症例は今回対象外とした)。

立位並びに臥位レ線像で判定した全症例の内訳は、正常 19 例、機能的側弯 24 例、特発性側弯 99 例であった。男性は 44 例、女性は 98 例であった。機能的

側弯の内左凸カーブは 17 例であり、構築性カーブにおいては右凸カーブが 40 例と最も多かった。シングルカーブが 67 例あり凸側が右側のものが 49 例であった。ダブルカーブは 29 例あり、大部分が右凸胸椎左凸胸腰椎・腰椎タイプであった (表 1)。

表 1 構築性カーブを有した症例のタイプ分類
TYPE of CURVES (structural)

TYPE	CASES	AGE yrs	ANGLE degree
Single			
rt T	40	14.3	17.5±8.8
rt TL, L	9	13.5	13.4±3.7
lt T	5	13.6	11.0±3.7
lt TL, L	13	13.5	13.4±3.7
Double			
rt T			24.8±9.3
+	22	14.2	
lt TL, L			21.7±5.6
lt UT			21.7±5.1
+	7	14.6	
rt T			19.6±6.0

T: thoracic TL: thoracolumbar
L: lumbar UT: upper thoracic

4. サーモの判定方法

判定の方法及び基準は、サーモ像において頸部より正中線を引きこれを基準線として左右の非対称性をみた。判定は視覚にて行うので判定者の主観の入る余地があり、これは判定方法の欠点であろう。

A. 先づ全体的にみて対称的か否かを決定し対称的なグループを抽出する。

B. 非対称的なグループにおいて

非対称的なグループにおいては高温域の左右差を決めるわけであるが、以下に述べる方法により決定した。

- 正中付近での明らかな左右差。
- 外側部での明らかな左右差。
- 一侧への高温域の島状域は斑点状の拡大。

以上の 3 法でも高温域の判定でしがたいもの、又、正中と外側で高温域の異なるものはサーモ異常で判定不能とした。

前記高温域の判定基準にて高温域を決定し右高温或いは左高温とした。

① 側弯症においては胸椎部カーブが多くを占めることより、先づ胸椎部において高温域を決定した。

② 胸椎部において対称的な場合は、肩及び腰部の対称性の有無を検討し高温域を決定した。

5. 結果 (表2)

サーモグラフィーを先述の如き判定基準にて分類すると対称的 17 例, 右高温 58 例, 左高温 57 例, 異常 10 例であった。

表2 カーブ方向とサーモ像の比較検討
(我々の判定基準による)

	対 称	右高温	左高温	異常	計
右 凸	2(0)	28(5)	15(1)	4(0)	49(6)
左 凸	3(5)	5(3)	9(9)	1(1)	18(18)
Double	0	14	14	1	29
正 常	7	2	9	1	19
	12(5)	49(8)	47(10)	7(1)	115(24)

() 内は機能性側彎症例を示す

肥満による皮下脂肪の差がサーモ像において差異を示すか否かを Rohrer 指数を用いて検討すると, 異常群が平均値にて高い傾向を示すもバラツキがあり各群間における統計的有意差は認められなかった。

サーモ像とレ線の比較において次の様な結果を得た。

先づレ線にて判定した正常及び異常(機能性も含む)において統計学的に検討すると, 異常例は正常例に比し明らかに非対称サーモ像を示していた ($P < 0.05$)。

正常例においては 19 例中 7 例が対称的であり, 非対称的なもの 12 例中 9 例は左高温を示していた。

カーブ方向とサーモ高温域の一致についてみると, 右凸カーブで右高温を示すものは構築性 49 例中 28 例, 機能性 6 例中 5 例であった。又, 左凸カーブで左高温を示すものは構築性で 18 例中 9 例, 機能性で 18 例中 9 例に一致をみた。カーブ凸側と高温域の一致を統計学的に検討すると構築性シングルカーブのみでは一致を示さないも, 機能性カーブを含めると $P < 0.05$ で高温域とカーブ凸側が一致する傾向を示した。これは機能性カーブにおける一致率が高いことを示していた。

6. 考 察

特発性側彎症の原因は未だ不明である。従来より, 体幹及び脊椎の筋肉の不均衡, 中枢性の姿勢制御の異常, 椎体の成長障害, 内分泌系の異常等がかえられ, 種々の実験的並びに臨床的研究がなされている。

我々は側彎症の原因は不明であるが後方の肋横靱帯を介しての支持機構の破綻は何等かの形で発症及び進

行に関与していると考えている。実験的に, ラット使用による肋骨切除・締結による側彎形成及び矯正の結果を発表してきた³⁾⁴⁾。又, 臨床面においても, Mehta の方法に準じて頂椎部を中心として肋骨・椎体角を測定することにより, 後方部の要素にも注目する必要のあることを述べた⁵⁾。サーモは皮膚表面における赤外線放射の放散を感知するものであり, 主としてその部の血流を反映する。このことは側彎症においてサーモを測定することにより, 同部における筋活動, 筋容量, 靱帯, 骨への血流がわかり, 側彎症における生理機能的な面も反映すると考えられる。

脊柱側彎症へのサーモの応用を検討しているのは, 現在まで著者の知る限りでは, Cooke¹⁾, Sibilla⁶⁾, 川上²⁾がある。彼等によるデータは判定及び結果において著者らと異なる点があるとはいえ, 側彎症におけるサーモは異常像を示すという点においては一致している。又, Cooke は側彎症が脊椎への血液供給の変化を伴っていると述べ¹⁾, Sibilla は digital computer にて分析し予後がわかると言っている⁶⁾。又, 川上はサーモの側彎症における生理的評価への利用を示唆している²⁾。

脊柱変形の早期発見の方法としての使用は, 我々の結果より充分可能と考えられる。普及しつつあるモアレ法と同様な形態学的変化をとらえる面も幾分あるとは言え, 機能的な面をかなり含んでいるのでより利用価値があると考えられる。その為には客観的な判定基準が望ましい。我々の脊柱異常例におけるサーモ対称的な症例は全例軽度側彎例であり実際上は特に問題ないと考えられた。又, 明らかなカーブは全例サーモ非対称を示し, 治療を要する例が落ちこぼれる危険性も少ないと考えられた。

生理機能的な面での有用性の有無について検討する為には, 判定方法, 撮影時の工夫等更なる改良が必要と考えられた。我々は先述の判定基準により凸側が高温を示す傾向であると言う結果を得たが, この判定結果は実際の症例において凸側が高温を示すもののみでなく, ある症例においては脊椎の側方転位の為凹側が凸側に位置し凹側に高温域が存在しても凸側高温と判定される可能性は充分ある。この様な不明瞭な事を防ぐには, 棘突起にマークをして, それにより左右差をみる必要があろう。しかし, スクリーニングの際は煩雑であり, サーモを我々の方法で判定するのみで充分とも考えられる。又, 詳細な分析には, Sibilla が述

べている如く digital computer の使用も有用である⁶⁾。

結 語

1. 正常脊柱を有する 19 例, 機能性側彎 24 例, 手術を要しない特発性側彎症 99 例において背部皮膚温を測定し, レ線像と対比検討した。

2. カーブの判定は全例レ線像にて行った。又, 背部皮膚温は室温約 25° にて測定した。

3. 背部皮膚温の判定方法について述べた。

4. 脊柱に側彎を有するものは背部皮膚温が統計学的有意差をもって非対称像を示した。

5. 背部皮膚温の高温域とカーブの凸側は一致する傾向を示すも, 判定法に問題があることを述べた。

6. 背部皮膚温測定は脊柱変形のスクリーニングの方法として充分利用出来, 又, 生理機能的な面からの分析も可能なことを述べた。

文 献

- 1) Cooke, E. D. et al.: Identifying scoliosis in adolescent with theormography. A preliminary study. Clin. Orthop., 148: 172-176, 1980.
- 2) 川上俊文・他: 側彎症患者の背部皮膚温の観察, 整形外科と災害外科, 30: 228-230, 1981.
- 3) 佐々木邦雄・他: 脊柱側彎症の実験的研究—肋骨締結による側彎形成—中部整災誌, 21: 1159-1161, 1978.
- 4) 佐々木邦雄・他: 脊柱側彎症の実験的研究—肋骨締結による側彎形成及び矯正について—, 中部

整災誌, 23: 664-666, 1980.

- 5) 佐々木邦雄・他: 胸椎部側彎における肋骨の意義—肋骨椎体角による検討—整形外科と災害外科, 30, 238-242, 1981.

- 6) Sibilla, P.: Possibilities of a prognostication of small scoliosis. SICOT, 1981, in Brasil.

質 問 山陰労災 那須 吉郎

左右の非対称をきたす原因をどのようにお考えでしょうか?

回 答 総合脊損センター 佐々木邦雄

背部皮膚温に異常がみられるということは, 筋血流量をも反映した意味で, カーブの性質を何等らの形で示していると思われ, 今後予測をも含め検討したい。

質 問 宮崎医科大学整形外科 武内 晴明

1. サーモグラフィーでの皮フ温の左右差は筋の活動性を示しているのか, それともミラーと被写体間の距離の差を現わしているのか。

2. サーモによる皮フ温左右差の程度と実際の Cobb 角との間にはかなりの相関関係がみられるか, 又スクリーニングとして使用可能であるか。

回 答 総合脊損センター 佐々木邦雄

背部隆起と皮膚温の検討は症例が少なかったので行っていない。

Cobb 角とサーモの比較検討は行っていない。