頸 部 脊 椎 症 の C T

総合せき損センター 整形外科

森 永 政 博・佐々木 邦 雄
芝 啓一郎・山 野 耕一郎
植 田 尊 善・浅 川 康 司
古 森 元 章・吉 浦 光 三
角 田 信 昭

CT of the Cervical Spondylosis

—Localization of Osteophyte—

by

Masahiro Morinaga, Kunio Sasaki, Keiichiro Shiba,
Koichiro Yamano, Takayoshi Ueta, Yasushi Asakawa,
Motofumi Komori, Kouzou Yoshiura
and Nobuaki Tsunoda

Department of Orthopedic Surgery, Spinal Injuries Center

We studied the localization of osteophytes in 28 patients with cervical spondylosis. Osteophytes of posterior part of body were classified into four types by transverse computed tomography, that are unilateral, bilateral, median and mixed (median+unilateral, median+bilateral) types. And posterior parts of body were divided into upper and lower parts in lateral roentgenogram. There were 73 osteophytes evaluated. Two thirds of osteophytes were distributed to lower part of the body in roentgenograms. In classification of CT, fifty-five percent of osteophytes were central type (median and mixed type), but lateral type (unilateral and bilateral types) occupied forty-five percent of them. Evaluation of osteophytes by CT seemed to be useful in surgical approach.

は じ め に

頸部脊椎症の発生因子のひとつとして、後方骨棘による脊髄への圧迫がある。その際、脊柱管前後径が問題となってくるが、実際、頸部脊柱管前後径の測定法として、上下の椎体後縁を結ぶ線上から棘突起内面を結ぶ線上への最短距離をとる Wolf 法や椎体後縁の中央部から棘突起内面の皮質を結ぶ線上への最短距離をとる Burrows 法などが用いられている。

我々は、今回、骨棘と脊柱管狭窄の関係を調べる為に、頸椎単純レ線の側面像で明らかに骨棘を認めた症例において、CT 像における骨棘の存在部位について、比較検討を加えたので報告する。

対象ならびに方法

対象は、1982 年 7 月から 1984 年 7 月までに、当センターにて頸部脊椎症および外傷で来院し、頸椎単純レ線の側面像で、椎体後縁に明らかな骨棘を有し、CT 撮影を行った 28 症例である。年齢は、29 才～74 才（平均 54.4 才）であり、男女比は、3:1 であった。

まず、頸椎単純レ線の側面像にて、骨棘の発生椎体を調べ、73 の骨棘の数を認めた。次に、CT 像による椎体後縁から脊柱管内へ突出する骨棘の存在部位について調べた。Fig. 1 で示すように、骨棘の存在部位を大きく Unilateral type, Bilateral type, Median type, Mixed type の 4 つに分け、そのうち、Mixed

Classification of type of CT

Fig. 1

type 護, i) median+unilateral, ii) median+bilateral のtype に分類した. なお, CT の使用機種は, TCT-60 A-30 型であり, window width は症例に応じ設定した.

結 果

まず, 頸椎単純レ線の側面像における各椎体の骨棘の存在の頻度についてみると, $C_5 \rightarrow C_6 \rightarrow C_4$ の順に多く認められた. 症例により, 多椎体にわたって骨棘の存在を認めるものもあった. (Fig. 2) 次に同じく頸椎単純レ線の側面像で, 椎体後縁に骨棘の存在する各椎体を, 椎体中央で上縁 (Upper lesion (略号: U)), 下縁 (Lower lesion (略号: L)) とに分け調べてみた. 骨棘が椎体上縁に存在したものの 24/73 (33%), 椎体下縁に存在したものの 49/73 (67%) と, 全体的にみると, 骨棘は, 椎体下面に多く存在した. しかし, C_6 椎体では, 上・下縁均等に, また, C_7 椎体では上縁に多く認められている. なかには, 1 椎体に, 上・下縁の 2 カ所に骨棘を認めたものもあった (Fig. 2).

次に, CT 像と頸椎単純レ線の側面像と対比しながら, 骨棘の存在部位を Fig. 1 の分類に従って調べた. 実際の各 type の代表例を供覧する. Fig. 3 は, Unilateral type の, 頸椎単純レ線側面及び CT 像であり, C_6 椎体上縁に存在した骨棘を表わしている. Fig. 4 は, Bilateral type で, CT 像は C_4 椎体下縁の骨棘を表わしている. Fig. 5 は, Median type で, CT 像は C_7 椎体上縁の骨棘を表わしている.

Fig. 2

Unilateral type

Fig. 3

Bilateral type

Fig. 4

Fig. 6 は, Mixed type の median+Bilateral type 及び median+unilateral type であり, それぞれ CT 像は C_5 椎体下縁及び C_5 椎体上縁の骨棘を表わしている.

以上の type を, type 別にみると, Unilateral type 13, Bilateral type 20, Median type 13, そして Mixed type 27 で, その内, median+unila-

Median type

Fig. 5

Fig. 6

Table 1 Distribution of types

1) Unilateral type	13
2) Bilateral type	20
3) Median type	13
4) Mixed type	27
i) Median + Unilateral	(5)
ii) Median + Bilateral	(22)

teral 5, Median + Bilateral 22 であった。(TABLE 1)

考 察

頸部脊柱管前後径の重要性については、1956年 Wolf らの報告以来、Payne, Burrows など数多くの報告を認める。また、頸椎の横断面の形態について

も、最近よく報告されている。我々は、今回、頸椎単純レ線の側面像で認められる骨棘が、脊柱管前後径の狭小化の原因となって、それが、そのまま脊柱管狭窄として症状発現に関与するか否か、CT 像と比較しながら骨棘の存在部位を分析してみた。その結果、CT 像での椎体後方から脊柱管内に突出する骨棘が、片側性に存在するものは、46%，中心性に存在するものは 54% にみられた。

このように、頸椎単純レ線の側面像で認められた骨棘も、CT 像によりいろいろな type のものがあるということがわかった。すなわち、頸椎単純レ線の側面像で、骨棘の存在を認めた時、脊柱管前後径の計測あるいは、dynamic canal stenosis の椎体椎弓間距離などの計測だけで、脊柱管狭窄として扱うのは、問題があると思われ、CT やミエログラフィーなどの検査が必要となってくる。CT は、現在、補助診断法と言われているが、頸部脊椎症などにおける診断や手術において脊柱管内除圧の範囲を決める場合などには、CT は重要な診断法であると考えられる。

ま と め

1. 頸椎単純レ線の側面像で、明らかな骨棘を有し、CT 撮影を行った 28 症例について骨棘の存在部位を比較検討した。
2. 頸椎単純レ線側面像での骨棘の存在は、椎体中央で上縁、下縁の 2 つに分け、CT 像での骨棘の存在部位は、主に、Unilateral Bilateral, Median, Mixed の 4 つの type に分類した。
3. 単純レ線での骨棘の存在は、椎体下縁に 63% と多く、CT 像での骨棘の存在は、中心性のものが 55%、側方のみに認められたものが 45% であった。

参 考 文 献

- 1) Burrows, E. H.: The sagittal diameter of the spinal canal in cervical spondylosis. Clin. Radiol. 14: 77-86, 1963.
- 2) Imai, K.: Cervical disorders on CT. Clin. Surg. 14: 64-70, 1979.
- 3) Mochida, J.: The Roentgenological Study of the Cervical Canal Stenosis. Clin. Orth. Surg. 18: 37-45, 1983.
- 4) Wolf, B. S. et al.: The sagittal diameter of the bony cervical spinal canal and its significance in cervical spondylosis. J. Mt. Sinai Hosp., 23: 283-292, 1965.

発言

諫早病院 菅 尚義

骨棘の median Type は骨棘ではなく OPLL ではないのでしょうか。晒骨では bilatrerat の骨棘はないが median にはほとんど見られない。

解答

総合脊損センター 森永 政博

確かに, midian type ぞ OPLL が区別つきにくいものもあります。しかし, 我々が調べたものは, OPLL では, ないと思われたあ の だけ を 選 び midian type とし, OPLL は除外致しました。