悪性リンパ腫 4 例の治療経験

国立米子病院整形外科

西 孝 之・古 瀬 清 夫
吉 川 暢 一・隅 坂 修 身
廣 瀬 方 志・津 田 公 子

皆生温泉病院整形外科

森 本 兼 人

Treatment for Malignant Lymphomas

by

Takayuki Nishi, Kiyoo Furuse, Masamoto Kikkawa,
Osami Sumisaka, Yasushi Hirose and Kimiko TsudaDepartment of Orthopaedic Surgery, National Yonago Hospital,
Tottori Japan

Kanehito Morimoto

Department of Orthopaedic Surgery, Kaike Onsen Hospital

We studied the effectiveness of low-dose, oral daily administration of etoposide (50mg/day) and prednisolone (5mg/day) with radiotherapy for Non-Hodgkin's lymphomas (NHL) arising in bone, soft tissue and epidural space. All patients were elderly, ranging in age from 71 to 81 years with a mean of 76.8 years. One patient presented with Stage I disease and three with Stage IV. All patients had either intermediate-or high-grade lymphomas.

The overall response rate was 50% (1 complete response, 1 partial response and 2 no response). One patient is alive and disease-free at 17 months. Three patients have died (1 dead of chemotherapy and 2 dead of disease). All patients had side effects (WBC decrease and alopecia).

It has suggested that oral administration of etoposide may be useful for Stage I disease in NHL patients.

Key words : Non-Hodgkin's lymphoma (非ホジキンリンパ腫), Chemotherapy (化学療法), Etoposide (エトポシド), Elder (高齢者)

は じ め に

悪性リンパ腫の治療成績は近年、多剤併用療法により著しく向上し、治療例もみられるようになってきた。しかし、高齢者の場合、化学療法による副作用で死亡する例も少なくない。今回われわれは、強力な多剤併用療法を実施しがたい高齢者で骨軟部に発生した非ホジキンリンパ腫に対し、etoposide と prednisolone 少

量持続経口投与 (EP 療法) と放射線療法を併用し、その有用性を検討した。

対象および方法

症例は 1993 年 6 月より国立米子病院整形外科および皆生温泉病院整形外科にて加療した骨軟部初発の非ホジキンリンパ腫 (NHL) 4 例である。年齢は 71 歳～89 歳、平均 76.8 歳、男性 1 例、女性 3 例である

(表1). 病理組織型 (LSG 分類⁸⁾) は、びまん性大細胞型2例、びまん性中細胞型1例、びまん性混合型1例であり、全例B細胞性であった。初発例3例、再発・治療抵抗例1例で、症例4には前治療中にetoposideが含まれていた。

投与方法は、原則としてetoposide 50mg/日を経口投与とし、predonisolone 5～10mg/日を併用した。

検討項目はStageはAnn Arbor 病期分類¹⁾、組織型はWorking Formulation分類⁹⁾、治療成績は木村らの判定基準⁴⁾、副作用は日癌治の判定基準⁵⁾を用いた。また、etoposideの投与日数、総投与量を算出した。

結 果

StageはIV A 3例、I EA 1例で、Working Formulation分類では、高度悪性群1例、中等度悪性群2例、不明1例であった。治療成績⁴⁾はCR 1例、PR 1例、NR 2例で有効率50%であった。予後はStage I EAの1例が17カ月の無病生存中であり、Stage IV A 3例は3～8カ月の間に全例死亡しており、1例

が化療死、2例が腫瘍死であった(表1)。

etoposideの総投与量は1,050～7,450mg(平均3,737.5mg)、投与日数は21～115日(平均64.1日)であった。etoposideの副作用はWBC減少、貧血および脱毛が全例に、血小板減少が2例にみられた(表2)。WBC減少が高度(Grade 3, 4)な場合、G-CSF (granulocyte colony stimulating factor)を使用した。

症 例 供 覧

症例1:71歳、女(図1)。

主訴:左膝関節痛。

現病歴:1年前より左膝関節痛、水腫にて近医で加療を受けるも疼痛が持続していた。平成6年2月、他医受診、骨腫瘍として当科紹介となった。

入院時現症:左膝水腫著明、脛骨近位部にびまん性腫脹と軽度熱感があった。

経過:Stage IVであり、左腓脛リンパ節生検にて、びまん性大細胞型リンパ腫と診断された。脛骨病巣に放射線照射(30 Gy)、EP療法を行い、PRの治療効

表1 悪性リンパ腫症例一覧(1)

症例	年齢	性	部位	組織型	Stage	効果	予後(月)
1	71	女	左脛骨	高度悪性群 IBL, plasmatoid	IVA	PR	DOC (8) (化療死)
2	76	女	左上腕骨	中等度悪性群 DM, small & large	I EA	CR	NED (17)
3	89	女	右腓腹部	中等度悪性群 DL	IVA	NR	DOD (7)
4	71	男	硬膜外	/	IVA	NR	DOD (3)

IBL:免疫芽球型, DM:びまん性リンパ腫混合型, DL:びまん性リンパ腫大細胞型

表2 悪性リンパ腫症例一覧(2)

症例	Etoposide 投与		副作用				
	総量 (mg)	日数 (日)	WBC	HGB	PLT	GO (P) T	脱毛
1	3925	76.5	G 2 (1-4) G 4 (5)	G 2 (1-4) G 3 (5)	G 0 (1-4) G 4 (5)	G 0	G 2
2	7450	115	G 2 (1, 3, 5-9) G 3 (2, 4)	G 1 (1-9)	G 0	G 0	G 2
3	2525	44	G 3 (1-4)	G 2 (1, 2) G 3 (3, 4)	G 0	G 0	G 2
4	1050	21	G 2 (1)	G 3 (1)	G 4 (1)	G 0	G 3

G:日癌治判定基準, ():クール番号

図1 71歳・女性

(左) 初診時X線像：周辺に硬化を伴った骨破壊の進行がある。

(中) EP療法後：骨硬化像がみられる。

(右) HE染色 (400倍)：核はクロマチンに富み小さな核小体を有している。胞体はひろく好塩基性である。細胞はシート状に配列している。

果が得られた。8月末、仙骨病変に放射線照射、EP療法を施行した後、9月にWBC、HGB、PLTの著明な減少がみられ、DIC、多臓器不全により8ヵ月後に死亡した。

症例2：76歳、女性（図2）。

主訴：左上腕部痛

現病歴：平成5年4月より左上腕部の疼痛が出現した。近医にて上腕骨病変の生検を行った後、5月24日当科紹介となる。

入院時現症：左上腕遠位1/3にびまん性腫脹、動作時痛あり、リンパ節腫脹はなかった。

経過：びまん性混合型悪性リンパ腫と診断され、Stage IEAであり、局所に放射線照射（51 Gy）、全身にEP療法（etoposide 1,500mg）を行い、8月9日、右上腕切断（wide margin）を施行した。術後、etoposide 4,900mg投与を行い、現在、17ヵ月無病生存中である。

考 察

etoposideはpodophyllo-toxinの半合成配糖体で、肺癌を中心とした固形癌や造血器腫瘍に有効性を示す抗癌剤として現在広く使用されている³⁾。

etoposide少量連日投与の効果について以下の報告がある、Hainsworthら²⁾は治療抵抗性悪性リンパ腫

に対し60%のPRを得、本田ら³⁾NHL 7例に対し、5例にPR、2例にCRを得た。新津⁷⁾は、高齢者再発例5例、治療抵抗例9例、85歳以上の初発例に対して、20%にCR、66.8%にPRを得た。自験例では、高齢者のNHLで骨軟部に初発した症例について、CR1例、PR1例で有効率50%であった。

今回、Stage Iの症例のみ生存し、Stage IVの症例は3～8ヵ月の間に死亡した。また、etoposide内服にて、副作用がなく、長期投与が可能であった症例では治療効果があり、投与直後より副作用があり、少量連日投与が不可能な症例では治療効果はNRであり、予後も悪い傾向にあった。

しかし、整形外科領域において骨軟部に初発したNHLは、Stage IVで高齢者であることが多い⁶⁾。etoposideの殺細胞様式は濃度依存性より時間依存性であり³⁾、今後、etoposideのより少量投与にてWBC減少などの副作用を避け、より長期に連日投与する工夫が必要であろう。

ま と め

1. 高齢者に発生した骨軟部初発の非ホジキンリンパ腫に対し、EP療法・放射線療法の併用を行い、その有用性について検討した。

2. EP療法施行時、Stage I 1例、Stage IV 3例

図2 76歳・女性

(左) 初診時X線像：虫喰い状で骨皮質の破壊がある。

(中) EP療法中病的骨折：骨硬化，骨梁の明瞭化がみられる。

(右) HE染色（400倍）：大型細胞と小型切れ込み核細胞の混在がみられ，細胞境界は不明瞭である。

であり，Working Formulation では全例，中等度・高度悪性群であった。

3. 有効率 50% で CR 1 例 (Stage I)，PR 1 例，NR 2 例であり，Stage I 症例のみ生存中，Stage IV 3 症例は 3～8 カ月のもので死亡し，化療死 1 例，腫瘍死 2 例であった。

4. 今後，より少量 (25mg/日)，より長期連日投与を検討する必要がある。

参 考 文 献

- 1) Carbone, P. P., et al.: Report of the committee on Hodgkin's disease staging classification. *Cancer Res.*, 31: 1860-1861, 1971.
- 2) Hainsworth, J. D., et al.: Chronic daily administration of oral etoposide in refractory lymphoma. *Eur. J. Cancer*, 26: 818-821, 1990.
- 3) 本田順一，他：リンパ性悪性腫瘍に対するエトポシド

少量連日経口投与の有用性について，癌と化学療法，18: 653-656, 1989.

- 4) 木村禧代二，他：悪性リンパ腫の化学療法－Bleomycin の効果を中心に－，日本臨床，27: 39-47, 1969.
- 5) 日本整形外科学会骨軟部腫瘍委員会：整形外科・病理悪性骨腫瘍取扱い規約，金原出版，東京：43-44, 1990.
- 6) 三宮貴彦，他：四肢骨軟部に発生した Non-Hodgkin Lymphoma の経験，整形外科と災害外科，42: 1274-1278, 1993.
- 7) 新津 望：老年者再発性・治療抵抗性悪性リンパ腫に対する Etoposide 少量持続経口投与の有用性，癌と化学療法，21: 565-567, 1994.
- 8) 須知泰山，他：非ホジキンリンパ腫病理組織診断の問題点－新分類の提案，最新医学，34: 2049-2062, 1973.
- 9) The Non-Hodgkin's Lymphoma Pathologic Classification Project: National cancer Institute sponsored study of classifications of non-Hodgkin's lymphomas: summary and description of a working formulation for clinical usage. *Cancer*, 49: 2112-2135, 1982.