両側先天性橈骨頭脱臼の1例

松江赤十字病院整形外科

後 藤 公 志・中 山 威知郎

長谷部 啓 司・中 川 武 志

小 田 裕 造・大 槻 文 悟

松江赤十字病院リハビリテーション科

秦 公 平

Congenital Dislocation of Bilateral Radial Heads A Case Report

Kouji Goto, Ichiro Nakayama, Keiji Hasebe, Takashi Nakagawa,
Yuzou oda, and Bungo Otsuki

Department of Orthopaedic Surgery, Matsue Red Cross Hospital

Kouhei Hata

Department of Rehabilitation, Matsue Red Cross Hospital

Congenital dislocation of the radial head is a rare condition. We experienced a case of the bilateral dislocation which was first diagnosed at an advanced age. The patient had been engaged in manual labor and had had no subjective symptoms. After a contusion, he complained of unilateral elbow pain and impaired range of motion. Radial head excision was performed on the elbow and eventually he was able to return to work.

Key words : congenital radial head dislocation (先天性橈骨頭脱臼), radial head excision (橈骨頭切除), impaired range of motion (可動域制限)

はじめに

先天性橈骨頭脱臼は比較的まれな疾患で、今回高齢になってから肘への外傷を契機に発見され、橈骨頭切除を行った症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

症 例

61歳男性 交通事故にて湖に転落して受傷。来院時には右肘の痛みを訴えられ、レントゲンにて右橈骨頭脱臼を認めた。整復を試みるも不能にて、左肘のレントゲンを撮ると、同様の脱臼を認めたため、先天性

橈骨頭脱臼と診断した。受傷後2週目から可動域訓練を開始し、約3ヶ月経過をみるも橈骨頭部の痛みと可動域制限を訴える為、橈骨頭切除を行った。外傷、出生時の異常、合併奇形は無く、これまで肘の変形と可動域制限はあったが、痛みを自覚したことは無かった。

身体所見として脱臼している右橈骨頭の前内側部に圧痛があり、屈曲が90度を越えるあたりで橈骨頭部に痛みを伴うクリックを認め、最大屈曲時には橈骨頭部に強い痛みを訴えた。可動域は右伸展-10°屈曲110°左伸展0°屈曲120°carrying angleは両側約20°で軽度外反肘を認めた。前腕の回旋制限に左右差なく、手関節痛も無かった。

図1 術前 X-P 左側にも同様の脱臼を認める。

図2 術前 3DCT 橈骨頭のドーム状変形を認める。

術前のレントゲン（図1），及び3DCT（図2）にて右橈骨頭のドーム状の変形を認め，右橈骨頭の前方や内方への脱臼を認めた．左橈骨頭にも同様の所見を認めた．

手術では，肘関節前外側にS字状切開を加え，腕橈骨筋と上腕筋の間を剥離して上腕筋を内側へよけて，その裏面に触る橈骨頭上で関節包を切開して橈骨頭を露出させた．橈骨頭の病理所見では変形性関節症性的変化に類似するものであった．輪状靭帯は通常よりも

橈骨頭先端から離れて存在し，橈骨頭切除に際して靭帯は温存できた．橈骨断端がimpingementを生じないことを確認して閉創した．術後は3日目より可動域訓練を開始した．術後3ヶ月のレントゲン（図3）では橈骨の近位断端のmigrationは認めず，その後のフォローでも橈骨近位断端の位置に変化は認めていない．

術後約1年で右肘の可動域は伸展 0° ，屈曲 120° で左右差無く，不安定性も無い．肉体労働の現場に復帰しているが，労作時の肘のだるさが残っている．

考 察

先天性橈骨頭脱臼における両側罹患例の割合は報告によってばらつきを認めるが，概ね半数近くを占めているとする報告が多い¹⁾⁴⁾⁵⁾．また膝蓋骨脱臼や，橈側列形成障害等の合併奇形を伴う場合は後方脱臼が多く，合併奇形を伴わない場合には前方脱臼が多いと言われている¹⁾．我々の症例でも合併奇形は無く，両側前方脱臼であった．

臨床症状としては，肘の外反肘変形，可動域制限，肘関節痛などが挙げられるが，いずれも日常生活の障害となることは少なく，その為に成人になって関節症変化に伴って症状が出現し，初めて発見される場合も少なくない．我々の症例でもこれまで肉体労働を仕事としてやってきて，両肘とも軽度の変形性変化を認めるものの痛みが無く，日常生活における障害とならなかった為に，61才に至るまで発見されていない．こ

図3 術後3カ月のX-P 橈骨近位断端の位置に変化を認めていない。

のことは、運動制限が肩関節や手関節で十分代償可能であること、二次性変形性関節症が、放置しても急速に進行するものではないことを示唆するものと思われる。また、我々の症例では、外傷を契機に偽関節を形成していた橈骨頭と上腕骨との間でずれを生じたために、運動制限と痛みが持続することになったものと推測される。

先天性橈骨頭脱臼では上腕骨小頭は低形成で扁平化しており、橈骨頭はドーム状に変形して中央部の陥凹は消失している¹⁾⁴⁾⁵⁾。また、尺骨は相対的に短縮していて、後方脱臼では近位部後縁が正常ではやや隆起するところが隆起が強くなっている。一方前方脱臼では尺骨近位部後縁がやや窪んでいるのが特徴的であり、我々の症例でも同様の所見を認めた。

先天性橈骨頭脱臼に対する治療法として、乳幼児期における観血的整復と輪状靱帯形成¹⁾や、若年者における橈骨骨切り術⁶⁾があるが、安定した成績を示す報告は殆どなく、また若年者で日常生活に支障となる症状を訴えることが少ないため、手術を要することはまれである¹⁾⁴⁾⁵⁾。橈骨頭切除術は、成長期に行うと、橈骨頭の再形成、尺骨との骨癒合、手関節障害が生じるなどの合併症の報告があり、安易に行うべきではないとされているが、CAMPBELL (1992) らは若年者に行っても7年の経過観察で良好な成績を得られたと報告している²⁾。

一方、成長期を過ぎてから行う橈骨頭切除術につい

てはいくつかの報告がなされており¹⁾³⁾⁴⁾⁵⁾、肘関節の不安定性への懸念はあるものの、概ねその成績は安定している。先天性橈骨頭脱臼の場合、肘関節の外反ストレスに対する腕橈関節の役割は元来ほとんど機能していないと考えられ、不安定性が生じたとしても軽微なものにとどまる可能性が高い。実際我々の症例でも術後に不安定性によると思われる明らかな症状は訴えていない。橈骨頭切除術による可動域の改善はあまり得られないとの報告が多い¹⁾²⁾⁵⁾が、我々の症例でも術前の可動域よりは改善したものの対側と比較して変わらなかったことから、先天性橈骨頭脱臼に伴う可動域制限を改善したものではないと考えている。

結 語

1 外傷を契機に60才を過ぎて発見された両側先天性橈骨頭脱臼の一症例を経験したが、外反肘変形は認めるものの、日常生活上の障害をこれまで認めていなかった。

2 外傷後の症状を訴える一側に対して橈骨頭切除術を行い、良好な結果を得た。

参 考 文 献

- 1) Almquist, E.E., Gordon, L.H. and Blue, A.I. : Congenital dislocation of the head of the radius. J.Bone Joint Surg. 51-A : 1118-1127, 1969.
- 2) Campbell, C.C. et al. : Excision of the radial head for

- congenital dislocation. J. Bone Joint Surg. 74-A : 726-733, 1992.
- 3) 堀井恵美子ほか：先天性橈骨頭脱臼。別冊整形外科，26：208-211，1994.
- 4) Mardam-Bey, T. and Ger, E. : Congenital radial head dislocation. Journal of Hand Surgery, 4 : 316-320, 1979.
- 5) T.Miura : Congenital dislocation of the radial head. Journal of Hand Surgery. 15B : 477-481, 1990.
- 6) 山崎幹雄ほか：先天性および外傷性橈骨頭単独脱臼に対する橈骨外旋骨切り術の遠隔成績。臨床整形外科，19巻7号：809-812，1984.
- ~~~~~