- 3) 吉川; 骨組織の石灰化, 整形外科, 3, 1, 53, 昭 27.
- 4) 石井; 血清 Ca, Mg の定量法, 医学と生物学, 24, 1, 9, 昭 27.
- 5) 緒方; 生骨格筋の収縮弛緩に関する生理生化学的研究, 総合医学, 14, 5, 509, 昭 32.
- 6) 片田; ウサギの血液成分の季節変動, 日新医学, 39, 8, 420, 昭 27.
- 7) 柳沢; カルシウム及びマグネシウム新定量法と代謝, 文光堂, 昭 30.
- 8) Schmid R. W. and Reilly C.N.; New Co-

mplexon for Titration of Calcium in the Presence of Magnesium, Analytical Chemistry, 29, 2, 264, 1957.

- 9) Carr M.H. and Frank H.A.; Improved Method for Determination of Calcium and Magnesium in Biologic Fluids by EDTA Titration, Amer. Jour. of Clin. Path., 26, 10, 1157, 1957.
- 10) Hildebrand G.P. and Reilly C.N.; New Indicator for Complexometric Titration of Calcium in Presence of Magnesium, Analytical, 29, 2, 258, 1957.

指 趾 矮 小 症 の 一 例

国立久留米病院整形外科 佐 藤 光 雄

A Case of Mikrodaktylia

By

M. Sato

Kurume National Hospital

指趾畸形の内最も多いのは諸家の統計によりますと指趾過多症であり、ついで指趾癒合症、指趾癒合過多症であり、指趾矮小症は極めて稀である。私は最近身体障害手帖診断書を求めに來た本症の一例を経験したので報告する。

症 例

16 歳 女 子

家族歴 父は 55 歳 健康で飲酒せず、喫煙は少量、畸形及遺伝性並びに伝染性疾患はなし。母は 52 歳、健康飲酒喫煙をなさず、流、早産なく畸形及び伝染性疾患なく、血液ワ氏反応は陰性で非血族結婚である。患児の妊娠中に転倒、驚愕等はなく出産は満期正常分娩であつた。

患児は同胞 6 人中の第 5 子で同胞に畸形を有するものなし。母乳栄養であり、生齒は正常、泉門の閉鎖も正常で歩行開始は 1 年 1 ケ月、その後体格智能發育は正常で學業成績は中であつた。

現症 全身所見は体格栄養共に中等度で他部に殆んど異常を認めないが右前胸部のみが胸筋の発達著しく悪く扁平で胸廓はレ線で右第 2, 第 3 肋骨は肋骨体肋角の彎曲が強く角状をなし第 3 肋骨前部は細小となり内側に軽く彎曲する。

局所々見として右上肢は肩関節の可動性が前舉 137 度、外舉 120 度に制限され、肘及手関節に異常を認め

ず。上肢長は右 48 種で 1 種の短縮を認め、又上肢の筋肉皮下脂肪の發育悪く上腕周径は右 20 種、左 22 種、前腕は右 19 種、左 20.5 種で夫々 2 種、1.5 種の短縮を認める。

図 1

手指部は図(1)の如く手掌は健側に比し短小で拇指は矮小にして小指側に強く屈曲し、示指、中指は痕跡的に豌豆大の小隆起を認めるのみで、環指は拇指より少々長い程度で、小指は 5 指中最も長いが健側小指の $\frac{1}{2}$ 程度の長さで環小指とも強く拇指側に屈曲し、拇指と示指の間には 1 指を容れる位の間隙があり、各指は何れも先端に小さな爪を有す。レントゲンのには図(2)の如く橈骨尺骨手根骨は正常であるが健側に比し矮

図 2

小である。中手骨は形状は正常であるが少々小さく第2, 3, 4中手骨は何れも中樞側半分だけ存し先端は中央部に細くなり消失する。又各指の指骨は拇指は細長い指骨が1節あるのみで環指は第4中手骨末端に接して指尖に至る極めて細長なる指骨が1節存し、小指は略々正常なる形態大きさを有するが中節を欠き2節である。

考 按

本症の発生原因については多くの先天性畸形と同様

今日なほ定説がなく内的原因即ち胚種の病的変化、遺伝的關係と外的原因即ち胚芽の機械的、温熱的、化学的作用又は羊膜の外力等によるものであり、指趾畸形の大部分は前者によるものと思われる。人類の上肢は胎生3週の終りに頸、胸椎節の移行部に長目の小隆起が生じ間もなくこれは円形の四肢蕾となり、これは延長して柄を作るが、その先端は扁平となり鰭状の盤を呈し、その前縁に刻み目が出来、これが指の端緒であり、およそ胎生6週目に上肢はその形を形成するが、本症はこの時期にその形をとるものと考ええる。遺伝的關係は容易に断定し難く、堀田氏は畸形100例につき12例認め、その中8例は血族結婚であり、河村氏は指趾畸形13例につき詳細に調査を行い8例に認め、その中4例が血族結婚であり、或程度までは関係があると考えるのが妥当であろう。性別には殆んど差はなく僅かに男性が多く、左右別は四肢については右側は左側より比較的多く、特に右手は左手より遙かに多い。指趾畸形の種類は河村、小林、中村、飯野氏らの統計によると図(3)の如くであり、指趾過多症が最多である。

む す び

私は16歳の女子で胸廓の変形を伴つた指矮小症の1例を報告します。

質 問

久 大 宮 城 教 授

指の機能は如何ですか。

答 殆ど動きません。

図 3 指 趾 畸 形 種 類 別

種 類	河 村			小 林			中 村			飯 野		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
指 趾 過 多 症	59	38	97	38	36	74			115	25	21	46
指 趾 癒 殆 症	29	22	51	34	23	57			60	31	17	48
指趾過多癒合症	4	14	18	8	3	11				21	24	45
指 趾 短 縮 症	3	14	17	3	6	9				2	10	12
指 趾 過 少 症	9	4	13	3	5	8			1	4	1	5
先天性指趾強直症	6	2	8						1	裂手, 裂足		
										7	9	16
指 趾 肥 大 症	0	3	3	1	1	2			1	2	3	5
指 趾 矮 小 症	1	1	2							3	1	4
指 趾 屈 曲 症	1	2	3							8	5	13
計	112	100	212	87	74	161	92	86	178	103	91	199