土 壌 の 函 数 的 研 究 (第20~22報)

農學博士 三 須 英 雄

(朝鮮總督府農事試驗場)

昭和16年4月12日受理

(第20報) 埴壤土に於ける pH と Fe^{+++} との函数式

緒 言

埴土に於ては水田及畑兩土壤共に pH と Fe^{+++} との間に極めて密なる函数的關係あることは前報の通りであるが埴壤土にありても亦同様極めて密接なる相關が認められ一つの函数式で表はし得ることを確めたので水田土壤及畑土壤に分ち報告する。各供試土壤の採集地名、地目、地質系統⁽¹⁾ pH⁽²⁾ 及 Fe^{+++} ⁽³⁾ はすでに報告してあるからこゝには省く。

實 驗 成 績

(A) 水田土壤 各道における埴壤土(作土及心土)の Fe^{+++} 量を 5 ppm の間をもつ階級に分ち各階級における pH の平均値を算出し次の如き結果を得た。

x (ppm)	平均 點數	pH
0~5	27	6.60
5~10	23	5.84
10~15	11	5.55
15~20	6	5.53
25~30	1	5.21
75~80	1	5.33

これらの平均値を對數方眼紙上に畫けば上圖の示す如く明かに直線になるから $y = ax^b$ なる函数式で表はすことができる。恒數決定に關する計算は省くが決定された式は次の如くである。

$$y = 6.753x^{-0.067}$$

この函数式の適否を判定するために計算値 (Y_c) と實測値 (Y_o) との殘差 (J) を算出すれば次の如くである。

x (中央の値)	Y_o	Y_c	$J = Y_o - Y_c$
2.5	6.60	6.35	0.25
7.5	5.84	5.90	-0.06
12.5	5.55	5.72	-0.17
17.5	5.53	5.59	-0.06
27.5	5.21	5.42	-0.21
77.5	5.33	5.04	2.80

上表の示す如く何れも殘差は小であるから上記の函数式は充分實際に應用することができる即ち Fe^{+++} 量を知れば直ちに計算により pH を知ることができる。

(B) 畑土壤 各道における埴壤土(作土及心土)の Fe^{+++} 量を 5 ppm の開きをもつ階級に分ち各階級における pH の平均値を算出し次の如き結果を得た。

x (ppm)	平均 点数	pH
0~5	20	6.85
5~10	10	5.49
10~15	4	5.83
20~25	3	5.46
25~30	1	4.59

これらの平均値を対数方眼紙上に畫けば上圖の如く明かに直線をなすから $y = ax^b$ なる函數式で表はすことができる。恒數決定に關する計算は省くが決定された式は次の如くである。

$$y = 6.417x^{-0.063}$$

この函數式の適否を判定するため計算値 (Y_c) と實測値 (Y_o) との殘差 (J) を算出すれば次の如くである。

x (中央の値)	Y_o	Y_c	$J = Y_o - Y_c$
2.5	6.85	6.05	0.80
7.5	5.49	5.65	-0.16
12.5	5.83	5.47	0.36
22.5	5.46	5.27	0.19
77.5	4.59	4.89	-0.30

上表の示す如く何れも殘差は甚だ小であるから上記の函數式は充分實際に應用することができる。即ち Fe^{+++} を知れば直ちに計算により pH を算出することができる。

要 約

埴壤土における pH と Fe^{+++} との函數式に關する成績を要約すれば次の如くである。

1. 埴壤土に於ては水田土壤たると畑土壤たるとを問はず pH と Fe^{+++} の間には極めて密接なる相關が認められ一つの函數式で表はすことができる。
2. 水田土壤における函數式は次の如くであつて實測値と極めてよく一致する。

$$y = 6.753x^{-0.067}$$

3. 畑土壤における函數式は次の如くであつて實測値と極めてよく一致する。

$$y = 6.417x^{-0.063}$$

4. 故にこれら函數式は充分實際に應用することができる即ち土壤中の Fe^{+++} 量さへ知れば直ちに計算により pH を算出することができる。

文 獻

1. Misu: Nōzisenkyō-ihō (Tyōsen) 8 (Syw. 11n.) 177; 9 (Syw. 12n.) 1, 216
2. —: 土肥, 14 (昭和15年) 428, 503, 556, 607
3. —: 農化, 17 (昭和16年) 157

(第 21 報) 埴土における pH と Fe^{+++} との函数式

緒 言

埴土に於ては水田及畑兩土壤共に pH と Fe^{+++} との間に極めて密なる函数的關係の存することとは前報に於て述べた通りであるが埴土に於ても亦全く同様兩者間に極めて密接なる相關が認められ一つの函数式にて表はし得ることを確めたので水田土壤と畑土壤とに分ち報告する。各供試土壤の採集地名、地目、地質系統⁽¹⁾、pH⁽²⁾及 Fe^{+++} ⁽³⁾はすでに報告してあるからこゝには省く。

實 驗 成 績

(A) 水田土壤 各道における埴土(作土及心土)の Fe^{+++} を 5 ppm の間をもつ階級に分ち各階級における pH の平均値を算出し次の如き結果を得た。

x (ppm)	平均 點數	pH
0~5	19	6.85
5~10	12	5.88
10~15	2	5.78
15~20	1	5.30
25~80	3	5.35

これらの平均値を對數方眼紙上に畫けば上圖の示す如く明かに直線をなすから $y = ax^b$ なる函数式で表はすことができる。恒數決定に關する計算は省くが決定された式は次の如くである。

$$y = 7.704x^{-0.122}$$

この函数式の適否を判定するため計算値 (Y_c) と實測値 (Y_o) との殘差 (d) を算出すれば次の如くである。

x (中央の値)	Y_o	Y_c	$d = Y_o - Y_c$
2.5	6.85	6.89	-0.04
7.5	5.88	6.03	-0.15
12.5	5.76	5.66	0.10
17.5	5.30	5.43	-0.13
27.5	5.35	5.14	0.21

上表の示す如く何れも殘差は甚だ小であるから上記の函数式は充分實際に應用することができる。即ち Fe^{+++} 量を知れば直ちに計算により pH を求むることができる。

x (ppm)	平均 點數	pH
0~5	10	6.79
5~10	2	6.50
10~15	1	5.99
15~20	1	5.01
25~30	2	5.33

(B) 畑土壤 各道における埴土(作土及心土)の Fe^{+++} を 5 ppm の間をもつ階級に分ち各階級における pH の平均値を算出し次の如き結果を得た。

これらの平均値を對數方眼紙上に畫けば上圖の

示す如く明かに直線になるから $y = ax^b$ なる函数式で表はすことができる。恒数決定に関する計算は省くが決定した式は次の如くである。

$$y = 8.664x^{-0.165}$$

この函数式の適否を判定するため計算値 (Y_c) と実測値 (Y_o) との残差 (d) を算出すれば次の如くである。

x (中央の値)	Y_o	Y_c	$d = Y_o - Y_c$
2.5	6.79	7.44	-0.65
7.5	6.50	6.22	0.28
12.5	5.99	5.72	0.27
17.5	5.01	5.41	-0.40
27.5	5.33	5.02	0.31

上表の示す如く何れも残差は甚だ小であるから上記の函数式は充分實際に應用することができる。即ち Fe^{+++} 量を知れば直ちに計算により pH を知ることができる。

要 約

埴土における pH と Fe^{+++} との函数式に関する成績を要約すれば次の如くである。

1. 埴土に於ては水田土壤たると畑土壤たるとを問はず pH と Fe^{+++} との間には極めて密なる相關が認められ一つの函数式で表はすことができる。

2. 水田土壤における函数式は次の如くであつて實測値と極めてよく一致する。

$$y = 7.704x^{-0.122}$$

3. 畑土壤における函数式は次の如くであつて實測値と極めてよく一致する。

$$y = 8.664x^{-0.165}$$

4. 故にこれらの函数式は充分實際に應用することができる即ち土壤中の Fe^{+++} を知れば直ちに計算により pH を求むることができる。

文 献

1. Misu: Nōzisenkyō-ihō (Tyōsen) 8 (Syw. 11n.) 177; 9 (Syw. 12n.) 1, 216
2. —: 土肥, 14 (昭和15年) 428, 503, 556, 607
3. —: 農化, 17 (昭和16年)

(第22報) 全土性における pH と Fe^{+++} との函数式

緒 言

何れの土性に於ても水田及畑兩土壤共に pH と Fe^{+++} との間には極めて密接なる函数的關係があることは既に述べた通りであるが全土性を平均した場合にも亦全く同様極めて密なる相關が認められ且一つの函数式で表はし得ることを認めたのでこゝに水田土壤及畑土壤に分ち報告する。

實 験 成 績

(A) 水田土壤 各土性における水田土壤の pH 及 Fe^{+++} を平均し次の如き結果を得た。

x (ppm)	平均 点数	pH
0~5	217	6.67
5~10	151	5.82
10~15	47	5.60
15~20	20	5.48
20~25	6	5.43
25~30	6	5.50
30~35	1	5.02
75~80	1	5.33

これらの平均値を対数方眼紙上に畫けば上圖の示す如く明かに直線をなすから $y = ax^b$ なる函数式であらうとすることができる。恒数決定に關する計算は省くが決定された式は次の如くである。

$$y = 6.753x^{-0.067}$$

この函数式の適否を判定するため計算値 (Y_c) と實測値 (Y_o) との残差 (Δ) を算出すれば次の如くである。

x (中央の値)	Y_o	Y_c	$\Delta = Y_o - Y_c$
2.5	6.67	6.35	0.32
7.5	5.82	5.90	-0.06
12.5	5.60	5.72	-0.12
17.5	5.48	5.58	-0.10
22.5	5.43	5.48	-0.05
27.5	5.50	5.42	0.13
32.5	5.02	5.36	-0.34
77.5	5.33	5.05	0.28

上表の示す如く何れも残差は甚だ小であるから上記の函数式は充分實際に應用することができる。即ち任意の土壌中の Fe^{+++} 量さへ定量すれば直ちに計算により pH を算出することができる。

(B) 畑土壌 各土性における畑土壌の pH 及 Fe^{+++} を平均し次の如き結果を得た。

x (ppm)	平均 点数	pH
0~5	337	6.65
5~10	61	5.93
10~15	22	5.67
15~20	10	5.31
25~30	6	4.99
75~80	1	4.59

これらの平均値を対数方眼紙上に畫けば上圖に示す如く明かに直線を示すから $y = ax^b$ なる函数式で表はすことができる。恒数決定に關する計算は省くが決定された式は次の如くである。

$$y = 7.551x^{-0.120}$$

この函數式の適否を判定するため計算値 (Y_c) と實測値 (Y_o) との殘差 (d) を算出すれば次の如くである。

x (中央の値)	Y_o	Y_c	$J=Y_o-Y_c$
2.5	6.65	6.76	-0.11
7.5	5.93	5.93	0
12.5	5.67	5.57	0.10
17.5	5.31	5.36	-0.05
27.5	4.99	5.07	-0.08
77.5	4.59	4.48	0.11

上表の示す如く何れも殘差は甚だ小であるから上記の函數式は充分實際に應用することができる即ち任意の土壤の Fe^{+++} 量さへ定量すれば直ちに計算により pH を求むることができる。

要 約

全土性における pH と Fe^{+++} との函數式に關する成績を要約すれば次の如くである。

1. 土性の如何をとらず水田土壤にありても畑土壤にありても pH と Fe^{+++} との間には極めて密接なる相關が認められ且一つの函數式で表はすことができる。
2. 水田土壤における函數式は次の如くであつて實測値と極めてよく一致する。又この函數式は如何なる土性を有する水田土壤にも應用することができる。

$$y = 6.753x^{-0.067}$$

3. 畑土壤における函數式は次の如くであつて實測値と極めてよく一致する。又この函數式は如何なる土性を有する畑土壤にも應用することができる。

$$y = 7.551x^{-0.120}$$

4. 故にこれらの函數式は充分實際に應用することができる即ち任意の土壤中の Fe^{+++} さへ定量すれば pH は計算により簡易に求むることができる。