酸化細菌に関する研究 (第 3 報) *Pseudomonas fluorescens* species

の 2 菌株の酸化的性質

横 沢 清 (東京大学農学部農芸化学教室)

昭和 27 年 4 月 1 日 受理

Studies on the Oxidative Bacteria. Part 3. Oxidative Properties of the
2 Strains of the Isolated *Pseudomonas fluorescens* species

By Kiyoshi YOKOSAWA (Dept. of Agr. Chem., Fac. of Agr. Univ. of Tokyo)

著者は前報⁽¹⁾及び前々報⁽²⁾に於て 13 株の *Pseudomonas* 属酸化細菌を分離し、それらの菌の形態学的、生理学的及び生化学的性質をあきらかにしたが、本報に於ては著者の分離した 9 株の *Pseudomonas fluorescens* species の中から葡萄糖を 2-ケトグルコン酸に酸化する菌の中菌株 33 F を、又グルコン酸に酸化する菌として菌株 40 F の 2 株の菌を選んで振盪培養法により hexose 及び pentose の酸化を行つてみた。又菌株 33 F の resting cell を用いて種々の基質に対する脱水素酵素能を調べた。PERVOZVANSKII⁽³⁾、LOCKWOOD⁽⁴⁾ 等によれば *Pseudomonas* 属酸化細菌は hexose をそれぞれの -onic acid に酸化し、又 LOCKWOOD⁽⁵⁾ により報告されたように pentose をもそれぞれの -onic acid に酸化する事実があきらかにされている。著者の菌株 40 F は何れもこのような性質を示したが、菌株 33 F は如上の報告には見られなかつた酸化的性質を示した。

実験と考察

I. 振盪培養による酸化

1. 葡萄糖の酸化 培養液として $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 0.15%, KH_2PO_4 0.2%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2%, glucose 9.5% の組成のものを用いた。300 ml 容平底フラスコに 50 ml 分注し滅菌後炭酸石灰 1.6 g を無菌的に加え、24 時間肉汁寒天斜面に前培養せる菌を 1 白金耳接種して 26~27° で振盪培養した。

Fig. 1. Oxidation of *D*-glucose

1 : Strain No. 33 F

2 : Strain No. 40 F

菌株 33 F は Fig. 1 に示す如く glucose の還元力は漸次減少するが或る点で還元力の減少は極めて緩慢になり、以後殆んど還元力の減少は見られなくなる。添加した炭酸石灰は菌の生育と共に急速に溶解し 30 乃至 48 時間で殆んど完全に溶解した。pH は 6.0 ~ 6.5 の間を維持する。

菌株 40 F は菌の生育と共に添加炭酸石灰は急速に溶解し、同時に還元力を極めて急速に減少し、30 乃至 48 時間後には還元力、炭酸石灰共に消失した。

両菌株共振盪培養後の培養液中の溶存カルシウムは glucose が完全に酸化された場合の理論的数値の 80~90% の間にあり、菌株 40 F にあつてはグルコン酸石灰の得量は理論値の 70~80% の間にあつた。菌株 33 F の 2-ケトグルコン酸得量は正確に測り得なかつたが、還元力及び溶存カルシウムより類推して 70~80% の間にあるものと思われる。

2. ガラクトースの酸化 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 0.15%, KH_2PO_4 0.2%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2% 及び蒸留水よりなる液 (KOH にて pH 6.0 に調整) を基本液とし、之にガラクトース及び炭酸石灰を添加して 33 F, 40 F の 2 菌株について振盪培養を行つた。

培養液の種類 A 及び B : 基本液 + ガラクトース 3%

C : 基本液 + ガラクトース 3% + 葡萄糖 0.1%

D : 基本液 + ガラクトース 3.3% + 葡萄糖 0.1%

上記の培養液 20 ml を 300 ml 容平底フラスコに分注し、滅菌後 A, B, C は炭酸石灰 0.15 g を、又 D は 0.17 g を無菌的に加え菌を接種後 26~27° で振盪培養した。

33 F を用いた場合の培養液の還元力の変化は Table 1 及び Fig. 2 の如くである。炭酸石灰は 48 時間前後

Table 1. The Change of Reducing Power of the Galactose Media when Strain No. 33 F was grown in Shaking Culture.

Hours	Before inoculation	24	48	68	94	240	290	336
Medium								
A	51.8		6.7			25.28		27.08
B	51.8		8.7			23.73		25.54
C	52.8		8.3			35.08		36.89
D	60.3	23.8	10.8	13.3	19.8		41.5	

Expressed as mg of Cu reduced per ml of media

Fig. 2. Oxidation of *d*-galactose (strain No. 33 F)

前後で還元力は消失し、添加炭酸石灰は殆んど溶解した。溶存カルシウムの量は生成した酸がガラクトン酸とすれば理論値の 80~90% であつた。

ガラクトン酸石灰の確認： 33 F を用いてガラクトースを酸化せしめる場合、48 時間前後に於て培養液の還元力が一時最低となり、再び還元力が増加して来るが、この最低の時期にガラクトン酸が集積されるものと見てこの時期に於て培養を中止し培養液中のガラクトン酸石灰の確認を試みた。

前記基本液にガラクトース 3.57% を溶解し 300 ml 容平底フラスコに 20 ml 宛分注し、滅菌後炭酸石灰 0.3 g 加えて 33 F を接種し 26~28° で 46 時間振盪培養した。7 箇のフラスコ培養液を集め 3,000 r. p. m. にて 15 分間遠心し、炭酸石灰及び菌体を除去した。この上澄液を分析したところ溶存カルシウムは理論値の 84%, 又還元力は原糖の 8.2% であつた。上澄液を集め減圧濃縮したところ濃縮中多量の白色柱状の結晶が析出した。この結晶を集めて熱水から再結晶し、其の一部をとつて 5 mg Hg の減圧下に 100° で恒量になる迄乾燥しカルシウム量を定量した。

Found : Ca 9.25%, Calcd. for $(C_6H_7O_{11})_2Ca$: Ca 9.30%.

即ちガラクトン酸石灰と一致する。次にこのカルシウム塩を水に溶解し蓚酸を加えて脱石灰し過剰の蓚酸をエーテル抽出して除去し、遊離酸としたものに炭酸カドミウムの微粉末を溶解するまで加える。不溶の部分を除き放置すると菱柱状の微小な結晶よりなる集塊が生ずる。このものは水に極めて難溶でガラクトン酸カドミウムの特性⁽⁶⁾とよく一致する。以上から著者は培養液中より得られたカルシウム塩はガラクトン酸石灰と断定した。

40 F の培養液についても同様の結果が得られた。

3. マンノースの酸化 前記基本液に葡萄糖 0.1%, マンノース 3% を溶解し、炭酸石灰を加えたものを培養液とし、之に菌株 33 F, 40 F を接種し 26~28° で振盪培養を行つた。其の結果 2 菌株共 48~72 時間の間に培養液の還元力は消失し、添加炭酸石灰は溶解し明かに酸の形成が見られた。培養液中の溶存カルシウムの量はマンノースが完全にマンノン酸に酸化されたものとして、理論値の 85~90% であつた。なお長時間の培養によつても培養液の還元力の発現は見られなかつた。

マンノン酸の確認： 培養液として乾燥麦酒酵母 1% 熱水浸出液にマンノースを 2% に溶解したものをを用い、500 ml 容振盪フラスコに 100 ml 分注して当量の炭酸石灰を添加し、肉汁寒天斜面に 20 時間前培養せる菌株 33 F を接種し 30°, 30 時間振盪培養した。培養液の還元力は消失し炭酸石灰は完全に溶解した。培養終了せる液を集め醋酸鉛を加えて脱蛋白し、硫化水素を通じて鉛を除き、減圧濃縮した後蓚酸を加えてカルシウムを除去し、醋酸及び蓚酸をエーテル抽出して除去した。この液の酸度を滴定してこれがすべてマンノン酸であるとして、マンノン酸・醋酸ソーダ・フェニルヒドラジンの重量比が 1.5 : 1 : 1.5 になる如く醋酸ソーダ及びフェニルヒドラジンを加え、之に醋酸を 10% になる如く加えた。2 時間還流冷却器をつけて湯煎上に加熱し、生ずる

で殆んど溶解し、pH は 5~6 の間にあつた。培養後分析を行つた所、揮発酸量は醋酸として 1 mg/ml 前後で極めて少く、エーテル可溶部には還元性物質は殆んどみとめられない。溶存カルシウムはガラクトースがガラクトン酸に完全に酸化されたとして其の理論値に対し 90~95% であつた。従つて 33 F の場合にはエーテル不溶の還元性酸が相当量生成されていることを示唆する。之に反し 40 F を用いた場合は 48 時間

沈澱を集めて熱水から再結晶せしめ、更に骨炭にて脱色し数回熱水より再結晶して白色針状結晶を得た。このものの融点は 215° で FISCHER⁽⁷⁾ の得た $214\sim 216^{\circ}$ と一致する。尙窒素含量を定量したところ次の通りであつた。

$C_{12}H_{18}O_6N_2$ Found : N, 9.88%, Calcd. : N, 9.80%

依つてマンノン酸の phenylhydrazid と断定した。

4. キシロースの酸化 前記基本液に葡萄糖 0.1% 加え之にキシロースを 2 種の濃度に溶解し、300 ml 容平底フラスコに 20 ml 宛分注し滅菌後炭酸石灰を当量よりやや少く無菌的に加え、之に肉汁寒天斜面に 24 時間前培養せる 33 F, 40 F の 2 菌株を 1 白金耳接種し $26\sim 28^{\circ}$ で振盪培養した。

Medium A : Xylose 4%, $CaCO_3$ 1.5% Medium B : Xylose 3.1%, $CaCO_3$ 1%.

上の 2 種の培養液にて 33 F を培養せる結果は Table 2 及び Fig. 3 に示す如くであつた。即ち菌株 33 F

Table 2. The Change of Reducing Power of the Xylose Media when Strain No. 33 F was grown in Shaking Culture.

Hours	Before inoculation	60	72	96	216	264	320
Medium A	72.75		8.8	14.4	46.7	47.0	
B	58.50	8.6			42.0		43.0

Expressed as mg of Cu reduced per ml of media

Fig. 3. Oxidation of *d*-xylose (Strain No. 33 F)

分析した (Table 3). 分析の終つた液を減圧濃縮し 75% アルコールを加えて沈澱せしめ、シロップ状の沈澱物を水に溶解し蓚酸にて脱石灰し過剰の蓚酸をエーテル抽出によつて除去した。

の場合には培養液の還元力は時間と共に一旦急速に減少し後再び徐々に増加する。菌株 40 F を培養した場合は培養液の還元力は次第に消失し 72 時間内外で痕跡となり以後還元力の増加はみとめられなかつた。両菌株共添加炭酸石灰は菌の発育と共に溶解し糖の消費と炭酸石灰の溶解とは平行した。

キシロン酸塩の単離 菌株 33 F を用いて振盪培養中一旦還元力が減少する時期にキシロン酸が集積されるものとみて、この時期にキシロン酸塩の単離を試みた。上述の基本液に葡萄糖 0.1% 及びキシロース 4% を溶解したものを培養液として用い、300 ml 容平底フラスコに 35 ml 宛分注し滅菌後炭酸石灰 0.5 g 宛添加した。肉汁寒天斜面に 24 時間前培養した菌を接種し 30° で 72 時間振盪培養し、培養終了後液を集め遠心分離し炭酸石灰及び菌体を除き、上澄液について

Table 3. The Oxidation of *d*-Xylose by *Pseudomonas fluorescens* sp.

Strain	Hours	<i>d</i> -Xylose		Acid yield based on <i>d</i> -xylose*	
		Supplied mg/ml	Consumed mg/ml	Supplied(theoret.)	Consumed(theoret.)
33 F	72	40.12	37.32	89.0	95.7
40 F	88	41.20	36.90	79.4	88.6

* Calculated from the data on Ca in solution.

Cinchonin 塩 : 上に得られた酸の溶液に cinchonin を加え加熱しつつ溶解せしむ。不溶の部分を濾別し濾液を氷室内に置くと結晶が析出する。この結晶を酒精から再結晶せしめて純白色細針状の結晶を得た。このものの融点は $162\sim 163^{\circ}$ で NEF⁽⁸⁾ により報告せられた 170° 及び NEUBERG⁽⁹⁾ の 180° なるものは得られなかつた。

Cadmium 塩の $CdBr_2$ 複塩⁽¹⁰⁾ : 炭酸カドミウムが得られなかつたので上記の酸の溶液を一旦苛性ソーダで中和し、之に計算量よりやや過剰の硝酸カドミウムを加えて溶解し、次に之に臭素を滴々攪拌しながら加えると直ちに臭素の吸収が起り、プリズム細針状の微小な結晶が夥しく析出して来る。これがキシロン酸カドミウム塩の $CdBr_2$ 複塩であるか否かの同定はしなかつたがキシロン酸の特性をよく現わしている。以上の結果から LOCKWOOD⁽⁵⁾ 等の研究とあわせて 33 F の培養液中の非還元性の有機酸がキシロン酸であると断定することは早計であるが其の可能性は充分強い。40 F の培養液についても同様の結果が得られた。

5. アラビノースの酸化 培養液は前記基本液に葡萄糖 0.1% 及び *l*-アラビノース 3% を溶解したものをを用い、之を 300 ml 容平底フラスコに 20 ml 宛分注滅菌後炭酸石灰 0.2 g を加え、之に予め肉汁寒天斜面に 24 時間前培養せる菌を 1 白金耳接種し $26\sim 28^{\circ}$ で振盪培養を行つた。33 F, 40 F の両菌株共よく発育し培養液の還

元力は次第に減少し添加炭酸石灰も溶解し明らかに酸の生成が見られた。33F を用いた場合はキシロース、ガラ

Table 4. The Oxidation of *l*-Arabinose by *Pseudomonas fluorescens* sp.

Strain	Days	Reduced Cu (mg/ml)
33 F	0	57.27
	3	3.62
	10	5.16
40 F	0	57.27
	3	4.15
	10	trace

クトースを基質にした場合と同様に還元力が一旦減少し後再び増加する結果が得られたがキシロース、ガラクトースの場合の如く顕著ではなかつた (Table 4)。40 F を用いて培養を行つた場合には還元力増加は全然認められなかつた。LOCKWOOD⁽⁵⁾ 等の研究から見てこれらの場合生成した酸が *l*-アラボン酸であることが推定される。

***l*-アラボン酸の確認** 乾燥麦酒酵母 1% 熱水浸出液に *l*-アラビノース 2% を培養液として用い、之を 500 ml 容振盪培養用フラスコに 100 ml 分注し当量の炭酸石灰を加え、之に予め肉汁寒天斜面に 20 時間前培養せる 33 F を接種し、30° で 6 日間振盪培養した。培養液の還元力は痕跡程度で添加炭酸石灰は殆んど溶解した。醗酵液を集め醋酸鉛を加えて蛋白質を除き、後硫化水素を通じて鉛を除去した。この液をエーテル抽出して醋酸を除き炭酸石灰を加えて pH 6.0 に中和し濾過した後減圧濃縮する。この濃縮液に酒精を加えて氷室内に置けば白色針状若しくは柱状の結晶が析出する。これを水及び酒精から再結して美麗な白色結晶を得た。このものを減圧下に 100° で恒量になる迄乾燥しカルシウム含量を定量した。

(C₅H₉O₆)₂Ca Found : Ca, 11.0%. Calcd. : Ca, 10.8%.

又上に得られたカルシウム塩を水に溶解しイオン交換樹脂を用いて遊離酸となし brucin にて中和し、過剰の brucin をクロロホルムで除去して濃縮し氷室中に置けば白色針状結晶を得る。之を 60% 酒精から再結晶した。このものの融点は 152~153° で LOCKWOOD⁽⁶⁾ により報告されたものと一致した。

依つて著者はここに得られた酸を *l*-アラボン酸と断定した。

II. Resting cell による酸化

1. **Resting cell の製法** KH₂PO₄ 0.1%, MgSO₄·7H₂O 0.1%, (NH₄)₂SO₄ 0.15%, glucose 2.0% 及び蒸留水よりなる液を 10% KOH にて pH 6.0 に調整した。この液を以下基本液と称する。予め肉汁寒天斜面からこの基本液に 33 F を接種し 30°, 2 日静置培養する。別にこの基本液に寒天 2% 加えて溶解せしめ、普通のルー瓶に 70 ml 宛分注し、滅菌後 1.0 g 程度滅菌炭酸石灰を加えてよく混和せしめ瓶を横にして 100° 附近で暫く放置して炭酸石灰を沈殿せしめてから冷却する。寒天が固つてからその上に滅菌基本液を 50 ml 宛無菌的に分注し次に基本液に培養して置いた菌を 5 ml 宛この瓶に分注接種し 30°, 3 日間静置培養する。この際瓶は横にしたままで培養液が寒天の層の上を全面に薄く覆うようにする。培養が終つたらこの培養液を集めて振盪し菌体を充分に分散せしめた後、500 r. p. m. で遠心し寒天、炭酸石灰其の他の夾雑物を除き菌液のみを集める。この菌液を 3,000 r. p. m. で 20 分遠心し菌体を沈殿せしめ、沈殿した菌体を生理的食塩水に懸濁し、振盪機で 10 分間振盪し再び遠心する。これを 3~4 回反復する。かくして洗滌し、最後に遠心して菌体のみを集め素焼板の上で水分を或る程度除き秤量し易いようにして置く。

2. **グルコン酸の酸化** グルコン酸石灰 4 g を蒸留水に溶解して 100 ml となし、この液 23 ml をとり之に SÖRENSEN の磷酸緩衝液 (pH 6.5) 2 ml を加えて 25 ml となし、之を 300 ml 容丸底フラスコに分注した。之に水分含量 57.6% の resting cell 0.20 g を加え 28° で振盪した。振盪開始後 4 時間、19 時間及び 48 時間後に溶液中の還元力を測定した (Table 5)。

Table 5. The Oxidation of *d*-Gluconic Acid by the Resting Cell of Strain No. 33 F

Supplied <i>d</i> -gluconic acid* mg/ml	Reducing power of medium Reduced Cu mg/ml		
	4 hrs.	19 hrs.	48 hrs.
35.08	25.19	43.96	36.55

* Supplied in the form of Ca-gluconate :-Calculated by determination of Cu

還元力の測定はこの振盪液を 3,000 r. p. m. で 15 分間遠心して菌体を沈殿せしめ、その上澄液について測定した。振盪開始前の溶液中のグルコン酸の量はカルシウムを定量しそれから算出した。

Table 5 に示す如く溶液中の還元力は急速に増加し 48 時間附近では却つて減少するが、この減少は 2-ケ

トグルコン酸石灰が同化されるか或は他の低還元性又は非還元性物質に変化したものと解せられる。STUBBS⁽¹¹⁾ によれば 2-ケトグルコン酸の還元力は葡萄糖の 87% と報告されているが 19 時間後の還元力を之に基いて計

Table 6. Test for the Dehydrogenase of Strain No. 33 F by THUNBERG'S Method

Substrate	Time required to reduce	Activity coef. (I)
d-Glucose	10'00''	10
Ca gluconate	7'20''	14
K-2-ketogluconate	>150'	0
d-Galactose	15'	7
Ca galactonate	28'	4
d-Xylose	16'	6
Ethanol	60'	2
*d-Glucose + Ca gluconate	4'30''	22
Control	>150'	0

0.5 ml of cell suspension, which contains 16.2 mg of dry cell per ml, and 0.5 ml of 0.001 M 2,6-dichlorophenol indophenol, 0.5 ml of 0.35 M substrate solution and 2.0 ml of 1/15 M phosphate buffer were used in this test.

* 0.25 ml of 0.35 M d-glucose solution and 0.25 ml of 0.35 M Ca gluconate solution were used.

が、著者は之に倣い色素には 2,6-dichlorophenolindophenol の 0.001 モル溶液を用いた。菌体分離後冷蔵庫内に保存し 24 時間以内に実験に使用した。基質には 0.35 M の葡萄糖、グルコン酸石灰、2-ケトグルコン酸加里、ガラクトース、ガラクトン酸石灰、キシロース及び酒精を用いた。この濃度は THUNBERG 管内で基質液、色素液、緩衝液及び菌体懸濁液を混合した場合丁度基質濃度が 0.05 モルになる。緩衝液には pH 6.45, 1/15 M の磷酸塩緩衝液を用いた。THUNBERG 管の主室に菌液 0.5 ml と緩衝液 2.0 ml を、側室に基質液 0.5 ml と色素液 0.5 ml を容れ、管内の空気を除去してから 30° の恒温水槽中で両者を混合してから色素が脱色する迄の時間を測定した。尙対照試験は同一条件で基質液の代りに蒸留水を用いた (Table 6)。

この結果 Table 6 に示す如く LOCKWOOD⁽⁴⁾、池田⁽¹²⁾が報告した如くグルコン酸を酸化して 2-ケトグルコン酸を生成する速度は、葡萄糖を酸化してグルコン酸を生成する速度より速い。従つて葡萄糖を基質として培養した場合、培養液中にグルコン酸が集積することなく直ちに 2-ケトグルコン酸が生成されるという事実を裏書するものと云える。この実験に用いた基質のうち 2-ケトグルコン酸のみが酸化をうけないが、他の基質はすべて酸化をうけることを示している。酒精の場合脱色時間がかなり長い、やはり酸化を受けることを示しいわゆる *Eugluconobacter*⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾ とは異なる。ここに興味があることは葡萄糖とグルコン酸を混合したものを基質とした場合には、それぞれの単独の場合より脱色時間が短かく、酵素活性度 *I* は混合の場合は 22 で又単独の場合の和が 24 で極めて近似している。このことは葡萄糖脱水素酵素とグルコン酸脱水素酵素がそれぞれ別個に存在するのではないかと想像される。

結 語

1. 著者は著者の分離した *Pseudomonas fluorescens* に属する菌株 No. 33 F 及び No. 40 F の 2 菌株を用いて各種糖類に対する酸化的性質を振盪培養によつて試験した。前者は 2-ケトグルコン酸生産菌であり、後者はグルコン酸生産菌である。

2. No. 33 F は葡萄糖を 2-ケトグルコン酸に酸化し、その収率は溶存カルシウム量から計算して 30~40 時間内に 80~90% に達する。No. 40 F はグルコン酸に酸化しその収率は 30~40 時間内に 70~80% である。

3. 両菌株共 d-ガラクトース、d-キシロース、l-アラビノースを酸化してそれぞれの -onic acid を生産する。何れの菌株の場合も培養後 50 時間以内で還元力は原糖の 10% 内外に減少し添加炭酸石灰を完全に溶解するが、この時期に於てそれぞれの -onic acid を得た。No. 33 F にあつては減少した還元力は後次第に増加しガラクトース及びキシロースの場合は増加は最初の糖の還元力の 50~70% に達するが、アラビノースの場合は極めて僅少であつた。No. 40 F の場合は還元力の増加は見られなかつた。即ち No. 33 F はガラクトース、キシロースを基質とした場合 -onic acid より更に還元性の酸に酸化が進むものと考えられる。

4. マンノースを基質とした場合両菌株共 72 時間以内に還元力は消失し培養液中の溶存カルシウムはマンノースが完全にマンノン酸に酸化されたとして理論値の 85~90% であつた。培養終了後の液からマンノン酸を得た。

すると 2-ケトグルコン酸 26.5 mg となり、始めのグルコン酸の量の 75.5% となる。即ち resting cell を用いた場合は普通の振盪培養法に比して 2-ケトグルコン酸の収量及び其の生成速度は遙かに優れていると云える。

3. 脱水素酵素能試験 THUNBERG 管を用い菌体の脱水素酵素による色素の還元時間を計り、其の時間の長短により脱水素酵素の強弱を比較した。又次の式により酵素の活性度 *I* を算出した。

$$I = 100 \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad \begin{array}{l} A: \text{脱色するまでの時間} \\ B: \text{対照が脱色するまでの時間} \end{array}$$

植付はグルコン酸菌の脱水素酵素能の試験に於て 2,6-dichlorophenolindophenol が種々の基質の酸化の際、活性の水素受容体となることを明らかにした

5. 菌株 33 F の resting cell を用いてグルコン酸の酸化を行つたところ、20 時間以内でもとのグルコン酸の 75% に相当する 2-ケトグルコン酸を生じ、以後漸次漸少する。

6. THUNBERG 管を用い、2,6-dichlorophenol indophenol を水素受容体の色素として菌株 33 F の脱水素酵素能の試験を行つたところ、葡萄糖、グルコン酸、ガラクトース、ガラクトン酸、キシロース及び酒精は酸化を受けることを示した。2-ケトグルコン酸は殆んど酸化を受けず、又グルコン酸を酸化する速度は葡萄糖を酸化する速度より早いことを示した。

終りに臨み本研究の遂行に当り終始懇篤な御指導を与えられた東大農学部朝井勇宜教授及びマンノン酸とアラボン酸の確認を担当された東大農学部朝井研究室上野靖博氏に感謝する。又本研究費の一部は文部省科学研究費の援助によることを附記する。

(1) 横沢 豊化, 26, 313 (1952)	(7) E. FISCHER : <i>Ber.</i> , 22, 3226 (1889).
(2) 横沢 : 豊化, 25, 556 (1952)	(8) NEF : <i>A.</i> , 403, 250 (1914).
(3) V. V. PERVOZVANSKII : <i>Microbiology</i>
(U.S.S.R.), 8, 149 (1939); <i>Chem. Abstr.</i> ,
34, 7321 (1940).	(9) NEUBERG : <i>Ber.</i> , 35, 1475 (1902).
(4) L. B. LOCKWOOD, B. TABENKIN and G.
E. WARD : <i>J. Bact.</i> , 42, 51 (1941).	(10) H. MEYER : <i>Nachweis und Bestimmung</i>
<i>organischer Verbindungen</i> (1933).
(5) L. B. LOCKWOOD and G. E. N. NELSON :
<i>J. Bact.</i> , 52, 581 (1946).	(11) J. J. STUBBS : <i>Ind. Eng. Chem.</i> , 32,
1626 (1940).
(6) E. FISCHER : <i>Ber.</i> , 33, 2146 (1900).	(12) 池田 : 農化, 24, 147 (1951).
	(13) 朝井 : 農化, 11, 689 (1935).
	(14) 植村 : 農化, 17, 1019 (1941).

Summary

1. The oxidative properties of the two strains which belong to *Pseudomonas fluorescens* species isolated by the author were studied by shaking culture. The one is a 2-keto-gluconic acid producer and its strain No. is 33 F. The other is a gluconic acid producer and its strain No. is 40 F.

2. Strain No. 33 F oxidized glucose to 2-keto-gluconic acid and gave 80 to 90% yield in 30 to 40 hours, based on dissolved Ca. Strain No. 40 F oxidized glucose to gluconic acid and the yield obtained was 70 to 80% in 30 to 40 hours culture.

3. Both strains oxidized *d*-galactose, *d*-xylose and *l*-arabinose to their respective -onic acids. The reducing powers of the above three culture media decreased to about 10% of the initial ones in 50 to 70 hours and then increased gradually, when strain No. 33 F was grown. The increase in the reducing powers attained 50 to 70% of the initial ones in the case of *d*-galactose and *d*-xylose but was very slight in the case of *l*-arabinose.

4. Both strains oxidized *d*-mannose to mannonic acid. The reducing power of culture media disappeared in 72 hours.

5. The resting cell of strain No. 33 F oxidized gluconate to 2-keto-gluconate, and the yield attained about 75% in 20 hours by shaking.

6. The resting cell of strain No. 33 F proved to oxidize *d*-glucose, gluconate, *d*-galactose, galactonate, *d*-xylose, xylonate and ethanol when 2,6-dichlorophenolindophenol was used as a hydrogen acceptor in Thunberg's tubes.

細菌胞子の耐熱性に関する研究 (第5報) 加熱後の培養基 組成の影響 (其の2) ビタミン及び N 源に就て

天 羽 幹 夫* (東京大学農学部醸酵学教室)

昭和 27 年 4 月 3 日 受 理

Studies on the Heat Resistance of Bacterial Spores. Part 5. Influences of Vitamins and Amino Acids in the Synthetic Subculture Media on the Survival Time.

By Mikio AMAHA (Dept. of Agric. Chem., Fac. of Agric., Univ. of Tokyo)

著者は第3報⁽¹⁾に於て、加熱後の培養基組成の中特に糖類の影響に就て検討し、糖類の存否により *Bacillus*

* 社団法人日本罐詰協会、派遣研究員。