米のタンパク質顆粒およびアリュースロン顆粒

(昭和56年度農芸化学奨励賞受賞)

田 中 國 介

(京都大学食糧科学研究所)

はじめに

われわれの食糧の多くは穀実を原料としている。このうち、日本人にとって、米は最も重要な穀実である。世界的にも米食人口は最も多く、食糧としての米の重要性はいまさら強調する必要はない。重要な穀実であるだけに、これまで米の生産技術に関する研究や米の栄養成分に関する研究は、他の穀実に比べて多い。しかしながら、古来、日本人が身近に接しながら、また将来も日本人の生活と切り離せない食糧であるわりには、まだ十分に調査されていない部分もある。とくに、微細構造やタンパク質、ミネラルの存在形態などについて不明なことも多い。

筆者は米種子中でのリン酸代謝の研究を進めているうち、米種子の成熟とともにリンがアリュースロン層に集積することを、近年発達した電子線プローブ分析を用いて明らかにし、さらに ^3H -myo-inositol を用いるマイクロオートラジオグラフィーにより、リンはフィチン酸としてアリュースロン層に集積することを明らかにした。さらに、アリュースロン細胞に含まれる顆粒を単離することにも成功し、この顆粒がフィチン酸に富むことを明らかにした。さらに、この顆粒がフィチン酸合成、分解系の酵素を含むことを証明し、アリュースロン顆粒のもつ生理的機能に関する新知見も得た。

また、米貯蔵タンパク質の集積の機構を研究する過程で、米の貯蔵タンパク質がデンプン性胚乳のタンパク質顆粒に局在することを示し、この顆粒が形態的、タンパク質組成的に2種類あることを明らかにし、さらに両者の起源の異なることを電子顕微鏡観察、分子生物学的方法によって立証した。

1. フィチン酸とアリュースロン顆粒

アリュースロン顆粒は、アリュースロン層中に存在する3~4 μm の顆粒である。アリュースロン層は、米、麦等のイネ科植物種子ではデンプン性内胚乳と表皮(種皮)との間に存在する1~数層の細胞層でその形態がはっきりしている。しかし、大豆等豆科植物の場合は、組織的に明確でない。

筆者は、アリュースロン顆粒という言葉をも米、麦等、禾本科植物種子のアリュースロン細胞中の顆粒に限定して用いている。研究者によっては、後述のデンプン性胚乳中に存在するタンパク質顆粒(プロテインボディ)と混同して用いる場合もあるが、両者は区別して用いるべきである。

1. フィチン酸

フィチン酸は、すべての植物種子の重要なリンの貯蔵形態である。この化合物は時に種子の全リンの80%を占める。

一方、植物種子、とくに米や麦類は人類にとって主食であるため、フィチン酸は日常的にわれわれの体に取り込まれている。家畜等の飼料としてこれら穀類や豆類が用いられる場合は、動物体内に常に取り込まれている。動物に多量に摂取されると、フィチン酸は栄養障害を起す。フィチン酸の栄養障害に関する研究は、すでに多数あり、Ca, Mg, Zn, Fe等の吸収阻害をフィチン酸が引き起していることはよく知られている⁽¹⁾。そのため、種子からの油、タンパク質等の調製の際にフィチン酸を除去することは重要な作業となっており、フィチン酸の集積場所や集積状態を知ることはきわめて重要である。

筆者は、まずフィチン酸の機能を知るために、もう一つは、フィチン酸の栄養障害防止のための合理的の方策を知るため、米種子中でのこの化合物の生合成、集積、分解に関して、幅広く調査した。

米種子中でのフィチン酸合成は、開花一週間後に急速

† Protein Bodies and Aleurone Particles in Rice Grains.

Kunisuke TANAKA (The Research Institute for Food Science, Kyoto University, Uji, Kyoto 611)

に進行しはじめる。フィチン酸合成の場所は不明であったが、合成の最も盛んと思われる開花後 10 日ごろの登熟期種子を胚、胚乳、アリュールン層に分離し、それぞれの組織でのフィチン酸の合成能を調べることににより非常にはっきりした結果が得られた。

すなわち、図 1 に示すようにフィチン酸合成は、主にアリュールン層で進行し、胚乳では合成されないことがわかった⁽²⁾。胚ではある程度の合成が進むが、これは胚盤細胞がアリュールン細胞ときわめて類似した機能をもつ細胞であることによる^(3,4)。

フィチン酸の集積部位は、いろいろの実験結果から明

図 1 登熟期米種子中でのフィチン酸合成
開花後 10 日ごろの種子を胚、胚乳、アリュールン層に分離し ^{32}P -無機リン酸、 ^{14}C -myo-inositol を与えてフィチン酸(IP₆)への放射能の取り込みを調べた⁽²⁾。

らかになった。筆者が最初に試みた方法は、精米法である⁽⁵⁾。この方法によりフィチン酸の集積部位は、アリュールン層であることがわかった。さらに、 ^3H -myo-inositol を用いるマイクロオートラジオグラフィ⁽⁶⁾(図 2)、アリュールン層の電子顕微鏡観察⁽⁴⁾、アリュールン顆粒

図 2 フィチン酸の集積部位を示すオートラジオグラフィ

登熟期米種子に ^3H -myo-inositol を与えた。(A) ヨウ素染色。胚乳中にヨウ素染色されないタンパク質顆粒が見える。(B)低倍でのオートラジオグラム。(C)高倍のオートラジオグラム。PE, 果皮; AL, アリュールン層; EN, 胚乳。

の電子線マイクロプローブ分析^(4,21) (図3) などから、フィチン酸の集積部位がアリユーロン顆粒であることは疑いのないものとなった。Lotte らは、電子線マイクロプローブ分析により、他の多くの植物種子中でのフィチン酸の集積部位を明らかにした^(7,8)。しかし、フィチン酸の合成、集積部位、集積形態を決定的にしたのは、アリユーロン顆粒の単離である⁽⁵⁾。

この顆粒の単離により、フィチン酸の集積の様子とフィチン酸形成に関してのアリユーロン顆粒の役割は非常にはっきりした。myo-inositol のリン酸化は、ATP を用いて進行することは明確だろう⁽¹⁾。また、単離顆粒の化学分析からフィチン酸は、主に K, Mg 塩であることは間違いなくなった。この点は、電子線マイクロプロー

ブ分析とも完全に一致した。これまでは、フィチン酸と結合するカチオンは Ca が重要なものと考えられたが、筆者の単離アリユーロン顆粒の分析結果と電子線マイクロプローブ分析の結果、Ca の寄与は、Mg, K の 10 分の 1 以下ということが判明した。胚の一部である胚盤細胞は、組織形態的にアリユーロン細胞にきわめて類似しており、アリユーロン顆粒と形態、化学成分で区別できない顆粒を含んでいる^(3,4)、フィチン酸形成能を胚がもつが、これは胚盤細胞による。

2. アリユーロン顆粒の構造

アリユーロン顆粒が、フィチン酸の集積 site であることが明確になった。そこで筆者は、この顆粒を電子顕微鏡を用いて詳細に観察するとともに、電子顕微鏡を用いる電子線プローブ分析を行い、フィチン酸のより詳細な集積形態とその化学状態に関する解析を行った。その結果、フィチン酸は、主に K, Mg 塩としてアリユーロン顆粒の中心殻であるフィチングロブイドを形成していた⁽²¹⁾ (図3)。このことは、さらにアリユーロン顆粒およびグロブイドの単離と化学分析により、さらに明確にできた。

3. アリユーロン顆粒の含む酵素

アリユーロン顆粒が単離できるようになり、この顆粒の酵素の詳細な解析が可能となった。

すでに述べたとおり登熟種実から分離したアリユーロン層は、効率よくフィチン酸を合成する⁽²⁾。また、単離アリユーロン顆粒と myo-inositol を ATP 存在下に反応させると myo-inositol のリン酸化が進む。これらのことから、アリユーロン顆粒自身が myo-inositol のリン酸化能を有することがわかった^(1,9)。さらに筆者らは、単離アリユーロン顆粒から酸性フォスファターゼを精製し、その性質を調べた。その結果、アリユーロン顆粒から精製したフォスファターゼは、すべての myo-inositol リン酸を基質とすることがわかった⁽¹⁰⁾。これらのことから、アリユーロン顆粒は、フィチン酸の合成分解の部位であると結論した。

アリユーロン顆粒の形成機構に関しては、諸説が出されている。初期にはアリユーロン細胞中の vacuole にフィチン酸が集積し、完熟脱水とともにフィチン酸が析出して形成されるといわれてきたが、電子顕微鏡による詳細な観察が進むにつれてこの顆粒の複雑さが明らかになり、単純な vacuole を origin とするものではなからう⁽¹¹⁾。この顆粒の形式機構も今後の研究が期待される

図3 米種子アリユーロン細胞の透過型電子顕微鏡像(上)とグロブイド部分(A)のエネルギー分散型分析スペクトル(下)。Mg(K_{α}), P(K_{α}), K(K_{α})が明確なピークとして示されている。

部分である。

II. 貯蔵タンパク質とタンパク質顆粒

米は、日本人を含めた多くのアジア人の主食である。このため、米タンパク質は、アジア人のタンパク質源として大きな weight を占めている。日本人の場合、全摂取タンパク質の 20% 近くが米由来といわれている。東南アジア等においては、この比率はさらに大きい。しかし、これまで米種子中でのタンパク質の存在状態などは、詳しくはわかっていなかった。

1. プロラミンを集積している顆粒

a. 形態・単離 米タンパク質顆粒に関する記述は、満田らによってもすでになされている⁽¹²⁾。彼達のグループは、米胚乳を電子顕微鏡観察し、胚乳細胞中に多くのタンパク性顆粒が存在していることを報告した。さらに、胚乳部からタンパク質顆粒の単離を試みた。彼達は単離顆粒成分を電子顕微鏡観察し、その顆粒は直径 2~3 μm でグルタル・オスミウム固定後、酢酸ウラニル染色により顆粒内部に年輪状構造を示すことを報告した。

われわれは、満田らの記述した年輪状構造を呈する顆粒以外に、年輪状構造をもたずオスミウムにより均一に染色される顆粒が存在することを観察した。前者を Type I、後者を Type II と呼んで区別している(図 4)。

米胚乳中のタンパク質顆粒の電子顕微鏡観察は、Bechtel のグループによってもなされ、彼達は胚乳中に 3 種類の顆粒が存在することを報告している⁽¹³⁾。

b. 形成・集積機構 Bechtel らは、電子顕微鏡観

察からタンパク質顆粒の形成機構を推察した⁽¹³⁾。

筆者も、電子顕微鏡観察で、プロテインボディタイプ I の形成途中に、顆粒表面にポリソームを観察している(図 5)。タイプ I の顆粒を構成するポリペプチドはタイプ I の顆粒の表面で生合成されたのち、膜を貫通して貯蔵タンパク質顆粒の表面に蓄積されることを示してい

図 5 形成途中のタンパク質顆粒タイプ I
顆粒表面にポリソームが観察される。

図 6 単離タンパク質顆粒の電子顕微鏡像
(上) タイプ I 画分, (下) タイプ II 画分

図 4 内胚乳中に存在する 2 種類のタンパク質顆粒
P.B. I, タンパク質顆粒タイプ I; P.B. II, タン
パク質顆粒タイプ II; C.W., 細胞壁; St., デンプン
粒。

る。さらに、このタイプの顆粒が成長してゆくと木の年輪に似た構造を呈するようになる(図4)。このこともタイプIのタンパク質の集積は顆粒の表面から順次進むことを支持している。なお、水性二層分配法とショ糖密度勾配遠心法を組み合わせることによりタイプIの顆粒に富む画分を得ることができた。同様の単離法によりタイプIIの顆粒も単離できた⁽¹⁴⁾(図6)。これらの画分のSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)の

結果、タイプIの構成ポリペプチドはa, b, cの3種類であると考えられる(表1)。このポリペプチドは図7に示すように米種子の開花後経時的に出現する時期を調べてみると開花後10日目ごろから形成され始めることがわかった。

なお、開花後10日目ごろの米胚乳から得たタンパク質顆粒画分を小麦胚由来の無細胞タンパク質合成系に加えると合成されるポリペプチドはタイプIの構成ポリペ

表1 単離タンパク質顆粒の性質

Subunits	Mol. wt. $\times 10^4$	Distribution		Property
		PB-I Fraction	PB-II Fraction	
a	1.0	+	—	Globulin
b	1.3	++	—	Prolamin
c	1.6	+	—	Globulin
d	2.2	++	++	Glutelin
e	2.6	—	+	Globulin
f ₁	3.7	++	++	Glutelin
f ₂	3.8	+	+	Glutelin
f ₃	3.9	++	++	Glutelin
g	5.7	+	—	

PB-I, タイプI ; PB-II, タイプII.

図7 登熟期米種子中の構成ポリペプチド
各ポリペプチドの性質は表1参照。横軸に開花後の日数と一粒あたりの平均重を示した。

プチドのみであった⁽¹⁵⁾ (図8). このことはプロテインボディ画分にはタイプ I, タイプ II の両方の顆粒が存在するが, 顆粒表面にポリソームを持つのはタイプ I のみであるという電子顕微鏡観察とよく一致する. なお, 小麦胚芽を用いる無細胞タンパク質合成系に登熟期の米種子胚乳から得られるプロテインボディ画分から得た mRNA を加えてタンパク質合成を行うと合成産物は単離タンパク質顆粒の構成ポリペプチドの分子量と異なっていた. すなわち, タンパク質顆粒タイプ I に含まれている成熟ポリペプチド a, b より, それぞれ 1400 および 1900 分子量の大きなポリペプチドが得られた. このことは米タンパク質顆粒中のポリペプチド合成はタイプ I 顆粒の表面に付着したポリソーム上で行われるが合成後のポリペプチドの膜通過はいわゆる, Blobel のシグナル説に従って進むことを示唆している⁽¹⁶⁾. 同様の機構はすでに Burr⁽¹⁷⁾ や Larkins⁽¹⁸⁾ らのグループがトウモロコシのゼイン生合成の機構として報告している. な

図8 米貯蔵タンパク質の生合成を示すフルオログラム

in vivo の実験には登熟期米種子と ^{14}C -ロイシンを用いた. *in vitro* 実験は小麦胚芽無細胞抽出液にタンパク質顆粒画分から単離した mRNA と ER-結合ポリソームを用いた.

お, タンパク質顆粒タイプ I を構成するポリペプチドに対する mRNA は poly A を持つことがその mRNA が Oligo dT セルロースを利用して調製できることから明らかになり, また 5' 末端に m⁷G のキャップ構造を持つことはプロテインボディを構成するポリペプチドの mRNA の翻訳が m⁷GMP で強く阻害されることから明らかとなった⁽¹⁵⁾.

2. グルテリンを集積している顆粒

a. 形態・単離 米胚乳中には直径 3~4 μm でタイプ I のタンパク質顆粒のような年輪状構造を示さずグルタール-四酸化オスミウムによる固定染色では顆粒内部に年輪構造を示さないもう一つの顆粒が存在する (図4). この顆粒は電子顕微鏡観察までのプロセスで形を崩しやすく, また, 上記染色では明確な境界を持つ顆粒としては観察され難いため詳しい記述はなされていなかった. 筆者らは米の登熟期胚乳から水性二層分配法とシロ糖密度勾配遠心法を組み合わせることにより, この顆粒の単離に成功した⁽¹⁴⁾. 単離顆粒の電子顕微鏡観察の結果, 顆粒の一部は破壊されているが単離顆粒画分の構成成分はきわめて均質であった (図6).

このようにして単離されたタンパク質顆粒画分を SDS-PAGE を用いて分析した結果, この顆粒画分を構成しているポリペプチドは d, e, f であることがわかった. このうち d, f はこれまでからグルテリンの構成ポリペプチドとして知られていたが, これまで常に米グルテリンの構成成分の一つであるといわれている b ペプチドは単離タンパク質顆粒タイプ II 中には全く含まれていない. 一方, b ペプチドは単離タンパク質顆粒タイプ I 画分に主要な構成ポリペプチドとして存在している. 以上の結果, 米胚乳中のグルテリンの構成ポリペプチドはきわめて単純でポリペプチド d グループと f グループの 2 成分のみから成り立っていると結論した.

b. グルテリン分子の組み上げ 米胚乳貯蔵タンパク質の構成基本ポリペプチドはきわめて単純であることは上述のとおりである. なお, d, f グループ中には microheterogeneity が存在しており d, f グループはそれぞれ分子量がわずかに異なるペプチド複数個から形成されている. SDS-PAGE で少なくとも f グループ中には f₁, f₂, f₃, d グループ中には d₁, d₂ が確認できる. 筆者はこれらの基本ポリペプチドがどのように組み上げられて高分子のグルテリン分子を形成するかを明らかにすることを試みた⁽¹⁹⁾. 胚乳グルテリンを酢酸抽出した

のちセファデックスカラムを用い 64k, 130k, 500k ダルトン以上の3分画に分け、その後、再クロマトグラフィーによりそれぞれの分子量の蛋白質画分を精製した。各分子量のグルテリンの構成ポリペプチドを2-メルカプトエタノール存在下に SDS-PAGE を行った結果、64k ダルトンポリペプチドは 130k, および 500k ダルトン以上のグルテリンとでは構成ポリペプチドに差があることがわかった⁽²⁰⁾。この結果、64k ダルトンのグルテリンは f_1, d_1 から、また 130k ダルトン以上では d_2, f_2, f_3 の組み合わせで高分子グルテリンが形成されていることがわかった。

なお、筆者がこれまでから指摘しているとおり、130k ダルトングルテリンの状態はグルテリンの高分子重合化の過程で形成される重要な基本単位と考えられる⁽¹⁸⁾。分子の基本構造は $2d+2f$ であるが $2f$ は f_2+f_3 であると考えられる。なお、64k ダルトンの分子量の状態と 130k ダルトン以上のグルテリン分子の状態の関係は明確でない。完熟種子から得られる 64k ダルトン、130k ダルトンおよび 500k ダルトン以上のグルテリンを BrCN により分解したのち、ペプチドマップを比較すると 130k ダルトンと 500k ダルトン以上の高分子グルテリンフラクションのものは完全に一致するが、64k ダルトンのものとは非常に異なったパターンを示した⁽²⁰⁾。このことは 500k ダルトン以上の高分子量グルテリンを形成するために 130k ダルトンがその前駆体になっており、その重合高分子化の際にはアミノ酸の修飾などがないことを意味している。しかしながら、完熟種子中にかなりの量存在する 64k ダルトンポリペプチドが 130k ダルトンポリペプチドの直接の先駆体であると考えれば、64k ダルトンと 130k ダルトンの両者での BrCN 分解パターンが非常に異なっており、64k ダルトン→130k ダルトンの重合過程でアミノ酸またはポリペプチドの修飾が起っていると考えなければならない。しかしながら、64k ダルトンポリペプチドは実際には種類が複数個あり、そのうちの1つは 64k ダルトンのまま留まり、ほかは生合成直後、または生合成中に2分子が重合し、ただちに 130k ダルトングルテリン分子を形成するとも考えられる。

c. 形成、集積機構 タンパク質顆粒タイプ I 中のポリペプチドと異なりタイプ II 中の構成ポリペプチド d, f はタンパク質顆粒画分を template とする *in vitro* タンパク質合成系で合成することはできなかった。その

他、template として遊離ポリソーム、膜結合型ポリソーム、粗面小胞体、さらには登熟期胚乳細胞のホモジネートそのものも用いられたが、いずれを template としても、 d, f ポリペプチドの合成を *in vitro* で証明することはできなかった。このことはタンパク質顆粒タイプ II 中のグルテリンの構成ポリペプチド d, f のそれぞれに直接対応する mRNA を胚乳中にもたないことを意味した。しかしながら、小麦胚芽を用いる無細胞タンパク質合成系に登熟期米胚乳細胞から調製した粗面小胞体画分を加えると合成されるポリペプチドの主要なものは g (57k ダルトン) であった⁽¹⁵⁾。分子量的に $g=d+f$ の関係にあるので、この結果は d, f ポリペプチド合成のために $g \rightarrow d+f$ のプロセシングの機構のあることを想像させた。そこで筆者らは、この機構を証明するため登熟期米種子を用いる *in vivo* の pulse-chase 実験を試みた。その結果、図 9 に示すように、 ^{14}C -ロイシンを与えて後の短時間には ^{14}C の取り込みは g に強く現れるが、 d, f には取り込みは全く見られない。しかし、その後、 ^{14}C -ロイシンの供給を断ち無標識のロイシンに切り替え、胚乳細胞中の放射能の動きを追跡すると g 中の放射能は次第に減少し、その分だけ d, f へ移行したと考えられる結果が得られた。この間 d, f 以外に放射能の増加するペプチドは検出されず、このことは $g \rightarrow d+f$ のプロセシングが存在することを明確に示している。いまのところその間のプロセスを *in vitro* で再現するには

図 9 米グルテリン構成ポリペプチドの形成を示すフルオログラム

登熟期米種子に ^{14}C -ロイシンを短時間与え無標識ロイシンで chase した。左端の数字は分子量を示す。

至っていないが前述のようにこのスプリットの機構にゴルジ体のような複雑な膜系の関与を想像させきわめて興味深い。実証はなかなか困難なものになる。今後の筆者の重要な研究課題の一つである。

3. タンパク質顆粒の形成時期、品種間差

タンパク質顆粒タイプIとタイプIIはシロ糖密度勾配遠心で相互に分離できることはすでに述べた。この方法で米種子の開花後の各時期における胚乳中のプロテインボディタイプIとタイプIIのピークのプロファイルと比較することより図10に示すようにタイプII顆粒は開花後7日ごろには出現しているがタイプI顆粒はこれより遅れて開花後10日ごろに出現することが示された⁽²⁰⁾。このことはすでに図7に示したように、タイプIIの構成ポリペプチドd, fが5日ごろに、タイプIの構成ポリペプチドは開花後10日ごろに出現し始めることとよく一致している。

水稻梗7種（コシヒカリ、ニホンバレ、キンマゼ、ハヤユキ、マツマエ、イシカリ、シオカリ）、水稻糯2種（シンハブタヌモチ、クロモチ）、陸稲梗4種（ノウリン12号、ノウリン9号、タチミノリ、センショウ）、陸稲糯3種（タロベエモチ、ノウリン3号、ノウリン4号）

図10 米胚乳中のタンパク質顆粒の出現パターン

を用いてタンパク質顆粒タイプIとタイプIIの存在比を調べたところ、すべての品種でタイプIIが主要タンパク質顆粒であることがわかったがとくに水稻梗種にタイプIIが多く、また、タイプIは陸稲および糯種に多いことが明らかとなった⁽²⁰⁾。

おわりに

穀実の貯蔵成分が特定の細胞顆粒の中に集積していることは何種類かの貯蔵成分についてすでにわかっていた。最も代表的なものはデンプンである。デンプンは穀実中ではデンプン粒の形態をとっている。これは正確にはアミロプラストという細胞顆粒に集積しており、この顆粒はもともと葉緑体と同様、プロプラスチド起源の構造体である。その他貯蔵脂質は脂肪粒またはスフェロゾームと呼ばれる細胞顆粒に封入されていることもすでに多くの研究者によって確認されてきた。タンパク質に関しても多くの植物種子から貯蔵部位と考えられるタンパク質顆粒が単離され、その性質もかなりはっきりしてきた。

米の場合もタンパク質顆粒に関し、何人かの研究者による報告がある。しかし、米種子中の貯蔵タンパク質であるグルテリン、プロラミン、グロブリン、アルブミンとタンパク質顆粒との関係は明確でなかった。この点、この拙文に示したとおり、米の主要貯蔵タンパク質であるグルテリンの集積部位はタンパク質顆粒タイプIIであることが明確となった。また、これまで知られていたタンパク質顆粒タイプIはプロラミンの集積部位である。その他、胚乳中のグロブリン(26kダルトン)はタイプIIにアルブミン、 γ -グロブリンはアリュエロン顆粒に集積している⁽²²⁾というように、米種子中のタンパク質の集積部位はかなりはっきりしてきた。また、リンの集積形態であるフィチン酸の集積部位がアリュエロン顆粒であることも疑いなくなってきたし、フィチン酸がMg, K, その他の塩であることから、アリュエロン顆粒はミネラルの集積部位であるともいえる⁽²¹⁾。

このようにかなりの種子貯蔵物質とその集積顆粒の関係が明らかになってきた。今後も、タンパク質やその他の物質の集積部位が明らかになることにより種子の構造の理解、さらには種子の貯蔵加工に対する合理的な方策、貯蔵物質の高度利用のための基礎知識が充実されてくるものと思う。なお、一口に貯蔵物質といっても、これらの物質は植物の種子発芽とともに新しい生命を支え

る原料として不可欠なものであるし、また中には発芽時に活性化される酵素もある。今後はこれら植物の生理とこれら細胞顆粒の關係に調査のメスが入れられるべきものと思う。この方面での研究の發展を期待している。

本研究に関し終始ご指導、ご鞭撻をいただいた葛西善三郎先生、浅田浩二先生のほか、京都大学食糧科学研究所の皆様をはじめ、ご助力をいただいた多くの方々に深く感謝いたします。

- (1) K. Tanaka and Z. Kasai : "Antinutrients and Natural Toxicants in Foods," ed. by R. L. Ory, Food and Nutrition Press, Inc., Westport, CT, 1981, p.239.
- (2) M. Ogawa, K. Tanaka and Z. Kasai : *Agric. Biol. Chem.*, **43**, 2211 (1979).
- (3) K. Tanaka, M. Ogawa and Z. Kasai : *Cereal Chem.*, **53**, 643 (1976).
- (4) K. Tanaka, M. Ogawa and Z. Kasai : *Cereal Chem.*, **54**, 684 (1977).
- (5) K. Tanaka, T. Yoshida, K. Asada and Z. Kasai : *Arch. Biochem. Biophys.*, **155**, 136 (1973).
- (6) K. Tanaka, T. Yoshida and Z. Kasai : *Plant Cell Physiol.*, **15**, 147 (1974).
- (7) J. N. A. Lott and E. Spitzer : *Plant Physiol.*, **66**, 494 (1980).
- (8) J. N. A. Lott, J. S. Greenwood and C. M. Vollmer : *Can. J. Bot.*, **56**, 2408 (1978).
- (9) K. Tanaka, T. Yoshida and Z. Kasai : *Agric. Biol. Chem.*, **40**, 1319 (1976).
- (10) H. Yamagata, K. Tanaka and Z. Kasai : *Plant Cell Physiol.*, **21**, 1449 (1980).
- (11) 小川雅広, 田中國介, 葛西善三郎 : 京都大学食糧科学研究所報告, **43**, 7 (1980).
- (12) H. Mitsuda, K. Murakami, T. Kusano and K. Yasumoto : *Arch. Biochem. Biophys.*, **130**, 678 (1969).
- (13) D. B. Bechtel and Y. Pomeranz : *Am. J. Bot.*, **65**, 684 (1978).
- (14) K. Tanaka, T. Sugimoto, M. Ogawa and Z. Kasai : *Agric. Biol. Chem.*, **44**, 1633 (1980).
- (15) H. Yamagata, K. Tanaka and Z. Kasai : *Plant Physiol.*, in preparation.
- (16) G. Blobel and D. Sabatini : "Biomembranes," ed. by L. A. Manson, Vol.2, Plenum, New York, 1971, p.193.
- (17) B. Burr, F. A. Burr, I. Rubenstein and M. N. Simon : *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, **75**, 696 (1978).
- (18) B. A. Larkins, N. L. Pearlmatter and W. J. Hurkman : "The Plant Seed," ed. by I. Rubenstein, R. L. Phillips, C. E. Green and B. G. Gengenbach, Academic Press Inc., New York, N. Y., 1979, p.61.
- (19) 田中國介 : 化学と生物, **17**, 777 (1979).
- (20) T. Sugimoto, K. Tanaka and Z. Kasai : *Agric. Biol. Chem.*, in preparation.
- (21) 田中國介 : ふんせき, **10**, 71 (1981).
- (22) M. Horikoshi and Y. Morita : *Agric. Biol. Chem.*, **39**, 2309 (1975).