海洋由来のポリエーテル化合物

—構造と作用—

(1991 年度農芸化学奨励賞受賞)

村 田 道 雄

(東北大学農学部)

ポリエーテル化合物とは、エーテル環に富む構造を有する一群の天然有機化合物の総称であり、当初は、放線菌 (*Streptomyces* 属) の生産する抗真菌物質群に用いられた。代表的な物質としては、ニワトリの抗コクシジウム剤のモネンシンやサリノマイシンがあり、オカダ酸 (図 1. 3) と類似して 5, 6 員エーテル環が連続する構造を有している。

最近、海洋生物から多くのポリエーテル化合物が報告されるようになり、その特異な化学構造と生理作用が注目を集めている。そのなかには、猛毒バトリキシンの構造決定⁽¹⁾と全合成⁽²⁾、オカダ酸⁽³⁾や bryostatin の全合成⁽⁴⁾、シガトキシンの構造決定⁽⁵⁾といった天然物有機化学の最前線における研究成果にも枚挙にいとまがない。また、生化学・薬理学の分野でも、海洋ポリエーテルの有する特異な生物活性が注目され、オカダ酸、calyculin, brevetoxin や maitotoxin など、新たなタイプの研究試薬として広く使用されている化合物も多い。

ここで取り上げるポリエーテル化合物は、“海洋由来のエーテル環を 2 つ以上含むポリケチド系の天然有機化合物”に限定するが、これは、あくまでも便宜的なものであって、エーテル環を 1 以下しか含まない同様化合物との生合成上の本質的な差異はない。本総説では、現在までに知られている海洋ポリエーテル化合物の化学構造と作用について筆者の関係した研究に限定せずに広範に紹介したい (この分野の総説⁽⁶⁾が数編著されている)。

1. 海洋ポリエーテル化合物の化学構造

渦鞭毛藻は、単細胞性の藻類であり、魚類の大量へい

死や食中毒の原因となる赤潮を形成することでも知られている。渦鞭毛藻からポリエーテル化合物が発見されたのは比較的最近のことで、1981 年ほぼ同時に、Lin ら⁽⁷⁾によって、*Gymnodinium breve* から brevetoxin-B (図 1. 7) が分離され、また、Murakami ら⁽⁸⁾によって、*Prorocentrum lima* からオカダ酸が分離された。その後、渦鞭毛藻を中心に数多くのポリエーテル系化合物が海洋生物から発見されており、新たな生産生物群として注目されている。海洋由来のポリエーテル化合物のうち、まず、筆者の関係した 2 種の食中毒に関与する有毒物質 (ciguatoxin と下痢性貝毒) の構造研究について解説した後、現在までに単離・構造決定されているポリエーテル化合物の構造を紹介したい。

1) シガテラの原因毒・ciguatoxin

シガテラ (ciguatera) とは、熱帯・亜熱帯のサンゴ礁海域で頻発している食中毒をいい、本来は無毒な食用魚が毒化して発生する。中毒症状は、消化器系 (下痢、吐き気、腹痛)、神経系 (知覚異常、関節痛、倦怠感、搔痒)、循環器系 (脈拍と血圧の低下) に大別される。死亡率こそ低いものの回復の遅いのが特徴で、時として中毒症状が半年近く続くこともある。シガテラの原因物質として、最も重要なものは ciguatoxin で、大型の肉食魚の主要毒である。そのほかに、酸化状態を異にした種類の ciguatoxin の類縁体が藻食魚を含めて、広く分布している。次に重要なのが、maitotoxin で藻食魚を中心に分布しているが、その毒性 (マウス腹腔内投与) は非タンパク毒としては、最も強い。Maitotoxin の構造はまだ未定である。Ciguatoxin も maitotoxin も渦鞭毛藻の *Gambierdiscus toxicus* によって生産され、食物連鎖によって藻食魚から肉食魚に移行蓄積される。

Ciguatoxin の構造決定に関しては、すでに“化学と生

Polyether Compounds from Marine Organisms.
Michio MURATA (Faculty of Agriculture, Tohoku University, Sendai 981)

図 1 海洋由来のポリエーテル化合物

物”⁽⁹⁾に概要を紹介しているので、今回は、構造決定に用いた NMR の手法について簡単に紹介する。

分子量 500 以上の有機化合物の NMR による構造決定には、各種の 2 次元 ^1H - ^{13}C 相関スペクトルを用いるのが一般的である。これは、水素のスピン系が中断する場合 (4 級炭素やヘテロ原子) には、 $^2J_{\text{C,H}}$ ($-\text{C}-\text{CH}-$) や $^3J_{\text{C,H}}$ ($-\text{C}-\text{X}-\text{CH}-$) を検出できる HMBC や long range H-C COSY などの ^1H - ^{13}C 相関スペクトルを使って、炭素や水素のつながり方を調べるのが普通である。しかし、ciguatoxin の場合、試料量が微量なため、 ^{13}C 観測の NMR スペクトルは、最も基本的な ^1H 完全デカップルスペクトルと DEPT スペクトル (45°) の測定がやっとで、感度の悪い上述の ^1H - ^{13}C 相関スペクトルは全く測定できなかった。したがって、構造研究には、ほとんどすべて ^1H NMR のみのデータを用いた⁽¹⁰⁾。このような 1 mg 以下の試料 (ciguatoxin は 350 μg , gambiertoxin-4 b は 750 μg) で構造決定に成功したおもな理由は、ciguatoxin 分子自身にある。Ciguatoxin や brevetoxin 群のような分子 (図 1.1 や 6, 7) では、ほとんどの水素が 5~8 員環上に存在するため、水素の立体的な位置関係が比較的固定しており (コンフォマー間の交換のある 9 員環の F 環を除く)、 ^1H NMR で立体構造を含めたかなり詳しい解析が可能である。すなわち、NOE や ^1H スピン結合定数を調べれば、4 級炭素近辺のつながりやエーテル環のつながり方などが比較的簡単にわかる。これが、極微量でも構造決定に成功した第一の要因である。他の理由としては、ciguatoxin の分子内に 4 級炭素が 2 個しかなかったこと (同系列の yessotoxin や brevetoxin-B では構造決定の障害となる 4 級炭素が 6 個ある)、窒素元素やその他のヘテロ元素が含まれていなかったことが挙げられる。

Ciguatoxin の構造決定に有効であった手法の 1 つに、NMR シミュレーションと分子力場計算、デカップリング差スペクトルを組み合わせた解析法がある。この方法は、通常の NMR と PC-9800 程度のパーソナルコンピュータがあれば簡単にできるので、とくに高価な機械を購入する必要 (NMR を除く) がなく、手軽にできるのが利点である。Ciguatoxin の構造研究では、 ^1H シグナルが複雑に込み合っていて 2 次元 NMR でも分離できない部分の構造、中員環のコンフォメーションや環上の置換基の立体化学を調べるときに便利であった。Ciguatoxin の H_2 -31 と H_2 -32, H_2 -38 から H_2 -40 にか

て、H-50 と H-51 といった部分は、シグナルの重なりが激しいうえにスピン結合したシグナルが接近しており、2 次の結合が顕著になっているので、通常の 2 次元法では解析が非常に困難であった。本方法はこれらの部分の構造決定におおいに役だった。

以下に、H-50 と H-51 (L 環) の場合を例にこの方法を簡単に説明する。パーソナルコンピュータを用いる場合は、PC 版の MM2⁽¹¹⁾ と簡単な NMR シミュレーションソフト (筆者は PC-9800 用の LAOCN 98 と NMR 98 を用いた⁽¹²⁾) が必要である。まず、2 次元スペクトルなどから適当に構造を推定しておいて、その構造について MM2 の計算を行う (H-50 と H-51 の解析の場合は、J 環以降の部分について計算したが、L 環を椅子型 6 員環として既成の値を用いても大差はなかった)。次に、MM2 で得られた水素の 2 面角を用いてスピン結合定数を計算する (ciguatoxin の場合は、酸素が関与しない系では古典的な Karplus の式がよい一致を示すが、オキシメチンとのスピン結合定数には隣接基の電子陰性を考慮にいった改変式⁽¹³⁾のほうがよい)。このスピン定数と 2 次元 NMR で得られている H-49, H-50, H-51 の化学シフト (メチル基と H-49 間のクロスピークは分離しているのでそれぞれの化学シフトは容易に求められる) を用いて Me-59 をデカップリングしたときの H-50 の差スペクトルのシミュレーションを作成する。H-50 は、6 スピン系 (5 個の水素とスピン結合している) であり、かつ H-50 だけをシミュレーションすればよいので非常に簡単である。これを本物のデカップリング差スペクトルと比較して、一致するまで構造の推定とシミュレーションを繰り返す (H-50 の実測とシミュレーションスペクトルを図 2 に示す)。一見、遠回りのように思えるが、実際には 1 つのスピン系について 3~4 時間で結論に達することが多い。単純にデカップリング差スペクトルだけで結合定数を予想して構造解析を行うと、2 次のスピン結合が顕著なときには思わぬ間違いを犯すことがあるので、シミュレーションと併用するほうが確実であろう。このようにして、得られた CTX の部分立体構造を CHARMm (分子力場計算) と QUANTA (3 次元グラフィックソフト) を用いてつなぎあわせた分子全体の立体構造を図 3 に示した。最近、Hirama らは、gambiertoxin-4 b の C1-C13 部分の誘導体を合成し、円二色性を比べることにより、ciguatoxin の絶対構造 (図 1.1) を推定している⁽¹⁴⁾。

図 2 ^1H NMR デカップリング差スペクトルのシミュレーション

A, Me-59 を照射した場合の H-50 のシミュレーションスペクトル(照射-非照射); B, 実測のデカップリング差スペクトル (gambiertoxin-4b, CD_3CN 溶液, 400 MHz); C, 非照射スペクトル (シグナルが重なって H-50 に対応するピークは判別できない). シミュレーションと実測のスペクトルが完全には一致していないのは, H-50 と H-51 の二次の結合が強く, パラメータの少しの違いでスペクトルが大きく変化することと, 実測スペクトルのノイズが大ききことによる. しかし, 構造解析に用いる場合, この程度の差異は問題ない.

2) 下痢性貝毒

下痢性貝中毒は, 1976 年に Yasumoto らによって発見・命名された, ホタテガイやムラサキガイ(通称ムール貝)などが原因食品となる食中毒である⁽¹⁵⁾. その原因物質は 3 つのグループからなり 10 種類以上におよぶが, そのすべてがポリエーテル化合物であり, 渦鞭毛藻によって産生される. 中毒症状はその名の通り消化器障害を主とするが, 主原因物質として, オカダ酸(図 1, 3)およびその 35 位のメチル誘導体である dinophysistoxin-1 (DTX 1, 4)⁽¹⁶⁾ とその脂肪酸エステル群である dinophysistoxin-3 (DTX 3, 5)⁽¹⁷⁾ が同定されている. なお, dinophysistoxin の名前は, 本化合物を生産する渦鞭毛藻の種名 *Dinophysis* に由来する.

DTX 3 の結合脂肪酸は, 炭素数 14~22 で, オクタデカテトラエン酸 ($\text{C}_{18:4}$), エイコサペンタエン酸 ($\text{C}_{20:5}$), ドコサヘキサエン酸 ($\text{C}_{22:6}$) などの高度不飽和酸を多く含む. これは, ホタテガイ中腸腺の脂肪酸組成に酷似しており, 二枚貝が DTX 1 を取り込んだ後, 脂肪酸を付加して, DTX 3 に変換しているものと考えられる. DTX 3 は, 極めて酸化されやすく容易に失活するので, 脂肪酸種のみを異にする各成分を単離するのは不可能であった. そのうち, 唯一単離に成功した成分は, DTX 1 の 7 位のパルミチン酸エステルと判明したが⁽¹⁷⁾ その毒性は DTX 3 混合物の 10 分の 1 以下であった.

このように, DTX 3 を完全に純化するのは, 不可能だったので, 微量の異なる毒が混入している可能性も否定できなかった. そこで, 各種脂肪酸エステルを化学的に調製して, 毒性の確認を行うことにした. この目的のために, DTX 1 より入手が容易なオカダ酸(3)を原

図 3 NMR データを基にして作成した gambiertoxin-4b の立体構造 (CHARMM による分子力場計算と QUANTA (Polygen 社) によるグラフィックを用いた; F 環は NMR データに合う $\text{C}26=\text{C}27$ UP の構造を示した)

料にして、7位に3種の脂肪酸を導入し DTX 3 の等価体を調製して活性を調べた⁽¹⁸⁾。その結果、高度不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸 (C_{22:6}) エステルに強いマウス致死毒性 (500 µg/kg) を認め、その活性は飽和脂肪酸のバルミチン酸エステルの約 10 倍であった。この値はホタテガイより単離された DTX 3 の毒性にはほぼ一致し、脂肪酸の不飽和度が致死毒性に大きく影響していることが証明された。なお、乳飲みマウス法による下痢原性試験では、脂肪酸の違いによる顕著な差は認められなかった⁽¹⁸⁾。

下痢性貝毒の毒化時に採取したホタテガイ中腸腺について、有毒成分を検索した結果、上述のオカダ酸群の毒に加えて、新たな有毒成分を検出した。この成分をホタテガイの学名 *Patinopten yessoensis* の属名に因んで pectenotoxin (PTX と略記) と命名した。PTX 1 の構造 (図 1. 8) にはその前駆体の PTX 2 を示した。PTX 1 右下端のメチルに水酸基が置換したもの) は共同研究者の Clardy 教授らによって X 線解析を用いて決定された^(17,19)。

下痢性貝毒の組成が年度によって変動することは知られていたが、1985 年産のホタテガイの場合、例年なら主要成分である DTX 1, 3 にかわって、新有毒成分が顕著に存在した。分光学的手法を用いて構造を検討した結果、DTX 1 や PTX 群とは全く異なる骨格構造を有することが判明したので、この成分をホタテガイの種名に因んで新たに yessotoxin (YTX, 図 1. 9) と命名した⁽²⁰⁾。YTX は brevetoxin 様の構造の末端に 2 個の硫酸基を有するのが特徴である⁽²⁰⁾。

3) その他の海洋ポリエーテル化合物

赤潮渦鞭毛藻・*Gymnodinium breve* の赤潮は、米国のフロリダ西海岸で頻繁に発生して、魚類の大量へい死を引き起こし大問題となっている。赤潮の密度が高い場合には、岸に打ち寄せられた藻体のために、目や喉に刺激性の痛みを訴えることもあるという。毒の成分 brevetoxin-B の構造 (図 1. 7) は、結晶 X 線解析によって決定された。全く新奇なポリエーテル化合物であることがわかり⁽⁷⁾、このグループの最初の例となった。その後、brevetoxin-A (6)⁽²¹⁾、下痢性貝毒の yessotoxin や ciguatoxin 等、その同族体が発見され、このように多数のエーテル環がはしご状につながった構造が、渦鞭毛藻に特徴的な代謝物であることがわかってきた⁽²²⁾。

下痢性貝毒やブレベトキシン以外にも渦鞭毛藻の生産

するポリエーテル化合物は数多い。最近 Kobayashi らは、扁形動物のヒラムシに共生していた渦鞭毛藻 *Amphidinium* sp. の培養藻体から、強力な抗腫瘍性物質である amphidinolide 類 (10) を単離・構造決定している⁽²³⁾。佐竹らは、サンゴ礁の渦鞭毛藻 *Amphidinium klebsii* の培養藻体から、全く新奇のポリオール・ポリエン化合物 amphidinol (11) を分離・構造決定している⁽²⁴⁾。また、Murakami らは、潮溜りの渦鞭毛藻 *Gonyaudoma pseudogonyaulax* から強力な抗カビ性を有する goniodomin-A (12) の構造を報告している⁽²⁵⁾。Torrigoe らは、前述の *Prorocentrum lima* から、窒素を有する新奇ポリエーテルマクロライド・prorocentrolide (13) を単離・構造決定した⁽²⁶⁾。

一方、渦鞭毛藻以外の海洋生物からもポリエーテル化合物が数多く分離されている。とくに、海綿はユニークな構造を有する二次代謝産物の豊富な源泉であり、そのなかにはポリエーテル系化合物も多く含まれる。*Halichondria okadai* からは、前述のオカダ酸とその episulfite 体の acanthifolicin が分離されている⁽²⁷⁾。また、同じ生物から Uemura らは、強い細胞毒性を有する halichondrin 群⁽²⁸⁾ (14) を分離している。Kato らは、伊豆半島海綿 *Distodermia calyx* からユニークな構造の calyculin 群 (16) を分離している⁽²⁹⁾。

一方、Pettit らは、外肛動物のコケムシから、bryostatin 群 (17) を分離している⁽³⁰⁾。Bryostatin 群は強い抗ガン性を示しており、海洋由来では最も期待されている抗ガン剤の 1 つである。腔腸動物のイワスナギンチャクからは、有名な猛毒 palytoxin (19) が取られている⁽¹⁾。このほかにも、*Theonella* 属の海綿から、抗カビ物質 swinholid (31) (15) が、*Lyngbya* 属のらん藻からは debromoaplysiatoxin⁽³²⁾ (18) が皮膚の刺激物質として分離されている。図 1 と表 1 に代表的な海洋ポリエーテル物質を示した。

2. 海洋ポリエーテル化合物の作用

海洋ポリエーテル化合物の生理作用の研究はその緒についたばかりであるが、薬理学者の精力的な研究によって、最近、急速に理解が進んでいる。また、ユニークな作用を示すものも多く、医薬に限らず、薬理・生化学の研究試薬の供給源として期待されている。今回は、最近の知見を中心におもなポリエーテル化合物の作用について簡単に紹介する。

表 1 海洋生物のポリエーテル化合物

化合物	分子量	分子式	生 物	文献
1 ciguatoxin	1110	C ₆₀ H ₈₆ O ₁₉	渦鞭毛藻 <i>Gambierdiscus toxicus</i>	5
2 gambiertoxin-4 b	1060	C ₆₀ H ₈₄ O ₁₆	渦鞭毛藻 <i>Gambierdiscus toxicus</i>	5
3 okadaic acid	804	C ₄₄ H ₆₈ O ₁₃	渦鞭毛藻 <i>Prorocentrum lima</i>	8
4 dinophysistoxin-1	818	C ₄₅ H ₇₀ O ₁₃	渦鞭毛藻 多種の <i>Dinophysis</i> 属	16
5 dinophysistoxin-3	1056**	C ₆₁ H ₁₀₀ O ₁₄	渦鞭毛藻 *** "	17
6 brevetoxin-A	866	C ₄₉ H ₇₀ O ₁₃	渦鞭毛藻 <i>Gymnodinium breve</i>	21
7 brevetoxin-B	894	C ₅₀ H ₇₀ O ₁₄	渦鞭毛藻 <i>Gymnodinium breve</i>	7
8 pectenotoxin-2	858	C ₄₇ H ₇₀ O ₁₄	渦鞭毛藻 <i>Dinophysis fortii</i>	17
9 yessotoxin	1186	C ₅₅ H ₈₀ O ₂₁ S ₂ Na ₂	微細藻 (未同定)	20
10 amphidinolide-C	714	C ₄₁ H ₆₂ O ₁₀	渦鞭毛藻 <i>Amphidinium</i> sp.	23
11 amphidinol	1488	C ₇₃ H ₁₂₅ O ₂₇ SNa	渦鞭毛藻 <i>Amphidinium klebsii</i>	24
12 goniodomin-A	768	C ₄₃ H ₆₀ O ₁₂	渦鞭毛藻 <i>Gonyaudoma pseudogonyaulax</i>	25
13 prorocentrolide	979	C ₅₆ H ₈₅ O ₁₃ N	渦鞭毛藻 <i>Prorocentrum lima</i>	26
14 halichondrin-B	1082	C ₅₈ H ₈₂ O ₁₉	海綿 <i>Halichondria okadai</i>	27
15 swinholid-A	1336	C ₇₄ H ₁₂₈ O ₂₀	海綿 <i>Theonella swinhoei</i>	31
16 calyculin-A	1008	C ₅₀ H ₈₁ O ₁₅ N ₄ P	海綿 <i>Discodermia calyx</i>	29
17 bryostatin-4	894	C ₄₆ H ₇₀ O ₁₇	コケムシ <i>Amathia convoluta</i>	30
18 debromoaplysiatoxin	592	C ₃₂ H ₄₈ O ₁₀	らん藻 <i>Lyngbya majuscula</i>	32
19 palytoxin	2677	C ₁₂₉ H ₂₂₃ O ₅₄ N ₃	腔腸動物 <i>Palythoa toxica</i>	1

*Ciguatoxin の前駆体である GT4b が渦鞭毛藻より発見されている。**Dinophysistoxin-3 は, dinophysistoxin-1 の脂肪酸エステル混合物であり, 1056 はそのうち一成分の分子量である。***Dinophysistoxin-3 は dinophysistoxin-1 を取り込んだ二枚貝が脂肪酸エステル化を行い, 産生されると考えられている。

1) オカダ酸と下痢性貝毒

オカダ酸の作用については, 特集で詳しく紹介されているので参照されたい⁽³³⁾。オカダ酸とその同族体である下痢性貝毒 (DTX 1 と DTX 3) の生理・薬理作用については, 比較的広範に研究が行われていた。ハワイ大学の Shibata らは, オカダ酸によって, 細胞外 Ca²⁺ がなくても, 平滑筋の収縮が起こることを見出し⁽³⁴⁾。次いで, Takai らは, 精製酵素を用いて, オカダ酸と DTX 1 が蛋白りん酸化酵素の特異的な阻害剤であることを明らかにした⁽³⁵⁾。これは, 同酵素の外来性の阻害剤としては最初の例である。オカダ酸の蛋白りん酸化酵素の阻害には, 選択性があり, Cohen の分類による 2A 型酵素を最も強く抑制し, 次いで, 1 型, 2B 型に効き, 2C 型にはほとんど作用しない。

一方, 国立がんセンターの Fujiki と Suganuma らは, 発ガンプロモーターの探索の過程で, オカダ酸と DTX 1 に強力な活性を見出し, TPA (フォールボールエステル) とは異なった作用機作を介することを示していた⁽³⁶⁾。後に, 蛋白りん酸化酵素の阻害が発ガンの促進に関与していることも判明した。下痢性貝毒成分が発ガン促進活性が認められたことから, 下痢性貝毒の潜在的危険性を懸念する声もある。Terao らは, 下痢性貝毒の

病理学的検討を広範に行い, DTX 1 の標的器官は小腸で^(37,38), 吸収上皮の変性と剥離を観察している。一方, PTX 1 の場合は, 標的器官は肝臓で, 肝小葉の局所的な液胞の発生と急激な肝細胞の壊死を認めている⁽³⁷⁾。PTX 1 の病理組織像は, きのこ毒の phalloidin に酷似しているという。YTX の標的器官は, 主に心臓で, 心筋細胞内の水腫の形成が顕著に認められた⁽³⁸⁾。YTX の脱硫酸物は, 肝臓と脾臓に損傷を与えるが, とくに脂肪肝が顕著であり, フォアグラ様の外観を呈していたという⁽³⁸⁾。

2) Ciguatoxin と brevetoxin

Brevetoxin の薬理作用については (詳しくは総説を参照されたい⁽³⁹⁾), 広範な研究が行われており, 知識の蓄積も進んでいる。Catterall らは, brevetoxin-A, B が, veratridine 存在下, 神経膜の Na イオンの透過性を顕著に増大させること, この作用が tetrodotoxin で完全に拮抗されることを見出した⁽⁴⁰⁾。すなわち, brevetoxin の作用の本質は, 神経膜の電位依存性ナトリウムチャンネルに作用して, これを活性化することである。

Ciguatoxin に関しては, 1940 年代から薬理的研究が行われている。最初, 未精製試料を用いた実験では, choline esterase の阻害剤と考えられていたが⁽⁴¹⁾, Rayner

らによって精製試料を用いた実験によって, brevetoxin と同様に Na イオンの透過性を増大させることが証明された⁽⁴²⁾. Ciguatoxin の標的器官は, 心臓, 副腎髄質, 自律神経系で心筋細胞の膨張と壊死および副腎髄質細胞の変質が報告されている⁽⁴³⁾.

3) Maitotoxin

Maitotoxin は, その毒性の強さ (130 ng/kg, マウス腹腔内投与) と特異な薬理作用のために, 最も, 広範に作用の研究されたポリエーテル化合物の1つである. Takahashi と Ohizumi らは, 培養細胞を用いた薬理実験で, maitotoxin が Ca イオンの細胞内流入を顕著に促進することを見出した⁽⁴⁴⁾. その後, Ca イオンの流入が引き金となる神経伝達物質やホルモンの遊離, 筋収縮の研究に多用されている (総説⁽⁴⁵⁾に詳しい). その後, イノントールリン酸系の代謝促進作用やアラキドン酸遊離作用など, Ca イオン流入だけでは説明できない作用も見出されるようになり, maitotoxin の作用が単純な電位依存性 Ca チャンネルの活性化だけではないと考えられるようになった. 最近の筆者らの知見では⁽⁴⁶⁾, maitotoxin の Ca イオン流入促進作用はその脱硫酸体によって拮抗的に阻害される. また, maitotoxin は, 試験したすべての細胞で Ca イオンの流入促進活性を示したが, 人工 liposome については活性を示さなかった. これらより, 細胞膜上には maitotoxin の特異的なレセプターが存在すると考えられるが, その解明は今後の課題である.

Maitotoxin は, また, シガテラの原因毒の1つであり, Terao らによってマウスを用いた病理学的検討がなされている⁽⁴⁷⁾. 標的器官は胃, 心, 胸腺であり, マウスの死因は心障害であるとしている. また, リンパ組織の萎縮, 血中のリンパ細胞と免疫グロブリンの減少も認められている.

4) Palytoxin

Palytoxin は フィリピンにおけるカニ中毒⁽⁴⁸⁾やサンゴ礁の藻食魚の中毒⁽⁴⁹⁾の原因物質であるので, 食品衛生的にも重要な毒である. Palytoxin も brevetoxin と同じく細胞膜の Na イオンに対する透過性を増大させるが, 陽イオンに対する選択性は低く, また, 電位依存性のチャンネルを介したものではないとされている (詳しくは, 総説を参照されたい⁽⁵⁰⁾). Palytoxin が Na⁺, K⁺-ATPase 自身もしくは, その近傍をイオンチャンネルに変えるという仮説が提出されているが⁽⁵¹⁾, 詳しい作用機

構はわかっていない. Palytoxin 投与時のマウスにおける病変は, 血管系の収縮が顕著であり, とくに心臓に対する作用がおもな死因とされている⁽⁶⁰⁾.

5) その他の化合物

抗ガン剤として期待されている bryostatins は, 培養細胞系において protein kinase C に結合して, DNA 合成を誘導することによって細胞分裂を促進すると考えられている^(52,53). また, らん藻の毒 aplysiatoxin の作用は, TPA (phorbol エステル) 型の発ガンプロモーターであり⁽⁵²⁾, protein kinase C の活性化を通じて発ガンを促進するとされている. 海綿から分離された calyculin は, 最近オカダ酸と並んで, 蛋白りん酸化酵素の阻害剤として注目されており⁽⁶⁴⁾, 研究用試薬として普及しはじめている. Calyculin の作用は, 2A 型酵素とともに, オカダ酸の阻害の弱い 1 型も強く阻害 (1 nM) する.

その他のポリエーテル化合物も最近, 薬理・病理学的研究の対象になる機会が増えてきており, ユニークな化学構造に加えて, ユニークな作用が次々と明らかにされてきた. ポリエーテル系に限らず, 海洋の生理活性物質は強力な新しい作用を有するものも多く, 今後, 各方面での多様な研究成果が期待される.

本総説の筆者の関与した部分は, 東北大学農学部食品衛生学研究室において安元 健教授の指導のもとに行われた. また, 構造解析に関しては, (財) サントリー生物有機科学研究所の直木秀夫・岩下 孝両博士, 筑波大学化学科の楠見武徳博士にご協力・ご指導をいただいた. シガトキシンの構造決定はタヒチ島ルイ・マラルデ医学研究所の Anne M. Legrand 博士, 下痢性貝毒 pectenotoxin の構造決定はコーネル大学の J. Clardy 教授との共同研究である.

その他の文献欄に挙げた共同研究者もあわせ, ここに厚く謝意を表したい.

- (1) R. E. Moore and G. Bartolini: *J. Am. Chem. Soc.*, **103**, 2491 (1981); D. Uemura, K. Ueda, Y. Hirata, H. Naoki and T. Iwashita: *Tetrahedron Lett.*, **22**, 2781 (1981).
- (2) R. W. Armstrong, J.-M. Beau, S. H. Cheon, W. J. Christ, H. Fujioka, W.-H. Ham, L. D. Hawkins, H. Jin, S. H. Kang, Y. Kishi, M. J. Martinelli, W. W. McWhorter, M. Mizuno, M. Nakata, A. E. Stutz, F. X. Talamas, M. Taniguchi, J. A. Tino, K. Ueda, J. Uenishi, J. B. White and M. Yonaga: *J. Am. Chem.*

- Soc., **111**, 7530 (1989).
- (3) M. Isobe, Y. Ichikawa and T. Goto: *Tetrahedron Lett.*, **27**, 963 (1986).
- (4) M. Kageyama, T. Tamura, M. H. Nantz, J. C. Roberts, P. Samfai, D. C. Whritenour and S. Masamune: *J. Am. Chem. Soc.*, **112**, 7407 (1990).
- (5) M. Murata, A. M. Legrand, Y. Ishibashi and T. Yasumoto: *J. Am. Chem. Soc.*, **111**, 8929 (1989).
- (6) 安元 健: 化学増刊, **111**, 3(1987); 上村大輔: 化学増刊, **111**, 145(1987); 上村大輔: 化学増刊, **114**, 59 (1988); P. J. Schuer, ed.: "Bio-organic Marine Chemistry," Springer-Verlag, Berlin, 1987.
- (7) Y. Y. Lin, M. Risk, S. M. Ray, D. VanEngen, J. Clardy, J. Golik, J. C. James and K. Nakanishi: *J. Am. Chem. Soc.*, **103**, 6773 (1981).
- (8) K. Tachibana, P. J. Scheuer, Y. Tsukitani, H. Kikuchi, D. V. Engen, J. Clardy, Y. Gopichand and F. J. Schmitz: *J. Am. Chem. Soc.*, **103**, 2469 (1981); Y. Murakami, Y. Oshima and T. Yasumoto: *Nippon Suisan Gakkaishi*, **48**, 69 (1982).
- (9) 安元 健, 村田道雄: 化学と生物, **29**, 379 (1991).
- (10) M. Murata, A. M. Legrand, Y. Ishibashi, M. Fukui and T. Yasumoto: *J. Am. Chem. Soc.*, **112**, 4380 (1990).
- (11) 大沢映二, 望月祐志: 化学, **40**, 703 (1985).
- (12) 佐竹恭介: 化学, 9月10月号付録 (1984).
- (13) C. A. G. Haasnoot, F. A. A. M. De Leeuw and C. Atlona: *Tetrahedron*, **36**, 783 (1980).
- (14) T. Suzuki, O. Sato, M. Hiram, Y. Yamamoto, M. Murata, T. Yasumoto and N. Harada: *Tetrahedron Lett.*, **32**, 4505(1991).
- (15) T. Yasumoto, Y. Oshima and M. Yamaguchi: *Nihon Suisan Gakkaishi*, **44**, 1249 (1978).
- (16) M. Murata, M. Shimatani, H. Sugitani, Y. Oshima and T. Yasumoto: *Nihon Suisan Gakkaishi*, **48**, 549 (1982).
- (17) T. Yasumoto, M. Murata, Y. Oshima, G. K. Matsumoto and J. Clardy: *Tetrahedron*, **41**, 1019 (1985).
- (18) T. Yanagi, M. Murata, K. Torigoe and T. Yasumoto: *Agric. Biol. Chem.*, **53**, 525 (1989).
- (19) M. Murata, M. Sano, T. Iwashita, H. Naoki and T. Yasumoto: *Agric. Biol. Chem.*, **50**, 2693 (1986).
- (20) M. Murata, M. Kumagai, J.-S. Lee and T. Yasumoto: *Tetrahedron Lett.*, **28**, 5869 (1987).
- (21) Y. Shimizu, H.-N. Chou, H. Bando, G. V. Duyle and J. C. Clardy: *J. Am. Chem. Soc.*, **108**, 514 (1986).
- (22) 安元 健: 化学と工業, **43**, 102 (1990).
- (23) J. Kobayashi, M. Ishibashi, M. R. Wälichli, H. Nakamura, Y. Hirata, T. Sasaki and Y. Ohizumi: *J. Am. Chem. Soc.*, **110**, 490 (1988).
- (24) 佐竹真幸, 村田道雄, 安元 健, 永井宏史, 直木秀夫: 第 32 回天然有機化合物討論会講演要旨集, 1990, p.143.
- (25) M. Murakami, K. Makabe, K. Yamaguchi, S. Konosu and M. R. Wälichli: *Tetrahedron Lett.*, **29**, 1149 (1988).
- (26) K. Torigoe, M. Murata, T. Yasumoto and T. Iwashita: *J. Am. Chem. Soc.*, **110**, 7876 (1988).
- (27) F. J. Schmitz, R. S. Prasad, Y. Gopichand, M. B. Hossain and D. Helm: *J. Am. Chem. Soc.*, **103**, 2467 (1981).
- (28) D. Uemura, K. Takahashi, T. Yamamoto, C. Katayama, J. Tanaka, Y. Okumura and Y. Hirata: *J. Am. Chem. Soc.*, **107**, 4796 (1985).
- (29) Y. Kato, N. Fusetani, S. Matsunaga and K. Hashimoto: *J. Am. Chem. Soc.*, **108**, 847 (1986).
- (30) G. R. Pettit, C. L. Herald, D. L. Doubek, D. L. Herald, E. Arnold and J. Clardy: *J. Am. Chem. Soc.*, **104**, 6846 (1982).
- (31) S. Carmely and Y. Kashman: *Tetrahedron Lett.*, **26**, 511 (1985); 北川 勲, 小林資正, 川添和義, 香取岳人, 田中淳一, 比嘉辰雄, 石田寿昌, 土井光陽, 佐々木琢磨: 第 32 回天然有機化合物討論会講演要旨集, 1990, p.127.
- (32) R. E. Moore: "Marine Natural Products, Chemical and Biological Perspectives Vol. IV," ed. by P. J. Scheuer, Academic Press, New York, 1981, p.1.
- (33) 藤木博太編: 実験医学, **8**, 1211 (1990).
- (34) S. Shibata, Y. Ishida, H. Kitano, Y. Ohizumi, J. Habon, Y. Tsukitani and H. Kikuchi: *J. Pharmacol. Exp. Ther.*, **223**, 135 (1982).
- (35) A. Takai, C. Bialojan, M. Troschka and J. C. Ruegg: *FEBS Lett.*, **217**, 81 (1988).
- (36) M. Suganuma, H. Fujiki, H. Suguri, S. Yoshizawa, M. Hirota, M. Nakayasu, M. Ojika, K. Wakamatsu, K. Yamada and T. Sugimura: *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, **85**, 1768 (1988).
- (37) K. Terao, E. Ito, T. Yanagi and T. Yasumoto: *Toxicon*, **24**, 1141 (1986).
- (38) K. Terao, E. Ito, M. Oarada, M. Murata and T. Yasumoto: *Toxicon*, **28**, 1095 (1990).

- (39) S. Ellis : *Toxicon*, **23**, 469 (1985).
- (40) W. A. Catterall and M. Risk : *Mol. Pharmacol.*, **19**, 345 (1981).
- (41) K. M. Li : *Science*, **147**, 1580 (1965).
- (42) M. D. Rayner, T. I. Kodaki and E. L. Fellmeth : *Science*, **160**, 70 (1968).
- (43) K. Terao, E. Ito, M. Oarada, Y. Ishibashi, A.-M. Legrand and T. Yasumoto : *Toxicon*, **29**, 633 (1991).
- (44) M. Takahashi, Y. Ohizumi and T. Yasumoto : *J. Biol. Chem.*, **257**, 7287 (1982).
- (45) F. Gusovsky and J. W. Daly : *Biochem. Pharmacol.*, **39**, 1633 (1990).
- (46) M. Murata, F. Gusovsky, M. Sasaki, Y. Yokoyama, T. Yasumoto and J. W. Daly : *Toxicon*, **29**, 1085 (1991).
- (47) K. Terao, E. Ito, Y. Kakinuma, K. Igaraishi, M. Kobayashi, Y. Ohizumi and T. Yasumoto : *Toxicon*, **27**, 979 (1989).
- (48) T. Yasumoto, D. Yasumura, Y. Ohizumi, M. Takahashi, A. C. Alcala and L. C. Alcala : *Agric. Biol. Chem.*, **50**, 163 (1986).
- (49) M. Fukui, M. Murata, A. Inoue, M. Gawel and T. Yasumoto : *Toxicon*, **25**, 1121 (1987).
- (50) E. Habermann : *Toxicon*, **27**, 1171 (1989).
- (51) G. S. Chhatwal, H.-J. Hessler and E. Harvermann : *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.*, **319**, 101 (1983).
- (52) J. B. Smith and L. Smith and G. R. Pettit : *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, **132**, 939 (1985).
- (53) A. S. Kraft, J. B. Smith and R. L. Berkow : *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, **83**, 1334 (1986).
- (54) H. Ishihara, H. Ozaki, *et al.* : *J. Pharmacol. Exp. Ther.*, **250**, 388 (1989).