 総 説

組織化学からみた食品加工の諸問題

市 川 収*

加工食品の形態は食品加工メカニズムによって作られた動・植物細胞の人工像 (artefact) に過ぎない。最近まとめた拙著「食品組織学—組織化学的食品構造論—」¹⁾は目で見る食品の栄養、目で見た食品の化学的構造といった考え方をとっている。生鮮食品である生物組織細胞にたいして物理的¹⁻¹⁾、化学的¹⁻²⁾、生物学的¹⁻³⁾要約を加えたさいの形態変貌を考究すれば、加工食品、調理食品、保蔵食品の製造工程に生ずるメカニズムを観察できるように思われる。

生鮮食品を加工食品化するさいには、畜産、水産、農産品をとわず、加圧、調味、加熱の工程を経て行なわれ、加圧はさらに圧偏、粉碎、捏粉、練合、爆裂など、調味、軟化のためには加塩、醤油漬、加糖、味付、調味、加酸、発酵、加石灰など、加熱には湯煮、蒸煮、焙焼、油揚、乾燥、燻煙などの細かい作業がなされている。

著者はこれらの加工プロセスをモデル実験し、以下のべる多くの要因の下に生組織をおき組織化学的影響を調べて来た。たとえば水¹⁻⁴⁾、乾燥¹⁻⁵⁾、凍結¹⁻⁶⁾、アルコール¹⁻⁷⁾、ホリマリン¹⁻⁸⁾ (燻煙に近い)、水素イオン濃度¹⁻⁹⁾、塩類濃度¹⁻¹⁰⁾、酸・アルカリ¹⁻¹¹⁾、加塩¹⁻¹²⁾、加糖¹⁻¹³⁾、陽イオン¹⁻¹⁴⁾、陰イオン¹⁻¹⁵⁾、有機溶媒¹⁻¹⁶⁾、酸化剤¹⁻¹⁷⁾、加温¹⁻¹⁸⁾、加熱¹⁻¹⁹⁾、時間経過¹⁻²⁰⁾、加油¹⁻²¹⁾、高分子溶媒¹⁻²²⁾、蛋白凝固剤¹⁻²³⁾、非蛋白凝固剤¹⁻²⁴⁾の下におかれた細胞の影響を、核酸、蛋白、多糖類、脂肪の側から調べている。また生組織を腐敗¹⁻²⁵⁾、死後変化¹⁻²⁶⁾、発酵¹⁻²⁷⁾のごとき生物学的影响、なま物、煮物、酢の物、蒸し物、揚げ物など調理科学的影响¹⁻²⁸⁾を観察した。

食品組織化学からみた食品加工機作の諸問題について現在の立場で逐次のべてみたい。

1. オルガノロジーからみた加工原料

加工原料は動植物の臓器 (器官) であって、これらの臓器は動植物が生きたための生理機能をいとなむための機能的単位である。したがって食品工業の領域にたいし

ては、可食性臓器であるから、医学、農学領域での詳しい解剖学、組織学的体系の知識は必要がない。たとえば豚では豚肉、肝臓が原料として重視され、血管、神経、骨などは重ぜられない。むしろ TRAUTMAN のいう臓器学 (オルガノロジー, Organology)¹⁻³⁰⁾の観点から理解したほうがよい。可食性の動植物臓器を原料とした各種加工品を表示しておく (第1表)。

動植物を通じて organ は臓器, apparatus は器官として考え、臓器は構造、器官は機能を伝え、たとえば心臓、腎臓、肺臓、葉、花は臓器であって、それぞれ循環器、泌尿器、呼吸器、栄養器、生殖器であって器官として理解する。食品は動植物を通じて可食性の臓器を用うるので、臓器学的な概念で考えて行くのがよいと著者は主張している。植物では習慣的に臓器といわず、器官とよんでいるが、植物でも臓器と器官とを別けて使ってよいと思う。

単一な臓器を原料とする加工品 (たとえばハム¹⁻³¹⁾、バター¹⁻³²⁾、チーズ¹⁻³³⁾、ビータン¹⁻³⁴⁾、煉製水産加工品¹⁻³⁵⁾、米加工品¹⁻³⁶⁾、麦加工品¹⁻³⁷⁾、豆加工品¹⁻³⁸⁾など) と数個のちがった臓器を原料とする加工品 (たとえばソーセージ¹⁻³⁹⁾、オイルサーजन¹⁻⁴⁰⁾、福神漬¹⁻⁴¹⁾など) があり、これらは動物性あるいは植物性臓器のいずれかが用いられている。しかしある種のソーセージ¹⁻⁴²⁾では動物性臓器以外に植物性デンプン、香辛料の種子¹⁻⁴³⁾、葉が加わり、ハンペンのごとき水産煉製品では魚肉にヤマモの根茎が付加される。

したがって加工品の構造¹⁻⁴⁵⁾を調べるためには各種の臓器の知識を必要とする。

2. 加工食品の組織標準化の問題

加工食品には、種類により、その硬さ、軟かさ、脆さ、内容の均一、不均一、水ばいもの、粘稠など区々であり、固体、半固体、半液体、液体性に属するものがある。いっぽう生鮮品と違って、加工品では蛋白凝固のものが多い。食品組織学的研究を行なうためには固定¹⁻⁴⁶⁾ (fixa-

* 東北大学農学部 (仙台市北六番丁)

Some Problems on the Food-processing from the Histochemical Points. By OSAMU ITIKAWA.

第1表 食品加工の原料としての可食性臓器のオルガノロジーと加工食品

加工品	機能器官	臓器	循環器			内分泌			栄養			呼吸	排泄	生殖		神経	感覚	
			循環器	血管	心臓	ホルモン	分泌	消化	栄養支持	栄養支持	消化	呼吸	尿管	生殖	生殖	神経	感覚器	木部
			血心	維節	甲唾	油粘	胃、小腸、大腸、膵臓	肝、筋肉、結合組織	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実	芽、根、葉、果実
			管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管	管管
畜産加工品	ハソベコ肉パチマビ	ムジンプーズン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水産加工品	乾魚ス塩練調味	水産物めざし辛品加工品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
農産加工品	米大麦小麦トウモロコシイモダイズマメ野菜漬物果物果汁	農産加工品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：臓器における ○ は動物性，● は植物性

tion), 脱水¹⁻⁴⁷⁾ (dehydration), パラフィンなどで包埋¹⁻⁴⁸⁾ (embedding) して, のちマイクロームで薄切¹⁻⁴⁹⁾ (cutting) して, 切片化 (sectioning) し, 染色¹⁻⁵⁰⁾

(staining) して検鏡する必要がある。

生きた組織または死んだ組織を用いる生鮮食品またはそれに近いものでは, 放置すると, 1) 無菌的に扱われ

なく、2) 空気中においても、これ以上脱水、乾燥、萎縮しないよう考えられ、3) すでに殺菌、滅菌の操作により蛋白凝固をおこし、液中において溶媒による膨化、収縮をこれ以上おこすおそれは少なく、4) 細菌、カビの侵入は包装、滅菌により防がれ、これらによる製造後の蛋白分解を比較的になく、5) 時間とともに酵素による蛋白分解も多くないし、6) 醗酵製品の場合は応用微生物による凝固細胞の酵素分解などの特徴を具えている。また 7) 加工過程に加えたアルコールは凝固剤⁶¹⁾ (coagulant) であり、醗製時に発生する一成分とし

注：蛋……蛋白，脂……脂肪，デ……デンプン

のホルムアルデヒドは非凝固剤¹⁻⁵³⁾ (non-coagulant) としてのホルマリンの固定に近い。

固定に用いるアルコールは核酸、多糖類、蛋白を調べるにはよいが、脂溶性であるから、脂肪をみるにはホルマリンがよい。核酸、多糖類、蛋白、脂肪ともに万能の固定はホルマリン緩衝液¹⁻⁵³⁾が適当である。

第2表は各種加工品の硬度、内容、性質の一覧表であって、適当な包埋方法を表示している。脆、軟、硬、不均一で硬軟の混じったもの、半固体、半液体のもの、水

分の多いものが加工品にみられるので、生鮮食品のさいのようにパラフィン包埋だけではむづかしい。ゲラチン包埋¹⁻⁵⁴⁾を行なうと、加熱処理しないし、有機溶媒で脱水を要しないため、軟脆な材料に適している。半液体、液体のものは、塗抹して標本を作ればよい。

3. 加工原料の鮮度の形態学的表現

新鮮な生物資材を加工原料にすることはのぞましい。新鮮度の高いものは生きた細胞をもつことである。鮮度の高い筋肉を例にとって酵素組織化学的染色¹⁻⁵⁵⁾を行な

第3表 鯉の側背筋の新鮮なもの、鮮度のわるいもの、加熱したもの、凍結したもの比較 (いずれも生きた鯉を用いての実験)

細胞物質部位		実験温度時間			
		新鮮	腐敗	煮沸	凍結
		10°C	37°C	100°C	-15°C
		瞬時	1日	30分	5日
組織化学的所見	DNA { 核	++	-	+	++
	低重合DNA { 細胞質	-	+	++	-
	DNA { 筋繊維	+	-	-	+
	グリコーゲン { 間質	++	-	+	++
	コラーゲン { 筋繊維	++	+	+	+
	蛋白質 { 間質	++	+	+	+
	コラーゲン { 筋繊維	++	++	+	++
	リン脂質 { 間質	++	++	-	++
	中性脂 { 筋繊維	++	++	-	++
	水晶 { 核	-	-	-	++
病変 { 細胞質核		-	空胞筋溶解	筋細胞膜と凝固筋原繊維との分離、顆粒化	水晶化
		-	核溶解	核濃縮、破壊	核内水晶
細菌 { 筋繊維内間質		-	++	-	-
		-	++	-	-
酵素組織化学	コハク酸脱水素酵素	++	-	-	++
	乳酸脱水素酵素	++	-	-	++
	TPNH ジアホラーゼ	+	-	-	-
	DPNH ジアホラーゼ	++	-	-	++
	チトクロムオキシダーゼ	++	-	-	++
	酸性ホスファターゼ	-	-	-	-
	アルカリ性ホスファターゼ	-	-	-	-
	ホスホリラーゼ	++	-	-	++
	モノアミンオキシダーゼ	++	-(菌++)	-	++
	アデノシン3リン酸酵素	++	-	-	++
リパーゼ		-	-(菌++)	-	+

い、細胞呼吸酵素¹⁻⁶⁶⁾、解糖酵素¹⁻⁶⁷⁾、糖合成酵素¹⁻⁶⁸⁾、アデノシン 3 磷酸酵素¹⁻⁶⁹⁾、アンモニア発生酵素¹⁻⁶⁰⁾などを調べると、鮮度の表現ができる¹⁻⁶¹⁾。さらに DNA のための Feulgen 塩酸 Schiff 反応¹⁻⁶²⁾、DNA と RNA 共染のピロニン・メチル緑染色¹⁻⁶³⁾、多糖類のための McMANUS 過ヨード酸 Schiff 反応¹⁻⁶⁴⁾、グリコーゲンのための唾液消化後の過ヨード酸 Schiff 反応¹⁻⁶⁵⁾、蛋白のための Dujin アクロレイン Schiff 反応¹⁻⁶⁶⁾、脂肪のための Sudan III 染色¹⁻⁶⁷⁾ も行なう。

新鮮肉にたいし、腐敗肉では核 DNA が崩壊し、減少、細胞質のグリコーゲンは全く消失する。

酵素もほとんど不活性となり、菌の繁殖甚しく、細菌のモノアミノオキシダーゼ、リパーゼが高活性であった。煮沸によって DNA の甚しい分解、低重合化、グリコーゲン減少、脂肪著減、諸酵素の全不活性化を見る。凍結により細胞核氷晶形成するが、細胞内諸成分とくに諸酵素は鮮度の高いものとほとんど変わらない。

4. 食品加工ステップの指標としての核酸

各種加工ステップの間に、生組織 (living tissue) のもつ細胞の細胞質と核は組織化学的影響が大きい。細胞質には RNA、グリコーゲン (またはデンプン)、脂肪、

蛋白、酵素蛋白、核には蛋白、DNA および RNA をもつが、脂肪と蛋白の消長よりも、RNA、グリコーゲン (またはデンプン)、DNA の変化を追うほうが見やすい。このうちでも DNA の動向は食品加工段階を知るために、もっともよい指標たりうることを知り得た。

案外簡単な染色ながら有用なのは Unna-Pappenheim のピロニン・メチル緑染色²⁾で、従来は形質細胞 (plasma cell) を探すのに適していた。BRACHET³⁾ はリボスクレアーゼ消化後ピロニン好性物質の不染性になることから RNA の同定、CASPERSSON⁴⁾ は紫外線顕微鏡によりピロニン好性細胞質物質およびメチル緑好性核物質が 2,650 Å 吸収波長をもつこと、DAVIDSON⁵⁾、MELLORS⁶⁾、NOVIKOFF⁷⁾ らのデゾキシリボスクレアーゼ消化後メチル緑好性物質の不染性になることから DNA の同定が行なわれてから、この Unna-Pappenheim 氏は近代的な様相を呈するにいたった。さらに重合度のおちた DNA はピロニン好染すること、POLLISTER⁸⁾、柴谷⁹⁾、市川¹⁰⁾ によって知られ、高分子 DNA、低重合 DNA および RNA の細胞内分布を調べる有用な染色法となるにいたった。

生きた細胞の各種溶媒条件下における核酸の変化を調べた著者の研究をまとめると第 4 表のようである。第 4

第 4 表 溶媒条件別による生きた肝細胞の核酸およびグリコーゲンの消長

	DNA		RNA	グリコーゲン
	DNA	DNA 低重合		
煮 沸 滅 菌 水	24 h 軽減	—	24 h 軽 減	24 h 著 減
ストマイ、ペニシリン水	//	—	24 h //	24 h //
0°C, 5 日	卅	周辺のみ軽度+	5 日 著 減	10 日 消 失
-5°C, 1 日	卅	// +	5 日 //	15 日 //
-10°C, 1 日	卅	// +	1 日 //	1 日 //
-25°C, 1 日	卅	// +	1 日 //	1 日 //
-72°C, 30 日	卅	—	卅	卅
ア ル コ ー ル 100%	卅	—	卅	卅
// 60%	軽 減	—	卅	卅
// 40%	//	—	軽 減	軽 減
// 20%	著 減	—	//	//
ホ ル マ リ ン 原 液	軽 減	軽 度 +	著 減	卅
酸性ホルマリン (4%)	pH 2-4 著 減	—	軽 減	卅
中性ホルマリン (4%)	卅	—	卅	卅
アルカリ性ホルマリン (4%)	pH 10-12 軽 減	軽 度 +	卅	卅
0.5M 食 塩 水	軽 減	—	軽 減	卅
1.0M //	//	—	卅	卅
1.5M //	著 減	著 明 卅	卅	卅
1N 塩 酸	//	// 卅	軽 減	著 減
1N 硫 酸	軽 減	// 卅	卅	//

1N カセイソーダ	消	失	—	消	失	卅
1N 重炭酸ソーダ	〃		—	〃		卅
1N 酢酸	卅		—	卅		卅
飽和食塩水	12h 著	減	—	3h 著	減	卅
飽和砂糖水	48h	〃	—	3h	〃	卅
有機溶媒ベンジン	著	減	—	著	減	卅
有機溶媒エーテル		〃	—	〃	著	減
0~3°C, 3h		卅	—	卅		卅
10~14°C, 3h		卅	—	卅		卅
27~37°C, 3h	軽	減	—	卅		卅
47~57°C, 3h	著	減	—	軽	減	卅
67°C, 3h	〃		—	消	失	卅
100°C, 2h	〃		著明 卅	〃	著	減
37°C 放置	12h 消	失	—	12h 著	減	12h 著 減
食用油	24h 著	減	—	24h 消	失	軽 減
グライコーゲン の少	高溶分子液	グリコーゲン液	軽 減	—	著 減	卅
		DNA 液	輕減, 細胞質, DNA 侵入	—	〃	常態 —
		RNA 液	著減 (核ピロニン酸)	—	著 増 卅	〃 —
		ヘパリン液	軽 減	—	軽 減	〃 —
		硫酸銅液	著減 (Cu 侵入)	軽度+ (Cu 侵入)	著 減 (Cu 侵入)	〃 —
		塩化鉄液	〃 (Fe 侵入)	軽度+ (Fe 侵入)	〃 (Fe 侵入)	〃 —
グライコーゲン の多	高溶分子液	グリコーゲン液	軽 減	—	著 減	常態 卅
		DNA 液	著減 (核水腫)	—	〃	軽 減
		RNA 液	輕減 (核ピロニン酸)	—	著 増 卅	著 減
		ヘパリン液	著減 (核水腫, DNA 繊維)	—	著 減	常態 卅
		硫酸銅液	〃 (Cu 侵入)	軽度+ (Cu 侵入)	〃 (Cu 侵入)	〃 卅
		塩化鉄液	〃 (Fe 侵入)	軽度+ (Fe 侵入)	〃 (Fe 侵入)	〃 卅
グリコーゲン の組織	水	煮 20 分	軽 減	著明 卅	消 失	著 減, 消 失
		酢物 30 分	〃	—	〃	軽 減
		揚げ物 1.5 分	消 失	著明 卅	〃	〃
		蒸物 10 分	〃	〃 卅	〃	常態 卅
		油炒 2 分	〃	〃 卅	〃	軽 減

表から次のことが知られるにいたった。

a. 生きた細胞核の DNA と変性

1) -72~+14°C の間では DNA は高分子状態を保ち, 100% アルコール, 1N 酢酸, 中性ホルマリンでも DNA は高分子のまま固定される。

2) 27~100°C の間の温度上昇, 100°C 以上の加熱, 水漬, 酸, アルカリ, 低調液, 高調液, 飽和の食塩水および同砂糖液, 有機溶媒, 酸, アルカリ液, 酸化剤, 油剤, 高分子物質, 陽イオン, 陰イオン, 各種調理によって DNA は分解, 消失し, 低重合化を見る。

2) 0~-25°C の間に軽度の DNA 低重合化を見るが, 凍結後の解凍によるためと思われる。

b. 生きた細胞の RNA と変性

1) 蛋白合成のさかんな細胞, とくに動物性の内臓, 植物性の芽, 根端には RNA が多いが, 動物性筋肉, 植物性根茎には少い。肝細胞は RNA が多いので, 各種要約下での RNA の消長をしらべやすい。

2) 100% アルコール, 1N 酢酸, 中性ホルマリンでは RNA をよく固定する。

3) 0~37°C の間では RNA は保たれるが, -25~-80°C では著減, 47~57°C で滅失する。

RNA は水, 食塩, 有機溶媒の下で失われ, 時間とともに著減する。

c. 高分子物質溶液中の生細胞核

飽食した動物の肝細胞にはグリコーゲンがきわめて多く貯えられ¹⁻⁶⁸⁾、絶食のさいには全く消失する¹⁻⁶⁸⁾のは生理的である。屠殺時絶食させているのは衛生的の考慮から習慣的になされているが、物質貯蔵の点からは飽食のほうがよい。

このような2つの肝組織をDNA、RNA、グリコーゲン、ヘパリンのような高分子物質溶液のなかにおくと¹¹⁾、細胞内物質と細胞外物質との競合 (interaction) が起こり、細胞外から内へ吸飲現象 (pinocytosis)、細胞内から外への吐出現象 (emiliocytosis) が細胞膜をへだてておこる (吸飲、吐出の訳は著者の説明に用いたものに過ぎぬ)。とくに興味のあるのは絶食時肝細胞をDNA液に入れると、細胞質にDNAが侵入し、RNAは著減する。

グリコーゲンの少ない絶食時の肝細胞をグリコーゲン液中におくと、細胞質にグリコーゲンが多く侵入し、RNAが著減する。

d. 鉄、銅イオンの細胞内とり込み

1) 生きた絶食時、飽食時の肝細胞を塩化鉄液中におくと¹⁻⁶⁹⁾、いずれの細胞でも、核DNAの著減、核および細胞質内への鉄反応陽性物の著しい侵入、DNA低重

合化、RNA著減を認める。

2) 生きた絶食時、飽食時の肝細胞を硫酸銅液中におくと¹⁻⁶⁹⁾、いずれの細胞でも、核DNA著減、DNA低重合化、RNA著減、核および細胞質への銅染色陽性物質の著しい侵入を見る。

これらのモデル実験は細胞外よりの各種イオンは細胞内に容易に侵入しうることと関係し、加工メカニズムの研究、容器金属による汚染の研究にも役立つ。

5. 加工食品細胞の核酸の消長

第5表は畜産・水産・農産加工品を構成する死んだ細胞および加工中に繁殖する生きた醗酵微生物における核酸の消長を示しているが、それらから次のことがまとめられる。

1) 畜産加工品のうちハムの一部 (ボーンレスハム¹⁻⁷⁰⁾、ローゼハム¹⁻⁷⁰⁾、卵加工品¹⁻⁷¹⁾、乳加工品¹⁻⁷²⁾を除いて、筋繊維核DNAは低重合化している。

全く高分子DNAを認めないものは、ロースハム¹⁻⁷³⁾、プレスハム¹⁻⁷⁴⁾、焼ブタ¹⁻⁷⁵⁾、ベーコン¹⁻⁷⁶⁾、肉かん詰¹⁻⁷⁶⁾などであって、スモークタン¹⁻⁷⁷⁾、ウインナーソーセージ¹⁻⁷⁸⁾、ツンゲソーセージ¹⁻⁷⁹⁾、チキンロール¹⁻⁷⁸⁾、ベ

第5表 加工食品における死んだ細胞の核酸、グリコーゲンの態度

		DNA		RNA	グリコーゲン (またはデンプン)	
		DNA	DNA低重合			
畜産加工品	ハム	ロースハム	—	著明(++)	—	消 失
		ボーンレス	++	—	—	〃
		ローゼハム	++	—	—	〃
		プレスハム	—	著明(++)	—	〃
		スモークタン	++	〃(++)	—	著 減
	ベーコン	焼ブタ	—	〃(++)	—	消 失
		ベーコン	—	〃(++)	—	〃
	ソーセージ	ウインナー	+	〃(++)	—	著 減
		ツンゲン	+	〃(++)	—	消 失
		チキンロール	+	〃(++)	—	著 減
	コンビーフ	ベリーロール	+	〃(++)	—	〃
		コンビーフ	+	〃(++)	—	++~—
	かんづめ	牛肉大和煮	—	〃(++)	—	著 減
		鶏かんづめ	—	〃(++)	—	〃
	ビータン	ビータン	なし	なし	—	糖蛋白 ++
	マヨネーズ	マヨネーズ	〃	〃	なし	〃 ++
チーズ	カスタード	〃(菌++)	〃	〃(菌++)	多糖類+菌P(++)	
	ブル	〃(菌++)	〃	〃(菌++)	多糖類+菌P(++)	
バター	バター	〃	〃	〃	なし	
乳酸食品	ヨーグルト	〃(菌++)	〃	〃(菌++)	糖蛋白++菌P(++)	
	カルピス	〃(菌++)	〃	〃(菌++)	なし(菌P++)	

水産加工品	乾性水産物	ニボシ	—	著明(卅)	—	卅
		チリメンジャコ	—	// (卅)	—	卅(内臓卅)
	塩蔵水産物	塩サケ	—	// (卅)	—	卅
		スジコ	— (菌卅)	// (卅)	—	糖蛋白卅(菌卅)
	魚味付かんづめ	タラコ	— (菌卅)	// (卅)	—	糖蛋白卅(菌卅)
		カツオ	—	// (卅)	—	著 減
	貝かんづめ	マグロフレーク	—	// (卅)	—	消 失
		サバ	—	//, 消失	—	//
	ハムソーセージ	オイルサーズン	—	// (卅)	—	卅
		貝 柱	—	消 失	—	卅
	ソーセージ	魚 肉 ハム	—	著 明 (卅)	—	消失(デンプン卅)
		魚肉ソーセージ	—	// (卅)	—	著減(// 卅)
	塩 辛	カツオ	なし(菌卅)	なし	— (菌 卅)	糖蛋白卅(菌卅)
		煉 ウニ	—	—	—	糖 蛋 白 卅
	煉 製 品	イ カ	なし(菌卅)	なし	— (菌 卅)	糖蛋白卅(菌卅)
		カ マ ボ コ	消 失	—	—	消失(デンプン卅)
	乾 性 品	チ ク ワ	//	—	—	// (// 卅)
		ナルトマキ	//	—	—	// (// 卅)
	調味製品	サツマアゲ	//	—	—	// (// 卅)
		ハンペン	//	—	—	// (// 卅)
	調味製品	ホシイカ	//	—	—	著 減
		魚 味 噌	なし(菌卅)	なし	なし(菌卅)	糖蛋白卅(菌卅)
	海草食品	ミリン干	消失(菌卅)	著 明 (卅)	// (菌卅)	消失(菌卅)
		ニシン粕漬	// (菌卅)	なし	// (菌卅)	糖蛋白卅(菌卅)
	海草食品	海草食品	—	—	—	糖蛋白, 粘多糖卅
農産加工品	大麦加工品	オートミル	—	著 明 (卅)	—	デンプン卅
		バ ン	なし(菌卅)	なし	なし(菌卅)	// 卅(菌卅)
	小麦加工品	マカロニ	//	//	//	// 卅
		うどん	//	//	//	// 卅
	大豆加工品	麸	//	//	//	// 卅
		トウフ	//	//	//	糖蛋白卅, デンプン卅
	大豆加工品	アブラアゲ	//	//	//	// 卅, // 卅
		凍りトウフ	//	//	//	糖蛋白卅, // 卅
	大豆加工品	ガンモドキ	//	//	//	デンプン卅
		味 噌	// (菌卅)	//	// (菌卅)	糖蛋白卅, デンプン卅
	大豆加工品	納 豆	// (菌卅)	//	// (菌卅)	// 卅, デンプン卅
	トウモロコシ	ポップコン	//	//	//	デンプン卅
		ビーナツ	//	//	//	// 卅
	豆加工品	ヨウカン	//	//	//	// 卅
		梅 干	//	//	//	多糖類卅
	野菜漬物	良 漬	卅 (菌 卅)	+	// (菌 卅)	// 卅(菌卅)
		塩 キウリ	卅 (菌 卅)	+	// (菌 卅)	// 卅(菌卅)
	野菜加工品	フキ佃煮	—	+	//	// 卅
		福 神 漬	—	+	//	// 卅
	漬物かんづめ	タ ク ワ ン	—	+	// (菌卅)	// 卅(菌卅)
		オレンジジュース	なし	なし	//	// 卅
	乾 製 品	トマトケチャップ	//	//	//	デンプン卅, 多糖類卅
		カンピョウ	//	//	//	多糖類卅
	乾 製 品	干 シ イ タ ケ	卅	+	卅	// 卅

リーロール¹⁻⁷⁸⁾、コンビーフ¹⁻⁷⁹⁾では高分子 DNA を混じている。ポーンレスハム¹⁻⁷⁰⁾、ローゼハム¹⁻⁷⁰⁾では核 DNA は高分子状態のままである。畜産加工品のほとんどは RNA を認めないのは、筋肉には少なく、かつ加工途中で失われるからと思われる。

2) 畜産加工品中乳製品のチーズ¹⁻⁸⁸⁾、バター¹⁻⁸⁹⁾ 乳酸飲料、卵製品のピータン¹⁻⁸⁴⁾、マヨネーズ¹⁻⁷¹⁾ などでは核 DNA、細胞質 RNA を認めないのは細胞をもたないからである。チーズ¹⁻⁸⁸⁾と乳酸飲料¹⁻⁸⁰⁾では微生物のもつ DNA、RNA を検鏡できる。

3) 水産加工品中乾性水産物¹⁻⁸¹⁾、塩蔵水産物¹⁻⁸¹⁾、魚味付かん詰¹⁻⁸²⁾、魚肉ハム¹⁻⁸³⁾、魚肉ソーセージ¹⁻⁸³⁾、煉製品¹⁻⁸⁵⁾、一部の調味製品¹⁻⁸⁴⁾ (ミリン干、ニシン粕漬) では筋繊維または卵、内臓の核 DNA の低重合化が著しく、高分子 DNA、RNA は見られない。

4) 水産加工品中塩蔵水産物¹⁻⁸¹⁾ のスジコ、タラコ、塩辛、魚味噌、ミリン干、ニシン粕漬には細菌が多く、微生物の DNA、RNA をみるが、食品構成細胞の DNA、RNA は消失する。

5) 農産加工品¹⁻⁸⁶⁾のほとんどは DNA、RNA は認められないが、大豆加工品¹⁻⁸⁸⁾ (味噌、納豆)、野菜漬物加工品¹⁻⁸⁹⁾ (奈良漬、塩キウリ)、乾製品¹⁻⁸⁷⁾ (干シイタケ) では DNA は低重合のものを認める。また醗酵食品では菌体の DNA、RNA が多い。干シイタケでは RNA にとむ。

動・植物性の加工食品では、加工ステップの間に、いろいろの物理的、化学的要因が加わり、また醗酵を用いる食品では生物学的要因が加わるため、上述のごとき核酸とくに DNA の変化は特徴的であり、加工研究の指標となる。

6. 食品加工ステップの指標としての多糖類

第4表では溶媒条件による生きた動物細胞のグリコーゲンの消長、第5表では動物性、植物性加工食品における死んだ動物細胞のグリコーゲンおよび植物細胞のデンプン、糖蛋白、セルロースなどの多糖類の消長をまとめている。

a. 溶媒条件による生細胞のグリコーゲンの消長

1) グリコーゲンは水、酸、有機溶媒により著減、100°C 加熱のさい、0～-25°C の凍結を解凍させたときに消失する。

2) グリコーゲンは 100% アルコール、ホルマリン、食塩、砂糖の下で失われず保たれ、0～67°C では消失しない。

b. 加工食品におけるグリコーゲンとデンプン

1) 畜産加工品のうち肉製品では、加工操作中に筋肉のグリコーゲンはほとんど消失する。コンビーフ¹⁻⁷⁹⁾の筋肉中にはグリコーゲンを多く含む。

卵製品¹⁻⁷¹⁾ (ピータン、マヨネーズ)、乳製品¹⁻⁷⁹⁾ (チーズ、ヨーグルト) では多糖類を豊富に、糖蛋白性である。チーズ¹⁻⁸⁸⁾、ヨーグルト¹⁻⁸⁰⁾、カルビス¹⁻⁸⁰⁾のごとき乳製品には微生物の多糖類が多い。

2) 水産加工品のうち筋肉を用いた乾性水産物¹⁻⁸¹⁾、塩蔵水産物¹⁻⁸¹⁾は乾燥、脱水のため、グリコーゲンは消失しないが、魚味付かん詰¹⁻⁸²⁾、魚ハム¹⁻⁸³⁾、魚ソーセージ¹⁻⁸³⁾、煉製品¹⁻⁸⁵⁾の筋肉グリコーゲンは加工ステップ中に消失する。スジコ、タラコのごとき卵は糖蛋白、カツオ、ウニ、イカの塩辛には糖脂蛋白小体をもつ。そのうちスジコ、タラコ、カツオ塩辛、イカ塩辛には微生物の多糖類が多い。

水産加工品¹⁻⁸⁸⁾のうち魚ハム、魚ソーセージ、カマボコ、チクワ、ナルトマキ、サツマアゲ、ハンペンなどでは筋肉のグリコーゲンは消失し、多量のデンプンが添加されている。

3) 農産加工品¹⁻⁸⁸⁾のほとんどはデンプンをもち、大麦加工品 (オートミル)、小麦加工品 (パン、マカロニー、ウドン、麩)、大豆加工品 (トウフ、アブラアゲ、凍りトウフ、ガンモドキ、味噌、納豆) トウモロコシ製品 (ポップコーン)、その他豆加工品 (ピーナッツ、ヨウカン、アン) にはデンプンが多い。大豆加工品ではややデンプンが少ない。トマトケチャップにも多い。

大豆加工品は柔細胞に蛋白小体 (protein bodies) をもつが、多糖類を少量混有し糖蛋白性である。

野菜漬物加工品のほとんどが、細胞膜の膨化した多糖類が多く、塩キウリ、奈良漬、タクワンでは多糖類をもつ菌体が多い。

7. 食品加工ステップにたいする病理解析

動・植物が生きている間におこる病的および異常状態の過程を調べる学問を病理学 (pathology) という¹⁻⁸⁹⁾。生鮮食品では死後変化 (postmortem changes) による自家融解および腐敗による変質と鮮度低下を来す。加工食品では製造工程中、生鮮または死後変化を受けた生物資材を水浸、加熱、乾燥、燻煙防腐、加塩、加糖、加酸、加油、アルコール漬、発酵、加圧などの加工ステップ、煮る、茹る、揚げる、蒸す、漬けるなどの調理ステップ、冷凍その他の保蔵ステップを踏むわけであるから、加工品の形態観察にたいしては火傷、水死、熱傷、脱水症、アルコール、ホルマリン、酸などによる凝固壊死、細菌繁殖、圧傷、凍傷などのさいの諸病変 (lesions)

に対する病理学的解釈が成立する。もちろん病理学の定義が示すごとく「生きている間」という限定があるが、死後変化と、続いてひきおこす加工変化 (processing changes) とは、生物細胞を原料とする限り、病理学的解釈を適用してよいと思う。

食品組織学をおし進めるために関連病変を紹介しておく。

1) 細胞死、火傷、凍傷、酸などによる組織死を壊死 (necrosis) と呼び、凝固壊死 (coagulation-necrosis) (チーズ化) と融解壊死 (液化) (liquefaction) に区別し、

乾燥するとミイラ化 (mumification)、細菌繁殖すれば腐敗、糜爛、軟化、液化ののち空洞となる。

2) 細胞の大きさ、容積の縮小を萎縮 (atrophy)、増加を腫脹 (swelling) という。

3) 細胞変性、蛋白凝固し細胞質が顆粒化するものを濁濁腫脹 (cloudy swelling)、空洞を生ずるものを空洞化 (cavity)、糸をひき粘稠なものを粘液化、色素化して沈着するもの、鉄反応陽性顆粒の出現などがある。細胞質および核に水様液の貯まるのを水腫 (edema) と呼ぶ。

4) 細胞膜と細胞質との疎化および細胞と細胞との離

第6表 加工食品形態の上に現われた病理学的変化

加工品	変 化	組 織 死					容 積		細 胞 変 性					疎 化		
		凝 固 (壊死)	液 化	ミ イ ラ 化	菌 集 落	軟 化	空 洞	萎 縮	腫 脹 膨 化	空 胞 化	粘 液 化	色 素 化	水 腫	物 質 侵 入	離 開 疎 化	索 状 破 裂
畜産加工品	ハム	○					○									
	ソーセージ	○				○	○			○				○		○
	ベーコン	○						○								○
	コンビーフ	○				○				○						○
	肉かん詰	○				○										○
	バター		○													
工 品	チーズ	○			○						○					
	マヨネーズ		○													
	ビータン	○										○		○		○
水産加工品	乾性水産物			○				○				○				
	魚かん詰	○				○	○			○						○
	魚ソーセージ	○					○			○				○		
	スモーク油	○		○				○				○		○		
	塩辛		○		○	○		○			○	○				
工 品	調味加工品	○			○	○		○			○			○		○
		○		○								○		○		
農産加工品	米加工品	○	○				○	○								○
	大麦加工品						○	○				○			○	○
	小麦加工品				○	○	○	○				○			○	○
	トウモロコシ加工品	○		○			○	○				○			○	○
	ダイズ加工品	○	○		○	○	○	○		○	○	○			○	○
	イモ加工品	○		○		○	○	○				○			○	○
	マメ加工品	○				○	○	○				○			○	
	野菜加工品			○				○								
	漬物加工品		○					○		○	○	○		○		
	ビシメ		○					○		○	○	○		○		
	果物加工品		○	○				○						○		
工 品	果汁							○								
								○								

開、植物細胞では脱水による萎縮が強く、細胞膜と細胞質を疎化、溶媒侵入による細胞質の気球化 (ballooning) または凝固像を呈するものをプラズモリジス (plasmolysis), 水により再び復旧原形にもどることを脱プラズモリジス (deplasmolysis), 傷害細胞で細胞膜と細胞質の分離が不完全で一部付着している不完全プラズモリジス (incomplete plasmolysis), 細胞質が泡沫ようとなる空胞化 (vacuolisation) または泡沫化 (foamy degeneration), 細胞液腔がさらに小さく分画される液腔凝集 (aggregation of cell sap), 細胞体が繊維または索状構造となる (fibrous or strand-like conversion of cell body), 細胞から細胞質の飛び出すプラズモプティシス (plasmoptysis) がある。

動物細胞相互の結合が離れバラバラとなるものを離開 (dissociation), 組織に加わった圧のため破裂 (rupture) を生ずる。

5) 色素体 (plastid) の変化には萎縮, 染色性低下, 葉緑体の変色, 色素溶解, デンプン粒過産生, デンプン粒肥大 (hypertrophy), 色素体凝集, 色素体溶解, 色素体空洞 (篩部化), 葉緑体, 色素体, 白色体の脂肪分離 (lipophanerosis) がある。

6) 動、植物細胞を通じて核病変は多く, 形で区別される¹²⁾。加工ステップの変化は核の形の諸種々相を観察する必要がある。核が大きくなるものを核肥大 (swelling), 染色質過多 (hyperchromatosis), 染色質低減 (hypochromatosis), 染色質が分離し, 核内に小空胞, 小顆粒多く粗大となる染色質分離 (Chromatinentmischung), 核容積が縮小し染色質が濃縮する核濃縮 (pyknosis), 染色質が分離して大部分が核膜の内側に堆積して核中央の染色質を欠く核壁染色質増多 (hyperchromatosis around nuclear membrane), 染色質が核網に堆積し, 類円形の境界明瞭な粗大顆粒が集って 2~3 個の小体となる核網染色質増多 (hyperchromatosis of nuclear network, 浜崎), または核小塊状変性 (浜崎), 核壁染色質増多し核壁に発芽ようとなり外方に突出する核壁発芽 (budding), (発芽には茸状, 撥状, 亜鈴状, 栗イガ状, 針状のものもある)。塊状となった染色質が細碎し, 核膜破壊すると細胞質内に分散し, その碎片が微小のときを核塵, 大きいのを核片 (fragment), 染色質融解初期, 不染性となる空胞をもつものを核水腫 (nuclear hydrops), 染色質が融解し, 核膜が残っているものを核融解

(karyolysis) といい細胞の死滅を意味し, その後核膜も融解すると, 核は跡かたもなくなったものを核消失といわれ, 染色質分離により核の網膜がこわれ, 核膜の開放されたところから, 体液で洗われ, 染色質の流出をみるものを染色質流出 (Chromatinauslaugung, lixivation of chromatin), 核が膨らみ染色質が少なく核の変性と思われるものを核膨化, 栄養のわるい筋肉でみる萎縮性核増殖の場合は不整楕円形の小核が多数出現し念珠

第1図 細胞核の形態変化の種々相

1. 正常核, 核膜にめぐらされ, 中にある小円は仁, その間にちらばる顆粒は DNA をもつ染色質。
2. 染色質低減, 仁附属染色質増加。
3. 染色質分離。
4. 核質湧出。
5. 核壁発芽。
6. 色質融解。
7. 紡錘状核。
8. 核壁染色質増多。
9. 染色質分離の甚しい核濃縮。
10. 両極性核湧出。
11. 核片。
12. 核融解。
13. 核濃縮した線状核。
14. 線状核。
15. 紐状核。
16. DNA 線維。
17. 紐状核不整形。
18. 染色質湧出。
19. 染色質小塊状変性。
20. 核粉又は核塵。
21. 核濃縮。
22. 核破砕。
23. 萎縮性染色質湧出。
24. 核内水晶形成。
25. 核内グリコーゲン沈着。
26. 核内グリコーゲンをもち空胞。
27. 核内グリコーゲン性大空胞。
28. 核内の著しいグリコーゲン沈着。
29. 水晶をもつ線状核。
30. 核内空胞形成又は核水腫。
31. 色素形成。
32. 色素形成による核濃縮。
33. 紡錘形小体形成。
34. 核膜破裂。
35. 核内脂肪沈着。
36. 核融解。
37. 核膜破裂と核水腫。
38. 核融解性線状核。
39. 核膨化。
40. 色素化。
41. 核索, n個の多数核が捻珠状形成。
42. 核板。
43. ウイルス性核封入体および好酸性核包含体。

(市川真直)

にならぶ核索 (Kernstrang), 核が幾列もならんで板状となる核板 (Kernplatte) などの多数である。

核水腫に近いものとして核水晶¹⁾ (市川, 高野, nuclear ice-crystalization) がある。核に色素形成を見るものに核内リポフスチン沈着 (intracellular lipofuscin, 浜崎) があり, 飢餓肝の核変性, 核破砕のさい核粉末の褐色色素に移行すると浜崎はのべたが, 油で揚げた肝細胞核に同じような現象が見出された¹⁶⁾ (市川, 楠原)。核膜が一部破れ, 破裂縁に染色質が増加して, 核内のゲル状滴が核外に舌状, 曲玉状に涌出するものを核質湧出 (浜崎, dripping of achromatic nuclear substance) といわれるが, 水煮された肝細胞核にもみられた¹⁶⁾ (市川, 楠原)。核内の好酸性核包含体 (eosinophilic intracellular inclusion) はウイルス病では多く見られているが¹⁵⁾, 実験的に人工形成にも成功している (DABENPORT¹²⁾ 高調食塩水漬, 市川¹⁶⁾, 楠原の飽和食塩水漬, 市川¹⁶⁾・星野, アンモニア中毒肝)。

核内グリコーゲンは糖尿病および糖原蓄積病の肝, うっ血肝でしばしば認められ, MEIXNER¹³⁾ (1911) 以来知られ, 正常動物の機能的なものとして, 星野の鶏舌腺¹¹⁾, 市川¹⁶⁾の豚副腎の核内に核内糖原を見たが, 実験的には市川, 楠原は生理的食塩水, 飽和食塩水, 醤油, 砂糖, 油, 水のなかに入れた肝およびそれらの 100°C に熱したもののなかに入れた肝において核内グリコーゲンを

作成することに成功している。

核内脂肪沈着 (intracellular fat deposition) について触れてみる。核の脂肪化の初めての記載は肝硬変について調べた BRANDTS (1909) である¹²⁾。WEGELIN¹³⁾ (1928) は正常肝に核内中性脂肪を, 星野, 市川¹⁶⁾はコレステリン給与動物において中性脂肪を, 市川¹⁶⁾, 楠原は実験的に行った肝の油揚げにおいて人工形成に成功した¹⁶⁾。

以上のごとく詳しく核の変化についてのべたが, 食品加工過程においてはきわめて関連のあるものは次にのべるごとく核の変化であることは興味深い。

8. 食品加工メカニズムの基礎実験の一部

動物性の筋肉細胞およびデンプン貯蔵および葉緑体をもつ植物性細胞の組織化学的構造と微細構造の関連模式図は第 2, 3 図のようである。調味および加熱のステップが肝細胞にたいして及ぼす影響について行なった実験の成績をのべてみる。第 7 表は生理食塩水, 飽和食塩水, 醤油, 飽和砂糖水, 食用油, 水の中に室温 30 分, 100°C, 30 分入れた場合の変化で, 加塩, 塩漬, 醤油漬, 加糖, 加油, 水漬の場合と, それらの加熱時のごとき加工メカニズムを探ぐるときの問題を示唆している。

1) 生理食塩水中では, 室温ではグリコーゲンをやや失なうが, 加熱すると保たれる。いっぽう加熱により核内グリコーゲン侵入甚だしい。ともに細胞質内にはノコ状の小胞体拡張性のグリコーゲン小体が持て

第2図 筋肉細胞の組織化学的構造と微細構造の関連模式図

1. alkaline phosphatase 2. phosphorylase, UDPG-glycogen transferase 3. G-6-P DHG 4. TPNH-diaphorase 5. DPNH-diaphorase 6. cytochrome-oxidase 7. succinic DHG 8. isocitric DHG 9. lipase 10. acid phosphatase 11. ATP-ase 12. monoamine oxidase, Pyr. (ピルビン酸), Lactic (乳酸), Fumar. (フマル酸), Succin. (コハク酸), Oxalo-succin. (オキサロコハク酸), fp (フラビン蛋白), Cyt. (チトクロム), A 帯, I 帯, Actr (アクチン), My. (ミオシン), ATP (アデノシン3リン酸) (市川原図)

第3図 植物細胞の組織化学的構造と微細構造との関連模式図

Lact. (乳酸), Fum. (フマル酸), Oxa. Succ. (オキサロコハク酸), fp. (フラビン蛋白), Cyt. (チトクロム), ATP. (アデノシン3P), ADP. (アデノシン2P), ADP-G. (アデノシン2P グルコース), Mt. (ミトコンドリア), PL. (有色体), Vac. (空胞), Lys. (リソゾーム), St. (デンプン粒), Pw. (第1次壁), Sw. (第2次壁), 細胞質内の管系の中黒い顆粒 (RNA 粒子) をもつものは粗面小胞体, もたないものは滑面小胞体, Pr. b (蛋白小体), St. (デンプン小体), Mt. は (ミトコンドリア) である。

1. TPNH-diaphorase, 2. ATP-ase, 3. Phosphoglucomatase, 4. ADP-G-pyrophosphorylase, 5. UDPG-starch glycosyl transferase, 6. glucan branching glycosyl transferase, 7. amylase, 8. ADP-glucose starch glycosyl transferase, 9. alkaline P-ase, 10. G-6-P DHG, 11. DPNH diaphorase 12. Cytochrom oxidase, 13. Succinic DHG, 14. isocitric DHG, 15. リパーゼ, (市川原図)

る。核は室温では高分子 DNA, 加熱すると DNA 低重合化が甚しい。核の形態は室温では変化がないのに, 加熱すると, 核膨化し, 軽度の延長, 皺縮 (shrinkage), 核水腫を見る。細胞質の RNA は室温では塩基好染強く変わらないが, 加熱すると, ヒストン蛋白凝固による RNA の濃縮 (condensation) が強い。室温ではみられないが, 加熱すると, 包膜下の水疱 (vesiculation), 空胞化 (vacuolisation), 細胞索離開 (dissociation) がみられる。

2) 飽和食塩水に入れると, 室温, 加熱ともにグリコーゲンは失なわれず, 核内にグリコーゲンの侵入著しい。ともに高分子 DNA は認められず, 低重合化 (depolymerisation) が著しい。核の破碎, 皺壁, 水腫著明。ともに RNA の濃縮を見, 加熱により RNA は紐状化する。細胞質内空胞化甚しく, 核周囲に水腫状の暈形成 (perinuclear edematous hallow-formation) は強い。浸

透圧による脱水像といえる。

3) 醤油に入れると, 室温, 加熱ともにグリコーゲンを失なわず, 核内にグリコーゲン侵入甚しい。核は低重合化のみとなる。ともに核の皺縮, 水腫, 色素化 (醤油色素の着色) が強いが, 加熱ではさらに核は延長型となり, 甚だしいのは線状核となり, 核破碎甚しい。また DNA 繊維 (DNA-fiber 化) もある。細胞質 RNA 失なわれ, 紐状化する。包膜下に水疱, 波状模様 (wave-like appearance), 空胞化, 核周囲性暈形成, 細胞離開甚しく, 組織内に水疱融合による破裂および空洞 (rupture and cavity) をみる。加熱による湯滴飛散の形であろう。醤油色素は毛細血管内血清, 赤血球, 細胞核に沈着して, 色素沈着 (pigment deposition) をおこす。

4) 砂糖液に入れると, 室温, 加熱ともにグリコーゲンをよく保ち, 核内にグリコーゲンを侵入さす。室温で

第7表 調味および加熱の肝細胞に及ぼす影響

病 変	メ ジ ウ ム	温 度	時 間	生 食 塩 水		飽 食 塩 水		醬 油		砂 糖		油		水	
				室	一	室	一	室	一	室	一	室	一	室	一
				温	〇〇℃	温	〇〇℃	温	〇〇℃	温	〇〇℃	温	〇〇℃	温	〇〇℃
グリコーゲン	肝 小 葉 核 内 グリコーゲン 細胞内グリコーゲン波状消失 キノコ状細胞内グリコーゲン			三〇分	一三〇分	三〇分	一三〇分	三〇分	一三〇分	三〇分	一三〇分	三〇分	一三〇分	三〇分	一三〇分
				++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+
				-	++	++	++	++	++	++	++	+	消失	++	++
				-	++	-	-	-	-	-	-	++	〃	++	-
DNA 核酸	高 分 子 DNA 低 重 合 DNA 核 延 長 核 膨 破 縮 腫 化 の 線 状 膨 破 縮 腫 化 変 核 破 縮 腫 化 化 核 色 素 化 DNA 纖 維			++	++	+	-	+	-	++	-	++	〃	++	-
				-	++	++	++	++	++	-	++	-	〃	+	+
				-	+	-	-	-	++	-	+	-	++	消	-
				-	+	-	-	-	++	-	+	-	++	消	-
				-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	++	++	-	++	-	-	-	++	消	-
				-	+	++	++	++	++	+	+	-	++	消	-
				-	+	++	++	++	++	-	-	++	++	+	++
				-	-	-	-	++	++	-	-	-	++	-	-
				-	-	-	-	-	+	-	-	-	++	消	-
RNA 核酸	ビ ロ ニ ン 好 性 RNA 凝 縮 化 RNA 紐 状 化			++	+	++	+	++	+	++	++	+	-	++	-
				+	++	++	+	++	+	-	-	+	++	+	-
				-	-	-	++	-	++	-	+	-	++	-	+
細胞変化	包 膜 下 水 疱 液 状 模 様 円 柱 細 胞 化 細 胞 空 胞 化 核 周 囲 暈 形 成 細 胞 索 離 開 油 の 侵 入 核 内 油 沈 着 破 裂 性 水 疱 空 洞 細 胞 圧 迫 萎 縮 褐 色 色 素 化			-	++	+	+	-	++	-	+	-	++	++	++
				-	+	-	+	-	++	-	++	-	消失	-	+
				-	+	-	+	-	++	-	++	-	〃	-	++
				-	++	+	++	++	++	-	-	++	++	+	++
				-	+	++	++	++	++	+	+	++	消失	++	++
				-	++	-	-	++	++	-	++	-	〃	++	++
				-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-
				-	-	-	-	-	++	-	-	-	++	-	++
				-	++	-	-	-	++	-	+	-	++	-	++
				-	-	-	-	++	++	-	-	-	++	-	-

は高分子 DNA のみであるが、加熱により DNA 低重合化基だしい。食塩に比べ、核の変化は乏しい。室温では RNA 多く保たれるが、加熱により消失し、紐状化もある。加熱によると、水疱は軽いがみられ、波状模様、表層における立方細胞の円柱状化 (cylindrication) を認め細胞索は離開する。

5) 食用油に入れると、室温ではグリコーゲン軽減、

核内グリコーゲン侵入軽度、キノコ状グリコーゲン小体を見、DNA は高分子状態に保たれ、核の変化としては水腫以外に少ない。RNA も消失し、空胞化、核周囲性暈形成強く、ズダン好染の食用油が核内に侵入し、また細胞質内にも侵入している。加熱により、グリコーゲン、DNA、RNA とともに完全消失に近い。残存核は延長し、線状核、DNA 繊維、皺縮、膨化、破裂、破碎、水腫な

ど甚しく、核内は色素化し黄色となる。RNA 濃縮、紐状化 (thread like appearance) 強い。包膜下水泡、細胞空胞化、破裂および空洞を作り、細胞索は圧迫萎縮に陥り線状となる。油は空洞内、細胞体、細胞核に侵入し、物質焙焼による黄褐色の色素化が著しい。アクロレイン蛋白反応もほとんど陰性で蛋白も消失する。

6) 水中に入れると、室温、加熱ともグリコーゲン減少または消失し、加熱では核内グリコーゲン侵入著しく、室温では水の進入によるグリコーゲンの波状消失の模様強い。

室温では高分子 DNA 多いが、低重合 DNA 軽度出現の程度であるが、加熱では DNA 著減し、低重合化のみとなる。核の形状は、延長核、線状核、破碎、皺壁、水腫化が甚しい。RNA は消失する。包膜下水泡、円柱細胞化、空胞化、核周囲性暈形成、油胞索離開、湯滴飛散による破裂および空洞を作り、細胞索の圧迫萎縮が強い。

食品加工のメカニズムを考えるさい、上述のような単純なモデル実験においてある一面の真理を物語っている。室温、生理的食塩水での特徴は、グリコーゲン、DNA、RNA をよく保ち、物質の逸出を防いで、緩衝の役割は十分であり、細胞核、細胞質の変形はない。加熱すると、グリコーゲン、RNA を保つが、DNA の低重合が著しい。核の変形は軽度、水泡、空洞化、離開が現われ、熱の影響を見る。

飽和食塩水では、室温、加熱ともグリコーゲン、RNA よく保たれ、核酸低重合化著しく、核変形も強いが、細胞体は皺縮、萎縮し脱水甚しい。

醬油では飽和食塩水に似ているが、空胞、水泡、空洞、色素化が甚しい。

砂糖では生理的食塩水にほぼ似て、緩衝の役割をはたしている。油では油の侵入強く、グリコーゲン、DNA、RNA 消失し、加熱により、変形甚しく、皺縮、油滴、水滴飛散による空洞のため圧迫萎縮が甚しい。水のみではグリコーゲン、DNA、RNA を失ない、加熱による核変形は著しい。

文 献

- 1) 市川収：食品組織学—組織化学的食品構造論—，(光生館)，(1966)；以下引用個処は前述書の頁数を示す。
 1-1) p. 169 1-2) p. 174 1-3) p. 193
 1-4) p. 169 1-5) p. 171 1-6) p. 172
 1-7) p. 174 1-8) p. 176 1-9) p. 178

1-10) p. 179	1-11) p. 181	1-12) p. 181
1-13) p. 181	1-14) p. 182	1-15) p. 182
1-16) p. 182	1-17) p. 185	1-18) p. 187
1-19) p. 188	1-20) p. 188	1-21) p. 189
1-22) p. 190	1-23) p. 191	1-24) p. 192
1-25) p. 194	1-26) p. 193	1-27) p. 198
1-28) p. 201	1-29) p. 39	1-30) p. 40
1-31) p. 256	1-32) p. 265	1-33) p. 263
1-34) p. 263	1-35) p. 273	1-36) p. 276
1-37) p. 277	1-38) p. 280	1-39) p. 253
1-40) p. 269	1-41) p. 286	1-42) p. 260
1-43) p. 252	1-44) p. 273	1-45) p. 255
1-46) p. 132	1-47) p. 133	1-48) p. 133
1-49) p. 134	1-50) p. 135	1-51) p. 191
1-52) p. 191	1-53) p. 132	1-54) p. 133
1-55) p. 308	1-56) p. 315	1-57) p. 319
1-58) p. 318	1-59) p. 319	1-60) p. 317
1-61) p. 311	1-62) p. 141	1-63) p. 141
1-64) p. 146	1-65) p. 151	1-66) p. 145
1-67) p. 152	1-68) p. 190	1-69) p. 190
1-70) p. 257	1-71) p. 263	1-72) p. 265
1-73) p. 256	1-74) p. 257	1-75) p. 258
1-76) p. 262	1-77) p. 260	1-78) p. 259
1-79) p. 262	1-80) p. 265	1-81) p. 267
1-82) p. 269	1-83) p. 270	1-84) p. 275
1-85) p. 275	1-86) p. 284	1-87) p. 287
1-88) p. 266	1-89) p. 159	
- 2) PAPPENHEIM, A.: *Virchows Arch.*, 157, 19 (1899).
 - 3) BRACHET, J.: *Compt. Rend. Soc. Biol.* 133, 88 (1940).
 - 4) CASPERSSON, P.: *Skand. Arch. Physiol.*, suppl., 8 (1936).
 - 5) DAVIDSON, J.N.: *Cold Spring Harb. or Symp. Quant. Biol.*, 12, 50 (1947).
 - 6) MELLORS, R.C.: *Proc. Soc. Expt. Med.*, 67, 242 (1948).
 - 7) NOVIKOFF, A.B.: *Science*, 113, 320 (1951).
 - 8) POLLISTER, A.W. and LEUCHTENBERGER, C.: *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.*, 35, 111 (1949).
 - 9) 柴谷篤弘：医学と生物学，14, 357 (1949).
 - 10) 市川収：第1回核酸シンポジウム，東京大学，1949年。
 - 11) 市川収：日本の医学の1959年，1, 108 (細胞の微細構造とその機能に関する最近の知見)。
 - 12) 浜崎幸雄：細胞核の生理と病理，(永井書店)，p. 214 (1951)。
 - 13) 市川収：生物科学，3 (2), 49; 3 (3) 98 (1951)。
 - 14) TORYU, Y., et al. *Tohoku J. Agr. Res.*, 11 (4), 309 (1960)。
 - 15) ICHIKAWA, O., et al. *Tohoku J. Agr. Res.*, 14 (4), 277 (1964)。
 - 16) 市川収：未発表。