Über das Ligamentum denticulatum der Vögel (*Passer montana* und *Gallus domesticus*).

Von

Kichisaburo Shimada,

(Aus dem Anatomischen Institut der Medizinischen Akademie, Kyoto).

Mit Tafel XVII und 5 Textfiguren.

Die Konfiguration des Ligamentum denticulatum weist je nach den Tierarten ziemlich bedeutende Verschiedenheiten auf. Schon vor einigen Jahren veröffentlichte ich sein eigentümliches Formverhältnis bei *Cryptobranchus japonicus*¹⁾ und Schlangen (*Trigonocephalus japonicus*, *Tropidonotus tigrinus*)²⁾. Dabei stellte ich fest, dass das Band einen das Rückenmark an die Wirbelkanalwand befestigenden Apparat darstellt und als eine Schutzvorrichtung gegen das Hin- und Herziehen des Rückenmarkes bei Bewegungen der Wirbelsäule dient.

Was die Art und Weise des Aufbaues der Wirbelsäule von Vögeln anbetrifft, so zeigt er beträchtliche regionale Verschiedenheiten. Dies beruht in der Hauptsache auf der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Die Halswirbelsäule ist sehr beweglich, während die Brustwirbelsäule dagegen unbeweglich ist und eine feste Stütze für den Brustkorb bildet. Die Lumbosakralsäule (der Beckenkanalteil) ist auch ganz unbeweglich und stützt, sich mit dem Becken verbindend, die kräftigen hinteren Extremitäten. Obgleich bei ausgewachsenen Vögeln die Lumbosakralsäule selbst unbeweglich ist, so ist doch der auf das embryonale Zentralnervensystem ausgeübte Zug³⁾ der wachsenden Spinalnerven, die später zum starken Ischiadicusgeflecht werden, in dieser Region so stark, dass dadurch ein besonderes Formverhältnis des Rücken-

1) Shimada, K., Über die Wirbelsäule und die Hüllen des Rückenmarks von *Cryptobranchus japonicus*. Anat. Hefte, Bd. 44, 1911.

2) Shimada, K., Über die Segmentierung des eigentümlichen Rückenmarksbandes und die „Hofmann'schen Kerne“ (Kölliker) des Rückenmarkes von einigen Schlangen (*Trigonocephalus*; *Tropidonotus tigrinus*). Anat. Anz. Bd. 42, 1912.

3) Imhof, G., Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Lumbalmarkes bei den Vögeln. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 85, 1905.

markes, d. h. die Bildung eines Sinus rhomboidalis resp. der Lumbalwulst, herbeigeführt wird. Es scheint mir daher von besonderem Interesse zu sein, zu untersuchen, ob das betreffende Band bei Vögeln ebenfalls solchen regionalen Bauverschiedenheiten unterworfen ist oder nicht.

I. Material und Untersuchungsmethode.

Ich benutzte zur vorliegenden Untersuchung *Passer montana* und *Gallus domesticus*, welche beide durch Zenkersche Flüssigkeit, Tellesniczky's Mischung und 10% Formollösung fixiert wurden. Die Wirbelsäule samt Rückenmark wurde mit 5% Salpetersäurealkohol entkalkt und in Zelloidin eingebettet; dann wurden Querschnittserien angefertigt. Als Schnittfärbung habe ich Hämatoxylin-Eosin, van Giesonsche Lösung, Weigertsche Lösung (für Markscheidenfärbung) und Mallorysche Hämatoxylinlösung (für Bindegewebsfärbung) angewandt.

II. Eigene Befunde.

1. Halsregion.

Bevor ich in die Beschreibung des Ligamentum denticulatum selbst eingehe, möchte ich einige Bemerkungen über die Rückenmarkshülle in dieser Region kurz angeben. Die Dura ist von der Wirbelkanalwand durch den Epiduralraum getrennt und bildet einen geschlossenen Sack. Die Arachnoidea liegt an der Dura so dicht an, dass die beiden nur an solchen Stellen als zwei besondere Hüllen zu unterscheiden sind, wo die Arachnoidea von der Innenfläche der Dura wellenförmig sich erhebt. Auf den nach van Gieson gefärbten Präparaten kann man jedoch die beiden Hüllen durch die verschiedenen Farbentöne genug unterscheiden. Zwischen beiden befindet sich kein bemerkbarer Raum (Subduralraum), während Arachnoidea und Pia immer durch einen schmalen Zwischenraum (Subarachnoidealraum) geschieden sind.

Das Ligamentum denticulatum stellt ein besonderes Gebilde des Pia-gewebes dar. Es besteht aus vielen derben straffen Bindegewebsfasern und dazwischen zerstreut liegenden stäbchenförmigen Zellkernen. Das Band

zieht als ein schmaler langer Strang der lateralen Fläche des Rückenmarks dicht anhaftend zwischen den dorsalen und ventralen Nervenwurzeln hindurch. Bei der Durchmusterung der Serienschritte erkennt man leicht, dass die Querschnittform und die Lagerung des Bandes sich nicht gleichartig durch die ganze Strecke des Halsmarks verhalten.

Im mittleren Gebiet des einzelnen Wirbelkörpers liegt das Band auf der Seitenfläche des Rückenmarkes, etwas dorsal von der Ebene des Zentralkanals, und stellt auf dem Querschnitt ein in die Rückenmarkssubstanz eingestecktes rundlichovales Gebilde¹⁾ dar. An dieser Stelle trägt das Band

Fig. 1.

Querschnitt durch die Wirbelmitte (7. Halswirbel
Passer, halbschematisch)

einen kleinen Zacken, der durch den Subarachnoidealraum dorsolateralwärts gegen die Arachnoidea verläuft und endlich mit dieser an der Innenfläche der Dura sich anheftet (Textfigur 1).

In der Zwischengegend zwei aufeinanderfolgender Wirbel (Intervertebralgend) ändert das Band sowohl seine Lage, als auch seine Querschnittform. Hier liegt das Band etwas mehr ventralwärts verschoben als dort und verdünnt sich, so dass seine Querschnittform sehr schmal und membranartig

1) Auf dem Schnitt zeigt das Band folgende Masse:

	beim Passer	beim Gallus
Dicke	0.022 mm	0.045 mm
Breite	0.037	0.150
Länge des Zackens	0.045	0.060

geworden ist¹⁾; auch sieht man hier keinen Zacken. Gerade an der Anheftungsstelle des verdünnten Bandes trifft man in der peripheren Zone der Rückenmarkssubstanz, also in der weissen Substanz, eine in geringer grauer Substanz eingebettete Ganglienzellengruppe d. h. den Hofmann'schen Kleinkern (Kölliker) oder den perimedullären Kern (Textfigur 2). Diese Nervenzellengruppen liegen wie bekannt^{2) 3) 4)} im ganzen Hals- und Dorsalmark in der oberflächlichen Schicht eingebettet.

Fig. 2.

Querschnitt durch die Intervertebralgegend zwischen 7. und 8. Halswirbel
(Passer, halbschematisch).

Nach dem oben Gesagten darf man wohl annehmen, dass das Band in der Halsregion einer abwechselnden Formveränderung (Segmentierung) unterliegt, es verdickt sich nämlich an der Wirbelmitte sehr und schickt hier einen Zacken aus (=vertebrale Verdickung mit Zackenbildung), während es in der Zwischenwirbelgegend bzw. in der Stelle, worin der Hofmann'sche Kleinkern sich befindet, sich verdünnt (=Intervertebralverdünnung ohne

1) Diese intervertebrale Verdünnung scheint mir der Zwischenzone des Seitenbandes bei den Schlangen zu entsprechen. Ihre Masse auf dem Schnitt sind wie folgt:

	beim Passer	beim Gallus
Dicke	0.015 mm	0.030 mm
Breite	0.090 „	0.210 „

2) Kölliker, A., Über einen noch unbekannten Nervenzellkern im Rückenmark der Vögel. Vorläufige Mitteilung. Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien. Sitz. d. math. naturw. Kl. 1901 (nach Referat).

3) Kölliker, A., Weitere Beobachtungen über die Hofmann'schen Kerne am Mark der Vögel. Anat. Anz. Bd. 21, 1902.

4) Berliner, K., Die „Hofmann'schen Kerne“ (Kölliker) im Rückenmarke des Hühnchens. Anat. Anz. Bd. 21, 1902.

Zackenbildung). Die knappste Zusammentreffung der Intervertebralverdünnung des Bandes und des Auftreten des perimedullären Kerns bei den von mir untersuchten Vögeln stimmt mit dem Befund derselben in der Zwischenzone des Seitenbandes und der Lage der betreffenden Nervenzellengruppe bei den Schlangen ganz überein. Hierdurch möchte ich bei den Vögeln die zwischen zwei hintereinanderfolgenden Intervertebralverdünnungen liegende Strecke ohne Zögern wohl als ein Segment des Bandes annehmen. Folglich darf man die intervertebrale Verdünnung auch intersegmentale Verdünnung nennen. Wenn man das Segment des Bandes mit demjenigen der Halswirbelsäule und des Rückenmarkes selbst vergleicht, so erkennt man leicht, dass das Segment des Bandes mit dem Wirbelsegment vollständig übereinstimmt, während es mit dem primären Rückenmarkssegment alterniert, weil der perimedulläre Kern bekanntlich in der Mitte des primären mit dem Urwirbel übereinstimmenden Rückenmarkssegments sich befindet.

2. Brustregion.

In der Brustregion ist das Lumen des Wirbelkanals viel enger als in der Halsregion. Die Dura, welche von der Wirbelkanalwand durch eine sehr schmale Spalte (Epiduralraum) getrennt ist, und die Arachnoidea liegen so dicht aneinander an, dass man diese zwei Hüllen nur durch ihre Färbbarkeit (auf van Giesonschen Präparaten) unterscheiden kann. Hier ist der Subarachnoidealraum viel schmaler als in der Halsregion. Also scheint hier der Wirbelkanal fast völlig durch das Rückenmark eingenommen zu sein.

Das Ligamentum denticulatum zeigt in der Brustregion eine sehr schwache Entwicklung, nämlich es verläuft als ein dünner bindegewebiger Streifen an der Seitenfläche des Dorsalmarkes sich anhaftend weiter; jedoch ist hier seine segmentale Formveränderung kaum erkennbar. Beim *Passer* kann ich durch die ganze Brustregion keinen Zacken des betreffenden Bandes vorfinden, der in der Halsregion in je einer Wirbelmitte metamer vorkommt. Beim *Gallus* weist das Band eine rudimentäre, unregelmässige Zackenbildung auf. Die Zacken sind an der Zahl unbestimmt und in ihrer Richtung ebenfalls ganz regellos, indem sie bald dorsolateralwärts gerichtet stehen, wie in der Halsregion, bald dagegen ventrolateralwärts ziehen.

Nach dem oben Geschilderten ist die Segmentierung des Bandes an

Brustmark nicht sicher erkennbar, obgleich der perimedulläre Hofmannsche Kern hier wie bei dem Halsmark ebenfalls metamer nachweisbar ist.

3. Lumbosakralregion.

Die Lumbosakralwirbel, die miteinander verschmolzen sind, enthalten einen einheitlichen Lumbosakralkanal (Beckenkanal). Dieser bietet auf dem die mittlere Höhe treffenden Querschnitt ein unregelmässiges Fünfeck dar (Textfigur 3-5, Tafelfigur 1-3). Der Boden resp. die ventrale Wand wölbt sich mehr oder weniger in das Kanallumen hervor. Die beiden Seitenwände laufen zunächst miteinander fast parallel dorsalwärts; dann knicken sie sich gegen die Medianlinie und bilden das Dach des Kanallumens, indem sie sich einander immer mehr nähernd schliesslich in der Medianlinie vereinigen. Zwischen der Kanalwand (inclusive ihre bindegewebige Auskleidung = inneres Periost) und der Markoberfläche (resp. Pia) befindet sich eine einheitliche Hülle. Dieselbe ist sehr wahrscheinlich eine eigentliche Arachnoidea, was daraus hervorgeht, dass sie sehr dünn und so charakteristisch hell gefärbt ist, wie ich es schon in der Arachnoidea der Halsregion sehen konnte. Die Dura ist jedoch im Lumbosakralkanal zugleich durch die Innenschicht der Kanalwand dargestellt; mit anderen Worten: sie ist hier von der Kanalwand nicht abgelöst, wie es in Hals- und Brustwirbelkanälen beobachtet wird. Daraus kann man schliessen, dass die Differenzierung der Rückenmarkshülle bei der Lumbosakralregion in einem mehr primitiven Zustand geblieben ist, als bei den Hals- und Brustregionen.

Der Umriss des Rückenmarkes weist eine dementsprechende Form auf. Die ventrale, am Boden des Kanals gelegene Fläche ist fast geradlinig, während die Seitenflächen gegen die Seitenwände des Kanals schauen. Aus den beiderseitigen Ecken, welche die Ventralfläche und die Seitenfläche zusammen bilden, treten die Ventralwurzeln heraus. Aus dem dorsalen Rand der Seitenflächen gehen die Dorsalwurzeln aus. Die beiderseitigen Dorsalstränge sind voneinander ziemlich weit getrennt, um auseinander klaffend zwischen sich die den Zentralkanal üppig umwuchernde eigentümliche sogenannte Gliamasse d. h. den Lumbalwulst zu umfassen (Textfigur 3-5, Tafelfigur 1-3).

Dieser Lumbalwulst stellt auf der Dorsalansicht des Lumbosakralmarkes eine aus der klaffenden Stelle der beiderseitigen Dorsalstränge

hervorquellende, einheitliche länglichovale Erhebung dar, welche gegen das Dach des Kanallumens vorgedrungen ist. Der Wulst¹⁾ erstreckt sich in kraniokaudaler Richtung von der Höhe des III. extramedullären Kernes bis zu der Höhe des VII. Kernes (s. unten).

Ausserdem erkennt man in dieser Gegend, dass das in der Hals- und Brustregion vorkommende Gebilde, d. h. der perimedulläre Hofmann'sche Kern, zu einem über die laterale Peripherie des Markes stark hervorragenden eigentümlichen, länglichovalen Körper d. h. dem extramedullären Hofmann'schen Grosskern (oder Lobus accessorius Lachi) ausgebildet ist (Textfigur 3 und 5, Tafelfigur 3). Durch die ganze Strecke des Lumbosakralmarks kommen von den extramedullären Kernen beim Passer 9 Paare und beim Gallus 10 Paare²⁾ metamerisch hintereinander vor, davon der erste und der letzte am kleinsten, die drei mittleren am grössten sind. Also kann man aus der Tatsache des Vorkommens des grossen Hofmann'schen Kernes mit Recht eine Segmentierung des Lumbosakralmarkes behaupten.

In der Lumbosakralregion kommen dreierlei Bänder vor, welche alle ebenfalls ein besonderes Gebilde des Pia-gewebes darstellen :

1) Ligamentum denticulatum, Lig. longitudinale laterale oder „Seitenband“. Das Band entspricht dem eigentümlichen Rückenmarksband oder Seitenband bei Reptilien und Amphibien.³⁾

2) Ligamentum longitudinale ventrale oder „Medianband“. Das Band entspricht dem Lig. pia ventrale bei Amphibien.⁴⁾

1) Auf dem Schnitt durch das mittlere Gebiet des Lumbosakralmarkes hat der Wulst folgende Grösse :

	beim Passer	beim Gallus
a) Von der ventralen Grenze des Wulstes bis zur dorsalen Grenze desselben (in der Medianlinie)	1.9 mm	4.6 mm
b) Von dem dorsalen Niveau des Markes bis zur dorsalen Grenze des Wulstes (in der Medianlinie)	9.5 „	2.5 „
c) Grösste Breite	1.7 „	4.4 „

2) Lachi schätzt die Zahl dieser Kerne auf 5-8 Paare; Kolliker und Imhof haben die Zahl derselben stets zwischen 7 und 8 Paaren schwankend gefunden.

3) Berger, E., Über ein eigentümliches Rückenmarkband einiger Reptilien und Amphibien. Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. Wissensch in Wien. 1878.

4) O'Neil, H. M., Hirn- und Rückenmarkshüllen bei Amphibien. Morph. Arbeiten. Bd. 8. 1898.

3) Ligamentum transversale ventrale¹⁾ oder „Querband“. Das Band wurde von Sterzi²⁾ als transversales Strängchen, von Imhof³⁾ als Querbalken der Dura beschrieben.

Diese drei Bänder repräsentieren recht eigentümliche Form und Lageverhältnis, nämlich einen segmentalen Aufbau, auf den ich im folgenden etwas näher eingehen werde.

Fig. 3.

Querschnitt durch den kranialen Pol des 4. Hofmann'schen Kerns (Passer, halbschematisch).

1) Ligamentum denticulatum, „Seitenband“.

Das Band setzt sich aus den straffen Bindegewebsfasern und stäbchenförmigen Bindegewebskernen zusammen und stellt eine direkte Fortsetzung desjenigen der Hals- und Brustregionen dar; jedoch erfährt es hier eine äusserst stärkere Dickenzunahme als dort und eine ganz eigentümliche

1) Streeter, G. L., The structure of the spinal cord of the Ostrich. Amer. Journ. of Anat. Vol. III. 1903 (nach Referat).

2) Sterzi, G., Die Blutgefässe des Rückenmarkes. Wiestalen 1904.

3) Imhof, G., Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Lumbalmarkes bei den Vögeln. Arch. f. makr. Anat. u. Entw. Bd. 65, 1905.

Fig. 4.

Querschnitt durch die zwischen dem 4. und dem 5. Hofmann'schen Kern befindliche Strecke des Lumbosakralmarkes (*Passer*, halbschematisch).

Fig. 5.

Querschnitt durch die Mitte des 4. Hofmann'schen Kerns (*Passer*, halbschematisch).

metamere Umbildung. Diese Eigentümlichkeit beginnt erst in der Stelle des Auftretens des I. Paares des extramedullären Kerns.

In dem Lumbosakralmark liegt das Band an der lateralen Markfläche, besonders der ventralen Ecke des Markes sich nähernd und an der dorsalen Seite der von der Markfläche heraustretenden Ventralwurzel dicht anliegend (Textfigur 3, Tafelfigur 1).¹⁾

In der Höhe des I. extramedullären Kerns befindet sich das Band an der seitlichen Ecke der ventralen Fläche des Markes, dicht ventral von dem ventralen Rand des Kerns. Hier schickt das Band einen ziemlich starken Zacken ventralwärts aus. Er rückt durch den Subarachnoidealraum gegen die seitliche Ecke des Kanalbodens vor, um sich dort die Arachnoidea vortreibend an der Kanalwand anzusetzen. Ich möchte den Zacken, der der Lumbosakralregion ganz eigentümlich ist, den „Ventralzacken“ des Bandes nennen, um ihn von dem in der Halsregion vorkommenden Zacken, der bald unten Erwähnung finden soll, zu unterscheiden. Die „Ventralzacken“ kommen an der Höhe eines jeden extramedullären Kerns vor, also bei Passer jederseits 9 an der Zahl und bei Gallus 10. Der erste (kranialste) Zacken ist am schwächsten, während die in der Mittelhöhe des Lumbosakralmarkes liegenden 4 Zacken bedeutend stark entwickelt sind²⁾ (Textfigur 5, Tafelfigur 3). Der Ventralzacken ist wie das Band selbst aus straffen Bindegewebsfasern und dazwischenliegenden stäbchenförmigen Kernen sehr fest aufgebaut. An den Ansatzstellen an die Kanalwand breiten die Zackenfasern sich fächerförmig aus und sind teilweise mehr oder weniger weit in die Knochensubstanz eingedrungen. Es ist bemerkenswert, dass der Zacken in der Anhaftungsstelle an der Markoberfläche (resp. Pia) weiter medialwärts sich erstreckt. Dieser letzte Teil des Zackengewebes zieht an dem Pia-gewebe

1) In der Mittelhöhe des Lumbosakralmarkes weist das Band auf der Schnittfläche eine ovale Form auf, deren Masse wie folgt sind:

	beim Passer	beim Gallus
Querdurchmesser	0.082 mm	0.150 mm
Längendurchmesser	0.150 „	0.248 „

2) Mass auf dem Schnitt.

	beim Passer	beim Gallus
Breite des Bandes in d. Höhe d. Ventralzackens	0.067 mm	0.21 mm
Breite d. Ventralzackens	0.052 „	0.15 „
Länge „	0.082 „	0.30 „

der Ventralfläche des Markes fest anliegend in horizontaler Richtung medialwärts gegen die Medianlinie hin, um sich dort mit dem Lig. longitudinale ventrale zu verbinden. Dieses quergestellte Teilbündel des I. (kranialsten) Ventralzackens hört weit lateral von dem Lig. longitudinale ventrale auf. Die übrigen erreichen dagegen die Medianlinie, um sich dort mit dem Lig. longitudinale ventrale (Medianband) zu vereinigen. Auf diese Weise entsteht das Lig. transversum ventrale (d. h. Querband), das ich unten näher besprechen werde.

In dem zwischen zwei aufeinanderfolgenden extramedullären Kernen befindlichen Abschnitt bezw. im vom betreffenden Kern freien Segment des Lumbosakralmarkes heftet sich das Band an das Pia-gewebe, ebenfalls dorsal von der Ventralwurzel dicht anliegend an dem Pia-gewebe. Hier entsendet das Band einen ziemlich starken Zacken, der durch den Subarachnoidealraum gegen die Seitenwand sich erstreckt; er setzt sich die Arachnoidea vortreibend an der Seitenwand des Lumbosakralkanals an (Textfigur 4, Tafelfigur 2). Ich nenne ihn den „Dorsalzacken“, um eine mögliche Verwechselung mit dem oben erwähnten „Ventralzacken“ zu vermeiden. Er kommt mit dem Ventralzacken ganz abwechselnd metamerisch vor, durch die ganze Lumbosakralregion bei *Passer* zu jederseits 8 an der Zahl, bei *Gallus* 9. Darunter sind die in der Mittelhöhe des Lumbosakralkanals befindlichen bedeutend stärker entwickelt.¹⁾ Der Zacken ist fast wie der Ventralzacken gebaut. An der Ansatzstelle des Zackens an die Kanalwand breitet er seine Bindegewebsfasern etwas aus. Seine Verbindung mit der Kanalwand ist auch hier sehr innig, indem die Bindegewebsfasern des Bandes zumteil in die Knochen-substanz hineinstrahlen, wie es bei den Sharpey'schen Fasern der Fall ist. Was den „Dorsalzacken“ anbelangt, so ist er, obgleich hier seine Stärke bedeutend zugenommen hat, doch ganz gleichwertig wie der betreffende Zacken der Halsregion. Zum Beweis dafür dient die Tatsache, dass der

1) Die Massverhältnisse auf der Schnittfläche:

	beim <i>Passer</i>	beim <i>Gallus</i>
Breite des Bandes an der Anhaftungsstelle an der Pia	0.090 mm	0.173 mm
Breite des Zackens	0.038 „	0.068 „
Länge des Zackens	0.225 „	0.750 „

Zacken stets abwechselnd mit dem extramedullären Hofmann'schen Grosskern vorkommt, wie in der Halsregion. Der Ansatz des Zackens an die Kanalwand der Lumbosakralregion und der des Zackens an der Innenfläche der Dura der Halsregion scheinen auf den ersten Anblick sich ganz verschieden von einander zu verhalten. Wenn man jedoch einmal auf den oben bemerkten Differenzierungszustand der Rückenmarkshülle bei beiden Regionen achtet, so kann man dort die Dura von der Kanalwand abgelöst und hier die Innenschicht des Kanals zugleich von der Dura dargestellt, die beiden für ganz gleichwertig halten.¹⁾

2) Ligamentum longitudinale ventrale, „Medianband“.

Das Band besteht aus vielen derben Bindegewebsfasern und dazwischen zerstreuten stäbchenförmigen Kernen und stellt einen ventrodorsal etwas abgeplatteten schmalen Streifen dar. Dieser Streifen zieht über die Fissura longitudinalis ventralis von der Höhe des kranialsten extramedullären Kerns kaudalwärts bis zur Höhe des kaudalsten Kerns kontinuierlich hin.²⁾ Dabei verschliesst es die Fissura von der Ventralseite her und an seiner Dorsalseite läuft die A. medullaris ihm dicht anliegend (Textfigur 3–5, Tafelfigur 1–3). Man bemerkt noch, dass es in der Höhe des extramedullären Kerns auch metamerisch durch das bald unten zu erwähnende Querband mit den Ventralzacken des Seitenbandes geweblich verbunden ist (Textfigur 5, Tafelfigur 3). Diese Verbindung ist nur mit Ausnahme vom ersten (kranialsten) Ventralzacken und von dem II. bis zum letzten Ventralzacken regelmässig metamerisch nachweisbar.

3) Ligamentum transversum ventrale, „Querband“.

Das Band ist in der Lumbosakralregion recht eigentümlich beschaffen. Seine Struktur ist ganz gleich der der beiden longitudinalen Bänder. Auf der Schnittfläche lässt sich das Band als ein längs der Ventralfläche des Rückenmarkes quergestellter, längsgeschnittener ziemlich starker Balken erweisen

1) Der Zacken scheint mir sowohl nach seiner Lage in der Wirbelmitte als auch nach seiner Ansatzweise mit dem Zacken des Seitenbandes bei *Cryptobranchus japonicus* ganz übereinzustimmen.

2) Masse in der mittleren Höhe der Lumbosakralregion.

	bei Passer	bei Gallus
Dicke (ventrodorsale)	0.020 mm	0.030 mm
Breite (Querdurchmesser)	0.060 „	0.135 „

(Textfigur 5, Tafelfigur 3). Wie ich oben sub 1) und 2) geschrieben habe, steht der Balken mit dem Lig. longitudinale laterale, besonders mit seinem Ventralzacken und dem Lig. longitudinale ventrale sehr innig im Zusammenhang. Das Querband ist vom II. extramedullären Kern bis zum letzten Kern regelmässig metamerisch wahrzunehmen. Seine Dicke ist an der Stelle, wo das Band und der Ventralzacken an der ventrolateralen Ecke des Lumbosakralmarkes zusammenstossen, am stärksten; von hier aus verdünnt sich das Band immer mehr, je weiter es medialwärts vorrückt. Was die Stärke der einzelnen Balken anbetrifft, so weisen die meisten in der mittleren Abteilung des Lumbosakralmarkes befindlichen eine bedeutende Entwicklung auf,¹⁾ während die mehr kranial- wie mehr kaudal liegenden stets viel schwächer ausgebildet sind. Auf der Schnittfläche bietet das Querband mit dem Ventralzacken, dem Seitenband selbst und dem Medianband einen einheitlichen kontinuierlichen Fessलगurt dar, womit das Lumbosakralmark an den Boden des Lumbosakralkanals befestigt ist (Textfigur 5).

Aus dem oben erwähnten erkennt man leicht, dass das Seitenband, Medianband und Querband in der Lumbosakralregion eine deutliche metamerische Baudifferenzierung erfahren und diese Metamerie steht mit dem segmentalen Auftreten des extramedullären Hofmann'schen Grosskerns in einer sehr innigen Beziehung.

a) In dem den extramedullären Kern enthaltenden Abschnitt schickt das Seitenband den „Ventralzacken“ aus, womit es sich an den Lumbosakralkanalboden ansetzt. Hierzu kommt noch das „Querband“ in Betracht, wodurch sowohl die beiderseitigen Seitenbänder als auch das Medianband mit einander verbunden sind²⁾ (Textfigur 5, Tafelfigur 3).

b) In dem vom extramedullären Kern freien bzw. in dem internukleären Abschnitt entsendet das Seitenband den „Dorsalzacken“, womit es

1) Das in der mittleren Strecke des Lumbosakralmarkes befindliche Querband hat auf der Schnittfläche folgende Masse:

	bei Passer	bei Gallus
Dicke an der Wurzel des Ventralzackens . .	0.045 mm	0.180 mm
Dicke in der Nähe des Medianbandes	0.020 „	0.030 „
Entfernung zwischen den beiderseitigen Ventralzacken	2.100 „	5.900 „

2) Diese Umbildung lässt an die intervertebrale Umbildung des Seitenbandes bei *Cryptobranchus* erinnern (vergl. Textfigur 12, b. meiner betreff. Arbeit).

sich an die laterale Wand des Lumbosakralkanals befestigt (Textfigur 4, Tafelfigur 2).¹⁾

Nun werde ich die eben sub a) und b) auseinandergesetzte Segmentierung des Bandapparates des Lumbosakralmarkes mit derjenigen der Wirbelsäule und der primären Segmentierung der Nervenzellen vergleichend betrachten. Da der extramedulläre Kern in der Mitte des primären, dem Urwirbel entsprechenden Nervensegmentes seine Lage einnimmt, darf man die oben sub a) beschriebene Umbildung des Bandapparates eine primäre intervertebrale Umbildung nennen, die sub b) erwähnte dagegen eine vertebrale Umbildung, welche letztere ihrer Lage nach stets mit dem primären Urwirbel vollständig alterniert und in der Mitte des fertigen Wirbels vor sich geht.

Auf den Modus der eigentümlichen Entwicklung der dreierlei Bänder in der Lumbosakralregion will ich hier nicht eingehen.

4. Schwanzwirbelregion.

In der Schwanzwirbelregion ist das Rückenmark sehr dünn geworden und die Rückenmarkshülle sieht ganz einfach aus, da hier die Arachnoidea nicht mehr als eine feine selbständige Hülle sich erkennen lässt.

Das Seitenband liegt als eine Verdickung des Pia-gewebes an der Seitenfläche des Rückenmarkes an, besonders etwas ventral von der Ebene des Zentralkanals. In dieser Region konnte ich weder seine segmentale Formveränderung noch Zackenbildung nachweisen. Das Medianband ist hier nicht mehr erkennbar.

III. Ergebnisse.

Das Ligamentum denticulatum weist bei den Vögeln (*Passer montana* und *Gallus domesticus*) je nach den verschiedenen Wirbelregionen ziemlich merkliche Formveränderung auf.

1. In der Halsregion lässt das Band eine deutliche metamerische Alternation erkennen, indem es sich einerseits an jeder Wirbelmitte verdickt

1) Diese Umbildung stimmt mit dem vertebralen (d. h. in der Wirbelmitte) Lageverhältnis des Seitenbandes bei *Cryptobranchus* überein (vergl. Textfigur 12a, meiner betreff. Arbeit).

und einen an der Innenfläche der Dura sich ansetzenden Zacken ausschickt, und anderseits in der Intervertebralgegend, wo der perimedulläre Hofmann'sche Kleinkern vorkommt, etwas verdünnt ist.

2. In der Brustregion ist das Band sehr schwach entwickelt und die vertebrale Verdickung mit Zackenbildung beim Passer kaum nachweisbar; beim Gallus ist es gewissermassen wahrzunehmen, jedoch in einer sehr rudimentären und regellosen Weise.

3. In der Lumbosakralregion erfährt das Band eine eigentümliche Ausbildung, indem es zweierlei Zacken metamerisch ausschickt, von denen der eine (der „Dorsalzacken“) sich an der Seitenwand des Wirbelkanals ansetzt, während der andere (der „Ventralzacken“) an der ventralen Kanalwand befestigt ist. Der Ventralzacken kommt in der Stelle metamerisch vor, wo die extramedullären Hofmann'schen Grosskerne segmentär neben der lateralen Fläche des Rückenmarkes auftreten, d. h. in jedem den betreffenden Kern enthaltenden Segment. Die beiderseitigen Zacken sind mit Ausnahme des ersten, kranialst liegenden durch das „Querband“ mit dem „Medianband“ verbunden. Der Dorsalzacken kommt auch metamerisch an jedem zwischen zwei hintereinanderfolgenden extramedullären Grosskernen befindlichen Segment vor.

4. In der Schwanzwirbelregion stellt das Band einen längs der Seitenfläche des Rückenmarks verlaufenden einfachen Strang dar.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel XVII.

Alle Figuren sind nach den Serienschnitten durch die Mitte des Lumbosakralkanals wiedergegeben (Gallus). 10 fache Vergrößerung. Schnittdicke 40 μ . Weigert-Pal'sche Markscheidenfärbung mit Nachbehandlung durch Säurefuchsinlösung.

Fig. 1. Schnitt durch die dem 4. extramedullären Hofmann'schen Grosskern dicht kaudal folgende Markhöhe.

Fig. 2. Schnitt durch die zwischen dem 4. und 5. extramedullären Hofmann'schen Grosskernen befindliche Markhöhe.

Fig. 3. Schnitt durch die den 5. extramedullären Hofmann'schen Grosskern enthaltende Markhöhe.