Untersuchungen über das Biddersche Organ.

I. Mitteilung.

Über das Biddersche Organ bei den japanischen Kröten (*Bufo formosus*).

Von

Ritsuzō Takashima.

Aus dem Anatomischen Institut der Medizinischen Fakultät der Kaiserlichen
Universität zu Osaka. (Prof. R. Tsukaguchi u. Prof. T. Tomita).

Mit 24 Textabbildungen und 4 Tafeln (III–VI).

Inhalt.

I. Einleitung	249
II. Material und Technik.	255
III. Eigene Untersuchungen	255
A. Makroskopische Betrachtung	256
B. Histologische Betrachtung	262
C. Zytologische Betrachtung	277
IV. Zusammenfassende Betrachtung	281
V. Schluss	284
Tafelerklärung	286
Literatur	287

I. Einleitung.

Das Biddersche Organ findet sich, wie bekannt, nur bei den Bufoniden vor und selbst bei der betreffenden Gattung weist das Organ je nach der Spezies und dem Geschlecht ziemlich verschiedene Erscheinungsformen auf und zwar besteht es zeitlebens bei allen Männchen jeder Art, während dies bei fast allen erwachsenen Weibchen, mit

Ausnahme von *B. vulgaris*, nicht der Fall zu sein scheint. Nämlich bei gewissen Spezien wie *Bufo calamita*, *B. viridis*, *B. lentiginosus*, *B. variabilis*, *B. formosus* sowie *B. typhosus* ist das Organ nur in der jüngeren Zeit zu finden. Merkwürdigerweise verhält sich die Sache bei *B. vulgaris* etwas anders; bei ihm befindet sich das Organ bei beiden Geschlechtern nicht nur zeitlebens, sondern drei histologische Vorgänge wie Degeneration, Regeneration sowie Wachstum gehen innerhalb des Organs jahreszyklisch hintereinander vor sich. Auf das letztere wurde zuerst von Knappe ('86) als „auffällige Erscheinung“ aufmerksam gemacht und dann weiter von Ognew ('08), Harms ('14-'23), Eggert ('26), Walther ('26) bestätigt und nähere Angaben darüber aufgeführt. Ferner King ('08) an *B. lentiginosus*, Takahashi ('19) an den unseren einheimischen Kröten und Harms ('21) an *B. calamita* et *variabilis* kamen zu ähnlichen Resultaten. Aus Harms' Bericht über *B. vulgaris* seien kurze Auszüge gegeben: Zuerst in Bezug auf Männchen (Seite 12-13) „Beim Bidderschen Organ erfolgt von Mitte des Winters an eine allmähliche Schrumpfung und Verkleinerung des Organs, die durch die Inkretion und Rückbildung der Eier bedingt ist. Die Wiedervergrößerung des Bidderschen Organs in den Monaten Juni, Juli geschieht durch eine erneute Wucherung der Eizellen. Das Biddersche Organ erreicht keinen Nullpunkt wie der Hoden, weil eine Zeitlang eine Neubildung und Rückbildung (Mai, Juni) nebeneinander verlaufen. Von Juli an bis etwa Dezember bleibt dann die Grösse des Bidderschen Organs ziemlich unverändert.“ Und dann bezüglich des Weibchens (Seite 24): „Das Biddersche Organ erreicht den Tiefstand seiner Entwicklung von Januar bis Februar oder März, je nach den Witterungsverhältnissen der Jahreszeit. Es wächst dann schnell heran bis zum Mai-Juni und wird von Mitte Juli an bis zum September hin wieder kleiner. Es beginnt dann im August-September eine nochmalige Grössenzunahme durch erneute Wucherung der Eizellen des Bidderschen Organs, worauf dann bis zum Januar hin eine Verkleinerung durch Resorption erfolgt.“ Auf Grund seiner langjährigen histologischen und experimentellen Untersuchungen kommt Harms zu der Vermutung, dass diese jahreszyklischen Veränderungen vielleicht mit der inneren Sekretion dieses Organs in inniger Beziehung stehen. Es scheint mir aber etwas sonderbar, wenn Takahashi bei den japanischen Kröten zu derselben Beobachtung wie bei *B. vulgaris* Harms' gelangte, denn ich habe aus ein und derselben Tierspezies, wie vorliegende Arbeit ergibt, ganz verschiedene Resultate bekommen.

Was den histologischen Bau dieses Organs anbetrifft, so bemerkt

Jacobson ohne weiteres schon sehr früh die Ähnlichkeit seiner Parenchymzellen mit den eigentlichen Eizellen. Nach Wittich ist Dotter in diesen Zellen mit enthalten, was später wegen des Widerspruches Spengel's keinen Anhänger mehr findet. Die meisten Angaben seit Wittich stimmen miteinander insofern überein als die Parenchymzellen dieses Organs, wie die eigentlichen Eizellen, niemals zur Befruchtung reifen und schliesslich degenerieren. Es scheint demzufolge, soweit es die histologische Untersuchung betrifft, die neueren experimentellen Untersuchungen von Policard, Aimè, Harms, Takahashi, Hoepke und Ponse ausgenommen, darin zu gipfeln, dass fast ausschliesslich die Degenerationsmodi jener Zellen erforscht werden, ohne dass man von irgend einer spezifischen Funktion des Organs spricht. Darüber hat Knappe zuerst seine Ansicht folgendermassen ausgedrückt: „—meine Beobachtungen über die Degenerationerscheinungen der Eikapseln lassen sich folgenden allgemeinen Gesichtspunkten unterordnen:—die Rückbildung geschieht entweder durch einwandernde Granulosazellen, oder durch Pigmentbildung, oder durch Gefässwucherung verbunden mit Pigmentbildung“ (Seite 534). Während Friedmann in den Parenchymzellen dieses Organs resp. den sog. Hodeneizellen das Vorkommen solcher Degenerationsformen durchaus negiert, werden die Knappeschen Beobachtungen mit Ausnahme von „Pigmentdegeneration“ von manchen Autoren wie Ognew, King, Takahashi und Harms gestützt. Ognew hat ferner die „linsenförmige Spalte“ als „eigentümlicher Process“ hervorgehoben, welche anfangs zwischen den Parenchymzellen erscheint und die betreffenden Parenchymzellen allmählich zur Verflüssigung und schliesslich zum Schwund führt. Die von ihm berücksichtigte „Kernatrophie“ und „Vacuolisation“ wurden später auch von Takahashi bemerkt. Vor Ognew fand auch Cerruti zwei Formen von Verschmelzungen der Parenchymzellen, von denen die eine mit „Penetratione fra di ovuli“ und die andere mit „Penetratione multipula“ bezeichnet wurde. Er hat die genannte Erscheinung nur bei den Männchen im Frühling gefunden. Dagegen hat Ognew denselben Process bei den jüngeren Weibchen nur im Juli und auch bei den älteren Weibchen nur im Dezember nachweisen können. Beide Autoren sind mit King und später auch mit Takahashi einig in der Annahme, wonach die betreffende Erscheinung durchaus nicht als Folge der direkten Zellteilung, sondern vielmehr einer Degeneration stattfindet. Nach Knappe, Ognew, King, Takahashi und Taguchi erweist sich, dass eigentlich die roten resp. die weissen Blutzellen für die Degeneration der Parenchymzellen eine gewisse Rolle spielen.

Spengel, Knappe, Ognew und Harms haben auch mitgeteilt, dass das Auftreten von Pigmentzellen, die zuweilen im Interstitium zu sehen sind, mit dem genannten Degenerationsprozess in einem bestimmten Zusammenhang steht. Während Takahashi bei den japanischen Kröten solche Pigmentzellen niemals konstatieren konnte, wies doch Knappe hin, dass sie bei *Bufo vulgaris*, *B. viridis* und *B. calamita* und zumal bei der letzteren überall so deutlich auftreten, dass das Organ dabei schon makroskopisch grau-schwärzlich erscheint. Was das Auftreten der Pigmentgranula innerhalb der Parenchymzellen selbst anbetrifft, so gehen die bisherigen Meinungen weit auseinander. Ognew hat gegen Wittich und Knappe das Vorkommen solcher Pigmente niemals gesehen. Nach Takahashi ist der Ursprung von in den Parenchymzellen vorkommenden Pigment darin zu suchen, dass die roten Blutzellen, die in die Parenchymzellen eingewandert sind, fortwährend zerfallen. Die nach der Degeneration und dem Schwund der Parenchymzellen im Organ entstehende Lücke werden, wie schon bekannt, bald durch interstitielles Bindegewebe ersetzt, bald bleiben sie dort als unregelmässige Spalte. Es bleibt aber wie Bidder schon früher angab, noch fraglich, ob dieser Hohlraum, in dem zentralen Bereich des Organs gebildet wird, oder nicht. Gegen Spengel haben unter anderen Knappe, Ognew und auch Harms behauptet, dass die Beantwortung dieser Frage jetzt noch offen bleibt, ob solcher zentrale Hohlraum mit Epithelschicht bekleidet ist oder nicht, wie uns die beiden letztgenannten Autoren gezeigt haben. Aber Marshall ging richtigerweise auf die Einzeinheiten dieser Fragen ein und sagte folgendermassen:—“In the centre of the organ is a cavity, which however is of small size and is traversed by the trabeculae of connective tissue accompanied by blood vessels.—”.

Betreffs der Untersuchungen des feineren Baues der Parenchymzellen bleibt aber vorläufig noch vieles zu wünschen übrig. Harms hat neuerdings mit der Flemmingschen Lösung die Lipoide, welche als das Inkret vom Kernkörperchen angesehen wurde, in den Parenchymzellen nachgewiesen. Diese Tatsache wurde auch von Eggert bestätigt. Das Vorkommen solcher Lipoidsubstanz wurde auch schon früher von Bidder, Wittich und Leydig zumal von Knappe als „grobe Körner, oftmals von Fettkügelchen ähnlichen Glanz“ aufmerksam gemacht, welche von den in die Parenchymzellen eingewanderten Leukozyten ähnlichen Zellen (His'sche Kolbzellen) abstammen. Marshall sah jedoch diese Erscheinung als eine fettige Degeneration an. King hat auch in den Parenchymzellen das dem Halbmond ähnliche Gebilde

gesehen, welches sie für Dotter hielt. Das Dotter entstammt den in den jüngeren Parenchymzellen vorkommenden „yolkspheules“, die von dem Synapsisstadium an allmählich vermehrt sind. Die Plastosomen in den Zellen wurden zuerst von Taguchi vor einigen Jahren in der japanischen anatomischen Gesellschaft ('25) mitgeteilt. Subba-Rau und Gatenby ('23) haben auch in diesen Zellen die Mitochondrien gefunden, welche von denjenigen der eigentlichen Eizellen noch wenig abweichen. Sie sagen:—“In the typical oogenesis of *Bufo* oocyte, the mitochondria, at first excentrically placed in the cell, spread out as a thick mat of partially fibrous structures throughout the substance of the cytoplasma. Eventually the mitochondria form a complete, halo around the nucleus, spreading to the confines of the egg cytoplasm.”

Was das Follikelepithel der Parenchymzellen zunächst anbetrifft, so glauben jetzt die meisten Autoren seit Wittich, dass die kleineren Parenchymzellen häufig gleichzeitig mit einigen anderen in ein und demselben Follikel eingeschlossen sind. In Bezug auf die Veränderungen des Follikelepithels, die überall mit der Entwicklung der Parenchymzellen stattfinden, gibt es vor Knappe keine ausführliche Mitteilung. Der letztgenannte Autor unterscheidete also zwei Arten von Umhüllungen, von denen die eine Tunica folliculi und die andere eine Granulosaschicht ist. Die erstgenannte besteht aus Bindegewebe mit den Blutkapillaren und die letztgenannte ist von epithelialer Natur und umhüllt unmittelbar die Parenchymzellen von aussen her. Ausserdem erscheint sie bei den jüngeren Parenchymzellen höher, bei den älteren dagegen niedriger. Er hat auch noch eine andere Schicht, d. h. eine Membrana vitellina unterschieden, welche in dem Zellplasma unmittelbar der Granulosaschicht anliegt und gab folgendermassen an (Seite 513):—„Eine deutliche Grenze ist zwischen Eikapselepithel und Eiplasma meistens zu bemerken, oft sogar eine unverkennbare substantielle, an Dauerpräparaten dunkler gefärbte Grenzschicht.“ Die Harms'sche Ansicht, welche darin liegt, dass das Follikelepithel bei der Lipoidresorption in den Parenchymzellen auffallend dicker wird, und dass aufgelöste Zellen zu Wanderzellen werden, bedarf noch weiterer Nachuntersuchung.

Schliesslich ist noch eine andere Tatsache von Interesse, nämlich die, dass das Organ sich dadurch kennzeichnet, dass es embryologisch zusammen mit den eigentlichen Keimdrüsen von gemeinschaftlichen Anlagen her stammt und früher als die Keimdrüsen sich entwickelt (Rathke, Wittich, Nussbaum, Knappe, Ikeda und King). Über die funktionelle Bedeutung des Organs gibt es aber noch keine

bestimmte Ansicht. Früher sah Rosenhof ohne nachherige Bestätigung das Organ als ein Fettkörper an. Die meisten Forscher (Wittich, La Valette St. George, Leydig, Bourne, Marshall und King) konnten auch über seine eigentliche Funktion keine sichere Auskunft geben. Sie betrachten das Organ als ein rudimentäres Ovarium, weil seine Parenchymzellen, eben den eigentlichen Eizellen sehr ähnlich konstruiert sind, weder reifen noch befruchten, um schliesslich zu degenerieren. Jacobson hat das adulte Männchen als eine Hermaphrodite betrachtet, weil es nebst diesem Organ gleichzeitig den Müllerschen Gang besitzt. Es gibt aber nicht selten ein solches Männchen, welches einerseits Ovarium und gleichzeitig das betreffende Organ besitzt (Knappe, Cerruti, Ognew, King, Harms und Hoepke). Nach Leydig gehört das Organ zur Zwitterdrüse, weil sich in diesem Organ gleichzeitig die Spermienbildung nachweisen lässt. Hoffmann sah es als eine rudimentäre Zwitterdrüse an, weil dort ein rudimentäres Hodenkanälchen existiert. Spengel behauptet, dass das Organ mit der Entwicklung der Keimzellen in inniger Beziehung steht, während dagegen Rathke, Bidder und auch Knappe das Organ für einen Teil des Hodens hielten. Dass dies Organ wirklich zur inkretorischen Drüse gehört, wurde in letzter Zeit von vielen Beobachtern experimentell festgestellt. In Bezug auf das Wesen seiner Funktion gehen die Ansichten noch auseinander. Nach Harms und Takahashi mag das Inkret dieses Organs jahreszyklisch für die Entfaltung der sekundären Geschlechtsmerkmale, nach Hoepke dagegen für den allgemeinen Stoffwechsel eine grosse Rolle spielen. Er vertritt entgegen Harms und Eggert die Ansicht, dass das Inkret dieses Organs mit Osmiumsäure nicht nachweisbar sei. Im Vergleich mit Resultaten Harms' und Takahashis ist es sehr interessant, dass Champy und in letzter Zeit Ponse an zahlreichen adulten Männchen experimentell nachgewiesen haben, dass die sekundären Geschlechtsmerkmale gar nicht vom genannten Organ, sondern in Wirklichkeit von der Keimdrüse abhängig sind.

Nach der obigen Literatur liegt die Ursache der verschiedenen Meinungen darin, dass die bisherigen Autoren mit Ausnahme von Eggert als Untersuchungsmaterial nur männliche, weibliche oder jüngere Kröten zum Versuch herangezogen haben. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt einerseits Wachstumsgrad und Geschlecht der Tiere sowie auch die Jahreszeit, anderseits Versuche mit Hilfe der neueren Plasma-Untersuchungsmethode, so dass den bisherigen Kenntnissen auf diesem Gebiet etwas Neues hinzugefügt wird.

II. Material und Technik.

Als Untersuchungsmaterial dienten über 200 männliche und weibliche Kröten (*B. formosus*) aus den verschiedensten Altersstufen und allen Jahreszeiten. Vor der Exstirpation des Materials habe ich zuerst Körpergewicht und Körperlänge (von Schnauzenspitze aus bis zur Sitzbeinspitze) gemessen und unter tiefer Äthernarkose sogleich die Lunasche Lösung (Formol 4,0 cc., 2,45% Kaliumbichromatlösung 20,0 cc., Eisessig 1–2 Tröpfchen) in den Bulbus aorticus gespritzt, um eine vitale Fixierung zu erreichen. Anschliessend daran öffnete ich die Bauchhöhle und beobachtete und skizzierte so schnell wie möglich das makroskopische Verhalten sowohl des Bidderschen Organs als auch der Keimdrüsen mit den Anhangsorganen. Darauf habe ich das Biddersche Organ in toto oder kleinen Stückchen desselben gemäss der Notwendigkeit samt einem Teilstück der Keimdrüsen in Fixierungsmittel gebracht. Gelegentlich benutzte ich gleichzeitig die Dekapitationsmethode ohne Narkose.

Als Fixierungsmittel verwandte ich folgende verschiedene Flüssigkeiten. Das Fixiergemisch nach Bouin, Zenker, Levi, Luna, Meves, Champy, Kolster, Cajal und Mann-Kopsch. Unter diesen habe ich jedesmal mit der Zenkerschen und auch Levischen Flüssigkeit gute Resultate erzielt. Alle Stückchen wurden nach Chloroform- gelegentlich auch Xylol-Paraffin in Paraffin (52–53° C.) eingebettet und in Serienschritte von 4–5 μ Dicke zerlegt. Für die Färbung des Übersichtspräparates benutzte ich das Hämatoxylingemisch von Hansen mit Eosin kombiniert und für zytologische Zwecke hauptsächlich das Eisenhämatoxylin von Heidenhain mit Rubaschkinscher Vorbehandlung. Auch die Altmannsche Pikrofuchsin-Methode und das Triachidverfahren wurden versucht.

III. Eigene Untersuchungen.

Das Biddersche Organ der japanischen Kröten ist, wie auch schon die bisherigen Autoren angegeben haben, je nach dem Geschlecht mehr oder weniger verschieden gebaut und sogar bei demselben Geschlecht sieht das Organ individuell, zumal je nach dem Alter verschieden aus. Aus Bequemlichkeit habe ich sowohl das Männchen als auch das Weibchen je nach dem körperlichen Entwicklungsgrad in folgende drei Gruppen eingeteilt. Dabei berücksichtigte ich besonders die Körpergrösse

und die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, weil es schwer und unsicher ist, das Alter des Tieres genau zu bestimmen.

Die erste Gruppe (jüngere Individuen) umfasst solche Tiere, deren Körpergewicht und Körperlänge beim Weibchen 74,0 gr und 7,2 cm, beim Männchen 47,0 gr und 4,3 cm betragen. Die dritte Gruppe enthält dagegen die voll erwachsenen Tiere. Die der zweiten Gruppe zugehörigen Individuen stehen hinsichtlich ihres Wachstumsgrades zwischen den oben genannten zwei Gruppen und zwar sind ihre primären und sekundären Geschlechtscharaktere, obgleich sie körperlich auch schon voll entwickelt sind, im Vergleich mit denjenigen des adulten Tieres wenig auffallend. Bei den erstgenannten jüngeren Individuen sind die Geschlechtsmerkmale natürlich noch rudimentär.

In den Tabellen I, II und Umrisszeichnungen des Bidderschen Organs sind die Tiere ihrem körperlichen Wachstumsgrad nach angeordnet.

A. Makroskopische Betrachtung.

a. Befund bei den weiblichen Kröten.

Bei den zur I. Gruppe gehörigen jüngeren Tieren tritt das Organ im allgemeinen als ein gespanntes, rotgelbliches Körperchen auf, welches zwischen dem noch faltigen, runzeligen, gelben Ovarium und dem kleinen Fettkörper seinen Platz hat, wie an Textfigur 1 zu sehen

Textfig. 1.

Weibliches Krötchen aus „jüngeren Stadium“.
F. Fettkörper, B. Bidder'sches Organ, O.
Ovarium. Ca. $\frac{3}{4} \times$.

ist. Obwohl die Form dieses Organs, wie die Umriss-skizzen auf Seite 258 zeigen, entweder individuell oder beiderseitig sogar bei demselben Tier mehr oder weniger verschieden ist, nimmt seine Grösse doch mit der körperlichen Entwicklung allmählich zu (Nr. 1-21).

Bei den unreifen Tieren der II. Gruppe wird das Organ beträchtlich grösser und erreicht in diesem Stadium seine maximale Entfaltung. Das Organ liegt dabei häufig unter dem kranialen Ende des Ovariums

begraben, welches auch schon ziemlich deutlich entwickelt ist, doch steht es ihm im Vergleich mit dem Adult nur an Grösse mehr oder weniger nach (Textfigur 2). Das Biddersche Organ ist jedoch manch-

Textfig. 2.

Weibliche Kröte aus „unreifen Stadium“. Ca. $\frac{3}{4}$ ×

mal sehr klein (Nr. 23, 28, 29 u. 30 an der oben erwähnten Umrisskizze), doch ist dieser Umstand ohne weiteres auf individuelle Verschiedenheiten zurückzuführen. Es kommt allerdings auch vor, dass die Entwicklung des Organs, wie es schon grobhistologisch nachgewiesen wurde, wie z.B. bei dem Individuum von Nr. 28 äusserst schwach und anderseits bei den Individuen von Nr. 23, 29 und 30 so auffallend ist, dass hierbei notwendigerweise schon eine Degeneration oder Verkleinerung anzunehmen ist (Tabelle I auf Seite 268).

**Umrisskizze des Bidderschen Organs der Japanischen Kröten
von verschiedenen Körperentwicklungen aus verschiedenen
Jahreszeiten. (Beim Weibchen).**

**Umrisskizze des Bidderschen Organs der Japanischen Kröten
von verschiedenen Körperentwicklungen aus verschiedenen
Jahreszeiten (Beim Männchen).**

F. Fettkörper, B. Biddersches Organ, H. Hoden.

Bei den adulten Tieren der III. Gruppe tritt die Degeneration des Organs so deutlich auf, dass es bald beiderseitig (Nr. 38, u. 55, Umrisszeichnungen auf Seite 258), bald einseitig vollständig zurücktritt (Nr. 33, 34, 42 u. 52). Jedenfalls nimmt das Organ gemäss der Degeneration ein sehr verschiedenes Aussehen an und es bedarf eines

Textfig. 3.

Männliches Krötchen aus „jüngeren Stadium“. H. Hoden.
Ca. $\frac{3}{4}$ ×

besonderen Scharfblicks, das Organ in diesem Stadium von der Umgebung überhaupt zu unterscheiden, weil es sich makroskopisch oft nur als ein spannungsloses, halbdurchsichtiges, gelbliches oder wenn auch selten als grauschwärzliches, winziges Knötchen zu erkennen gibt und zwischen dem grossen Ovarium (mit Ausnahme des Ovariums unmittelbar nach der Eiablage oder 1–2 Monaten danach) und dem Fettkörper verborgen ist. Man kann aber das kleine Organ des erwachsenen Tieres schon makroskopisch durch den Farbenton und durch den Spannungsgrad des Organs von dem des jüngeren leicht unterscheiden.

Dem Gesagten zufolge ist es schon makroskopisch nicht zweifelhaft, dass das Organ des Weibchens bei den jüngeren Individuen (I. Gruppe) mit der körperlichen Entwicklung allmählich heranwächst, um bei den unreifen (II. Gruppe) seine maximale Entfaltung zu zeigen und bei den adulten (III. Gruppe) plötzlich so stark zu degenerieren, dass es im auffallendsten Fall vollständig zum Verschwinden gebracht wird. Man kann aber die näheren Umständen der Organ-Entwicklung und Degeneration, wie später ausführlich geschildert wird, erst durch die histologischen Untersuchungen genau erkennen.

b. Befund bei den männlichen Kröten.

Die zur I. Gruppe zugehörigen jüngeren Männchen sind dadurch charakterisiert, dass das Biddersche Organ in Gestalt eines gelben oder gelblich-rötlichen Gewebeknötchen dem kranialen Ende des Hodens angelagert ist, der sich in diesem Stadium deutlich als ein schwärzliches Säulehen darstellt (Textfigur 3). Bei den Männchen nimmt das Organ mit dem körperlichen Wachstum des Tieres an Umfang zu, wie bei den weiblichen Kröten. Vergleicht man hierbei die Individuen der beiden Geschlechter, welche ungefähr die gleiche körperliche Entwicklung zeigen (Nr. 1, 2, u. 3 in der Umrisskizze auf Seite 259 und Nr. 1,

2, u. 3 in derselben auf Seite 358), so bemerkt man, dass das Organ des erstgenannten Individuums in diesem Stadium viel grösser ist als

Textfig. 4.

Männliche Kröte aus „adulten Stadium“. Ca. $\frac{3}{4} \times$.

dasjenige des letztgenannten. Dieser Umstand, dass das Organ des Männchens sich früher als das des Weibchens entwickelt, ist, wie ich später noch näher beschreiben will, auch histologisch sicher nachgewiesen. In nächsten, nämlich im unreifen Stadium (II. Gruppe) wächst das Organ intensiv heran, wie es beim Hoden der Fall ist. Eine interessante Erscheinung ist auch, dass das Organ in diesem Stadium eben so gut wie bei den weiblichen Kröten mit der körperlichen Entwicklung allmählich weiter

heranwächst, ohne jedoch die maximale Entfaltung zu zeigen (Nr. 12–30 in der Umrisszeichnungen auf Seite 259). Letzteres ist erst im erwachsenen Zustand (III Gruppe) (Textfigur 4) der Fall, doch treten hierbei ziemlich grosse individuelle Verschiedenheiten auf. Z.B. bei Nr. 35, 43, 50, 59 u. 60 ist das Organ viel grösser als bei Nr. 31, 38, 48 u. 57 in der Umrisszeichnungen auf Seite 259. Doch habe ich bei diesen männlichen Tieren niemals solches kleine Organ gesehen, das bis zu einem halbdurchsichtigen Knötchen reduziert ist, wie es bei den erwachsenen Weibchen häufig der Fall ist. Ausserdem findet sich bald ein grosses Organ, welches jedoch histologisch keine maximale Entfaltung erfährt, bald ein kleines Organ, bei dem weder Degeneration noch Verkleinerung in Erscheinung tritt (Nr. 35 u. 60 resp. Nr. 33 u. 53 auf Seite 259 u. 275). Das Organ bedeckt bei den Erwachsenen zuweilen die Hodenspitze mantelartig oder kappenartig, was aber niemals bei jüngeren Tieren, deren Organ immer vom Hoden isoliert gelagert ist vorkommt. Einmal habe ich allerdings eine Gelegenheit gehabt, ein Organ zu beobachten, das bei

einem verhältnismässig jungen Männchen tumorartig an der ventralen Oberfläche des Hodens lag. Entgegen Harms und anderen habe ich jedoch kein Tier gesehen, welches als eine Hermaphrodite anzusehen gewesen wäre.

Es ergibt sich also, dass das Organ im jüngeren und unreifen Stadium ebenso wie beim Weibchen mit der körperlichen Entwicklung allmählich immer grösser wird und erst im adulten Stadium makroskopisch seine maximale Entfaltung zeigt und häufig viel grösser als beim

Textfig. 5.

Schnitt eines Bidderschen Organs aus „jüngeren Stadium“. ♀. Fixierung:—Kolster. Färbung:—Eisen-Hämatoxylin. Ca. 350×.

Textfig. 6.

B.O. aus „jüngeren Stadium“. ♀. Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-Eosin. Ca. 350×.

Weibchen ist. Kurz gesagt, es entwickelt sich beim Männchen überhaupt früher als beim Weibchen und sein Wachstum dauert bis zum erwachsenen Stadium und beginnt dann nach bestimmter Zeit allmählich zu degenerieren ohne jedoch vollständig zu verschwinden.

B. Histologische Betrachtung.

1. Allgemeine Befunde.

Man kann bei diesem Organ zwei Arten von Bestandteilen unterscheiden, von denen die eine aus Parenchymzellen und die andere aus interstitiellem Bindegewebe besteht. Die Grösse und die Zahl, sowie auch

die innere Struktur der Parenchymzellen sind jedoch je nach dem Organ mehr oder weniger verschieden. Das Organ enthält ausserdem Parenchymzellen reichlicher in seinem jüngeren als seinem älteren Stadium, in dem die Parenchymzellen durch interstitielles Bindegewebe ersetzt worden sind. Das jüngere Organ besitzt im allgemeinen viele kleine und wachsende Zellen, wenngleich dies nicht immer der Fall ist und nicht selten reichliche Parenchymzellen, die aber nach der maximalen Entwicklung

Textfig. 7.

B.O. aus „jüngeren Stadium“. ♀.
Fix. :—Zenker, Färb. :—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

Textfig. 8.

B.O. aus „jüngeren Stadium“. ♀.
Fix. :—Zenker, Färb. :—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

schon der Degeneration verfallen sind. Daneben besteht das makroskopisch grössere Organ in der Hauptsache aus solchen Parenchymzellen, die sich schon ziemlich hoch entwickelt haben oder nicht selten auch schon atrophisch geworden sind bis sie schliesslich vollständig resorbiert werden. Im Laufe der Entwicklung des Organs können also zwei Vorgänge, nämlich die Entwicklung der Parenchymzellen einerseits und die Degeneration derselben andererseits gleichzeitig beobachtet werden. Der Degenerationsherd wird bald durch interstitielles Bindegewebe ersetzt. In dem makroskopisch grösser gewordenen Organ nehmen also die Parenchymzellen mehr oder weniger ab, dagegen die Interstitien ziemlich zu. Die Reduktion des Organs kann nicht selten einen solchen Grad erreichen, dass es schliesslich hauptsächlich aus Bindegewe-

webe besteht und nur hier und dort noch wenige sich degenerierende Parenchymzellen übrig bleiben. Sie sind also im äussersten Fall in dem Organ nur wenig oder gar nicht zu beobachten.

Das Interstitium findet sich in dem jüngeren Organ nur spärlich zwischen den einzelnen Parenchymzellen und in dem älteren, wo die Parenchymzellen sich zu degenerieren beginnen, sehr reichlich. Also nimmt das Interstitium im Gegensatz zu den Parenchymzellen mit der

Textfig. 9.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♀.
Fix.:—Meves, Färb.:—Eisen-Hämat..
Ca. 350×.

Textfig. 10.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♀.
Fix.:—Levi, Färb.:—Eisen-Hämat..
Ca. 350×.

Entwicklung des Organs allmählich zu. Es liegt nämlich der Gedanke nahe, dass das Interstitium im Hinblick auf die Funktion des Organs nur einen nebensächlichen Bestandteil darstellt. Die Menge desselben steht im umgekehrten Verhältnis zu den Parenchymzellen. So kann man unter Umständen darauf kommen, dass die Menge des Interstitiums, die der Parenchymzellen resp. den funktionellen Leistungsgrad dieses Organs zeigt. Aber es steht fest, dass die Parenchymzellen für die funktionellen Leistungen dieses Organs eine schwerwiegende Rolle spielen. Es wäre also von Bedeutung, dass die so mannigfaltige strukturellen Veränderung der Parenchymzellen zuerst zur Beobachtung herangezogen wird, um ihre funktionelle Bedeutung festzustellen.

Aus Bequemlichkeit habe ich deshalb mit Rücksicht auf Grösse,

Form und Struktur die Parenchymzellen in folgende vier Gruppen eingeteilt.

1. Die jüngere Form:—Sie umfasst hauptsächlich solche kleine Zellen, die auf der Oberfläche des Organs zusammengeballt sind, wie aus Textfigur 16 ersichtlich ist. Diese Zellen weisen ungefähr $18-26\mu$ im grössten Durchmesser auf.

2. Die wachsende Form:—Die wachsenden Zellen finden sich sehr

Textfig. 11.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♀.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. $350\times$.

Textfig. 12.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♀.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. $350\times$.

häufig in einem solchen Organ vor, wie es in Textfigur 8, 11 und 20 gezeigt wird. Sie weisen verschiedene Entwicklungen auf und haben einen Hauptdurchmesser von $26-35\mu$ bis $60-83\mu$.

3. Die Riesenform:—Die hier in Frage kommenden Zellen sind diejenigen, welche sich im Vergleich mit den oben angegebenen zwei Formen viel höher entwickelt und im grössten Durchmesser $124-162\mu$ messen (Textfigur 12 und 13).

4. Die degenerierende Form:—Diese Zellen sind von unregelmässiger Kontur und verschiedenartig gebaut. Das Verhalten gegen Farbstoffe ist auch mannigfaltig, was ohne weiteres dafür spricht, dass diese Zellen schon der Degeneration verfallen sind (Fig. 30-34 auf Tafel VI). Diese Gruppe enthält eine Reihe von Zellen, welche bald

gross wie die Riesenform, bald klein wie die der jüngeren Form sind.

Die Menge sowie die Anordnungsweise der oben in Rede stehenden verschiedenen Zellarten im Organ sind je nach dem Alter und dem Geschlecht des Tieres mehr oder weniger verschieden.

2. Befund bei den weiblichen Kröten.

Zu dieser Untersuchung wurden 58 Tieren, d.h. 21 jüngere (I.

Textfig. 13.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♀.
Fix.:—Meves, Färb.:—Eisen-Hämat.
Ca. 350×.

Textfig. 14.

B.O. aus „adulten Stadium“. ♀.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

Gruppe), 10 unreife mittelgrosse (II. Gruppe) und 27 erwachsene (III. Gruppe) Weibchen als Material herangezogen. Von Einzelheiten absehend, möchte ich hier an Hand der Tabelle I die Hauptresultate, die sich bei den weiblichen Kröten ergaben, übersichtlich darstellen, unter besonderer Berücksichtigung des Schicksals der Parenchymzellen, die eine Reihe von wichtigsten histologischen Veränderungen darboten. Die Tiere wurden auf Tabelle I und II wie auf den oben erwähnten Umrisszeichnungen nach dem körperlichen Entwicklungsgrad angeordnet. Die Nummerzahl des Tieres auf den Tabellen entspricht denen auf den Umrisszeichnungen. Ausserdem wurden auf den Tabellen hauptsächlich die Mengenveränderung d.h. Zu- und Abnahme des Interstitiums sowie

Tabelle I.

**Übersichtliche Darstellung der histologischen Befunde
bei den weiblichen Kröten.**

Nummer	Körpergewicht in gr.	Körperlänge in cm.	Datum	Gesamte Menge des Interstitials	Gesamte Menge der Parenchymzellen	Zellarten						Wachstums-Grad d. Tieres
						Jüngere Form	Wachsende Form	Gespannte Zelle	Atrophische Zelle	Riesenform	Degenerie- rende Form	
1	8,0.	3,9.	7. I '26	+	■	—	■	■	—	+	+	I. Jüngerestadium
2	11,2.	4,8.	7. XI „	+	■	+	■	■	—	—	+	
3	13,0.	5,0.	9. IV '25	+	■	+	■	■	—	—	—	
4	17,1.	4,8.	2. III „	+	■	+	■	■	—	+	—	
5	12,0.	6,7.	4. V „	±	■	—	■	■	—	—	+	
6	19,0.	5,5.	20. VI '26	+	■	—	■	■	—	—	+	
7	19,0.	5,6.	7. XI '24	+	■	+	■	+	+	—	+	
8	25,5.	5,0.	24. IX '26	±	■	—	■	■	+	—	—	
9	17,2.	8,5.	16. V „	+	■	—	■	■	—	—	+	
10	25,0.	6,7.	9. IV '25	+	■	+	■	+	+	—	+	
11	34,5.	6,6.	27. V „	+	■	—	■	■	—	+	+	
12	37,0.	6,8.	14. X '26	+	■	—	+	+	+	+	+	
13	35,0.	7,3.	9. IV '25	+	■	—	■	■	+	—	+	
14	42,0.	6,7.	20. VI '26	+	■	—	■	■	+	—	+	
15	41,0.	6,9.	9. IV '25	+	■	+	■	■	—	—	+	
16	63,0.	5,0.	1. XII '26	+	■	+	■	■	—	—	—	
17	49,0.	7,2.	12. I '25	+	■	—	■	+	+	—	+	
18	42,0.	8,5.	14. VI „	±	■	+	■	■	+	—	—	
19	44,0.	10,0.	24. IX '26	+	■	—	■	■	—	—	+	
20	57,5.	7,9.	16. V „	+	■	+	+	+	—	—	+	
21	74,0.	7,2.	7. I '27	+	■	+	■	+	+	—	+	

Tabelle I. (Fortsetzung).

Nummer	Körpergewicht in gr.	Körperlänge in cm.	Datum	Gesamte Menge des Interstitials	Gesamte Menge der Parenchymzellen	Zellarten						Wachstums-Grad (d. Tieres)
						Jüngere Form	Wachsende Form	Gespannte Zelle	Atrophische Zelle	Riesenform	Degenerie- rende Form	
22	129,0.		24. VII '24	+	###	-	+	+	-	#	+	II. Unreifes Stadium
23	137,0.	12,0.	7. X „	++	###	-	+	+	-	++	+	
24	175,0.		7. XI „	+	###	-	#	#	-	+	+	
25	176,6.		24. VII „	+	###	-	#	#	-	+	+	
26	185,0.	11,6.	2. III '25	++	###	-	#	+	+	-	+	
27	207,0.	11,9.	12. I „	+	###	-	++	+	-	++	+	
28	202,0.	10,0.	23. IX '24	+	###	-	#	+	+	+	+	
29	237,0.	14,5.	7. X „	++	###	-	++	+	-	-	+	
30	243,0.	13,4.	9. IV '25	###	++	-	+	+	-	-	+	
31	281,0.		15. VII '24	++	###	-	#	+	+	-	+	
32	157,0.	9,8.	7. X '24	###	+	-	-	-	-	-	+	III. Erwachsenes Stadium
33	135,0.	11,5.	9. IV '26	###	+	-	-	-	-	-	+	
34	148,0.	14,0.	24. III '25	+	###	-	###	#	-	-	-	
35	182,0.	12,0.	7. X '24									
36	200,0.	11,0.	20. VI '26									
37	212,0.	11,2.	14. VI '25									
38	190,0.	13,2.	21. IX '24	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	192,0.	13,3.	27. V '25	###	###	-	-	-	-	-	±	
40	227,0.	12,0.	7. IX '26	###	+	-	-	-	-	-	+	
41	214,0.	13,6.	24. III '25									
42	264,0.	11,8.	7. I '27									
43	261,0.	12,3.	2. XII '24	###	+	-	-	-	-	-	+	
44	237,0.	13,7.	27. X „	###	+	-	+	-	+	-	-	
45	253,0.	13,0.	14. II '25	###	+	-	-	-	-	-	+	
46	263,0.	12,5.	27. V „									
47	256,0.		24. VII '24									
48	266,0.	13,0.	10. XII '24	###	+	-	+	-	+	-	-	
49	270,0.		15. VII „	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	308,0.	12,0.	20. XI „									
51	315,0.	12,6.	19. II '27									
52	287,0.	13,9.	21. IX '24									
53	316,0.		24. VI „									
54	315,0.	13,7.	15. I '25	###	+	-	+	-	+	-	-	
55	327,0.	14,0.	14. I '24	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	326,0.	14,7.	7. XI „									
57	377,0.	13,1.	12. IX '26						-			
58	405,0.	14,0.	19. II '27	###	+	-	-	-	-	-	+	

der Parenchymzellen und daneben gleichzeitig Nummer, Körpergewicht, Körperlänge und Empfangsdatum des Tieres angegeben. Dabei gebrauchte ich auch aus Bequemlichkeit ein bestimmtes Zeichen, um das Mengenverhältnis zwischen Interstitium und Parenchymzellen zu zeigen.

Wenn die Parenchymzellen oder das Interstitium nur spärlich oder gar nicht vorhanden waren, dann wurde das Zeichen ($\pm$) gebraucht.

Textfig. 15.

B.O. aus „adulten Stadium“. ♀.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

Textfig. 16.

B.O. aus „jüngeren Stadium“. ♂.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

Unter dem Zeichen (+) hat man zu verstehen, dass das Organ wenig Parenchymzellen oder wenig Interstitium besitzt. Also z.B. in einem Organ (Textfigur 23) die Parenchymzellen und in anderem Organ (Textfigur 5) das Interstitium nur wenig vorhanden sind. Endlich gebrauchte ich das Zeichen (###) in dem Falle, in dem die Parenchymzellen oder das Interstitium im Organ am reichlichsten vorhanden waren (Textfigur 11, 15 und 17). Bei dem Organ, bei dem das Zeichen (++) vertreten ist, kommt die Menge der Parenchymzellen derjenigen des Interstitiums fast gleich (Textfigur 14 und 21). Wenn der Gehalt der Parenchymzellen resp. des Interstitiums zwischen dem des letzt- und vorletztgenannten Falles liegt, so wird er mit dem Zeichen (###) oder (++) gezeichnet. Also z.B. ist der Parenchymzellengehalt der Textfigur 10 und 22

mit dem Zeichen (≡) und der des Interstitiums mit (≡) versehen und das Verhalten der Textfigur 23 ist ein umgekehrtes. In dieser Tabelle wurde ebenfalls das Mengenverhältnis zwischen den oben genannten verschiedenen Zellarten in gleicher Weise angegeben. Obgleich nun das Organ unter anderen die wachsende Form der Parenchymzellen am reichlichsten enthält, wäre es doch nicht zutreffend, alle wachsenden Zellen für einheitlich zu halten, weil sie in Bezug

Textfig. 17.

B.O. aus „jüngeren Stadium“. ♂.
Fix.:—Luna, Färb.:—Hämat.-Eosin.
Ca. 350×.

Textfig. 18.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♂.
Fix.:—Kolster, Färb.:—Eisen-Hämat..
Ca. 350×.

auf die Form und den Bau in Wirklichkeit ziemlich erheblich Verschiedenheiten aufweisen. Im Hinblick auf die feinere Struktur und Spannung sowie auch auf das Verhalten gegen Farbstoffe lassen sich noch zwei Unterarten, d.h. die der gespannten und die der atrophischen Formen unterscheiden. Das Zelleib und der Kern sind bei der erstgenannten Form in gleicher Weise wie bei den gewöhnlichen Zellen immer gespannt. Ausserdem ist sie auch dadurch charakterisiert, dass ihr Zelleib im Laufe der Organentwicklung die morphologisch wohl nachweisbaren, eigentümlichen Veränderungen aufweist. Sie wird auch am häufigsten in dem Organ beobachtet, wie an der Textfigur 8 und Textfigur 20 zu sehen ist. Demgegenüber ist der Zelleib bei der letztgenannten atrophischen Form mehr oder weniger entspannt und

die Kontur dieser Zellen erscheint unregelmässig polygonal. Ihr Zelleib wird mit Eisen-Hämatoxylin nicht selten dunkel gefärbt, während ihr Kern gewöhnlich gespannt ist (Textfigur 10, 18 und 21). Die beiden Formen der Parenchymzellen können auch als besondere Zellarten beobachtet werden, weil gerade sie mit der Funktion des Organs in einem bestimmten Zusammenhang stehen.

Ein Blick auf die Tabelle I lehrt uns, dass das Organ in der

Textfig. 19.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♂.
Fix.:—Luna, Färb.:—Hämat.-Eosin.
Ca. 350×.

Textfig. 20.

B.O. aus „unreifen Stadium“. ♂.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

jüngeren Zeit die Parenchymzellen im Vergleich mit dem Interstitium viel reichlicher enthält. Sie kommen bei den mittelgrossen, unreifen Tieren annähernd gleich oder das Interstitium oft mehr oder weniger reichlich vor. Demgegenüber nehmen die Parenchymzellen bei den Adulten erheblich ab und es bleibt manchmal im Organ keine Spur von ihnen übrig, wobei dieses hauptsächlich aus Interstitien besteht. Dies histologische Verhältnis, welches bei den jüngeren, mittelgrossen und erwachsenen Tieren beobachtet wurde, geht mit der Volumenveränderung dieses Organs Hand in Hand. Was die einzelne Zellart der Parenchymzellen anbetrifft, so besteht das Organ auch in der jüngeren Zeit hauptsächlich aus wachsenden Zellen, obgleich die andere Form dort

auch nicht selten gefunden werden kann. Die oben in Rede stehende Struktur lässt sich im Organ bis zu seinem unreifen Stadium nachweisen, bei dem aber die jüngeren Zellen nicht mehr, die grossen Zellen (Riesenform) dagegen sehr reichlich gefunden wurden. Beim erwachsenen Weibchen nehmen die Parenchymzellen im Gegensatz zum Interstitium plötzlich ab. So ergibt sich dann, dass das Organ an Stelle der beiden letztgenannten Zellarten teils aus dem interstitiellen Bindegewebe, teils

Textfig. 21.

B.O. aus „adulten Stadium“. ♂.
Fix.:—Luna, Färb.:—Eisen-Hämat.
Ca. 350×.

Textfig. 22.

B.O. aus „adulten Stadium“. ♂.
Fix.:—Meves, Färb.:—Eisen-Hämat.
Ca. 350×.

aus einer kleinen Anzahl von wachsenden, insbesondere atrophischen oder degenerierenden Zellen besteht. Auch im zweiten unreifen Stadium, in dem das Organ makroskopisch seine maximale Entfaltung zeigt, existieren sowohl die wachsenden als auch die riesigen Zellen reichlich, welche letztere aber nicht selten im Organ überwiegend vorhanden sind. Wir sind also berechtigt zu sagen, dass diejenigen, welche mit der Funktion dieses Organs in innigster Beziehung stehen, in Wirklichkeit die wachsenden und zwar die gespannten und die riesigen Zellen sind, und dass sie sowohl bei den jüngeren wie auch bei den mittelgrossen unreifen Tieren überall vorkommen. Die riesigen Zellen erscheinen auch im unreifen Stadium manchmal sehr zahlreich. Bei dem oben angezeigten strukturellen Verhältnis liegt der Gedanke nahe, dass das Organ in dem jüngeren Stadium

mehr oder weniger seine Funktion ausübt, während dies dann im mittelgrossen unreifen Stadium auf lebhafte Weise geschieht, was aus der oben angezeigten Tabelle hervorgeht. Was den Einfluss der Jahreszeit auf die Funktion dieses Organs anbetrifft, so zeigt uns die beistehende Tabelle folgendes. Unter den vom Frühling bis zum Sommer gefangenen Tieren gibt es solche, deren Organ sich dem ihrer Genossen gegenüber weniger regsam zeigt. Selbst im Winter erlischt die Funktion des Organs manchmal

Textfig. 23.

B.O. aus „adulten Stadium“, ♂.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

Die Funktion ist				
lebhaft			Jahreszeit	träg
1			I	17 27
			II	
4			III	26
15	13	3	IV	10
11	9	5	V	20
18	14	6	VI	
25	22	16	VII	31
			VIII	
19	8		IX	28
23	12		X	29
2	24		XI	
16			XII	

N.B.—Die arabischen Ziffern zeigen die Nummer der Tiere, welche in der Tabelle I gezeigt wurden. Die römischen Ziffern zeigen die Monats-Zahl.

nicht ganz. So ist die Funktion des Organs von der Jahreszeit nur wenig beeinträchtigt und steht auch mit der Brunst des Tieres in keiner merklichen Beziehung.

3. Befund beim Männchen.

Für diesen Zweck wurden 63 und zwar 11 jüngere, 19 unreife und 33 adulte Männchen untersucht. Die Resultate sind in gleicher Weise, wie beim Weibchen, auf Tabelle II angezeigt. Vergleicht man die bei männlichen und weiblichen Tieren erhaltenen Resultate miteinander, so ergeben sich, bezüglich der Mengenveränderungen der Parenchymzellen ziemlich grosse Verschiedenheiten. Diese Zellen kommen im Organ im

Tabelle II.
Übersichtliche Darstellung der histologischen Befunde
bei den männlichen Kröten.

Nummer	Körpergewicht in gr.	Körperlänge in cm.	Datum	Gesamte Menge des Interstitialis	Gesamte Menge der Parenchymzellen	Zellarten						Wachstums-Grad d. Tieres
						Jüngere Form	Wachsende Form	Gespannte Zelle	Atrophische Zelle	Riesenform	Degenerie- rende Form	
1	7,5.	3,8.	24. IX '26	+	###	+	##	#	-	-	+	I. Jüngerer Stadium
2	10,0.	4,2.	7. I '27	+	###	++	+	+	-	++	-	
3	12,0.	4,5.	30. XI '26	+	###	+	++	+	-	+	+	
4	12,0.	4,7.	2. III '25	++	###	-	##	#	-	-	+	
5	14,0.	5,6.	4. V '25									
6	16,0.	5,4.	6. I '27	+	###	+	##	#	-	-	+	
7	20,0.	4,8.	14. X '26	+	###	+	++	+	-	+	+	
8	17,0.	5,9.	14. II '25	±	###	+	##	+	+	-	+	
9	25,5.	6,0.	16. V '26	+	###	+	##	#	-	-	-	
10	24,0.		12. I '25	+	###	+	##	#	-	-	+	
11	47,0.	4,3.	27. V „	±	###	-	++	+	-	##	-	
12	31,0.	6,4.	7. XI '26	++	###	+	++	+	-	-	+	II. Unreifes Stadium
13	31,0.	6,7.	20. IX '24	+	###	+	##	#	+	-	-	
14	35,0.	6,4.	7. I '27	+	###	+	##	#	+	-	-	
15	42,0.	6,7.	14. II '25	+	###	+	##	#	-	-	+	
16	45,0.	7,5.	16. V '26	+	###	+	##	#	-	-	+	
17	45,0.	7,5.	20. VI „									
18	48,0.	7,2.	14. X „	+	###	+	##	+	-	++	-	
19	46,0.	7,7.	7. XI '24	+	###	+	##	+	+	+	-	
20	50,0.	7,0.	20. VI '26	++	###	-	++	+	-	+	+	
21	42,0.	9,1.	4. V '25									
22	74,5.	6,4.	24. IX '26	+	###	+	##	+	+	-	+	
23	60,0.	8,7.	25. XII '24	+	###	-	##	+	+	-	+	
24	77,5.	7,8.	7. I '27	±	###	+						
25	74,0.	8,0.	7. I „	+	###	-	##	+	#	-	+	
26	66,8.		24. VI '24	+	###	-	##	+	+	+	+	
27	60,0.	9,9.	13. VI '25	++	###	-	++	-	+	-	++	
28	180,0.	9,2.	2. VII '26	+	###	-	##	#	-	+	+	
29	161,0.	11,2.	7. X '24	++	###	-	##	#	-	-	+	
30	118,0.		2. VII „	+	###	+	##	#	-	-	+	

Tabelle II. (Fortsetzung).

Nummer	Körpergewicht in gr.	Körperlänge in cm.	Datum	Gesamte Menge des Interstitialis	Gesamte Menge der Parenchymzellen	Zellarten						Wachstums-Grad d. Tieres
						Jüngere Form	Wachsende Form			Riesenform	Degenerie- rende Form	
								Gespannte Zelle	Atrophische Zelle			
31	78,5.	8,7.	17. II '27	++	###	-	##	#	-	-	+	III. Erwaachsenes Stadium
32	86,0.	11,3.	2. III '26									
33	125,0.	9,4.	5. XI „	+	###	-	##	+	+	+	+	
34	158,0.	9,0.	10. XII '24	+	###	-	##	#	+	-	+	
35	149,0.	10,0.	19. II '27	##	##	-	++	+	+	-	+	
36	143,0.	11,4.	9. IV '25	##	++	-	++	+	+	-	-	
37	137,0.	12,0.	24. III „	##	##	-	++	+	-	+	-	
38	150,0.	11,0.	7. I '27	###	±	-	-	-	-	-	±	
39	153,0.		23. X '24									
40	175,0.	11,0.	3. III '25	++	###	-	##	+	+	-	+	
41	160,0.		8. IX „	++	###	-	++	+	+	-	++	
42	163,0.	12,0.	23. X '24	++	###	-	##	+	+	-	+	
43	162,0.		24. VI „	+	###	-	##	#	-	+	+	
44	163,0.		10. VII „	++	###	-	##	-	+	-	+	
45	180,0.	11,0.	25. XI „	++	###	-	##	#	-	-	+	
46	167,0.	12,0.	23. X „	++	###	-	##	+	-	-	+	
47	136,0.	15,0.	21. IX „	++	###	-	##	#	-	-	+	
48	172,0.	12,0.	9. IV '25	##	##	-	++	+	+	-	+	
49	130,0.	16,0.	21. XII '24	++	###	-	##	+	+	-	+	
50	173,0.		15. VII „	+	###	-	##	+	##	+	+	
51	195,0.	12,0.	12. I '25	++	###	-	##	+	##	-	+	
52	182,0.	12,0.	22. IX '24	+	###	-	+	+	-	##	+	
53	182,0.	12,0.	1. XII '26	+	###	-	##	+	+	+	+	
54	184,0.	12,0.	21. IX '24	++	###	-	##	+	##	-	+	
55	185,0.	12,0.	4. V '25	+	###	-	##	#	+	-	+	
56	183,0.	12,5.	14. II „	++	###	-	##	#	-	-	+	
57	174,0.		7. IX '24	++	###	-	##	+	+	-	+	
58	208,0.	12,0.	14. VI '25	+	###	-	+	+	-	##	+	
59	208,0.	13,3.	24. III „	###	++	-	+	-	+	-	+	
60	230,0.	12,5.	27. V „	++	###	-	##	+	##	-	+	
61	167,0.		24. VII '24	+	###	-	##	+	+	+	+	
62	275,0.	11,5.	12. IX '26	++	###	-	+	+	-	++	+	
63	177,0.	18,0.	12. I '25	###	++	-	+	-	+	-	+	

III. Erwachsenes Stadium

ersten Stadium sehr reichlich vor, das Interstitium dagegen nur wenig, wie beim Weibchen. Man kann in dem Organ dieselbe Struktur noch bis ins zweite Stadium (mittelgrosse unreife Tiere) verfolgen, während das Interstitium in letzteren mehr oder weniger zugenommen hat. Im dritten (adulte Tiere) nehmen die Parenchymzellen anfangs nicht ab, sondern werden erst später allmählich reduziert, so dass sie in diesem Zeitpunkt im Vergleich mit denjenigen des erwachsenen Weibchens

Textfig. 24.

B.O. aus „adulten Stadium“. ♂.
Fix.:—Zenker, Färb.:—Hämat.-
Eosin. Ca. 350×.

Die Funktion ist											
lebhaft					Jahres- zeit	träg					
14	10	6	2		I	13	25				
	56	31	15		II	8					
			4		III	4	59				
					IV	36	48				
55	16	11	9		V	60					
		58	43		VI	27					
		30	28		VII	44					
					VIII						
52	47	13	62	1	IX	12	41	54	59		
	18	29			X	7	18	42	46		
		45			XI	19	22				
		34			XII	49	23				

ausserordentlich vorhanden sind. Das Interstitium beginnt erst später unter Abnahme der Parenchymzellen allmählich zuzunehmen, was aber gewöhnlich nicht so deutlich, wie beim Weibchen ist. Nur ausnahmsweise nimmt es so stark zu, dass dabei die Parenchymzellen vollständig aus dem Organ verdrängt werden (Nr. 38 in der Tabelle II). Dieser Befund stimmt in dem jüngeren und unreifen aber nicht in dem erwachsenen Stadium mit dem makroskopischen Verhalten des Organs ganz überein. Bei letzterem gibt es bald ein grosses, welches jedoch histologisch keine maximale Entwicklung zeigt, bald ein kleines Organ, bei dem die Degeneration noch nicht in Erscheinung getreten ist. Dies Verhältnis steht mit der individuellen Verschiedenheit, insbesondere mit dem Lebensalter des Tieres in innigster Beziehung.

Die jüngeren Zellen kommen im ersten und zweiten Stadium überall, im dritten Stadium jedoch nirgends vor. Die wachsenden oder die gespannten Zellen kommen bei fast allen Tieren vor, sind dagegen bei den mittelgrossen oder erwachsenen Tieren nur ausnahmsweise in geringerer Anzahl als die atrophischen Zellen vorhanden. Die riesige Form der Parenchymzellen wird im Gegensatz zu dem Weibchen in allen Stadien häufig beobachtet. Aus der inneren Struktur des Organs geht ohne weiteres hervor, dass das Organ von dem jüngeren bis zum erwachsenen Stadium sich ständig betätigt. Ebenso steht die Funktion des Organs auch beim Männchen immer mit der körperlichen Entwicklung im Einklang. Jahreszeit und Brunst üben jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Funktion dieses Organs aus, wie in der beistehenden Tabelle zu sehen ist.

C. Zytologische Beobachtung.

In diesem Kapitel möchte ich vorwiegend über die Parenchymzellen der weiblichen Kröten berichten, weil die feinere Struktur der betreffenden Zellen in Bezug auf das Geschlecht im Grunde keine erheblichen Verschiedenheiten aufweist. Ich teilte sie hier, ausgehend von der Verschiedenheit der Struktur, auch in vier Arten, d.h. in die jüngeren, wachsenden, riesigen und degenerierenden Zellen ein.

1. Die jüngeren Zellen.

Zu dieser Gruppe gehören solche Zellen, welche sehr primitiv gebaut, wie Figuren 1–7 auf Taf. III zeigen. In der Mitte der Zellen befinden sich ein kleiner Kern, welcher von spärlichem Protoplasma umgeben ist (Fig. 1 und Fig. 2 auf Taf. III). Er erscheint bald heller, bald dunkler gefärbt, auch dort, wo das Protoplasma mehr oder weniger reichlich vorhanden ist. Gleichlaufend mit der Grösse des Zelleibes nimmt auch sein Umfang allmählich zu (Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 auf Taf. III). Wenn der Kern ausserdem färberisch heller erscheint, dann ist seine Kontur scharf und umgekehrt. Das Protoplasma enthält ausser einigen Lipoidgranula wenige Plastochondrien und auch wenige verhältnismässig grosse dunkel gefärbte Granula. Die letztgenannten entstammen höchstwahrscheinlich zusammen mit einigen Übergangsformen den Plastosomen. Die jüngeren Zellen werden unter Umständen atrophisch, ohne sich mitotisch zu teilen und wandeln sich zu einem strukturlosen Plasma-klumpchen um, um dann schliesslich vollständig resorbiert zu werden (Fig. 7 auf Taf. III).

2. Die wachsenden Zellen.

Die diese Kategorie umfassenden Zellen sind verschieden gross und verschieden gebaut. Die kleineren Zellen entstehen aus den grösseren

der jüngeren Zellen, welche sich manchmal in solchem Masse entwickeln, dass sie die Bezeichnung Riesenform verdienen. Die wachsenden Zellen sind, wie schon erwähnt, so deutlich verschieden gebaut, dass sie sowohl der feineren Struktur als auch der Reaktion gegen Farbstoffe nach noch in zwei verschiedene Zellarten, nämlich die gespannte und die atrophische Form eingeteilt wurden.

a. Die gespannte Form.

Diese Zellen befinden sich im Organ bedeutend zahlreicher als die der atrophischen Form, bieten auch im Laufe ihrer Entwicklung sehr verschiedene strukturelle Veränderungen dar. Die Figuren, welche auf Taf. III u. IV ungefähr nach dem Entwicklungsgrad angeordnet wurden (Fig. 8–15 und Fig. 17–19), lassen erkennen, dass diese Zellen von kleinerer Form an allmählich zur grösseren heranwachsen. Die strukturellen Veränderungen können sowohl von Seiten des Kernes als auch des Zelleibes betrachtet werden. Der Kern ist immer kuglich geformt und seine Konturlinie gegen das Protoplasma ist meistens glatt, nur selten stark gewellt (Fig. 15 auf Taf. IV). Die innere Struktur des Kernes ist an den meisten Zellen gleichartig, wenn er auch unter Umständen mehr oder weniger verschieden gebaut sein kann. Betreffs der Plasmastruktur der einzelnen Zellen werden je nach dem Wachstumsgrad mehr oder weniger erhebliche Verschiedenheiten nachgewiesen. Der geformte Bestandteil der verhältnismässig jungen Zellen bestehen hauptsächlich aus Plastosomen und aus ein wenig dunkel gefärbter Granula. Die Plastosomen sind in den Zellen sehr verschieden geformt und angeordnet. In den kleineren Zellen zeigen sie gewöhnlich die Granulaform (Plastochondrien), welche sich in ihr gleichmässig verteilen (Fig. 8 auf Taf. III). In den mehr oder weniger gross gewordenen Zellen weisen sie dagegen vorwiegend die Fadenform (Plastokonten) auf, welche bald gleichmässig, bald gruppenweise in dem Protoplasma erscheint (Fig. 10 und Fig. 11 auf Taf. III). Unter den kleineren Zellen gibt es solche, welche einerseits einige Lipoidgranula, andererseits oft viele Vakuolen enthalten (Fig. 9 auf Taf. III).

In den ziemlich gross gewordenen Zellen befinden sich die Plastosomen meist gruppenweise im peripheren Teil des Zelleibes und die Lipoidgranula nehmen an Zahl allmählich zu (Fig. 12, 13 und 14 auf Taf. III). Sie färben sich gelb-bräunlich oder gelblich, während die Plastosomen, wie in den übrigen Zellen, mit Eisenhämatoxylin tief blau gefärbt werden. Ausserdem befinden sich in den Zellen dabei gleichzeitig solche Granula, welche nach der Färbbarkeit als eine Übergangsform der oben genannten Granula angesehen werden kann (Fig.

16 auf Taf. IV). Betreffs der Lipoidbildung nimmt man jetzt folgenden Mechanismus an. Die Lipoidgranula wird, wie Fig. 16a auf Taf. IV, welche nach den Fig. 13 und 14 auf Tafel III etwas vergrössert abgebildet worden ist, erkennen lässt aus Plastosomen in der Weise gebildet, dass die Plastochondrien anfangs allmählich heranwachsen, um sich dann von ihrem peripheren Teil nach dem Zentrum zu allmählich in gelbbraunliche Substanz, d.h. Lipoidgranula umzuformen. Die gelbe Lipoidsubstanz wandelt sich unter Volumenzunahme schliesslich zu einer farblosen, hellen Vakuolensubstanz um, indem sie sich dabei substantiell verändert (Fig. 16b auf Taf. IV). Im Laufe der Zellentwicklung wird das Lipoid in den Zellen stetig gebildet und immer mehr angesammelt (Fig. 15 auf Taf. IV).

Die Lipoidbildung findet nicht in allen Zellen gleichmässig statt, sondern sie bleibt bei einigen wachsenden Zellen, d.h. eben bei der gespannten Form nicht selten vollständig aus (Fig. 17 auf Taf. IV und Fig. 18 und 19 auf Taf. III). Die eine der Zellen (Fig. 17 auf Taf. IV) hat in ihrem Protoplasma nur die feineren Plastosomen allein ohne Lipoidgranula und die andere (Fig. 19 auf Taf. III) hat, obgleich sie schon ziemlich ausgewachsen ist, als Zellelemente nur die Plastosomen allein, wo sie sich, wie in den nicht so stark entwickelten Zellen, überall gleichmässig vorfinden. Zelleib und Kern sind dabei heller gefärbt. Fig. 20 auf Taf. IV zeigt diejenige Zelle, welche sich durch Mehrkernigkeit auszeichnet, obwohl sie gleichartig wie die in Fig. 18 angegebenen Zellen gebaut ist. Die Ursache solcher Erscheinung und das Schicksal solcher Zellen konnte ich aber jetzt noch nicht aufklären.

b. Die atrophische Form.

Diese Form der Parenchymzellen ist strukturell ganz verschieden gebaut und kommt gewöhnlich seltner als die gespannte Form vor (Fig. 21–27 auf Taf. V). Der Zelleib ist im allgemeinen dunkel und homogen gefärbt (Fig. 21 auf Taf. V). Die Plastosomen sammeln sich hier und dort gruppenweise nur in dem peripheren Zellteil an. In anderen Zellen (Fig. 22 auf Taf. V), welche schon grösser geworden, sind die Plastosomen bald im peripheren, bald im mittleren Teil des Zelleibes als eigentümliches Konglomerat zusammengeballt. Die übrige Partie dieser Zellen ist überhaupt homogen gebaut, und es gibt in diesem Abschnitt keinen geformten Bestandteil.

In Fig. 23 auf Taf. V ist der Zelleib fleckenweise besonders dunkel gefärbt. Die Plastosomen sind in dieser Zelle, in der sie den geringsten Bestandteil darstellen, nur wenig vorhanden. Die in Fig. 24 auf Taf. V abgebildete Zelle ist noch höher entwickelt, färbt sich auch dunkler

als diejenigen der Fig. 21, 22 und 23. Innerhalb derselben ballen sich die Plastosomen besonders im peripheren Teil des Zelleibes zusammen. Es ist aber bemerkenswert, dass im Zelleib noch einige feinere Lipoidgranula sich inselförmig bald allein, bald mit anderen dunkel gefärbten Granula anhäufen. Das Bild lässt vermuten, dass die betreffenden dunklen Zellen, wie Fig. 13 und 14 auf Taf. III, direkt abstammen können. Dieselbe Struktur ist auch bei einer anderen kleineren Zelle (Fig. 25 auf Taf. V) beobachtet. Die Dunkelfärbung der atrophischen Zellen wird auch bei den kleineren Zellen beobachtet (Fig. 26, Fig. 27 auf Taf. V), bei dem der Zelleib mit Ausnahme des Kernes, welcher meistens noch gespannt ist, sich gewöhnlich so stark dunkel färbt, dass ihre innere Struktur gar nicht unterschieden werden kann.

3. Die riesigen Zellen (Textfig. 12, 13 und 16 sowie Fig. 29 auf Taf. IV).

Die Zellen sind von verschiedener Grösse und Struktur und haben die folgenden gemeinschaftlichen Eigentümlichkeiten. Der Kern liegt umgeben von dichtem homogenen Protoplasma fast in der Mitte der Zelle und hat eine stark wellige Kernmembran. Das Zelleib enthält mehr oder weniger die Plastosomen. Die Peripherie des Zelleibes ist so stark vakuolisiert, dass diese Zelle ein sehr helles Aussehen hat. Die Lipoidgranula werden in dieser Partie nicht selten zahlreich gefunden (Textfig. 12 und 13). Die Fig. 29 auf Taf. IV, welche nach einer grösseren Zelle der Textfig. 12 vergrössert gezeichnet wurde, zeigt uns die Zelle, deren Kern stark wellig kontuiert und von aussen her unmittelbar von dichtem Protoplasma mit wenigen Plastosomen umgeben ist. Der grösste Teil des Zelleibes ist mit zahlreichen Lipoidgranula von verschiedener Grösse völlig ausgefüllt. Sie sind im peripheren Teil des Zelleibes viel feiner und zahlreicher, im zentralen dagegen grösser und weniger zahlreich. Die kleineren Lipoidgranula wachsen allmählich heran, verschmelzen miteinander, indem sie ein grosses Lipoidtröpfchen werden und wandeln sich schliesslich zu einem hellen Vakuoleninhalt (Fig. 16c auf Taf. IV). Im Organ, in dem viele riesige Zellen vorhanden sind, werden im Interstitium häufig einige grosse Lücken und zahlreiche stark vakuolisierte kleinere Zellen beobachtet (Textfig. 12 und 13).

4. Die degenerierende Form.

Die betreffende Form ist im wesentlichen dadurch charakterisiert, dass die Zellen nach der maximalen Entwicklung allmählich atrophisch werden, nachdem sie den Zellinhalt vollständig verloren haben. Sie sind meist entspannt und unregelmässig geformt, weil ihre innere Struktur schon zerstört worden ist (Textfig. 7). Einige Parenchymzellen

fallen schon in der jüngeren Zeit in Degeneration, ohne die maximale Entwicklung zu erreichen, wie schon oben angegeben ist. Die Degeneration der wachsenden Zellen lässt sich auch nicht selten in jeder der Entwicklungsstufen nachweisen. Die betreffende Degenerationserscheinung beruht in Wirklichkeit auf der Kern- und Protoplasma-Zerstörung. Man trifft aber manchmal solche Zellen an, in welcher der Kern intakt ist und nur das Protoplasma allein grosse Veränderung erfährt wie die meisten Zellen der Textfig. 6 erkennen lassen. In Textfig. 18 ist der Zelleib so kompakt und so stark dunkel gefärbt, dass seine innere Struktur nicht mehr nachweisbar ist, wie bei einigen der oben erwähnten atrophischen Zellen der Fall ist. Wenn der Degenerationsvorgang noch weiter fortschreitet, wird die Zelle allmählich resorbiert und schliesslich völlig durch interstitielles Bindegewebe ersetzt (Fig. 30—33 auf Taf. VI).

IV. Zusammenfassende Betrachtung.

Das Biddersche Organ verhält sich, soweit ich an den japanischen Kröten beobachten konnte, je nach dem Geschlecht mehr oder weniger, wenn auch nicht grundlegend, verschieden. Es sei zuerst das allgemeine Verhalten des betreffenden Organs hauptsächlich beim Weibchen und dann der geschlechtliche Unterschied betrachtet.

Das Organ wächst bei den jüngeren Weibchen gleichzeitig mit der körperlichen Entwicklung heran, zeigt bei den grösseren noch nicht ausgereiften Tieren seine maximale Entfaltung und beginnt sodann bei den Adulten plötzlich zu degenerieren und schliesslich beiderseitig vollständig zurückzutreten (Umrisszeichnungen auf Seite 258). Wenn die strukturelle Veränderung dieses Organs im Laufe der äusseren Formveränderung, welche schon oben ausführlich geschildert wurde, betrachtet wird, so überzeugt man sich, dass das kleinere Organ der jüngeren Tiere nur spärliches Interstitium aber zahlreiche Parenchymzellen und zwar die jüngeren und verschieden entwickelten Formen derselben enthält (Textfig. 5). Dies strukturelle Verhältnis zeigt, dass das Organ nachher noch weiter heranwächst.

Das grössere Organ der unreifen Tiere enthält im allgemeinen spärliches Interstitium aber zahlreiche Parenchymzellen, wenn auch unter Umständen im Organ das Interstitium mehr oder weniger vermehrt, dagegen die Parenchymzellen an Zahl etwas zurücktreten. Aber in diesem Stadium treten die kleineren jüngeren Zellen vollständig zurück. Das Organ enthält hauptsächlich die grösseren und zeitweise die riesigen

Zellen, um seine maximale Entfaltung zu zeigen (Textfig. 12 und 13). Bei den Adulten kommen im Organ ausser in dem interstitiellen Bindegewebe fast keine Parenchymzellen vor (Textfig. 15). So ergibt sich, dass das Organ bei den erwachsenen Weibchen schon rudimentär geworden ist. Diese histologischen Veränderungen, welche mit der äusseren Formveränderung immer Hand in Hand gehen, beweisen klar den Vorgang der Entwicklung und Degeneration dieses Organs.

Die Formbestandteile der Parenchymzellen sind die Plastosomen, die Lipoidgranula und die Vakuolen. Die Plastosomen weisen in den jüngeren Zellen oft Körnerform und in den wachsenden meistens Fädenform auf (Fig. 1—10 auf Taf. III). Die grösser gewordenen Zellen bergen in ihrem Zelleib zahlreiche kettenartig angeordnete oder körnige Plastosomen und nicht selten einige gelbliche Lipoidgranula. Letztere sammeln sich aber unter Zellentwicklung immer mehr an (Fig. 13—14 auf Taf. III) doch ist es schwer, ihren Ursprung zu erklären. Nach meiner zytologischen Untersuchung liegt jedoch der Gedanke nahe, dass die Lipoidgranula auch bei diesen Zellen genetisch höchstwahrscheinlich mit den Plastosomen in innigster Beziehung stehen, weil die zuerst erscheinenden feineren Lipoidgranula morphologisch gleichartig mit den körnigen Plastosomen geformt sind und diese beiden Granulen färberisch nach einigen Übergangsformen ineinander übergehen. Die Ansicht Harms, dass der Ursprung der Lipoidgranula eigentlich im Kernkörperchen zu suchen ist, konnte ich nicht bestätigen. Die Lipoidgranula nimmt, unter Grössenzunahme oder Verschmelzung einiger derselben, allmählich an Umfang zu, so dass sie dabei ihre Färbbarkeit vermindert und schliesslich zu einer hellen Vakuolensubstanz übergeht, indem sie dabei substantiell sich verändert (Fig. 16a auf Taf. IV).

Weil die oben angegebenen strukturellen Veränderungen der Parenchymzellen mit der Zellentwicklung d.h. mit der Zellgrösse nicht immer Hand in Hand gehen, so weisen eben die die wachsende Form umfassenden Zellen in dem jüngeren und unreifen Stadium des Tieres äusserst verschiedene Innenstrukturen aus. Ich habe bis dahin die Entwicklungsweise und die Innenstruktur der Parenchymzellen hauptsächlich bei der wachsenden, besonders bei der gespannten Form beobachtet, aber ich bin jetzt noch nicht imstande, das Wesen der Funktion dieser Zellen zu entscheiden, auch wenn sie ihrer feineren Struktur nach vielleicht eine bestimmte Funktion haben mögen. Man kann aber ohne weiteres annehmen, dass diese Zellen histologisch anderen Drüsenzellen sehr ähnlich gebaut sind, weil sie als aktiven

Bestandteil Plastosomen und als inaktiven Bestandteil Lipoidgranula und Vakuolen, die in bezug auf Entstehung mit Plastosomen morphologisch in enger Beziehung stehen, enthalten. Wenn meine Vermutung, dass das Organ eine Art von Drüse sei, mehr oder weniger berechtigt wäre, so könnte ich die Lipoidgranula in diesen Parenchymzellen mit den Sekretgranula und die Vakuolen mit dem Sekret der anderen Drüsenzellen vergleichen. So wage ich vom histologischen Standpunkt aus höchstens zu glauben, dass dies Organ ein drüsiges Organ sei.

Im folgenden möchte ich die Funktion dieses Organs als solches einer Drüsenart betrachten. Der Mechanismus der Bildung von Vakuolen durch Granula-Veränderung, d. h. die Sekretbildung dieser Zellen stimmt mit dem der anderen Drüsenzellen vollständig überein. Der sekretorische Vorgang ist aber hier im Gegensatz zu den gewöhnlichen Drüsen dadurch ausgezeichnet, dass die Zellen dieses Organs mit der Sekretbildung gleichzeitig an Grösse immer weiter zunehmen, um schliesslich die der riesigen Zellen zu erreichen. So findet die Sekretion dieser Zellen stetig im Wege ihrer Entwicklung statt. Der Grund dieser Vermutung liegt in der Tatsache, dass es in jedem Stadium der Zellentwicklung bald eine solche Zelle mit Vakuolen gibt, die dem Sekret der anderen Drüsenzellen entsprechen und der „gespannten Form“ zugehören, bald eine solche, welche mehr oder weniger entspannt ist und der „atrophischen Form“ zugerechnet wird. Daher liegt der Gedanke nahe, dass die Sekret-Produktion und -Ausscheidung dieser Zellen mit der Zellentwicklung immer wiederholt stattfindet. Ist diese Vermutung richtig, so entspräche die atrophische Zelle der im Ruhestadium befindlichen Drüsenzelle und begänne wahrscheinlich nach bestimmter Zeit die Sekretion wieder von neuem. Es ist auch nicht zweifelhaft, dass einige von den atrophischen Zellen nicht selten verschwinden ohne sich funktionell wieder zu erholen, weil die degenerierende Form der Parenchymzellen in jedem Stadium der Zellentwicklung auftritt. Der Vorgang der Sekretion dieses Organs wird im Gegensatz zu den anderen Drüsen dadurch charakterisiert, dass die Parenchymzellen einerseits unter funktionellen Leistungen ständig heranwachsen und andererseits in jedem Stadium der Zellentwicklung beliebig zu Grunde gehen. So finden also Sekretion und Degeneration der Parenchymzellen im Organ nebeneinander statt, wodurch die ausserordentlich verschiedenen strukturellen Verhältnisse erklärt werden. Die funktionelle Tätigkeit der Parenchymzellen löst sich also im Organ in jeder Zeit bald progressiv, bald regressiv aus. Es ist aber schwer streng zu entscheiden, ob sich eine Zelle im progressiven oder regressiven Zustand befindet oder nicht,

wobei ich besonders Form und Bau des Kernes einer Zelle der regressiven Form berücksichtige, bei welcher der Kern schon mehr oder weniger degeneriert ist. Man findet auch ausser den verschieden gebauten Parenchymzellen Blutkapillaren im Organ, welche die Parenchymzellen sehr zahlreich umgeben und eines der wichtigsten Bauelemente derselben darstellen, ebenso wie es bei den anderen Drüsen der Fall ist. Diese Gefässnetze stehen mit der Degeneration und Resorption der Parenchymzellen in innigster Beziehung, indem sie dabei die betreffenden Zelle rasch zerstören und zur Resorption bringen.

Das Organ des Männchens ist von gleicher Konstruktion wie das des Weibchens. Bei den männlichen Kröten jedoch wächst das Organ, wie aus makroskopischen und grobhistologischen Untersuchungen leicht zu ersehen ist, zwar früher aber langsamer als beim Weibchen, um erst später bei den erwachsenen Tieren seine maximale Entfaltung zu zeigen und dann allmählich mit der Degeneration zu beginnen. Was das Wesen der Funktion dieses Organs anbetrifft, so gibt es keinen merklichen Unterschied zwischen beiden Geschlechtern. In bezug auf den sekretorischen Vorgang dieses Organs tritt die Funktion beim Männchen schon im jüngeren Stadium stärker hervor als beim Weibchen und zeigt auch seine maximale Entfaltung erst später nämlich in dem adulten Stadium. Und sogar in diesem Stadium tritt die Funktion dieses Organs noch nicht gänzlich zurück, wie bei den weiblichen Kröten immer der Fall ist.

Zum Schluss kann ich gestützt aus meiner langjährigen histologischen Grundlagen über die Funktion dieses Organs folgende Tatsache zu behaupten wagen, welche von den bisherigen Angaben weitaus verschieden sind. Die funktionelle Leistung dieses Organs hängt bei beiden Geschlechtern hauptsächlich von dem Alter ebentuell dem Wachstumsgrad, niemals von der Jahreszeit oder der Brunst des Tieres ab.

V. Schluss.

Die Hauptresultate der vorliegenden Untersuchungen lauten wie folgt.

Bei den weiblichen Kröten.

1. Das Organ stellt sich bei den jüngeren Tieren als ein kleines, gespanntes Körperchen dar und wächst mit der körperlichen Entwicklung allmählich heran. Seine Entwicklung erreicht in dem unreifen Tier, bei dem das Ovarium noch nicht ausgereift ist, den maximalen Punkt und beginnt dann beim Adulten plötzlich zurückzu-

treten, bis es nur noch ein spannungsloses, winziges Knötchen aufweist. Es tritt im äussersten Fall einerseits oder auch beiderseits vollständig zurück.

2. Die Parenchymzellen kommen im Organ bei den jüngeren Individuen sehr reichlich, das Interstitium dagegen nur spärlich vor. Bei den grösseren noch nicht ausgereiften Tieren zeigen die Parenchymzellen meistens ihre höchste Entwicklung, indem sie dabei verschieden geformt und gebaut sind. Obgleich das Interstitium überhaupt nur spärlich vorhanden ist, so nimmt es in diesem Stadium doch zeitweise mit der Reduzierung der Parenchymzellen mehr oder weniger zu. Bei den Adulten besteht das Organ hauptsächlich aus Bindegewebe, weil die Parenchymzellen schon zurückgetreten und resorbiert sind. Man sieht im Organ oft keine Spur der Parenchymzellen mehr.

3. Die Parenchymzellen wachsen von der jüngeren Form zur wachsenden Form übergehend allmählich zur Riesenform heran, um schliesslich zu degenerieren und resorbiert zu werden. Sie wachsen nicht alle gleicherweise, treten auch beliebig in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen wieder zurück.

4. Der Formbestandteil des Protoplasmas besteht hauptsächlich aus Plastosomen, Lipoidgranula und Vakuolen. Die Plastosomen, welche in den jüngeren Zellen die Granulaform aufweisen und wenig zahlreich enthalten sind, nehmen mit der Zellentwicklung allmählich an Zahl zu und nehmen verschiedene Formen an. Die Lipoidgranula kommt hauptsächlich in der wachsenden Zelle vor. Die feinere Lipoidgranula, welche anfangs den körnigen Plastosomen in Form und Farbe ähnelt, nimmt später nicht nur an Grösse zu, sondern zeigt auch seine eigentliche Färbung, um dann zu hellen farblosen Vakuolen zu werden, sich dabei zu vergrössern oder mit den anderen zu verschmelzen und sich substantiell zu verändern.

5. Die strukturellen Veränderungen, welche mit der Granulaveränderung einhergehen, finden beliebig zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen in den Zellen statt. So erscheinen die Parenchymzellen in ihren Entwicklungsstufen äusserst verschieden. Aus den strukturellen Veränderungen der Parenchymzellen, welche im Laufe der Zellfunktion vor sich gehen, ergibt sich ohne weiteres, dass das Organ im wesentlichen eine Art von Drüse ist.

6. Vom histologischen Standpunkt betrachtet ist die Funktion dieses Organs schon in der jüngeren Zeit ziemlich lebhaft und erreicht im unreifen Stadium der Tiere den maximalen Wert. Die sekretorische Funktion bleibt jedoch bei den Adulten vollständig aus.

7. Die Funktion dieses Organs steht ausserdem mit dem Alter, eventuell mit dem Wachstumsgrad des Tieres in inniger Beziehung. Sie wird jedoch von der Jahreszeit und der Brunst des Tieres niemals beeinflusst.

B. Bei den männlichen Kröten.

8. Das Organ wächst auch beim Männchen mit der körperlichen Entwicklung allmählich heran. Es entwickelt sich aber früher als beim Weibchen und auch bis zu einer bestimmten Zeit der Adulten noch weiter heran, um erst dann allmählich reduziert zu werden. Die Reduktion des Organs geht aber nicht so stark vor sich, dass das Organ vollständig zurücktritt, wie beim Weibchen.

9. Die Parenchymzellen sind im Grunde nicht verschieden von denjenigen des Weibchens gebaut, kommen im Organ auch bei den jüngeren und unreifen Tieren so reichlich wie beim Weibchen vor. Bei den Adulten nehmen die Parenchymzellen dagegen nur wenig an Zahl ab. Das Interstitium nimmt eben in diesem Stadium nicht erheblich zu, füllt nur ausnahmsweise das ganze Organ völlig aus.

10. Dem feineren Bau der Parenchymzellen nach erneuert sich das Organ von der jüngeren Zeit an bis zu einer bestimmten Zeit der Adulten immer lebhaft. Die Funktion zeigt beim Männchen erst im adulten Stadium das Maximum, um sodann allmählich zu sinken; die Funktionsverminderung ist aber eben in diesem Stadium nicht so deutlich wie beim Weibchen. Die funktionelle Leistung dieses Organs hängt auch beim Männchen erheblich von dem Alter, dagegen niemals von der Jahreszeit oder Brunst des Tieres ab, wie beim Weibchen.

Die Hauptresultate der vorliegenden Untersuchungen wurden schon an den 35. (Sendai, 1927) und 36. (Nagoya, 1928) japanischen anatomischen Gesellschaften partiell mitgeteilt.

Zum Schluss möchte ich nicht vergessen, meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. R. Tsukaguchi, der mir immer mit seinem Rat zur Seite stand, meinen herzlichsten Dank zu sagen.

Tafelerklärung (Taf. III-VI).

Sämtliche Figuren sind mit dem Abbeschen Zeichenapparat auf der Giesenhagens-Tischebene gezeichnet und zwar mit Zeiss' Apochromat 2 mm., n. A. 1, 3, Komp.-Ok. 10 in Tubusl. 160 mm.

Die Präparate, die den Fig. 1-4, Fig. 6-7, Fig. 9-16 auf Taf. III und IV, Fig. 21-25, Fig. 28 auf Taf. V und Fig. 31-33 auf Taf. IV zu Grunde liegen, sind mit der Levischen, die der Fig. 29 auf Taf. IV mit Mevesschen, die der Fig. 5 und 8 auf Taf. III, Fig. 17 auf Taf. IV, Fig. 26, 27 auf Taf. V und Fig. 30, 34 auf Taf. VI mit der Kolsterschen, die der Fig. 18 auf Taf. III mit der Lunaschen Flüssigkeit fixiert. In allen Fällen ist die Eisenthämatoxylinfärbung angewandt.

- Fig. 1-6. Jüngere Form der Parenchymzellen.
 Fig. 8-19. Gespannte Form } der wachsenden Zellen.
 Fig. 21-28. Atrophische Form }
 Fig. 20. Mehrkernige Zelle aus den wachsenden Zellen.
 Fig. 29. Riesenform der Parenchymzellen.
 Fig. 7. Degenerierende Zellen aus der „jüngeren Form“.
 Fig. 30-34. Degenerierende Form der Parenchymzellen.

Literatur.

1. Ame' et Champy. 1909. Compt. rend. de la soc. de biol. Paris. 67. Note sur l'ablation de l'organe de Bidder du Crapaud.
2. Bidder, F. H. 1846. Dorpart. Vergleichende anat. und histolog. Untersuchungen über die männlichen Geschlechts- und Harnwerkzeuge der nackten Amphibien.
3. Bourne, A. G. 1886. Quart. journ. micros. science. Vol. 24. On certain abnormalities in common frog (*Rana temporaria*).
4. Cerruti, A. 1903. Rendiconti Accad. Scienze fisiche e matematiche. Ser. 3. Vol. 9. Contributione per lo studio dell'organe di Bidder nei Bufonidae. I. Prosenza di Spermii nell'organo.
5. Derselbe. 1903. Bolltino di Soc. Naturalisti Napoli, Ser. 1. Vol. 17. A protosito della penetrazione di ovuli in ovuli nell'organo di Bidder di *Bufo vulgaris*, Laur.
6. Derselbe. 1905. Atti della Reale Accad. della Fische e Matematiche. Vol. 12. Contributione per lo studio dell'organo di Bidder nei Bufonidae. II.
7. Derselbe. 1907. Anat. Anz. Bd. 30. Nr. 2/3. Sopra due casi di anomalia dell'apparto riproduttore nel *B. vulg.* Di una speciale penetrazione di ovul adiacenti nel *B. vulg.*
8. Eggert, B. 1926. Zeitschr. f. Anat. u. Entwickl. Bd. 79. Die Geschlechtsmerkmale im Lebenszyklus der männlichen und weiblichen Kröten, *B. vulg.* L.
9. Friedmann, Fr. 1898. Arch. mikr. Anat. Bd. 42, Heft 2. Rudimentäre Eier im Hoden von *Rana viridis*.
10. Fuhrmeister, O. 1921. Reue Suisse de Zool. Nr. 21. L'hermaphrodisme chez *B. vulg.* L.
11. Guyenot et Ponse. 1922. Compt. rend. de la soc. de biolog. 86. L'organe de Bidder et des caractères sexuels secondaires du Crapaud.
12. Dieselbe. 1923. Compt. rend. 89. Inversion du type sexuel dans la Gonade du Crapaud.
13. Dieselbe. 1923. Compt. rend. 89. Nouveaux resultats concernant les determinations des caractères sexuels secondaires du Crapaud (*B. vulg.*).
14. Dieselbe. 1923. Compt. rend. 89. L'organe de Bidder du Crapaud est-il indispensable à la vie?

15. Harms, W. 1913. Zool. Anz. Bd. 42. Die Brunstschwielen von *Bufo vulgaris* und die Frage ihrer Unabhängigkeit von den Hoden oder dem Bidderschen Organ; zugleich ein Beitrag zu der Bedeutung des Interstitiums.
16. Derselbe. 1914. Mai 13. Sitzungsberichte d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. Marburg. Nr. 5. Über die Inneresekretion des Hodens und Bidderschen Organs von *Bufo vulgaris*, L.
17. Derselbe. 1914. Gustav Fischer, Jena. Experimentelle Untersuchungen über die innere Sekretion der Keimdrüsen und ihre Beziehung zum Gesamtorganismus.
18. Derselbe. 1915. Zool. Anz. Bd. 45. Ergänzende Mitteilung über die Bedeutung des Bidderschen Organs.
19. Derselbe. 1921. Zeitschr. f. Anat. u. Entwickl. Bd. 62. Heft 1/2. Untersuchungen über das Biddersche Organ der männlichen und weiblichen Kröten. I. Mitteilung:—Die Morphologie des Bidderschen Organs.
20. Derselbe. 1921. Zool. Anz. Bd. 53. Verwandlung des Bidderschen Organs in ein Ovarium beim Männchen von *Bufo vulgaris*, L.
21. Derselbe. 1923. Zeitschr. f. Anat. u. Entwickl. Bd. 69. Heft 4/6. Untersuchungen über das Biddersche Organ der männlichen und weiblichen Kröten. II. Mitteilung:—Die Physiologie des Bidderschen Organs und experimentell-physiologische Umdifferenzierung von Männchen in Weibchen.
22. Hoffmann, C. K. 1886. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 44. Zur Entwicklungsgeschichte der Urogenitalorgane bei *Anamnia*.
23. Hoepke, H. 1922. Zeitschr. f. Anat. und Entwickl. Bd. 68. Das Biddersche Organ von *Bufo vulgaris*, L.
24. Derselbe. 1924. Zeitschr. f. Anat. und Entwickl. Bd. 71. Der Begriff und Einteilung des Hermaphroditismus.
25. Ikeda, S. 1896. The zool. magazine in Tokio. Vol. 8. Hermaphroditism in Japanese toads.
26. Derselbe. 1896. Ditto. On the development of Bidder's organ.
27. Jacobson, D. 1828. Tredje Deel. Det Conlige Danske Videns Kabernes Selskabs Naturvidenskabelige og matematiske Afhandlinger.
28. Derselbe. 1842. Foerhandlinger vid Skandinaviske Naturforskarnes tredje Moete i Stockholm.
29. King, H. D. 1908. Journ. of Morphology. Vol. 19. The structure and development of Bidder's organ in *Bufo lentiginosus*.
30. Derselbe. 1910. Amer. jour. anat. Vol. 10. Some anomalies in the genital organs of *B. lentiginosus* and their probable significance.
31. Knappe, E. 1886. Morphol. Jahrb. Bd. 11. Das Biddersche Organ.
32. Leydig, F. 1853. Berlin. Anatomische und histologische Untersuchungen über Fische und Reptilien.
33. Derselbe. 1888. Zool. Jahrb. Bd. 11. Beiträge zur Kenntnis des tierischen Eies im unbefruchteten Zustande.
34. Marshall, A. M. Journ. of anat. and physiol. Vol. 18. On certain abnormal conditions of the reproductive organs in the frog.
35. Nussbaum, M. 1880. Arch. mikr. Anat. Bd. 18. Zur Differenzierung des Geschlechts im Tierreich.
36. Ognew, S. J. 1908. Arch. mikr. Anat. Bd. 71. Materien zur Histologie des Bidderschen Organs der Kröten.
37. Policard. 1900. Compt. rend. des se'ances et memoirs de la soc. biol. Re'un. Notes sur effects de l'ablation de la greffe de l'organe de Bidder du Crapaud.

38. Ponse, K. 1923. Compt. rend. 89. Pontes au effects de l'ablation de la greffe de l'organe de Bidder d'un Crapaud male feminine.
 39. Derselbe. 1924. Revue de Suisse. L'organe de Bidder et de determinatisme des caracteres sexuels second. du Crapaud, B. vulg., L.
 40. Rathke, H. 1825. Beiträge zur Geschichte der Tierwelt. III. Abt. Bd. 4. H. 4.
 41. Rössel von Rosenhof. 1758. Historia naturalis ranarum.
 42. Spengel, J. W. 1876. Arbeiten an dem zool.-zootom. Institut in Würzburg. Das Urogenitalsystem der Amphibien.
 43. Derselbe. 1884. Biol. Zentralb. Bd. 4. Zwitterbildung bei Amphibien.
 44. St. George von la Valett. 1874. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 10. Über die Genese der Samenkörper.
 45. Stohler, E. 1928. Zeitschr. Zellf. und mikr. Anat. Bd. 7. Zytologische Untersuchungen an den Keimdrüsen mitteleuropäischer Kröten (*B. viridis*, *B. calamita*, *B. vulgaris*).
 46. Subba Rau. 1923. Journ. of Royal micros. society. London. Notes on the distribution, morphology and cytology of the organ of Bidder.
 47. Taguchi, T. 1925. Folia Anatomica Japonica. Bd. 3. H. 3. Über das Biddersche Organ. I. Mitteilung.
 48. Takahashi, N. 1919. Mitteil. a. d. med. Fakul. d. Kaiserl. Universität Tokio. Bd. 22. Über die Geschlechtsdrüse der Wirbeltiere. I. Mitteilung. Biologische histologische und anatomische Studien der Keimdrüsen und des Bidderschen Organs bei *Bufo japonicus* (Schlegel).
 49. Walther, M. 1926. Zeitschr. f. Anat. u. Entwickl. Bd. 78. H. 1/2. Die Entwicklung des Bidderschen Organes von *Bufo vulgaris*.
 50. Wittich, V. 1853. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 4. Beiträge zur morpholog. und hist. Entwicklung der Harn- u. Geschlechtswerkzeuge der nackten Amphibien.
 51. Zeuner, G. 1922. Naturwiss. Wochenschr. Nr. 17. Das Biddersche Organ.
-

R. Takashima.