Über eine Substanz, welche die Schmidt-Lantermann- schen Einkerbungen ausfüllt.

Von

Futoshi Bitō.

Aus dem Anatomischen Institute der Medizinischen Fakultät, Okayama
(Vorstand: Prof. Dr. K. Kōsaka).

Mit 40 Figuren auf Tafeln XVI-XVII.

In Verbindung mit der Entdeckung mancher ausgezeichneten Methoden für die Nervenfärbung ist die mikroskopische Struktur der peripheren markhaltigen Nervenfasern durch zahlreiche Forscher nach und nach eingehender beschrieben worden. Was den feineren Aufbau der peripheren markhaltigen Nervenfasern betrifft, gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Wie Spielmeyer schon beschrieben hat, sind die Nervenfasern mehr oder weniger empfindlich gegen Fixiermittel. Infolge der physikalischen und chemischen Wirkung des Fixiermittels zeigen die Nervenfasern in ihrer fixierten Form immer ein mikroskopisch charakteristisches Bild, welches von dem normalen mehr oder weniger abweicht. Es ist schade, dass manche Forscher bei ihrer histologischen Untersuchung der Nervenfasern nur mit einem einzigen Fixierungsmittel sich zufrieden geben, ohne dessen Wirkung genau zu studieren, obgleich das mikroskopische Bild sehr viel von der Fixierungsmethode abhängig ist. Dagegen ist es auch nicht richtig, ein erst im fixierten Präparate an den Tag tretendes Bild ohne weiteres als Artefakt aufzufassen, weil es im lebenden Zustand unsichtbar ist. Eine von Hause aus vorhandene Struktur kann im lebenden Zustand verdeckt sein und nur mit Hilfe der Fixierungs- oder Färbungsmethode zu Gesicht kommen. Allerdings fällt die Frage schwer ins Gewicht, ob ein solches Bild im fixierten Präparate ein künstliches oder natürliches ist. Um sie richtig zu beurteilen, muss man in erster Linie die Wirkungsweise der angewendeten Reagenzien genau studieren.

Hennig hat die Nerven vieler Tiere mit verschiedenen Härtungsmethoden untersucht und hält die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen für Kunstprodukte aus folgenden Gründen :

- 1) ihrem vollständigen Fehlen beim Hund, Schaf, Schwein, Kaninchen und Hecht ;
- 2) ihrem vollständigen Fehlen an vielen Nervenfasern von Tauben, Fröschen, Menschen und Ratten ;
- 3) ihrem plötzlichen Verschwinden in den Nervenfasern (Tauben, Frosch, Mensch und Ratte), die eine Strecke weit sie sehr deutlich zeigen ;
- 4) ihrer Unsichtbarkeit an lebenden Nervenfasern ;
- 5) der ganz unbestimmten Länge ihrer Entfernung ;
- 6) der grossen Unregelmässigkeit ihrer Form, Grösse und Richtung.

Nach H.D. Schmidt sollen die Einkerbungen postmortale Faltungen der Markscheide vorstellen.

Toel, der bei Tieren und Menschen mit Osmiumsäure fixierte Nervenfasern untersuchte, konnte überhaupt keine Einkerbungen finden, im Gegensatz zu anderen Forschern, die die Osmiumsäure für ein geeignetes Mittel halten um dieses Gebilde zu sehen. Er nimmt daher an, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen Artefakte seien.

Rawitz, der in seiner Untersuchung sehr verschiedene Reagenzien benützte, ist der Meinung, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen nichts anderes als Schrumpferscheinungen darstellen. So fasst er sie als Falten der Schwannschen Scheide auf, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, dass sie sich mit Fuchsin färben.

Hesse entmarkte die Nervenfasern unter dem Mikroskop durch Wasserzusatz und verfolgte die einzelnen Vorgänge bis zur vollständigen Entleerung der Schwannschen Scheide.

Obschon er auf die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen grosse Aufmerksamkeit richtete, so hat er doch niemals beobachten können, dass sich dem strömenden Mark (innerhalb der Schwannschen Scheide) Widerstände der Art entgegengestellt hätten, wie man sie hätte annehmen müssen, wenn ein Balkengerüst von der Schwannschen Scheide her zum Achsenzylinder ausgespannt wäre.

Joseph glaubt, dass ein an seinen mit Osmiumsäure gehärteten Präparaten hervortretendes Balkenwerk nicht präformiert sei und stellt die Frage, ob vielleicht in dem Markmantel neben dem Fette eine andere Substanz vorkäme, welche unter der Wirkung verschiedener Agentien uns unter dem Bilde eines Balkenwerkes zu Gesichte käme.

Kölliker sagt, dass die Schmidt-Lantermannschen Einker-

bungen nichts anderes als Kunstprodukte seien, welche immer durch die Härtingsflüssigkeiten hervorgebracht werden.

Nach Wynn dürften die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen wohl Risse in der Marksubstanz zwischen den Kegeln sein.

Auch Bolton glaubt, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen nur künstliche Risse der Marksegmente darstellen.

Ebenso hält Früst die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen für Kunstprodukte, welche nur durch die Wirkung der Reagenzien zu Tage treten.

Nach Flatau sollen die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen nur Artefakte sein, welche nach dem Tod der Nervenfasern auftreten.

Chio ist der Meinung, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen wahrscheinlich Kunstprodukte seien.

Im Gegensatz hierzu glauben andere zahlreiche Arbeiter, z. B. Lantermann, Boll, Pelizzi, Rumpf, Rezzonico, Golgi, Ceni, Mendino, Cathani, Firelli, Margenghi, Villa, Pertik, Johansen, Ranvier, Kuhnt, Boveri, Jacobi, Koch, Engelken, Schieferdecker, Ramon y Cajal, Nemiloff, Nageotte u. a., dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen zu einer präformierten Struktur gehören, oder wenigstens, dass ihre Bildung auf gewisse präformierte morphologische Verhältnisse der Markscheide zurückzuführen ist. Doch beruhen ihre Behauptungen auf einfachen mikroskopischen Befunden, meistens an der Hand der fixierten Präparate, ohne jedoch einen stichhaltigen Grund anzugeben, welcher jedermann von der Richtigkeit ihrer Meinung überzeugen lässt.

In Betreff der Markscheidenstruktur der peripheren Nervenfasern herrscht heute folgende Meinung:

Die Markscheide besteht aus trichterförmigen Segmentstücken, welche sich aufeinander stülpen, wie man dies in einem Präparate der Markscheidenfärbung deutlich sehen kann (Doinikow, Murawieff, Spielmeyer, Torigata, Wynn u. a.). Die hellen lückenartigen Spalten zwischen ihnen sind von einer plasmatischen Substanz ausgefüllt, die sich tinktoriell wie das Myelo-axostroma verhält. Dieses Plasma trägt zur Unterstützung des Myelins bei, welches ausserdem von dem plasmatischen Wabenwerk der Schwannschen Zellen gehalten wird.

Zuweilen zeigen sich die obenerwähnten Marktrichtersegmente als fischflossenartige Gebilde, welche eine schwammige Struktur (Mark-spongiosa) besitzen.

Diese Erscheinung trifft man besonders an den dicken Nervenfasern,

dann an den mittelmässigen, während sie an den feinen Fasern fehlt.

Doch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die genannten trichterförmigen oder fischflossenartigen Marksegmente fast ausschliesslich durch Anwendung einer formalinhaltigen Fixierungsflüssigkeit an den Tag gebracht werden. Nach Formalinfixation treten die Gebilde deutlich auf.

Fast ausnahmslos zeigt käufliches Formalin (40% Formaldehyd CH_2O) eine schwache Säurereaktion, weil wegen der Verbindung mit O_2 aus der Luft die Ameisensäure CH_2O_2 in der Formalinlösung entsteht;

Um diese Säurewirkung zu vermeiden, lege ich immer ein Kreidestück einige Tage lang in das Gefäss, welches Formalin enthält, ehe ich es brauche.

Wenn man nun 10% ige Formalinlösung zu einem möglichst frisch zerzupften Nervenstück (Kaninchen, Hund, Maus und Frosch) hinzufügt und seine markhaltigen Fasern unter dem Mikroskop 6 Stunden hindurch vorsichtig untersucht, so erhält man folgenden Befund:

In erster Linie kommen mehrere helle, schräg zum Achsenzylinder gerichtete Streifen zum Vorschein, an Stelle der Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen, die intra vitam sehr schwer sichtbar sind. Dann vergrössern sich diese Streifen mit der Zeit immer mehr. Gleichzeitig wird jedes Marksegmentstück zwischen den Streifen durch diese stark verdrängt, hauptsächlich entlang der Längsachse der Nervenfasern, um sich endlich zu einem trichterförmigen oder fischflossenartigen Gebilde zu verkleinern. Natürlich muss der Druck in den sich vergrössernden Streifen gleichmässig nach jeder Richtung wirken, damit an diesen Stellen die Schwannsche Scheide sich etwas nach aussen ausdehnt und der Achsenzylinder sich leicht bogenförmig vertieft (Fig. 1—Fig. 5).

Bei den dickeren Nervenfasern zeigt jedes Marksegmentstück immer eine breite fischflossenartige Umformung, ohne einen schmalen Trichter zu bilden, da das Myelin in der Mitte des Marksegmentstückes durch von aussen hinein diffundiertes Formalin vollständig gefällt wird, ehe die quellenden Einkerbungen darauf ihre Druckwirkung ausüben.

Nun gehe ich zur Beschreibung des Befundes, welchen mit Formalin fixierte und dann gefärbte Präparate zeigen.

Zuerst beschäftige ich mich mit der Markscheidenfärbung nach Scarpatetti. Wie bekannt sieht man hier in einem Marksegment mehrere schwarzblau gefärbte, aufeinander gestülpte trichterförmige oder fischflossenartige Bilder. Bei der dickeren Nervenfasern färben sich beide an die gequollene Einkerbung grenzenden Markstückränder am stärksten

schwarzbläulich, und zeigen an und für sich schmale trichterartige Gebilde. Diese Erscheinung ist darauf zurückzuführen, dass das Myelin hier besonders stark gedrückt wird und infolgedessen eine dichtere Schicht bildet, welche sich nach der Färbung nicht leicht entfärben lässt. Dieses intensiv gefärbte trichterförmige Gebilde verlängert sich bogenförmig an der Innenfläche der Schwannschen Scheide entlang, indem seine Konkavität gegen die gequollene Einkerbung gerichtet ist, so dass ein Täuschungsbild entsteht, als ob achsoplasmatische Fortsätze vom Achsenzylinder nach der inneren Seite der Schwannschen Scheide hin wüchsen, wie einige Autoren auch irrtümlicherweise annehmen (Fig. 6). Selbstverständlich färben sich weder die innere Seite der Schwannschen Scheide noch die Oberfläche des Achsenzylinders durch die Markscheidenfärbung, sofern als keine Marksubstanz an diesen Stellen übrig bleibt. Dagegen sieht man den gequollenen Einkerbungen entsprechend eine leichte Bauschung der Schwannschen Scheide, und eine geringe Vertiefung des Achsenzylinders, was ohne Zweifel auf der Druckwirkung beruht. Anderseits dort, wo das Myelinstück der gequollenen Einkerbung seine Konvexität zuwendet, verlängert sich seine dichte und daher intensiv gefärbte Schicht von der Innenfläche der Schwannschen Scheide nach dem Achsenzylinder trichterartig und umhüllt dann diesen mehr oder weniger (Fig. 6).

Die Trichterbildung ist hier vollständiger als an dem konkaven Rand. Es hat den Anschein, als ob Plasmafasern von der Schwannschen Scheide zum Achsenzylinder übergehen, wie Spielmeyer u. a. hervorheben, was natürlich nur Täuschung ist.

Zwischen diesen konkaven und konvexen, dichten Markrändern bleibt eine lockere, weniger gefärbte Markschieht, welche die sog. Markspongiosa, eine wabige Struktur, enthält. Nach Spielmeyer stellt diese Spongiosa ein feines plasmatisches Wabenwerk dar, welche der Schwannschen Zelle entspringend durch die Markscheide hindurchzieht. Ich halte aber für wahrscheinlich, dass dieses Wabenwerk mit dem Neurokeratinnetz von Ewald und Kühne identisch ist. In dieser lockeren Markschieht zeigt der Achsenzylinder eine leicht gelbliche Farbe im Gegensatz zur Höhe der gequollenen Einkerbung, wo er stärker gedrückt und mit einer dünnen Schicht dichter Myelinsubstanz bedeckt intensiv schwarzblau gefärbt ist (Fig. 6).

Das obengenannte gilt nur für die dicken Nervenfasern, bei den feinen Fasern sind die Markstücke nicht so kompliziert geformt wie bei jenen, sondern sie zeigen alle typische schmale Trichter, welche mit Intervallen der hellen gequollenen Einkerbungen auseinander liegen,

ohne jedoch immer eine parallele Richtung zu nehmen (Fig. 7).

Selbstverständlich zeigt das Marksegment in den mittelmässigen Nervenfasern eine Übergangsform zwischen den beiden genannten. Auch bei anderer Färbung, z. B. Malloryscher Färbung, sind die obenerwähnten Verhältnisse im Marksegment völlig dieselben, sodass die Marksubstanz, die in der Markscheidenfärbung jederzeit positiv ausfällt, mit Säurefuchsin rötlich gefärbt zum Vorschein kommt, und zwar ist die Intensität der Färbung immer der Dichtigkeit der Substanz proportional.

Dasselbe gilt auch für den Achsenzylinder, indem derselbe in der Höhe der gequollenen Einkerbung stark rot erscheint, während der dazwischen liegende Teil mit Anilinblau leicht bläulich gefärbt ist. Etwas bläulicher zeigt sich die Schwannsche Scheide, welche für Anilinblau eine gewisse Affinität hat.

Aus dem gesagten geht schon hervor, dass die Schmidt-Lantermannsche Einkerbung keinesweges ein Artefakt ist, sondern eine wirkliche Unterbrechung des Marks darstellt. In dieser Unterbrechung findet sich jedoch eine Substanz, welche durch eine 0.4–19% ige Formalinlösung zum Aufquellen gebracht wird. Um diese Tatsache zu erweisen, gibt es noch andere Gründe, wovon später die Rede sein wird. Leider hat man bisher die Einwirkung des Fixiermittels allzu wenig berücksichtigt, um den feinen Bau der markhaltigen Nervenfasern zu studieren. Soweit ich weiss, nehmen alle Autoren an, dass die trichterförmigen oder fischflossenartigen Bilder des Marksegmentes eine normale Struktur darstellen, während sie nichts anderes als Umformungsbilder der Marksegmentstücke sind, welche durch die stark gequollenen Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen zu solchen Formen gedrückt worden sind.

Bei der Einführung des Formaldehyds in die mikroskopische Technik empfahl Blum zuerst die Anwendung einer 4%igen wässrigen Lösung (10%iges Formalin). Seine Ansicht stützte sich auf eine vergleichende Betrachtung des makroskopischen und mikroskopischen Befundes der Organstücke, die mit wässrigen Lösungen von 0.4–40% igem Formaldehyd behandelt waren. Dabei sollen die dünneren Lösungen eine Volumzunahme der Organstücke hervorgerufen haben.

Auch nach Parker und Floyd soll das Gehirn bei der Behandlung mit schwächerem Formalin (2%) eine Volumzunahme erfahren.

Ebenso nach Hoyer muss man bei der Fixation mit Formaldehyd eine konzentrierte Lösung anwenden, weil seine schwächeren Lösungen eine Quellung des Protoplasmas der Zellen hervorrufen.

Sjöbring benützt zum Fixieren das Formol als eine vierfach mit dest. Wasser verdünnte Lösung, denn er hält diese Konzentration für eine isotonische mit dem Protoplasma der Säugetiere.

Dagegen konnte Reimer gar keinen Unterschied zwischen 4 und 10%iger Formalinlösung finden, indem er die Wirkung beider Lösungen auf das Gewebe verglich.

Nach Mayer spielt die Isotonie der Formalinlösungen mit dem Gewebssaft bei dem Fixieren die grösste Rolle.

Nach einer späteren Untersuchung von Blum soll dagegen die Isotonie der Lösung für den histologischen Fixierungszweck der Säugertiergewebe keine allzugrosse Rolle spielen, vielmehr sei eine 4%ige Formaldehydlösung im allgemeinen ausreichend.

Kenyon hält schwache Formalinlösungen (1–2%) für wichtig, weil sie sonst nicht deutlich sichtbare Zellen zur Schwellung bringen und dadurch in die Augen springen lassen.

Nach Bang und Sjövall sollen die Mitochondrien der Leberzellen in einer anisotonischen Formalinlösung eine Formveränderung erfahren, und zwar durch eine hypertonische oder hypotonische Wirkung der angewendeten Lösung.

Auch Lewis macht darauf aufmerksam, dass die Mitochondrien der hyper- oder hypotonischen Wirkung der Formalinlösung unterworfen werden können, ehe eine Veränderung des Zytoplasmas auftritt.

Um die Quellung oder Schrumpfung der Chromosomen (in den Leberzellen des Kaninchens und Frosches) durch Formalinlösungen zu vermeiden, fügt Anitschkow Kochsalz im Verhältnis von 0.5 Prozent zu den Lösungen hinzu.

Ebenso hat Carleton den Zusatz von Kochsalz empfohlen, um eine mit dem Gewebssaft isotonische Formalinlösung herzustellen (bei der Fixation von Niere, Leber und Darm der Katze und des Frosches).

Nach Lachi sollen die dünneren Formalinlösungen (1–2%) eine schädliche Wirkung haben, besonders für die Grundsubstanz des Bindegewebes, anderseits sagt Gerota, dass die dünneren Formalinlösungen (1–10%) keine ungünstige Einwirkung auf die histologischen Elemente ausüben, während die dickeren Formalinlösungen (20–25%) eine Veränderung der Gewebszellen verursachen.

Auch hat Loew gesagt, dass die Zellkerne sich in 1%igem Formalin in einer Stunde stark deformieren, nämlich zu flachen Scheiben.

Flatau sagt, dass das Zentralnervensystem in Formalinlösungen um so mehr an Gewicht zunimmt, je verdünnter sie sind.

Alles in allem unterliegt es keinem Zweifel, dass die dünneren

Formalinlösungen (1-2%) im allgemeinen eine Quellung des Gewebs-eiweisses hervorrufen, obwohl die Frage offen bleibt, ob diese Quellung einfach auf der Hypotonie der Formalinlösungen beruht. Nun gehe ich auf meine eigentliche Frage ein, welche Beziehung zwischen der Konzentration der Formalinlösungen und dem Quellungsgrade der Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen besteht.

In erster Linie untersuchte ich diese Frage an frischen peripheren markhaltigen Nervenfasern, indem ich sie auf dem Objektglas zerzupfte und dazu verschiedene Formalinlösungen hinzufügte, um ihre Veränderung unter dem Mikroskop 3-6 Stunden hindurch vorsichtig zu beobachten. Das Ergebnis ist wie folgt.

0.1-0.3% ige Formalinlösungen üben fast keinen nennenswerten Einfluss auf die Einkerbungen aus, so dass diese Stellen schwer sichtbar bleiben. Wenn man aber 0.4-2%ige Formalinlösungen braucht, so sieht man, dass die Einkerbungen als hellere, schräg zum Achsenzylinder ziehende Streifen, deren Breite übrigens von der Konzentration der Lösungen abhängt, auftreten, weil die diese Stellen ausfüllende Substanz durch die Lösungen mehr oder weniger einer Quellung unterworfen ist (Fig. 9-13).

Von 3%iger Lösung aufwärts springt diese Quellungserscheinung sehr deutlich in die Augen, um endlich mit der 9%igen Lösung ihr Maximum zu erreichen (Fig. 15-20).

Kurz und gut, das Formalin lässt in 0.4-9%igen Lösungen die die Einkerbungen ausfüllende Substanz aufquellen, und zwar um so mehr, je stärker die Konzentration der Lösung ist.

Über 10 Prozent hinaus nimmt dagegen diese Eigenschaft der Lösung mit ihrer Konzentration allmählich ab, um endlich in der 20%igen Lösung ganz zu verschwinden, so dass gar keine Aufquellungserscheinung in dieser Konzentration auftritt (Fig. 21-31).

Bemerkenswert ist, dass alle Marksegmentstücke in den Zelloidin- oder Paraffinpräparaten, welche mit den dünneren (1-3%) Formalinlösungen fixiert worden sind, mehr oder weniger trichterförmige oder fischflossenartige Bilder zeigen, während diese im frischen Material trotz Zusatz derselben Formalinlösungen noch nicht auftreten. Doch liegt es auf der Hand, dass die Entstehung der genannten Bilder nicht bloss auf die Einwirkung des Formalins zurückzuführen ist, so lange die Konzentration der betreffenden Lösung nicht hinreichend stark ist.

Um zu sehen, welche Rolle der Alkohol dabei spielt, untersuchte ich die Wirkung dieses Reagens unter dem Mikroskop, indem ich die mit Formalinlösungen verschiedener Konzentration fixierten Nervenfasern

auf den Objektträger legte und mit Alkohol verschiedener Stärke behandelte.

Es ergibt sich, dass die Marksegmentstücke der mit dünneren (unter 2%) Formalinlösungen behandelten Nervenfasern mehr der hygroscopischen Wirkung des Alkohols unterworfen sind als die der mit konzentrierteren Formalinlösungen behandelten, so dass jedes Marksegmentstück immer eine unvollständige trichter- oder fischflossenartige Gestalt zeigt. Je stärker die Formalinkonzentration ist, desto geringer ist die Schrumpfung des Marksegmentstückes.

Andererseits tritt diese Schrumpferscheinung nur dann deutlich auf, wenn man stärkeren Alkohol als 70%igen braucht, während schwacher Alkohol unter 60% nur geringen Einfluss ausübt. Nach meiner Erfahrung fällt die weisse Substanz des Kaninchengehirns durch über 70%igen Alkohol augenblicklich, während dies bei unter 60%igem Alkohol nicht der Fall ist.

Auf Grund dieser Tatsachen glaube ich, dass Myelin resp. Marksegment durch dünnere Formalinlösungen nur unvollständig fixiert wird, und erst dann stark einschrumpft, wenn es mit starkem Alkohol nachbehandelt wird.

Wie oben erwähnt, spielt die Konzentration des Formalins eine grosse Rolle für die Quellung der Substanz in der Schmidt-Lantermannschen Einkerbung und infolgedessen fällt der Effekt der Nachbehandlung mit Alkohol sehr verschieden aus.

Doch möchte ich einstweilen über die Wirkung einiger anderer Reagenzien sprechen, ehe ich auf die Wirkungsweise des Formalins genauer eingehe. Anstatt des Formalins liess ich verschiedene Säure- oder Alkalilösungen auf die frischen peripheren markhaltigen Nervenfasern einwirken und untersuchte die Folgeerscheinung unter dem Mikroskop durch 3–6 Stunden hindurch. Im allgemeinen quillt die Substanz in der Schmidt-Lantermannschen Einkerbung durch die Wirkung der dünneren Säure- oder Alkalilösungen, während eine starke Lösung gar keine Quellungserscheinung zur Folge hat, obwohl auch zu schwache Lösungen wirkungslos sind.

Was den Quellungsgrad anbetrifft, so wirken verschiedene Reagenzien in folgender Reihe :

In der nächsten Tabelle zeigt die Zahl der Plus-Zeichen den Quellungsgrad der Substanz in der Einkerbung, so dass 0.1%ige Ameisensäurelösung am stärksten wirkt, während das Minus-Zeichen gar keine Quellung bedeutet.

	0.001%	0.01%	0.1%	1%	5%	10%	20%	40%
CH ₂ O ₂	—	++	+++	+	—	—	—	—
CH ₃ COOH	—	+	++	—	—	—	—	—
H NO ₃	—	+	++	—	—	—	—	—
HCl	—	++	+	—	—	—	—	—
KOH	+	+	—	—	—	—	—	—
NaOH	+	+	—	—	—	—	—	—

Aus dieser Tabelle sieht man, dass die Ameisensäurelösung über 1% oder unter 0.01% nicht mehr quellend wirkt, während dies für Essig-, Salpeter- und Salzsäurelösung über 0.1% oder unter 0.01% gilt, obwohl ihre maximale Wirkung bei den ersteren zwei in 0.1%iger, bei der letzteren in 0.01% iger Lösung zum Vorschein kommt (Fig. 32–34).

KOH und NaOH wirken zu 0.01% am stärksten (Fig. 35), während ihre Lösung über 0.1% oder unter 0.001% ganz wirkungslos ist. Verglichen mit Formalin tritt jedoch die genannte Wirkung der Säuren und Alkalien bei weitem in den Hintergrund.

Übrigens bestätigen alle diese Tatsachen das Vorhandensein einer Substanz, welche die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen ausfüllt.

Es fragt sich, ob alle markhaltigen Nervenfasern sich mit den Einkerbungen ausrüsten. Nach Spielmeyer vermisst man diese im intramedullären Teil der Rückenmarkswurzeln und in den markhaltigen Fasersystemen des Zentralorgans. Um diese Frage an der Hand der Formalinpräparate klar zu entscheiden, untersuchte ich die weisse Substanz des zentralen Organs und den Nervus opticus, wo überall bekanntlich markhaltige Nervenfasern ohne Schwannsche Scheide vorhanden sind, indem ich das Material mit 10%igem Formalin fixierte. Zum Vergleiche kamen auch sympathische Nervenfasern in Betracht. Dabei ergab sich, dass weder Einkerbungen noch trichter- resp. fischflossenartige Marksegmente zu sehen sind.

Auf Grund dieser Tatsache bin ich fest überzeugt, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen nur für die peripherischen markhaltigen mit Schwannscher Scheide versehenen Nervenfasern eine charakteristische Einrichtung darstellen, während sie in den markhaltigen Nervenfasern ohne Schwannsche Scheide nicht vorhanden sind, wie in den sympathischen Fasern, denn sonst müssten sie wegen

der quellenden Wirkung der 10%igen Formalinlösung überall zum Vorschein kommen.

Nun gehe ich auf die Frage ein, wie die genannte Wirkung der 9%igen Formalinlösung durch den Zusatz eines neutralen Salzes z.B. des Kochsalzes beeinflusst wird.

In dieser Beziehung finde ich die interessante Tatsache, dass Kochsalz gegen die Quellung der Substanz in den Einkerbungen durch 9%ige Formalinlösung immer hemmend wirkt.

Wenn man Kochsalz zu der 9%igen Formalinlösung im Verhältnis von 1.1 Prozent oder darüber hinzufügt, so vermag dieses Gemisch die genannte Quellungserscheinung gar nicht mehr hervorzurufen, so dass in diesem Fall die Wirkung der 9%igen Formalinlösung durch Kochsalz vollständig gehemmt wird. Bei der Mischung, welche weniger als 1 Prozent Kochsalz enthält, tritt die Formalinwirkung mehr oder weniger auf, und zwar um so stärker, je schwächer die Konzentration des Kochsalzes ist (Fig. 36–38).

Dasselbe gilt auch für die Wirkung der Säuren und Alkalien, welche bei Zusatz von Kochsalz je nach der Konzentration des letzteren mehr oder weniger vermindert wird.

Viele Nervenforscher glauben, auf Befunde in fixierten Präparaten sich stützend, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen wahrscheinlich die plasmatischen Bestandteile der Schwannschen Zellen enthalten. Nach Kaplan sollen die Einkerbungen ausfüllenden Zwischentrichter sich bei Achsenzylinderfärbung auch intensiv in derselben Nuance wie die Achsenzylinder färben. Nageotte fand eine mitochondriale Granulation in der Membran an den Einkerbungen nach Fixierung mit Kalibichromat-Essigsäure. Nach Michotte soll eine besondere, mit Silber tingierbare Substanz in den Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen vorhanden sein.

Meine oben erwähnten Befunde decken sich merkwürdigerweise in vollem Umfang mit dem bekannten Quellungsverhalten der Proteinkolloide gegen die genannten Reagenzien, welches von zahlreichen Forschern wie Fischer, Moore, Spiro, Ostwald, Procter, Loeb, Bottazzi, Scalinci u.s.f. an Gelatin, Fibrin, Muskeln und Augäpfeln untersucht worden ist. Angesichts dieser Tatsache drängt sich mir unwillkürlich der Gedanke auf, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen ausfüllende und durch Formalin, Säuren und Alkalien aufquellende Substanz nichts anderes als ein Eiweisskörper ist.

Es fragt sich erstens, warum Formalin-, Säure- und Alkalilösungen nur in einem Rahmen gewisser Konzentration die Substanz in den

Einkerbungen aufquellen lassen, und zweitens warum ihre quellungsfördernde Wirkung durch den Zusatz von neutralem Salz gehemmt wird. Diese Frage halte ich für eine leicht lösliche, da die Substanz nichts anderes als eines der Proteinkolloide ist.

Nach Hofmeister sind drei verschiedene Vorgänge, welche allerdings oft nebeneinander stattfinden, bei der Quellung streng auseinander zu halten.

1. Die kapilläre Imbibition, die Aufnahme von Flüssigkeit durch eine poröse Masse mit vorgebildeten, nach aussen offenen, daher meist mit Luft gefüllten Hohlräumen.

2. Die endosmotische Imbibition, die Flüssigkeitsaufnahme einer porösen Masse in vorgebildete, aber abgeschlossene und mit löslichen Stoffen oder Flüssigkeit gefüllte Hohlräume durch Osmose. Diese Form der Quellung liegt bei allen organischen Geweben vor, welche sich aus mit durchlässigen Membranen abgeschlossenen Elementen zusammensetzen.

3. Die molekulare Imbibition oder die echte Quellung, die Flüssigkeitsaufnahme einer porenfreien, homogenen Masse, z.B. die Flüssigkeitsaufnahme von Leim, pflanzlichen und tierischen Schleimarten, unlöslichen Eiweisstoffen usw.

Von diesen drei Formen der Imbibition erfolgt nach Hofmeister die kapilläre nach den Gesetzen der Oberflächenspannung, die endosmotische nach den Gesetzen der Osmose, während die molekulare, echte Quellung einen Vorgang eigener Art darstellt, der den sog. Adsorptionsvorgängen anzureihen ist.

Es ist klar, dass die Quellung der Substanz in den Einkerbungen mit der kapillären Imbibition nichts zu tun hat. Auch die endosmotische Imbibition spielt dabei keine Rolle, da die Quellung der Substanz von dem osmotischen Druck der Lösungen unabhängig stattfindet.

So bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als die molekulare Imbibition in Betracht zu ziehen.

Was diese molekulare Imbibition betrifft, so haben Pauli, Handowsky, Schorr, Wagner u.a. eine rein chemische Deutung gegeben und zahlreiche Belege für die Richtigkeit dieser Auffassung erbracht.

Auf Grund der Theorie von Pauli-Handowsky schlägt Bauer vor, die Quellung als gesteigerte Hydratation, vermehrte Bindung von Hydratwasser zu erklären. Er sagt:

„In reinem Zustand dissoziiert Eiweiss bekanntlich nur minimal, d.h. es besteht grösstenteils aus elektrisch neutralen Teilchen; mit Säuren oder Alkalien versetzt, bildet es hingegen reichlich elektrone-

gative oder elektropositive Ionen. Diese Tatsache folgt aus der Aminosäurestruktur des Eiweisses. Das amphotere Eiweiss reagiert mit Säuren nach folgender Formel:

wobei das Säureeiweissmolekül dissoziiert in das elektropositive Eiweiss-

ion $\left(\begin{array}{c} \text{NH}_3 \\ \diagup \\ \text{R} \\ \diagdown \\ \text{COOH} \end{array} \right)^+$ und das elektronegative Cl^- .

Mit Alkalien reagiert Eiweiss folgendermassen:

wobei das Alkalieiweissmolekül dissoziiert in das elektronegative Eiweiss-

ion $\left(\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \diagup \\ \text{R} \\ \diagdown \\ \text{COO} \end{array} \right)^-$ und das elektropositive Na^+ .

Nun sind gerade diese dissoziierten Eiweissionen den elektrisch neutralen Molekülen gegenüber viel stärker hydratisiert, ähnlich überhaupt den Ionen in kristalloiden Lösungen.

Weiter sagt er: „Die Steigerung der Hydratation prägt sich aus in einem bedeutenden Anstieg der inneren Reibung (v. Schröder, Pauli und Handowsky) und in einer Hemmung aller dehydrierenden Einflüsse, wie Alkoholfällung oder Hitzekoagulation (Schorr, Procter). Hydratation bedeutet aber, wenn ein Sol fest ist, nichts anderes als Quellung. Daher wird sich die Ionisation eines festen Sols durch Säure- oder Alkalizusatz in einer Quellungszunahme äussern, wie wir dies bei den Untersuchungen von Spiro, Ostwald, Fischer u.s.f. bereits kennen gelernt haben.“

„Die verschiedene Wirkung der einzelnen Säuren hängt von der Zahl der entstehenden Eiweissionen ab. Dass bei Zusatz starker Säuren ein Maximum der inneren Reibung von Eiweisslösungen (Pauli-Handowsky) resp. ein Maximum der Quellung fester Eiweisskörper erreicht wird, kommt daher, dass schliesslich eine Zurückdrängung der Ionisation der Säureeiweissmoleküle stattfindet; denn fortgesetzte Zugabe von HCl z.B. wird durch die Vermehrung der mit dem Eiweissmoleküle gemein-

samen Cl-Ionen die Dissoziation des Säureeiweissmoleküls rückgängig machen und die Bildung elektrisch neutraler Moleküle, die eben wenig Wasser zu binden imstande sind, verursachen.“

„Die quellungshemmende Wirkung von Neutralsalzen auf Säureeiweiss beruht ebenfalls auf der Zurückdrängung der elektrolytischen Dissoziation und Bildung weniger hydratisierter undissoziierter Moleküle. Nach Pauli und Handowsky gestaltet sich die Reaktion der Neutralsalze mit Säureeiweiss folgendermassen :

die Moleküle $\text{R} \begin{array}{l} \text{NH}_3\text{Cl} \\ \text{COONa} \end{array}$ werden aber wegen der gleichzeitig wirksamen entgegengesetzten Ionisierungstendenz – die Moleküle sind gleichzeitig Säure- und Alkalieiweiss und sollten daher gleichzeitig elektronegative und elektropositive Eiweissionen abdissoziieren – zum grössten Teil in neutraler Form bestehen bleiben.“

Vorausgesetzt, dass die oben angeführte Meinung von Bauer zu recht besteht, will ich mich darauf einlassen, welche Rolle die Formalinlösungen bei der Quellung der Substanz in den Einkerbungen spielen.

Bekanntlich färben sich die Marksegmentstücke durch die Reduktionswirkung der Osmiumsäure schwarz, während die Einkerbungen dabei ungefärbt bleiben. Diese Tatsache springt in die Augen, wenn man ein Gemisch von Osmiumsäure und 10%iger Formalinlösung anwendet (Fig. 39). Durch diese Lösung, welche Osmiumsäure im Verhältnis von 1 Prozent enthält, zerfällt jedes Marksegment in mehrere schwarzgefärbte, trichterförmig ineinander gestülpte Stücke, während die dazwischen liegenden gequollenen Einkerbungen als fast ungefärbte helle Stellen deutlich zum Vorschein kommen.

Daher glaube ich, dass die Einkerbungen mit einer an Sauerstoff reichen und daher oxydierend wirkenden Eiweisssubstanz ausgefüllt sein müssen.

Wenn man anderseits auch die zerzupften Nervenfasern, die in der dünneren Formalinlösung 3–6 Stunden eingetaucht worden sind, auf dem Objektträger direkt mit NH_4OH einige Minuten lang behandelt, so wird Formaldehyd in den Nervenfasern wegen der chemischen Verbindung mit NH_4OH Hexamethylentetramin bilden. Der Vorgang ist wie folgt :

Durch Anwendung der Jod-Jodkalilösung (Jod 1 g, Jodkali 1 g, dest. Wasser 100 ccm) auf so behandelte Nervenfasern bekommt man das Jodoformin $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4\text{J}_2$, welches sich unter dem Mikroskop als gelbbraunen, kristallinischen Niederschlag in den Nervenfasern erkennen lässt. Allerdings habe ich diese Kristalle nur in den Marksegmentstücken und Achsenzylindern massenhaft gefunden, während die gequollenen Einkerbungen fast frei von ihnen sind (Fig. 40). Die letztere Tatsache bedeutet nichts anderes als Abwesenheit des Formaldehyds in den Einkerbungen, was aber nicht erlaubt, die Undurchdringlichkeit des Reagens in den betreffenden Stellen vorauszusetzen. Viel mehr bin ich der Meinung, dass das hier eindringende Formalin sich sofort durch den oxydierend wirkenden Eiweissstoff in Ameisensäure verwandelt. Dank dieser Ameisensäure wird der Eiweisskörper in Quellung gebracht, wie es M. Fischer an der Gelatinplatte experimentell beweist.

Wie oben erwähnt, dissoziieren die Eiweissmoleküle durch die Wirkung der Salzsäure in elektronegative Chlorionen und elektropositive Eiweissionen, welche ihrerseits stark hydratisiert zur Quellung Anlass geben. Dieser Vorgang wird aber durch Anwendung zu starker Säure wieder rückgängig, wovon auch schon früher die Rede gewesen ist. Gerade darauf beruht die Tatsache, dass eine Quellungserscheinung beim Applizieren zu starker Formalinlösung ausbleibt, weil die in den Einkerbungen gebildete Ameisensäure ihrer starken Konzentration entsprechend mehr entquellend wirkt. Dasselbe gilt auch für den Fall, wo Kochsalz zur Formalinlösung hinzugefügt wurde.

Aus den Untersuchungen von Höber, Porges, Neubauer, Handowsky, Wagner u.a. ergibt sich, dass Säuren, Laugen und Salze die Quellbarkeit des Lecithins herabsetzen. Im Einklang mit diesem Befunde steht meine Beobachtung, dass die Marksegmentstücke durch den Zusatz von Säuren, Alkalien und Formalin gar keine Quellung zeigen.

Carleton, Anitschkow u.a. haben den Zusatz von Kochsalz zur Formalinlösung empfohlen und sind der Meinung, dass sie dadurch die Lösung mit dem Gewebssaft isotonisch machen, und infolgedessen

die Quellung der Gewebsbestandteile vermeiden können. Meiner Meinung nach ist aber diese Anwendung des Kochsalzes vielmehr daher nützlich, dass das Kochsalz in diesem Falle gegen die Ameisensäure wirkt, welche ihrerseits durch die Oxydation des in die Gewebsbestandteile eingedrungenen Formalins gebildet wird, und die Ionisation der Eiweissmoleküle rückgängig machen kann.

Wie schon erwähnt, sind die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen eine Vorrichtung, welche sich nur in den peripheren markhaltigen Nervenfasern findet.

Engelken fasst die Schmidt-Lantermannschen Incisuren als accessorische Ernährungswege zum Achsenzylinder auf, und betrachtet die grössere oder geringere Deutlichkeit der Schmidt-Lantermannschen Incisuren sowie ihre Erweiterung unter einem physiologischen oder pathologischen Zustande als Folge des erhöhten Saftzuflusses zum Achsenzylinder.

Nach Schiefferdecker sollen die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen wahrscheinlich dem Durchtritt von Abscheidungsprodukten dienen. Ich bin der Meinung, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen zweifellos einen wichtigen Ernährungsapparat für die peripherischen mit der Schwannschen Scheide umhüllten markhaltigen Nervenfasern darstellen, weil sich da eine stark oxydierend wirkende Substanz findet. Andere Nervenfasern, wie die marklosen sympathischen Fasern und die markhaltigen Fasern ohne Schwannsche Scheide im Zentralorgane sind mit diesem Apparate nicht ausgerüstet, denn in diesen Nervenfasern kann der Ernährungssaft ohnehin leicht den Achsenzylinder erreichen.

Schluss.

1. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen keine Artefakte, sondern eine präformierte natürliche Vorrichtung darstellen, und zwar eine eigentümliche Struktur in den peripheren markhaltigen Nervenfasern.

2. Sie sind aber nicht vorhanden in anderen Nervenfasern, wie den markhaltigen Fasern im Zentralorgane und Sehnerven, sowie in den marklosen Nervenfasern.

3. Sie sind mit Eiweiss statt Lipoid ausgefüllt.

4. Diese Eiweisssubstanz hat eine starke Oxydationskraft.

5. Dank diesem Eiweiss verwandelt sich das in die Einkerbungen eindringende Formalin sofort in Ameisensäure.

6. Diese Ameisensäure erhöht die Ionisation der Säureeiweissmoleküle stark, und die Hydratation der Eiweissionen gibt zur Quellung der betreffenden Stellen Anlass.

7. Bei Anwendung der dickeren (über 10 Prozent) Formalinlösung bildet sich zu viel Ameisensäure in den Einkerbungen, so dass eine Zurückdrängung der Ionisation der Säureeiweissmoleküle stattfindet. Daher wird die Quellung in diesem Falle mehr oder weniger gehemmt, je nach der Konzentration des Formalins.

8. Die maximale Quellung der Einkerbungsstellen tritt bei Anwendung von 9%iger Formalinlösung auf.

9. Durch Zusatz von Kochsalz wird die Wirkung der Ameisensäure auf die Eiweissmoleküle gehemmt und infolgedessen tritt die Quellungserscheinung ganz in den Hintergrund.

10. Die trichterförmigen oder fischflossenartigen Bilder der Nervenfasern, die nach Formalinfixierung zum Vorschein kommen, sind auf eine Umformung der einzelnen Marksegmentstücke durch die Quellung der Einkerbungsstellen zurückzuführen.

11. Das in die Marksegmentstücke und Achsenzylinder diffundierte Formalin lässt sich mit der Hexamethylentetramin-Reaktion leicht mikroskopisch nachweisen.

12. Die Schmidt-Lantermannschen Einkerbungen dienen zur Ernährung der peripheren markhaltigen Nervenfasern, welche mit der Schwannschen Scheide umhüllt sind.

Zum Schlusse erfülle ich hier die angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. K. Kösaka für seine freundliche Leitung und Anregung meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Literatur.

- Anitschkow, Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 97. 1923.
Bang u. Sjövall, Beiträge z. pathol. Anatom. u. allg. Pathol. Bd. 62. 1916.
Bauer, Arbeit. aus d. Neurolog. Instit. Obersteiner. Bd. 19. 1912.
Bidder u. Volkmann, Die Selbständigkeit des sympathischen Nervensystems. 1842.
Blum, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. 10. 1893.
———, Münch. med. Woch. 1894.
———, Americ. Natur. Bd. 31. 1897.
———, Berl. Klin. Woch. Jahrg. 38. 1901.
Boll, Monatsberichte d. Berl. Academie. 1900.

- Bolton, Journ. Anatom. Physiolog. vol. 32.
- Bottazzi u. Scalinci, Rendic. della R. Accadem. dei Lincei classe di fisic. mathem. e nat. 18, Refer. in d. Kolloid-Zeitschr. Bd. 7.
- Boveri, Abhandl. d. mathem.-physiol. Klasse d. Königl. Bayer. Acad. d. Wissenschaften. Bd. 2. 1885.
- Capparelli, Arch. f. mikroskop. Anatom. Bd. 66. 1905.
- Carleton, Quart. Journ. mikr. Soc. vol. 66. 1922.
- Catani, Arch. ital. de biologie. T. 7. 1886.
- Cei, Atti d. R. Acad. dei Lincei. Ser. 3 vol. 9. 1880-1881.
- Chio, Arch. Ital. Biol. Turin. T. 41.
- Cossy u. Dejerine, Arch. Physiol. 1875.
- Doinikow, Histol. u. histopathol. Arb. über d. Grosshirnrinde mit bes. Berücks. d. pathol. Anatom. d. Geisteskr. Bd. 4. 1911.
- Eleschnig, Jahrbüch. f. Psychiatr. Bd. 23. 1903.
- Engelken, Ziegler's Beiträge z. pathol. Anat., Bd. 28.
- Ewald u. Kühne, Verhandl. naturhist. Vers. Heidelberg, N. F. Bd. 1. 1874.
- Engelmann. Pflügers Arch. Bd. 13. 1876.
- Fischer, Arch. f. Physiol., 1908-1909.
- u. Moore, The Americ. Journ. of Physiol. 20. 1907.
- Flatau, Anatom. u. Pathol. Anatom. Teil. Bd. 1.
- , Anatom. Anzeiger. Bd. 13. 1897.
- Früst, Schwalbes Morph. Arbeit. Bd. 4 H. 3.
- Gerlach, Verhandl. d. Naturforsch. in Cassel. 1878.
- Gerota, Internat. Monatschr. f. Anatom. u. Physiol. Bd. 8. 1896.
- Golgi, Arch. f. Anatom. u. Physiol. Vol. 4. 1880.
- Handowsky, Kolloidzeitschr., Bd. 7, 1910.
- u. Wagner, Biochem. Zeitschr. Bd. 31. 1911.
- Hannover, Recherches microsc. sur le syst. nerv. Copenhagen. 1844.
- Hennig, Inaug.-Diss. Königsberg. 1877.
- Hennle, Allgem. Anatom. 1841.
- Hesse, Arch. f. Anatom. u. Physiol. 1879.
- Höber, Physikal. Chem. d. Zelle u. d. Gewebe. 1906.
- , Pflügers Arch. f. Physiol. 1910.
- Hofmeister, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 27. 1890.
- , Ebenda Bd. 28. 1891.
- Hoyer, Verh. Anatom. Ges. Strassburg. 1894.
- , Anatom. Anzeiger. Bd. 9. 1894.
- Jacobi, Inaug.-Diss. Würzburg. 1886.
- Jannson, Arch. f. Anatom. u. Physiol. 1892.
- Joseph, Verhandl. d. physiol. Gesellsch. z. Berlin. 1888.
- Kaplan, Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Berlin. Bd. 35.
- Kenyon, Americ. Nature. Bd. 29. 1895.
- Key, Axel u. Retius, Studien in d. Anatom. d. Nervensyst. 2. H.
- Koch, Inaug.-Diss. Erlangen. 1879.
- Kölliker, Handbuch der Gewebelehre. 1902.

- Kuhnt, Arch. f. mikrosk. Anatom. Bd. 13. 1876.
 Lachi, Monit. Zool. Ital. Anno 5. 1895.
 Landowski, St. Peterburger Psych. Gesellsch. 1883.
 ———, Centralbl. f. Neurologie. 1885.
 Lantermann, Centralbl. f. d. med. Wissensch. Bd. 45. 1874.
 Lewis, Biochem. Zeitschr. Bd. 74. 1916.
 Lewis, Amer. Journ. Anatom. vol. 17. 1914.
 Liacre, Cpt. rend. d. seances d. l. soc. d. biol. Bd. 86. 1922.
 Löb, Pflügers Arch. f. Physiol. Bd. 67, 71, 75 1898-1899.
 Lee u. Mayer, Grundzüge der mikroskopischen Technik. 1901.
 Malay, Inaug.-Diss. München. 1883.
 Mc Carthy, Quart. Journ. of microsc. science. vol. 60. 1875.
 Mendino, Arch. f. Anatom. u. Physiol. vol. 4. 1880.
 Michotte, Le Nervex. Louvain. vol. 6.
 Murawieff, Beitr. pathol. Anatom. u. allg. Pathol. Bd. 29. H. 1.
 Nageotte, Compt. rend. soc. biol. Paris. 1910.
 ———, Arch. f. mikroskop. Anatom. Bd. 77. 1911.
 Nemiloff, Arch. f. mikrosk. Anatom. u. Entwickl. Bd. 72. 1908.
 ———, Ebenda. Bd. 76. 1910.
 Ostwald, Pflügers Arch. f. Physiol. Bd. 108. 1905.
 ———, Ebenda. Bd. 109. 1906.
 Parker u. Froyd, Anatom. Anzeiger. Bd. 11. 1896.
 Pauli, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 67, 71, 78.
 Pauli u. Handowsky, Biochem. Zeitschr. Bd. 18. 1909.
 Perusini, Zeitschr. f. Heilk., Bd. 27, 1906.
 Porges u. Neubauer, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. Bd. 3. 1910.
 Procter, Kolloidchem. Beih. 2. 1911.
 Rawitz, Arch. f. Anatom. u. Physiol., 1879.
 Ranvier, Leçons sur l'histologie du système nerveux. Bd. 2. Paris. 1878.
 Reimer, Fortschr. d. Med. Bd. 17. 1900.
 Remark, In Frorieps Notizen Bd. 3. 1837.
 Rezzinico, Arch. pour le Science Med. vol. 4. 1879.
 Rosolimo u. Murawiev, Neurol. Centralbl. Bd. 16. 1897.
 Rumpf, Untersuch. aus d. physiol. Instit. zu Heidelberg. Bd. 2. 1878.
 Scarpatetti, Neurol. Centralbl. Bd. 16. 1897.
 Schiefferdecker, Arch. f. mikrosk. Anatom. Bd. 30. 1887.
 Schmidt, The monthly microsc. Journ. Vol. 2. 1874.
 Schorr, Zit. nach Handowsky u. nach Pauli.
 Segall, Journ. de l'anat. 1893.
 Sjöbling, Anatom. Anzeiger. Bd. 17. 1900.
 Spielmeyer, Histopathol. d. Nervensyst. Bd. 1. 1922.
 Spiro, Hofmeisters Beiträge f. chem. Physiol. u. Pathol. Bd. 5. 1905.
 Toel, Inaug.-Diss. Zürich 1875.
 Torigata, Kyoto Igaku-Zassi. Bd. 4. 1909.
 Vallenti, In Wagners Handwörterbuch. Bd. 1.

Wynn, Journ. Anatom. and Physiol., vol. 34.

Zawerthal, Ricerche istitute nell Istituto fisiologic. della Regia die Napoli, 1874.

Erklärung der Abbildungen (Tafel XVI-XVII).

Fig. 1—5. Skizzen der mit 10% iger Formalinlösung behandelten peripheren markhaltigen Nervenfasern.

Fig. 1 nach einigen Minuten

Fig. 2 nach 1 Stunde

Fig. 3 nach 2 Stunden

Fig. 4 nach 4 Stunden

Fig. 5 nach 6 Stunden

Fig. 6—7. Skizzen der mit Scarpatettischer Methode gefärbten peripheren markhaltigen Nervenfasern.

Fig. 8—31. Skizzen der peripheren markhaltigen Nervenfasern, welche mit verschiedenen Formalinlösungen 6 Stunden hindurch fixiert wurde.

Fig. 8 mit 0.2% iger Formalinlösung

Fig. 9 mit 0.4% iger Formalinlösung

Fig. 10 mit 0.6% iger Formalinlösung

Fig. 11 mit 0.8% iger Formalinlösung

Fig. 12 mit 1% iger Formalinlösung

Fig. 13 mit 2% iger Formalinlösung

Fig. 14 mit 3% iger Formalinlösung

Fig. 15 mit 4% iger Formalinlösung

Fig. 16 mit 5% iger Formalinlösung

Fig. 17 mit 6% iger Formalinlösung

Fig. 18 mit 7% iger Formalinlösung

Fig. 19 mit 8% iger Formalinlösung

Fig. 20 mit 9% iger Formalinlösung

Fig. 21 mit 10% iger Formalinlösung

Fig. 22 mit 11% iger Formalinlösung

Fig. 23 mit 12% iger Formalinlösung

Fig. 24 mit 13% iger Formalinlösung

Fig. 25 mit 14% iger Formalinlösung

Fig. 26 mit 15% iger Formalinlösung

Fig. 27 mit 16% iger Formalinlösung

Fig. 28 mit 17% iger Formalinlösung

Fig. 29 mit 18% iger Formalinlösung

Fig. 30 mit 19% iger Formalinlösung

Fig. 31 mit 20% iger Formalinlösung

Fig. 32—35. Skizzen der mit Säuren oder Kalilauge 6 Stunden lang behandelten peripheren markhaltigen Nervenfasern.

Fig. 32 mit 0.1% iger Ameisensäurelösung

Fig. 33. mit 0,1% iger Essigsäurelösung

Fig. 34. mit 0.01% iger Salzsäurelösung

Fig. 35. mit 0.01% iger Kalilauge

Fig. 36—38. Skizzen der peripheren markhaltigen Nervenfasern, welche durch 9% ige Formalinlösung, die Kochsalz in verschiedenen Prozentsätzen enthält, fixiert wurden.

Fig. 36. im Verhältnis von 0.5 Prozent

Fig. 37. im Verhältnis von 0.9 Prozent

Fig. 38. im Verhältnis von 1.1 Prozent

Fig. 39. Skizze der mit Osmiumsäure-Formalinlösung behandelten peripheren markhaltigen Nervenfasern.

Fig. 40. Skizze der mit der Ammonia- und Jodjodkalilösung behandelten peripheren markhaltigen Nervenfasern.

A Achsenzylinder

S Schwannsche Scheide

M Markscheide

Ms Marksegmentstück

E Schmidt-Lantermannsche Einkerbung

JK Jodoformkristalle