Beiträge zur Anatomie des Zentralnervensystems der Japaner.

V. Corpus striatum.

Von

Kichisaburo Shimada.

Aus dem Anatomischen Institut der Kaiserlichen Universität, Kyoto.

Mit 4 Textfiguren und 4 Figuren auf Tafel XII.

Die vorliegende Abhandlung behandelt Form und Grösse des Corpus striatum.¹⁾ Bezüglich dieses Gebildes findet man bisher ziemlich genaue Beschreibungen in den üblichen anatomischen Lehrbüchern von Hoffman- Schwalbe²⁾, Déjerine³⁾ u. a. Es ist aber noch von keinem Autoren versucht worden, den äusseren Umriss des Corpus striatum mit dem des betreffenden Grosshirns zu vergleichen. In der Absicht, einmal diese Lücke auszufüllen, zum anderen aus anthropologischem Interesse habe ich die vorliegende Untersuchung an den Gehirnen der Japaner angestellt.

Material.

Die von mir zur Untersuchung benutzten Gehirne stammen aus den folgenden 6 Individuen :

- Nr. 1. 12 jähriger Knabe
- Nr. 2. 26 jähriger Mann

1) Unter dem corpus striatum fasse ich den Nucleus caudatus und das Putamen des Linsenkerns zusammen, also das Neostriatum Kappers' im Sinne von Vogt, der die sog. Striatum-Pallidum-Lehre begründete.
2) Schwalbe, G.; Lehrbuch der Neurologie. 1881.
3) Déjerine, J.: Anatomie des Centres nerveux. T. II. Paris 1901.

Nr. 3. 28 jähriger Mann

Nr. 4. 51 jähriger Mann

Nr. 5. 58 jähriger Mann

Nr. 6. 36 jähriges Weib.

Die Gehirne wurden gleich, nachdem sie den Leichen entnommen, in 10%igem Formolwasser fixiert und aufbewahrt. Die betreffenden Schädel wurden nach der gewöhnlichen Methode mazeriert.

Untersuchungsmethode.

Ich teile die eigene Untersuchungsmethode in die folgenden 3 Phasen ein.

1) Die Beobachtung an der Grosshirnhemisphäre selbst.

Man entfernt die Pia mater von der Grosshirnoberfläche und trägt die zum Mittelhirn und Rautenhirn gehörigen Teile durch einen unmittelbar hinter dem Corpus mamillare geführten Schnitt ab. Das Grosshirn wird durch einen Median-Sagittal-Schnitt in zwei symmetrische Hälften, d. h. in beide Hemisphären, getrennt. An jeder Hemisphäre wird der Frontal- und Occipitalpol markiert, indem man je eine Stecknadel in den Polpunkt sticht. Zwischen diesen beiden Polpunkten spannt man einen Faden sowohl auf der lateralen als auch medialen Fläche jeder Hemisphäre aus, und zwar derart, dass die Fäden der beiden Flächen auf die horizontale Ebene fallen. Der Verlauf des Fadens wird mit japanischer Tusche auf die Gehirnoberfläche aufgezeichnet. Diese Tuschlinie wird wieder mittelst eines elektrischen Glühdrahtes kauterisiert. Diese Brandmark, d. h. die Fronto-Occipital-Pollinie, habe ich bei der Aufnahme der Umrisspause der Hemisphäre als Orientierungslinie benutzt. Nun bringt man die Hemisphäre in eine solche Lage dass die oben-erwähnte Orientierungslinie in der horizontalen Ebene liegt. Bei dieser Stellung habe ich die Umrisspause der dorsalen Ansicht des Gehirns mittelst des Dioptographs in natürlicher Grösse hergestellt. Auf dieser Pause ist der Sulcus centralis sowie die Lage der Polnadel eingezeichnet (Fig. 4, c). Weiter legte ich die laterale Fläche der Hemisphäre unten auf die Bodenplatte, während die mediale Fläche oben in der horizontalen Ebene eingestellt wurde. Bei dieser Stellung nimmt man die Umrisspause der medialen Ansicht mittelst des Dioptographs in natürlicher Grösse auf. Auf dieser Pause wird gleichzeitig der Umriss des Corpus callosum aufgezeichnet (Fig. 4, b). Danach wird die Hemisphäre in der umgekehrten Lage eingestellt, d. h. die mediale Hemisphärenfläche liegt unten auf der horizontalen Platte und die laterale Fläche oben. Bei

dieser Stellung bekommt man die Umrisspause der lateralen Ansicht in natürlicher Grösse. Hier wird gleichzeitig der Verlauf des Sulcus centralis aufgezeichnet. Hierauf entfernt man das Operculum von der lateralen Hemisphärenfläche, und der Insellappen ist blossgelegt, und auf der so freigewordenen Insula markiert man die Fronto-Occipital-Pollinie mittelst des elektrischen Glühdrahtes. Zuletzt zeichnet man mittelst des Dioptraphs den Umriss der Insula wieder in die laterale Ansichtspause der Hemisphäre ein (Fig. 4, a). Auf diese Weise erhält man drei verschiedene Hemisphärenpausen: Eine dorsale Pause mit dem Verlauf des Sulcus centralis, eine mediale mit dem Umriss des Corpus callosum und eine laterale mit der Insula. In der ersten Pause sind der Frontal- und Occipitalpolpunkt markiert. In den beiden letzteren Pausen ist die Fronto-Occipital-Pollinie aufgezeichnet. In diesen drei Pausen habe ich die Gestalt des Corpus striatum projiziert (Fig. 4), welche ich durch die unten zu erwähnenden Manipulationen gewonnen habe. Auf Grund dieser Pausen habe ich meine Beobachtungen über die Form- und Grössenverhältnisse zwischen dem Grosshirn selbst und dem Corpus Striatum angestellt.

2) Die Zerlegung des Corpus striatum in frontale Schnitte von je 1 mm Dicke.

Aus jeder Hemisphäre schneidet man das Corpus striatum samt allen es umgebenden Massen wie folgt heraus: Zuerst dringt man mit dem Hirnmesser in das ein wenig oberhalb der dorsalen Fläche des Balkens befindliche Niveau der Fronto-Occipital-Pollinie parallel ein und schneidet die Hemisphärenmasse ab. Dann schneidet man den frontalen und occipitalen Polteil einige Centimeter vor dem Balkenknie resp. hinter der Balkenwulst genau senkrecht zur Fronto-Occipital-Pollinie ab. Die herausgeschnittene Masse trägt in der medialen Fläche den Balken, in der lateralen Fläche den Insellappen, und in ihren Innern befindet sich das Corpus striatum. Aus dieser Masse fertigte ich eine Serie frontaler Scheiben von 1 mm Dicke an.

Für die Zerlegung habe ich eine neue Schneidevorrichtung konstruiert (Fig. 1), die aus einem Schneideapparat und einem Einbettungskasten besteht. Der erstere (Fig. 1, a) setzt sich aus einem Metallgestell (A) mit zwei Laufschiene (Ls), einem Treiber (B) und einem Lineal (C) zusammen.

Das Metallgestell (A) hat eine Länge von 40 cm und zwei verschiedene Breiten. Der schienentragende Teil besitzt eine Breite von 10 cm, der treibertragende Teil eine Breite von 6 cm. Der erstere Teil ist 26 cm lang und an den beiden Rändern der oberen Fläche mit einer 12 mm

Fig. 1 (a).

Fig. 1 (b).

breiten Laufschiene versehen, worauf das Kastenbett oder der Schlitten (Sch) resp. der Objektträger gleiten kann, während an seinen beiden Seitenrändern das Lineal eingeschraubt ist. Der letztere Teil ist 14 cm lang. An seiner oberen Fläche sind zwei Treiberhalter (T^1 T^2) befestigt, während an seinem hinteren freien Ende ein Gradzirkel (g) angebracht ist.

Der Treiber (B) ist an dem schmalen Teil des Gestells mittelst der 2 Treibhalter (T^1 T^2) befestigt. Er besteht aus zwei Pressern (p) und einem Schraubenschaft (s). Der Presser (p) stellt zwei 12 cm lange, durch einen Balken (l) verbundene Metallstangen dar. In der Mitte des Balkens befindet sich eine Schraubenmutter (m), durch die der Schrauben-

schaft zieht. Je ein Presser läuft durch das Loch von je einem der am Treiberhalter (T¹) vorhandenen 2 seitlichen Metallknöpfe (sk). Der Schraubenschaft (s) zieht durch die Schraubenmutter (m) des Presserbalkens. Ein Ende des Schraubenschaftes ist durch einen mittleren Knopf (k) des Treiberhalters (T¹) gestützt, während das andere Ende durch das Loch des übrigen Treiberhalters (T²) geht. An diesem freien Ende ist eine Radscheibe (R) befestigt. An einem Punkt der Radscheibe befindet sich ein Handgriff (h), am anderen Punkt eine Zeignadel (z). Durch einmalige Drehung der Radscheibe schreitet der Presser je 1 mm vor oder rückwärts. Der minimale Schritt wird durch die Zeignadel auf dem Gradzirkel angezeigt. Das Lineal (C) stellt einen bogenförmigen Metallrahmen dar, sitzt senkrecht auf dem Gestell und dient gleichzeitig als Messerführer.

Der hölzerne Einbettungskasten (Fig. 1, b) besteht aus einem Kastenboden oder einem Schlitten (Sch) und den Kastenwänden (w). Der Kastenboden dient zugleich als Objektträger und ist 13 cm lang und 9,5 cm breit. Er besitzt mehrere kleine Löcher (bn), in die sich beinahe 1 cm lange Bambusnägeln (bn) stecken lassen. Diese Nägel besorgen das Festhalten der Einbettungsmasse. An der unteren Fläche der Bodenplatte befinden sich zwei Metalleisten, wodurch der Kastenboden über die Laufschienen des Gestells leicht vor- oder rückwärts gleiten kann. Ferner befindet sich an einer schmalen Seite der Bodenplatte eine feste Platte (L) in senkrechter Stellung, die eine Schlitten- oder Materiallehne darstellt. An der Rückseite dieser Lehne sind zwei pfannenförmige Metallscheiben (pf) vorhanden, welche gerade die Enden des Pressers empfangen. Von den Kastenwänden (w) sind je zwei starr verbunden, und diese zwei starren Verbindungen sind durch ein Scharnier drehbar vereint. Weiter lassen sich diese in dem Scharnier drehbaren Verbindungen, wenn vorher nicht geschlossen, durch einen Schliesshaken zu einem Rahmen wiedervereinen. Erst durch das Zusammenbringen des Kastenbodens (Sch) mit den Kastenwänden (w) ist der Einbettungskasten fertig. Endlich wird im Innern des Kastens eine Art Lagerungsrost hergestellt, indem man 3 lange Stahlnadeln (sn) durch die an den gegenüberstehenden Wänden befindlichen Löcher (sn) sticht. Dieser Stahlnadelrost liegt genau horizontal und zwar ein wenig über dem Niveau der Köpfe der im Kastenboden eingestochenen Bambusnägeln.

Die Einbettung geschieht in der folgenden Reihenfolge: Zuerst legt man die zu zerschneidende Striatummasse auf den Stahlnadelrost im Einbettungskasten so, dass die Orientierungslinie (die Brandmarke) auf der medialen resp. lateralen Fläche der Striatummasse ganz parallel mit

den Stahlnadeln des Lagerungsrostes läuft. Dann giesst man das erwärmte und verflüssigte Agaragar-Wachsgemisch (mit 10% igem Agaragar mischt man 0.5% Weisswachs) langsam in den Einbettungskasten. Nach der Erstarrung der oberflächlichen Schicht taucht man den Einbettungskasten in toto in 10%iges Formolwasser ein und lässt ihn in dieser Erstarrungsflüssigkeit bis zum Herausnehmen am nächsten Tage stehen. Nun wird der Dreistahlnadelrost aus dem Kasten herausgezogen und die Kastenwände weggenommen. Darauf wird der Kastenboden mit dem eingebetteten Material auf die Laufschiene des Gestells gebracht, ganz wie ein Schlitten auf die Laufschiene. Das Lineal (C) wird an dem freien Ende der Masse eingestellt, und das freie Ende des Pressers stösst an der pfannenförmigen Scheibe der Schlittenlehne an. Zum Schneiden gebraucht man ein übliches Gehirnmesser, das stets dicht neben den freien Rändern des Lineals (resp. Messerführers) langsam hingezogen wird. Mittelst der Radscheibe wird der Kastenboden, also der Schlitten mit dem Material, je 1 mm vor das Lineal geschoben, und darauf wird geschnitten.

3) Die graphische Rekonstruktion des Corpus striatum.

Nach der obigen Methode habe ich 12 frontale Scheibenserien der Striatummasse aus den mir zur Verfügung stehenden Materialien angefertigt. Die Schnittbilder der Streifenhügelmasse sind in den einzelnen Scheiben bei sorgfältiger Besichtigung durch ihre eigentümliche Farbennuance gut erkennbar. Ebenso ist in jeder Scheibe die Lage der Brandmark der Fronto-Occipital-Orientierungslinie als eine mehr oder weniger deutliche Einkerbung leicht aufzufinden. Ferner ist die Lage des Stahlnadelrostes in der Einbettungsmasse durch drei Löcherchen auffindbar. Um die Bilder des Corpus striatum nachzuzeichnen, habe ich die folgenden Manipulationen ausgeführt.

Zuerst streckt man eine dünne Zelluloidplatte über die Serienscheibe flach aus und zeichnet mit japanischer Tusche den Umriss des Striatumbildes nach; gleichzeitig wird die äussere Konturlinie der Scheibe selbst und die Lage der Orientierungslinie in der Scheibenkante sowie die der Löcherchen des Stahlnadelrostes der Einbettungsmasse gezeichnet. Dieses Bild wird mittelst eines Durchleuchtungsapparates auf Millimeterpapier durchgezeichnet.

Einzelne Bilder in den Serienscheiben derselben Hemisphäre sind in der Reihenfolge von frontal nach occipital auf Millimeterpapier zusammengestellt. Auf diese Weise habe ich 12 tabellarische Zusammenstellungen mit den Schnittbildern des Corpus striatum angefertigt (Fig. 2). Aus diesen tabellarischen Zusammenstellungen habe ich mittels der graphischen

Rekonstruktionsmethode die Projektionsbilder des Corpus striatum auf der medialen lateralen und dorsalen Hemisphärenoberfläche hergestellt (Fig. 3, a,b,c)

Eigene Befunde.

1) Zusammenfassende Beschreibung der Schnittbilder des Corpus striatum in den Scheibenserien.

Bevor ich auf die Beschreibung der Schnittbilder eingehe, möchte ich einige Bemerkungen über die Verbindungsverhältnisse der einzelnen Bestandteile des Corpus striatum unter sich und die zwischen dem Corpus striatum und dem Mandelkern angeben, da über die Endigungsweise der Schwanzspitze des Nucleus caudatus und die Begrenzungsweise zwischen dem Streifenhügel und dem Mandelkern bis jetzt von vielen Autoren die verschiedensten Ansichten ausgesprochen worden sind.

A. Bezüglich der Endigungsweise des Schwanzkernschwanzes findet sich freie Endigung oder direkter Anschluss an die übrigen Kernmassen angegeben. Der Schwanz des Schwanzkerns verliert sich gegenüber dem Pulvinar zugespitzt (Henle¹⁾); oder er hört mehr oder weniger weit hinter dem Mandelkern auf (Schwalbe²⁾). Dagegen steht die Schwanzspitze mit dem Putamen an der Stelle in direkter Verbindung, wo die Basis des Putamen als ein Schläfenfortsatz-Pedunculus nuclei lenticularis in das Unterhorndach frei hineinragt (Meynert³, Obersteiner⁴, Smith⁵); an dem Niveau des Unterhorns konfluert das vordere Ende des Schwanzes sowohl mit einer aus der Unterfläche des Linsenkerns herantretenden grauen Lamelle (Pedunculus du noyau lenticulaire) als auch mit der Amygdala und der Vormauer (Déjerine⁶); oder die Schwanzspitze verschmilzt an dem vorderen Ende des Unterhorns mit dem Nucleus amygdalae (Brodmann⁷, Monakow⁸); es gibt eine

1) Henle, J.; Handbuch der Nervenlehre des Menschen. 1879.

2) Schwalbe, G.; l. c.

3) Meynert, Th.; Vom Gehirn der Säugetiere. Handbuch der Lehre von den Geweben von S. Stricker. Bd. 2. 1872.

4) Obersteiner, H.; Anleitung beim Studium des Baues der nervösen Zentralorgane im gesunden und kranken Zustande. 1912.

5) Smith, G. Elliot; The central nervous system. Cunningham's Textbook of anatomy. 1917.

6) Déjerine, J.; l. c.

7) Brodmann, K.; Feinere Anatomie des Grosshirns. Lewandowsky's Handbuch der Neurologie. Bd. I.

8) Monakow, C. v.; Gehirnpathologie. II. Auflage. 1905.

Verbindung zwischen dem Mandelkern einerseits und Schwanzkern, Linsenkern und Vormauer anderseits (Landau¹⁾). Bei vielen Säugern erfährt das ventrale Ende des Schwanzkerns eine in dem Unterhorn vorspringende Verdickung (Colliculus terminalis), an die sich das Putamen direkt anschliesst (Vries²⁾). Es ist dagegen schon von allen Autoren sicher gestellt, dass das Kopfende des Schwanzkerns und der kraniale Teil des Putamen sich substantiv vereinigen und diese Verschmelzungsstelle an der Hirnbasis, und zwar im medialen Teil der Substantia perforata anterior, eine leichte Hervorragung (Colliculus nuclei caudati, Colliculus du noyau caude) bildet, und dass sich ferner zwischen dem Schwanzkernkörper und dem Schwanz einerseits und dem Putamen selbst anderseits einige schmale, graue Verbindungsbrücken durch die Faser-masse der Capsula interna finden.

B. Über die Begrenzungsweise zwischen dem Streifenhügel und dem Mandelkern ist von vielen Autoren Verschiedenes ausgesagt worden: Der Mandelkern verschmilzt nur mit dem vorderen Ende des Schwanzkernschwanzes (Brodmann); er steht einerseits mit dem lateralen Gebiet des Linsenkerns und anderseits mit dem ventromedialen Teil des Claustrum in direkter Verbindung (Obersteiner), oder er verbindet sich an seinem oberen Teil mit dem Linsenkern und an seinem unteren Teil mit der Schwanzspitze des Nucleus caudatus (Elliot Smith); zwischen Mandelkern und Linsenkern (Putamen) befinden sich ebenfalls graue Übergänge, wie zwischen Mandelkern und dem Schwanz (Monakow, Landau); der Nucleus amygdalae hängt mit der Substantia perforata anterior zusammen, wie das Claustrum und der konfluente Teil des Schwanzkernkopfes mit dem Putamen (Henle, Merkel, Rauber-Kopsch, Villiger³⁾).

Beim Studium der Schnittbilder habe ich sowohl auf die Endigungsweise des Schwanzkernschwanzes als auch auf die Begrenzung zwischen der Striatummasse und dem Mandelkern besondere Aufmerksamkeit gerichtet. So habe ich mich zwecks genauer Kontrolle der mir zur Verfügung stehenden mikroskopischen Präparate bedient. Ich werde daher bei der unten folgenden Beschreibung auch einige mikroskopische Befunde bringen.

Ich teile den ganzen Streifenhügel in die folgenden 5 Segmente: (Fig. 2, 3).

-
- 1) Landau, E.; Anatomie des Grosshirns. Formanalytische Untersuchung. 1923.
 - 2) Vries, Ernst; Das Corpus striatum der Säugetiere. Anat. Anzeiger. Bd. 37. 1910.
 - 3) Villiger, E.; Gehirn und Rückenmark. 1922.

Fig. 2. (a)

Fig. 2. (b)

- I. Segment : Kranialer Pol (oder das Kaudatus-Kopfende).
- II. Segment : Aufgeklaffter Teil (Kaudatus-Putamen-Verschmelzung).
- III. Segment : Gespalteter Teil (Kaudatus-Putamen-Trennung).
- IV. Segment : Zersplitterter Teil (Kaudatus-Kauda-Putamen-Zergliederung).
- V. Segment : Kaudaler Pol (Kaudatusbogen).

Was die Streckenweite der einzelnen Segmente anbetrifft, so kann man sie aus der beiliegenden Tabelle näher erkennen.

Tabelle 1.

Segment Fall		I	II	III	IV	V	Zahl aller Scheiben resp. Streckenweite in Milli- metern
links	1	1.-2.	3.-13.	14.-25.	26.-42.	43.-50.	50
	2	1.-4.	5.-12.	13.-28.	29.-40.	41.-49.	49
	3	1.-4.	5.-14.	15.-33.	34.-47.	48.-54.	54
	4	1.-4.	5.-12.	13.-36.	37.-54.	55.-60.	60
	5	1.-4.	5.-12.	13.-33.	34.-44.	45.-53.	53
	6	1.-4.	5.-15.	16.-34.	35.-50.	51.-56.	56
rechts	1	1.-3.	4.-13.	14.-27.	28.-44.	45.-51.	51
	2	1.-3.	4.-13.	14.-31.	32.-40.	41.-50.	50
	3	1.-5.	6.-15.	16.-34.	35.-53.	54.-57.	57
	4	1.-4.	5.-14.	15.-39.	40.-55.	56.-60.	60
	5	1.-4.	5.-12.	13.-31.	32.-46.	47.-51.	51
	6	1.-4.	5.-14.	15.-32.	33.-47.	48.-52.	52

Beschreibung der Schnittbilder der einzelnen Segmente.

1. Segment. Kranialer Pol des Streifenhügels oder das Kopfende des Schwanzkerns der Autoren (Fig. 2, Scheibe 1-4).

Die Streifenhügelmasse ist mit einer senkrecht stehenden Birn- oder Erbsenform vergleichbar. Ein kleiner Teil ihrer Konturlinie, d. h. der mediodorsale Teil des Graus, nimmt bei den meisten Fällen (bei 11 unter 12) einen Teil der Vorderhornwand des Seitenventrikels ein, während ihr grösster Teil in dem Frontalmarkweiss eingebettet liegt (Fig. 2, Scheibe 1-2). Selten (nur einmal unter 12 Fällen) ist sie vollständig im Markweiss eingebettet; mit anderen Worten, der Frontalpol des Streifenhügels befindet sich weiter kranialwärts als der des Vorderhorns. Der dorsolaterale Teil ihrer Konturlinie sieht zackig aus, indem sich hier eine Menge der quergeschnittenen weissen Bündel aus dem umgebenden Markweiss der grauen Masse beimischt (Fig. 2, Scheibe 3-4), während der übrige Teil gegen das umgebende Mark sehr scharf abgegrenzt ist. In dem I. Segment trifft man den frontalen Pol des Streifenhügels an, der besonders in dem ersten oder zweiten Schnitt eine fast rein graue Masse darstellt. Dieses Segment gehört bekanntlich dem Caput nuclei caudati an. In der letzten Scheibe des Segmentes (Fig. 2, Scheibe 3-4) zeigt die graue Masse, insbesondere in dem dorso-lateralen Abschnitt der Masse, die Neigung, sich durch Beimischung

von quergeschnittenen Bündeln, wie oben schon erwähnt, zu spalten. Die Grösse der grauen Masse in der angegebenen Scheibe gibt die beistehende Tabelle an:

Tabelle 2.

	Fall	Senkrechter Durchmesser mm	Querdurch- messer mm	Flächen- inhalt qmm
links	1	14	9	94
	2	18	12	135
	3	19	11	137
	4	18	10	129
	5	14	10	119
	6	16	11	104
rechts	1	15	11	106
	2	16	9	83
	3	18	12	170
	4	16	10	109
	5	18	12	159
	6	15	9	93

2. Segment. Aufgeklaffter Teil des Streifenhügels (Kaudatus-Putamen-Verschmelzung). (Fig. 2, Scheibe 5-14).

Dieses Segment setzt sich aus dem ersten kontinuierlich fort. Hier merkt man ausser der bedeutenden Vergrösserung der grauen Masse auch die eigenartige Zunahme der Faserbeimischung und die daraus erfolgte Absplitterung der grauen Masse, so dass der Streifenhügel hier eigentümliche Formverhältnisse darbietet. Bekanntlich gehört diese Fasermasse der quergeschnittenen Faserstrasse der Capsula interna an. Die Faserstrasse dringt von der dorsolateralen Peripherie der Striatummasse durch die Substanz gegen das ventromediale Gebiet vor, ohne aber die basale Peripherie zu erreichen. Dadurch bietet die Striatummasse die Gestalt einer auf einer Seite aufgeklafften Hülse dar (Fig. 2, Scheibe 5-14). Bekanntlich stellt der von der Faserstrasse dorsolateral befindliche Teil den Nucleus caudatus und der ventromedial befindliche das Putamen dar, und die beiden Teile verschmelzen in der Basis

miteinander. Ferner sind der Nucleus caudatus und das Putamen durch einige durch die Faserstrasse ziehende graue Streifen miteinander verbunden. Wir finden, dass die Faserstrasse um so tiefer in die Striatummasse eindringt, je weiter kaudal die Scheibe liegt. Die Faserstrasse erreicht in der ersten Scheibe des nächstfolgenden Segmentes die ventromediale Peripherie der Striatummasse. Die Gesamtzahl der Scheiben in dem II. Segment resp. die Streckenweite beläuft sich auf 7–11 resp. meist auf 10 mm (Tabelle 1). Auf dieser ganzen Strecke nimmt die Striatummasse kaudalwärts immer mehr zu und erreicht in der letzten Scheibe ihre grösste Dimension. Die Grösse der Striatummasse in der letzten Scheibe dieses Gebietes ist aus Tabelle 3 zu ersehen.

Tabelle 3.

Die Grösse des II. Segmentes (und zwar in der letzten Scheibe).

	Fall	Senkrechter Durchmesser mm	Querdurch- messer mm	Flächen- inhalt qmm
links	1	31	19	275
	2	35	19	332
	3	31	22	356
	4	27	19	268
	5	29	19	313
	6	28	18	247
rechts	1	30	19	315
	2	32	16	279
	3	33	22	319
	4	28	20	290
	5	30	20	311
	6	28	17	248

Das Querschnittbild des Nucleus caudatus und des Putamen in der letzten Scheibe des II. Segmentes ist halbmondförmig. Die eine Seite der beiden Kernmassen, welche gegen die Kapselstrasse gekehrt ist, ist ebenfalls zackig, während die andere Seite konvex ist; und hier ist die laterale Begrenzung des Putamen viel stärker konvex als die mediale des Nucleus caudatus.

Von vielen Autoren wird als Colliculus nuclei caudati eine hügelartige Verdickung der Verschmelzungsstelle des Nucleus caudatus mit dem Putamen bezeichnet. In den Schnittbildern der Serienscheiben ist die Colliculusbildung wahrzunehmen. Es ist nämlich die Konturlinie der Striatummasse in der von der Mitte des in Rede stehenden Segmentes mehr kaudal liegenden Scheibe mehr oder weniger basalwärts vorgewölbt (Fig. 2, Scheibe 11–14). Der Gipfel des Colliculus wird aber erst im nächsten Segment (Fig. 3, a,b) angetroffen. Nach meinen Befunden ist es wahrscheinlich, dass der Gipfel des Colliculus nicht aus der eigentlichen Striatummasse selbst, sondern aus der dem Striatum, und zwar dem Putamen, sich dicht anschliessenden Pallidummasse, gebildet wird, worüber ich noch weiteres bei der Betrachtung des nächsten Segmentes bringen werde.

3. Segment. Gespaltener Teil des Streifenhügels.

(Kaudatus-Putamen-Trennung).

(Fig. 2, Scheibe 15–33).

Dieses Segment stellt den Hauptabschnitt der Striatummasse dar, indem es über $\frac{1}{3}$ der ganzen Striatumlänge einnimmt, wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist. Auf dieser Strecke weist die Striatummasse ein sehr kompliziertes Formverhältnis auf. Das Segment zeigt folgendes:

1. Die sogenannte Pallidummasse schliesst sich dem Putamen so dicht an, dass die erstere hier mit dem letzteren den Nucleus lenticularis bildet (Putamo-Pallidum-Anschluss (Fig. 2, Scheibe 15–33)).

2. Die Fasermasse der Commissura anterior zieht in auffallender Weise durch die betreffende graue Masse (Kommissurdurchzug) (Fig. 2, Scheibe 21–22).

3. Der im III. Segment erst auftretende Mandelkernkomplex schliesst sich gewissermassen der Pallidummasse an (Amygdalo-Pallidum-Anschluss) (Fig. 2, Scheibe 27–33).

4. Das Putamen und der Mandelkernkomplex hängen in der später erwähnten eigentümlichen Art miteinander zusammen (Amygdalo-Putamenanheftung) (Fig. 2, Scheibe 29–30).

5. Das Putamen verbindet sich ebenfalls in eigentümlicher Weise mit der sog. Schwanzspitze des Schwanzkerns (Kaudo-Putamen-Verschmelzung) (Fig. 2, Scheibe 31–33).

Durch diese 5 Beziehungen wechselt die Formbeschaffenheit der Schnittbilder der Striatummasse streckenweise hintereinander, wie man es aus den beistehenden Figuren (Fig. 2) sowie der folgenden Tabelle ersehen kann.

Tabelle 4.

Fall		Gesamtstrecke	Putamo-Pallidum-Anschluss	Kommissuren-durchzug	Amygdalo-Pallidum-Anschluss	Amygdalo-Putamen-Anheftung	Kaudo-Putamen-Verschmelzung
links	1	14.-25.	13.-	14.-16.-21.	17.-23.	22.-23.	24.-25.
	2	13.-28.	12.-	16. 14. 17.-23.	21.-27.	23.-24.	25.-28.
	3	15.-33.	15.-	21. 20. 22.-28.	27.-33.	29.-30.	31.-33.
	4	13.-36.	13.-	21. 19. 22.-29.	26.-33.	28.-31.	32.-33.
	5	13.-33.	13.-	20. 19. 21.-26.	26.-32.	26.-29.	30.-31.
	6	16.-34.	14.-	18.-20.-27.	25.-31.	27.-29.	30.-31.
rechts	1	14.-27.	14.-	16. 15.-17.-22.	19.-26.	23.-25.	26.-27.
	2	14.-31.	15.-	16.-18.-25.	23.-29.	27.-28.	27.-30.
	3	16.-34.	14.-	20. 21.-28.	26.-34.	28.-29.	30.-31.
	4	15.-39.	15.-	19.-21.-27.	28.-34.	31.	32.-33.
	5	13.-31.	16.-	19. 17.-20.-25.	24.-32.	27.-28.	29.-30.
	5	15.-32.	12.-	17.-20.-26.	23.-30.	27.	28.-39.

N.B. Die Zahl der einzelnen Kolonnen zeigt die Scheibenummer, welche von kranial nach kaudal gezählt wird.

Im folgenden werde ich die Formänderung auf den einzelnen Strecken beschreiben.

1. Putamo-Pallidum-Anschluss (Neo- und Palaeostriatum-Anschluss).

Bekanntlich zeichnet die Pallidumsubstanz sich durch besondere Eigenschaften, durch die fahle Farbennuance und stärkeren Faserreichtum aus. Die Pallidummasse schliesst sich der Putamenmasse dicht an und bildet damit eine einheitliche Kernmasse, den Nucleus lenticularis. Die Stelle, wo sich die Pallidummasse dem Putamen anschliesst, trifft entweder gerade das Niveau, wo die Striatummasse durch die Kapselfaser-

strasse in Putamen und Nucleus caudatus gespaltet wird (bei 5 Fällen unter 12) (Fig. 2, Scheibe 15), oder das um eine Scheibe vorangehende Niveau (ebenfalls bei 5 Fällen unter 12); zuweilen liegt sie aber in dem nächsten Niveau. Bei den meisten Fällen (bei 7 unter 12) schaltet sich die Pallidummasse zwischen die basalen Enden des Kaudatus und des Putamen ein, indem die Pallidummasse selbst die basale Konturlinie der Striatummasse bildet (Fig. 2, Scheibe 15). Bei den übrigen Fällen geschieht der Pallidumanschluss entweder (bei 3 unter 12) am inneren Winkel der aufgeklafften Striatummasse oder (bei 2 unter 12) am äusseren Winkel der letzteren. Die Pallidummasse bildet früher oder später die basale Konturlinie der Striatummasse. Wie ich im Anschluss an die Beschreibung des II. Segmentes erwähnt habe, bildet die Pallidummasse

Tabelle 5

Fall		Scheiben, wo der Colliculusgipfel ange- troffen wird
links	1	13
	2	13
	3	19
	4	18
	5	16
	6	18
rechts	1	14
	2	16
	3	19
	4	18
	5	16
	6	16

den Gipfel des sog. Colliculus nuclei caudati (Fig. 2, Scheibe 19). Dieser Gipfel drängt sich dicht an die basale Oberfläche gerade in der Gegend der Substantia perforata anterior und wird dort von einer schmalen Rinden-Schicht, der sog. Rinde am Kopf des Streifenhügels-, bedeckt. Die beiliegende Tabelle zeigt die Scheibennummer, wo der Colliculus-Gipfel getroffen wird. Jedenfalls schliessen sich am Pallidumanschluss das Neostriatum (die eigentliche Striatummasse des Putamens) und das Palaeostriatum (Pallidummasse) an.

Von vielen Autoren ist eine deutliche Fortsetzung des Kaudatuskopfes auf das Septum pellucidum als besonderer Kern-Nucleus septi (Zuckerkandl, Meynert), Nucleus accumbens (Ziehen), Nucleus accumbens septi (Kappers)- beschrieben worden. Bei Durchforschung der betreffenden Serienscheiben traf ich bei den

meisten Fällen (bei 10 unter 12) in den dem Niveau, wo der Pallidumanschluss stattfindet, nächstfolgenden 2 oder 3 Scheiben eine die Kammerfläche des Septum bekleidende graue Masse an. Diese Masse ist (Farbennuance etc.) der an der Bildung des Colliculus sich beteiligenden Pallidummasse sehr ähnlich. Danach möchte ich annehmen, dass die Septumkernmasse nicht zur Kaudatus-, sondern zur Pallidummasse gehört.

2. Kommissurendurchzug.

Bei Durchmusterung der Serienscheiben trifft man die Fasermasse der Commissura anterior gleich nach dem Pallidumanschluss im Innern der Pallidummasse selbst in der Nähe des Putamen als eine mehr oder weniger quergestellte und schräggesechnittene Fasermasse an (Fig. 2, Scheibe 20). In der nächsten oder der nächstzweiten Scheibe stellt das Faserbündel einen quergestellten längsgeschnittenen Strang dar, der über die Mittellinie hinwegzieht (Fig. 2, Scheibe 21–22). In den nächstfolgenden 5–7 Scheiben ist dieser Strang ebenfalls zu sehen. Er findet sich in der Pallidummasse in zwei oder drei Scheiben nach Überschreitung der Medianlinie als quergestellter, medialwärts zugespitzter Keil (Fig. 2, Scheibe 23–24). Dann weicht er in den weiter kaudal liegenden 4 oder 5 Scheiben mehr und mehr lateralwärts ab (Fig. 2, Scheibe 25–28), indem er zuerst von der Pallidummasse nach der Grenze zwischen Putamen und Pallidum und noch weiter lateral unter das Putamen zu liegen kommt, um sich schliesslich lateralwärts vom Putamen in das umgebende Markweiss hinziehend zu verlieren.

3. Amygdalo-Pallidum-Anschluss (Archi- und Palaeostriatum-Anschluss).

Bei Durchforschung der Serienscheiben traf ich auf einer grösseren Strecke (Fig. 2, Scheibe 24–33) dieses Segmentes den Mandelkernkomplex.

Der Mandelkernkomplex erstreckt sich über 9–15, am häufigsten 11 Scheiben. In diesen Scheiben steht die Mandelkernmasse mit der Striatummasse in Zusammenhang. Zuerst sieht man, dass die Pallidummasse, obgleich sie eigentlich nicht zum Striatum gehört, mit der Mandelkernmasse in Verbindung steht. Es geschieht dies in 7–9 Scheiben (Fig. 2, Scheibe 27–33). Bei sorgfältiger Betrachtung, besonders bei der mikroskopischen Kontrolle, erkennt man aber, dass zwischen der Pallidummasse und dem Mandelkernkomplex ein eigentümlicher Bestandteil, welcher Substantia innominata genannt wird, eingeschaltet ist (Tafelfig. 1).

4. Amygdalo-Putamen-Anheftung. (Archi- und Neostriatum-Anheftung).

Es handelt sich um eine direkte Anheftung der Putamenmasse an den Mandelkernkomplex, welcher auf einer beschränkten Strecke des Amygdalo-Pallidumanschlusses vorkommt. Der Mandelkernkomplex erstreckt sich nämlich durch 1–4, am häufigsten durch 2 Scheiben (d. h. 2 mm) (Fig. 2, Scheibe 29–30). Bei den betreffenden Scheiben sieht man, dass sich die Putamenmasse auf dem Niveau, wo der Kommissurenstrang als eine stumpfe, keilförmige Masse angetroffen wird, weiter basalwärts

Fall		Scheiben- nummer, wo der Mandel- kernkomplex angetroffen wird	Scheibenzahl, wo der Mandel- kernkomplex angetroffen wird
links	1	13.-23.	11
	2	17.-28.	12
	3	24.-33	10
	4	23.-33.	11
	5	22.-32.	11
	6	23.-31.	9
rechts	1	15.-29.	15
	2	21.-30.	10
	3	23.-34.	12
	4	23.-34.	12
	5	20.-32.	13
	6	20.-30.	11

als ein sehr schmales Blatt gegen das Unterhorn verlängert und sich der lateralen Seite der Mandelkernmasse dicht anheftet (Tafelfig. 2, 4). Dieses eigenartige schmale Blatt der Putamenmasse ist allgemein als Pedunculus nuclei lenticularis oder Schläfenfortsatz des Linsenkerns bekannt. Man darf es wohl mit Recht Putamenstiel nennen.

5. Kaudatus- Putamen-Verschmelzung.

Nachdem sich der sog. Pedunculus nuclei lenticularis, d. h. der Putamenstiel an den Mandelkernkomplex innig angeheftet hat, verbindet er sich wieder mit der Schwanzspitze des Nucleus caudatus. Diese Verbindung habe ich in 1 oder 4, am häufigsten (bei 9 unter 12) in 2 Scheiben gefunden (Fig. 2, Scheibe 31-33). Auf diesen Scheiben ist der Putamenstiel durch die gerade hier anzutreffende sublenticulare Kapsel-faserstrasse von der Mandelkernmasse ziemlich stark abgeschnürt, als ob er hier endige. Bei sorgfältiger mikroskopischer Untersuchung habe ich jedoch festgestellt, dass der Putamenstiel durch einen sehr schmalen, zwischen die sublenticulare Faserstrasse und den Mandelkernkomplex eingeschalteten Pass nach dem Unterhorndach herabsteigt, um dort mit der Schwanzspitze (d. h. mit dem vorderen Ende des sog. unteren Teiles

vom Schwanzkernschwanz, welcher sich hier gerade in dem Unterhorndach als eine mehr oder weniger deutliche hügelartige Verdickung¹⁾ darstellt) zu verschmelzen (Tafelfig. 3, 4).

Wie schon oben erwähnt, erfährt die eigentliche Striatummasse hier eine bemerkenswerte Umformung. Sowohl beim tiefen Eindringen der Kapselfaserstrasse als auch beim Anschluss der Pallidummasse trennt sich die eigentliche Striatummasse beim ersten Eintritt ins III. Segment im grossen und ganzen in zwei Kerne, den Nucleus caudatus und das Putamen, obgleich diese beiden Kerne durch feinere graue Streifen, welche durch die Kapselfaserstrasse hindurchziehen, miteinander verbunden sind. Diese eigentümliche Formeigenschaft lässt sich durch das ganze III. Segment verfolgen.

Der Nucleus caudatus erfährt auf allen Scheiben dieses Segmentes eine sehr auffallende Volumreduzierung (Fig. 2, Scheibe 15-33). Obgleich dies auf der ganzen Strecke des Segmentes allmählich geschieht, findet doch die Verkleinerung desto schneller statt, je weiter man kaudal vom Niveau der Kommissuren gelangt. Auf der praekommissuralen Strecke bietet das Kaudatusgrau ein quappenförmiges Schnittbild dar, dessen verdicktes Ende lateral nach oben gerichtet ist (Fig. 2, Scheibe 15-19). Die mediale Seite des Nucleus caudatus ist dem Ventrikelraum zugekehrt und sehr glatt, während die laterale, der Kapselfaserstrasse zugekehrte Seite stark gezähnt ist. Auf der postkommissuralen Strecke weist die Kaudatusmasse ein bohnenförmiges Querschnittbild auf (Fig. 2, Scheibe 24-33), dessen Umrandung überall sehr gleichmässig ist. Der Flächeninhalt des Schwanzkerns beläuft sich im Niveau des Kommissurendurchzuges auf 47-98 qmm, im letzten Niveau dieses Segmentes auf 11-29 qmm.

Das Putamen erfährt auch im III. Segment eine ziemlich bedeutende Volumreduzierung und Formveränderung. Auf der Kommissurenstrecke ähnelt das Schnittbild des Putamens mehr oder weniger einer Plankonvexlinse. Die laterale, konvexe Seite ist der Capsula externa zugekehrt und scharf konturiert, während die plane, mediale Seite teils nach der Capsula interna, teils nach dem Pallidum gerichtet und nicht gleichmässig ist. Der der Capsula interna zugekehrte Teil ist wie die gegenüberstehende Seite des Schwanzkerns stark gezähnt, während der sich dem Pallidum anschliessende Teil glatt aussieht. Auf der postkommissuralen Strecke erinnert das Schnittbild an das einer ziemlich

1) Diese leichte Verdickung scheint mir dem Colliculus terminalis (Vries) der Säugetiere zu entsprechen.

Tabelle 6.
Flächeninhalt des Nucleus caudatus.

Fall		in dem Niveau des Kommissuren- durchzugs qmm	im letzten Niveau des III. Segmentes qmm
links	1	55	29
	2	58	18
	3	79	16
	4	47	17
	5	56	14
	6	58	12
rechts	1	66	28
	2	56	19
	3	98	24
	4	47	11
	5	64	17
	6	62	17

dicken konvex-konkaven Linse. Die laterale, konvexe Seite ist gegen die Capsula externa hin scharf konturiert, und die mediale, konkave schliesst sich dicht an die Pallidumasse und ist ebenfalls sehr scharf umrissen. Das Putamen ist nicht gleichmässig dick. Sein oberer Rand ist dicker als der untere und ist gegen die Capsula interna hin gezähnt. Der untere Rand wird teils durch den durchziehenden Kommissurenstrang scharf abgegrenzt, teils gegen den Mandelkernkomplex hin stielartig verschmälert und verlängert. Der letztere Teil heftet sich an die laterale Seite des Mandelkernkomplexes innig an, während er sich gegen das Unterhorndach hin verlängert und mit der Schwanzkernschwanzspitze vereinigt. Was den Flächeninhalt des Putamens anbetrifft, so ist er im Niveau des Kommissurendurchzuges sehr ausgedehnt und wird um so kleiner, je weiter man kaudal gelangt.

4. Segment. Zersplitterter Teil des Streifenhügel (Kaudatus-Kaudo-Putamen-Zergliederung) (Fig. 2, Scheibe 34-47).

In diesem Segment sucht man schon vergebens nach dem Mandelkern. Die Striatummasse zersplittert sich in 3 Teile, nämlich: Den

Tabelle 7.

Flächeninhalt des Putamens im III. Segment.

Fall		im Niveau des Kommissuren- durchzugs. qmm	in dem letzten Niveau des III. Segmentes. qmm
links	1	146	117
	2	156	89
	3	171	118
	4	155	124
	5	154	97
	6	146	82
rechts	1	135	118
	2	139	92
	3	155	120
	4	157	80
	5	161	111
	6	126	92

Nucleus caudatus als die Fortsetzung des vorigen Segmentes, das Putamen im Hemisphärenmark, welches ebenfalls die kaudale Fortsetzung des vorigen Segmentes bildet, und endlich den Schwanz des Nucleus caudatus, und zwar den unteren Schenkel (oder den reflektierten Teil) dieses Kerns im Unterhorndach. Der Schwanzkern, welcher im vorigen Segment mit dem Putamenstiel verbunden war, ist beim Eintritt in das IV. Segment durch die sublenticulare Kapselfaserstrasse von dem Putamenstiel getrennt und liegt als selbständiges Grau in dem Unterhorndach völlig subependymal.

Man stösst in dem IV. Segment auf die Kaudatusmasse zweimal: Einmal ganz oben in der Pars centralis des Seitenventrikels und dann ganz unten im Dach des Unterhorns (Fig. 2, Scheibe 34-47). Die Putamenmasse stellt in der kranialen Hälfte dieses Segmentes ein Dreieck dar, dessen Basis lateral und dessen Scheitel medial gerichtet sind (Fig. 2, Scheibe 34-41). In der kaudalen Hälfte des Segmentes ist die Putamenmasse durch die sog. retrolenticulare Kapselfaserstrasse in mehrere kleine Stücke zerklüftet (Fig. 2, Scheibe 42-47). Diesem

Ausschen nach möchte ich das IV. Segment in zwei Strecken einteilen, nämlich eine kraniale Strecke, wo sich die Putamenmasse als eine kompakte, mehr oder weniger dreieckige Substanz vorfindet, und eine kaudale Strecke, wo die Putamenmasse mehrere kleine Graukörner darstellt. Die Nummern der letzten Scheibe der kranialen Strecke, wo also das Putamen als kompakte Masse nachzuweisen ist, ist in der folgenden Tabelle wiedergegeben. Gleichzeitig finden sich in dieser Tabelle der Flächeninhalt des Putamens und der der oberen und unteren Schwanzkernmassen in der betreffenden Scheibe.

Tabelle 8.

Fall		Die letzte Scheibe, der kranialen Strecke, Putamen als kompakte Masse nachzuweisen.	Flächeninhalt des Putamen. qmm	Flächeninhalt des Schwanzes im Ventrikelfoden. qmm	Flächeninhalt des Schwanzes im Unterhorn-dach. qmm
links	1	36.	25	15	3
	2	36.	15	8	5
	3	41.	21	6	3
	4	43.	22	8	4
	5	39.	14	6	2
	6	39.	25	10	3
rechts	1	36.	30	12	2
	2	37.	23	8	2
	3	43.	32	15	3
	4	44.	18	9	2
	5	37.	25	9	2
	6	39.	19	11	3

Aus der obigen Tabelle ersieht man, dass in dem IV. Segment die Striatummasse, sowohl das Putamen als auch beide Schwanzkernabteilungen, eine bedeutende Volumreduzierung erfährt.

5. Segment. Kaudaler Pol des Streifenhügels (sog. Kaudatusbogen im engeren Sinne) (Fig. 2, Scheibe 48-54).

In diesem Segment ist eine Putamenmasse nicht mehr zu finden. Die Stelle, an der sich im vorigen Segment die Putamenmasse befand, ist jetzt gänzlich durch die sog. retrolenticulare Kapselfaserstrasse ausgefüllt. Die Kaudatusmasse, nämlich der Bogenteil der Cauda nuclei caudati, wird wie beim vorigen Segment an zwei Stellen angetroffen,

und zwar sieht man einmal den oberen Schenkel des Bogens oben im Ventrikelboden und weiter den unteren Schenkel des Bogens unten im Unterhorndach (Fig. 2, Scheibe 48–51). Diese zwei Massen nähern sich einander immer mehr, je weiter die Scheibe kaudal liegt. Endlich vereinigen sie sich zu einem einheitlichen grauen Band (Fig. 2, Scheibe 52–54).

In der folgenden Tabelle ist die Scheibenzahl bzw. die fronto-kaudale Länge des V. Segmentes angegeben.

Tabelle 9.

Scheibenzahl (resp. mm) des V. Segmentes.

Fall		Wo die beiden Schenkel des Kaudatusbo- gens ange- troffen werden.	Wo der Bogenscheitel angetroffen wird.
links	1	7	3
	2	6	2
	3	4	3
	4	4	2
	5	6	3
	6	4	2
rechts	1	3	3
	2	8	2
	3	2	2
	4	3	2
	5	3	2
	6	3	2

2. Betrachtung an den durch die graphische Rekonstruktionsmethode hergestellten Projektionsbildern des Corpus striatum.

Aus den oben erwähnten frontalen Serienscheiben habe ich mittelst der graphischen Rekonstruktionsmethode auf der medialen, lateralen und dorsalen (Fig. 3, a, b, c) Hemisphärenoberfläche das Corpus striatum herausprojiziert.

Bekanntlich wird die Striatummasse von dem Stabkranzfaser durchzogen. Der Raum für diese Faserstrasse stellt sowohl im seitlichen als auch im dorsalen Projektionsbild einen gewissermassen kranio-lateral geöffneten Bogen dar (Fig. 3, a, b, c). Der dorsomediale Schenkel des

Fig. 3.

Bogens entspricht in seiner kranialen Hälfte dem kaudo-lenticularen in der kaudalen Hälfte dem lenticulothalamischen der Bogenteil dem retro-lenticularen und der ventrolaterale Schenkel des Bogens dem sublenticularen Abschnitt der Capsula interna.

1) Betrachtung an der lateralen und medialen Hemisphären-oberfläche (Fig. 3, a, b; Fig. 4, a, b).

Die äussere Kontur des Corpus striatum stellt im Projektionsbild auf der lateralen sowie der medialen Grosshirnoberfläche ein Ellipsoid dar, dessen Längsachse mit der von mir in der vorliegenden Untersuchung auf den Grosshirnhemisphären als Orientierungslinie benutzten Fronto-Occipital-Pollinie fast parallel verläuft. Bei 9 unter 12 Hemisphären entfernt sich die Längsachse des Corpus striatum von der Fronto - Occipital - Pollinie 6-9 mm nach oben, und nur bei einem Fall dagegen 3 mm von der genannten Linie nach unten. Bei 2 Fällen verläuft sie gerade im Niveau der Pollinie.

Der Frontalpol des Striatumellipsoides liegt 40–46 mm, am häufigsten 40 mm von dem Frontalpol der Hemisphäre entfernt, 3–9 mm, meistens 6 mm hinter dem Balkenknie und 1–9 mm hinter der vorderen Grenze des Insellappens oder im Niveau der vorderen Inselgrenze. Den hinteren Pol des Ellipsoides trifft man im Niveau an einer Stelle, die 57–68 mm vom vorderen Occipitalpol entfernt ist und gleichzeitig 3–14 mm, meistens 8 mm, vor dem Balkensplenium liegt. Weiter überschreitet er bei den meisten Fällen das kaudale Grenzniveau des Insellappens nach hinten um 4–14 mm. Nur bei einem Fall liegt er gerade in der kaudalen Grenze des Insellappens. Der kraniale Pol wird durch die Substanz des Schwanzkernkopfes und der kaudale durch den Bogenteil des Schwanzkernschwanzes (oder den absteigenden Teil des Schwanzkernschwanzes) gebildet.

Die dorsale Kontur des Striatumellipsoides wird durch gewisse Teile des Schwanzkernkopfes, nämlich Körper und Schwanz, welche sich an der Bildung der Wand des Cornu anterius sowie der Pars centralis des Seitenventrikels beteiligen, hergestellt. Die angegebene Kontur zieht bei allen Fällen ein wenig unterhalb der dorsalen Kontur des mediangeschnittenen Balkens und ein wenig oberhalb der ventralen Kontur desselben hin. Zu der dorsalen Grenze des Insellappens verhält sich die dorsale Kontur des Striatumellipsoides folgendermassen: Bei den meisten Fällen (11 unter 12) überschreitet die Kontur die dorsale Grenze des Insellappens nach oben um 4–10 mm, nur bei einem Fall um 2 mm nach unten. Der höchste Punkt der dorsalen Kontur des Ellipsoides liegt 37–48 mm tief, vom höchsten Punkt der median-dorsalen Kante der betreffenden Hemisphäre aus gerechnet.

Die ventrale Kontur des Striatumellipsoides ist im Gegensatz zur dorsalen nicht gleichmässig. Sie ist mit zwei ziemlich bedeutenden Vorsprüngen versehen. Der kraniale Vorsprung ist nichts anderes als der Colliculus nuclei caudati der Autoren. Er liegt in den nebeneinander liegenden Endteilen des II. und III. Segmentes, worüber ich bei der Beschreibung der betreffenden Segmente schon Näheres gebracht habe. Sein Gipfel ist vom kranialen Pol des Ellipsoides 13–19 mm entfernt (Tabelle 5). Der kaudale Vorsprung repräsentiert den Pedunculus nuclei lenticularis (d. h. Putamenstiel). Man trifft ihn auf einem Niveau, das vom kranialen Pol des Ellipsoides kranialwärts 24–32 mm, am häufigsten 25–30 mm entfernt ist (Tabelle 4) und dicht kaudal von der Unterhornspitze liegt. Wie ich schon bei der Beschreibung der Serienscheiben des III. Segmentes erwähnt habe, ist der Putamenstiel die direkte Fortsetzung der Putamenmasse, welche sich von dem ventralen Rand des Putamens ventralwärts bis zum Dach des Unterhorns erstreckt und sich hier

einerseits an die laterale Fläche des Mandelkernkomplexes anheftet und sich anderseits mit der Schwanzspitze des Schwanzkerns verbindet.

2) Betrachtung an der dorsalen Hemisphärenoberfläche (Fig. 3, c; Fig. 4, c).

Von der dorsalen Seite her gesehen, stellt das Corpus striatum ein seitlich etwas abgeplattetes, längliches Ellipsoid dar. Seine Längsachse zieht von kraniomedial nach kaudo-lateral. Die lineare Entfernung zwischen den beiderseitigen Frontalpolen beträgt 22–31 mm, die zwischen den beiderseitigen kaudalen Polen 39–59 mm. Der frontale und der occipitale Pol sind selbstredend, wie bei der seitlichen Ansicht, durch das Kopfende des Schwanzkerns resp. den Bogen teil des Schwanzkernschwanzes abgebildet. Die mediodorsale Kontur ist durch den Schwanzkern selbst und die latero-

Fig. 4.

ventrale im kranialen grösseren Teil durch das Putamen und im kaudalen kleineren Teil durch den unteren Schenkel (den reflektierten Teil) des Schwanzkernschwanzes hergestellt.

In bezug auf das gegenseitige Lageverhältnis fallen bei einem unter

6 Gehirnen die beiden kranialen Pole des Striatumellipsoides auf eine Ebene. Ebenso liegen die beiden kaudalen in einer Ebene. An einem Gehirn liegen die kranialen gleichnamigen Pole in einer Ebene, die kaudal dagegen um 1 mm auseinander gerückt sind. An einem anderen Gehirn verhält es sich ganz umgekehrt. Bei den zwei anderen Gehirnen überschreiten die beiden Pole der einen Seite sowohl kranial- als auch kaudalwärts die beiden Pole der anderen Seite. Bei einem übrigen Gehirn ist die Lage der Pole auf den beiden Seiten ziemlich asymmetrisch, indem die beiden Pole auf einer Seite die auf der anderen Seite kranialwärts bzw. kaudalwärts überschreiten.

3. Die Form- und Grössenverhältnisse zwischen Grosshirn und Corpus striatum.

Zwecks einer zusammenfassenden Betrachtung der Form und Grösse des Corpus striatum und des Grosshirns selbst habe ich als Grundlinie die Fronto-Occipital-Pollinie gebraucht. Als Länge des Grosshirns habe ich die auf die Medianlinie projizierte Entfernung zwischen den Frontal- und Occipitalpolen bei gleichzeitiger Betrachtung der beiderseitigen Hemisphären gemessen, als Breite den projizierten Querdiameter der hervorragendsten Punkte der beiderseitigen Hemisphären in der senkrechten Richtung gegen die Medianebene und als Höhe die projizierte Distanz des höchsten und des tiefsten Punktes der linksseitigen Hemisphäre in der gegen die Grundlinie senkrechten Ebene. Bezüglich der Länge, Breite und Höhe des Striatum gilt dasselbe Prinzip. Die Masse der dreierlei Diameter des Grosshirns und Corpus striatum sind aus beistehender Tabelle zu erschen.

Tabelle 10.

Fall	Grosshirn			Corpus striatum		
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1	147	127	105	51	66	42
2	162	117	114	50	57	41
3	167	136	109	58	68	43
4	172	132	105	60	70	41
5	160	132	108	53	65	40
6	165	122	99	56	64	35

Aus den obigen Zahlen habe ich den Längen-Breiten-Index und Längen-Höhen-Index berechnet.

Tabelle 11.

Fall	Grosshirn		Corpus striatum	
	Längen-Breiten-Index.	Längen-Höhen-Index.	Längen-Breiten-Index.	Längen-Höhen-Index.
1	86.3	70.6	129.4	82.5
2	72.2	70.3	114.0	82.0
3	81.4	65.2	117.0	74.1
4	76.7	61.0	116.6	68.3
5	82.5	67.5	122.6	75.4
6	73.9	60.0	114.2	62.5

Ordnet man die Längenbreitenindexe und Längenhöhenindexe des Gehirns von oben nach unten an, so findet man, dass die Reihenfolge der Indices des Gehirns und des Corpus striatum miteinander gut übereinstimmen. So darf man wohl annehmen, dass zwischen dem Längenbreitenindex und dem Längenhöhenindex des Corpus striatum und denen des betreffenden Grosshirns eine gewisse Korrelation herrscht.

Tabelle 12.

Fall	Längen-Breiten-Index	
	Grosshirn	Corp. striatum
2	72.2	114.0
6	73.9	114.2
4	76.7	116.6
3	81.4	117.2
5	82.5	122.6
1	86.3	129.4

Fall	Längen-Höhen-Index	
	Grosshirn	Corp. striatum
6	60.0	62.5
4	61.0	68.3
3	65.2	74.1
5	67.5	75.4
2	70.3	82.0
1	70.6	82.5

Das Schlussergebniss der vorliegenden Untersuchung ist in der folgenden Tabelle übersichtlich zusammengestellt.

Material	Nr.	1		2		3		4		5		6	
	Alter u. Gesch.	12 j ♂		26 j ♂		28 j ♂		51 j ♂		58 j ♂		36 j ♀	
	Seite	l	r	l	r	l	r	l	r	l	r	l	r
Kranio-kaudal- Länge des Corpus striatum mm	1. Segment	2	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4
	2. Segment	11	10	9	10	10	10	7	10	8	8	11	10
	3. Segment	12	14	16	18	20	19	24	25	21	19	19	18
	4. Segment	17	17	12	9	14	19	18	16	11	15	16	15
	5. Segment	8	7	8	10	7	3	6	5	9	5	6	5
	gesammt. Länge	50	49	49	50	54	57	60	60	53	51	56	52
Entfernung des Frontalpol's des Corp. striat. von dem Hemisphärenteil : mm	v. Front. Pol.	40	41	40	40	46	42	43	43	40	41	41	42
	v. Balken knie	8	7	6	6	8	9	9	9	5	6	3	4
	v. Insel : grenze	6	4	1	3	9	8	7	5	=	3	5	8
Entfernung des Kaudalpol's des Corp. striat. von dem Hemisphärenteil : mm	von Occip. pol.	57	57	67	67	66	68	68	67	66	65	67	65
	von Balken- Splenium	3	7	8	7	8	4	8	8	8	9	9	14
	v. hinter. Inselgrenze	5	4	=	5	9	10	14	13	8	6	10	7
Längsachse d. Corp. striat. gegen d. F-O-Pollinie d. Hemisphäre.		oben 6	oben 7	unten 3	=	oben 7	oben 9	oben 7	oben 6	oben 6	oben 6	=	oben 7
Drei Diameter d. Corp. striat., beiderseitig zusammen- betrachtet.	Länge	51		50		58		60		53		56	
	Breite	60		57		68		70		65		64	
	Höhe	42		41		43		41		40		35	
Längen-Breiten-Index d. Corp. striat.		129.4		114.0		117.2		116.6		122.6		114.2	
Längen-Höhen-Index d. Corp. striat.		98.1		98.0		86.6		80.0		90.5		76.8	
Drei Diameter d. betreffenden Gehirns	Länge	147		162		167		172		160		165	
	Breite	127		117		136		132		132		122	
	Höhe	105		114		109		105		108		99	
Längen-Breiten-Index d. Gehirns		86.3		72.2		81.4		76.7		82.5		73.9	
Längen-Höhen-Index d. Gehirns		70.6		70.3		65.2		61.0		67.5		60.0	

Nachtrag.

In der vorliegenden Arbeit bin ich auf die Beziehung der Schädelform zum Corpus striatum sowie auf die Beziehung des Schädeltypus zu der Lagerung des Gehirns und der Lagerung des Corpus striatum nicht weiter eingegangen. Nach Ausführung der Messung an den Schädeln und betreffenden Hemisphären fand ich, dass die letzteren in der Fixationsflüssigkeit eine gewisse Umgestaltung erlitten hatten. Deshalb bin ich eben dabei, an dem in situ, d. h. im Schädel vollständig fixiertem Material, aufs neue diesbezügliche Untersuchungen anzustellen.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel XII.

Die Figuren sind 1.5 mal vergrößert wiedergegeben.

Fig. 1.-3. Frontalschnittserie.

Fig. 4. Sagittalschnittserie.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

K. Shimada.