Beitrag zur Topographie der grossen Äste der Bauchaorta.

Von

Toratoshi Taniguchi.

Aus dem Anatomischen Institut der Keio Universität, Tokyo.

Über das Lageverhältnis der grossen Äste der Bauchaorta gegen Wirbelsäule hin und die Entfernung zwischen den Ursprungsstellen derselben haben viele Autoren schon des öfteren eingehende Studien gemacht, doch stimmen die Angaben miteinander nicht überein. Seit kurzem verfolgt Heidsieck ('28) diese Frage bei annähernd 100 Europäern statistisch und vermutet, dass die Lage der Äste geographisch je nach der Zusammensetzung der Bevölkerung wechseln würde.

Ich habe 100 Japaner untersucht, wobei die Behandlungsweise nach Heidsieck und Adachi vorgenommen wurde. Die Resultate bei den Japanern von Adachi ('28) und Tsukamoto ('29) über die betreffende Frage wurden zusammen mit denen bei den anderen Rassen verglichen.

Befunde.

A. Ursprungshöhe der Arterien gegen Wirbelsäule.

Zuerst werde ich die Ursprungshöhe der Gefässe gegen Wirbelsäule hin beschreiben. Nach der Methode von Adachi habe ich hier immer die Mittelwerte (durchschnittliche oder mittlere Ursprungshöhe) berechnet. Dabei behandelte ich die einzelnen Drittel der Wirbelkörper und die Zwischenscheibe als gleichweite Klassen der Reihenvariation; die Klassengrenzen wurden durch 1, 2, 3, ... gezeichnet.

I. A. coeliaca.

Die A. coeliaca geht bei meinen Fällen, wie Tabelle 2 zeigt, am häufigsten in der Höhe des kranialen Drittels des I. Lendenwirbels aus, was mit dem Befund von Heidsieck und Tsukamoto

völlständig übereinstimmt; bei Tsukamoto steht aber die mittlere Ursprungshöhe etwas kaudaler als bei Adachi und mir. Die Ursprungshöhe der Arterien ist auch bei den Franzosen von Piquand, Bloch und Michon, bei den Italienern von Monguidi, Rossi und Cova und bei den Koreanern von Adachi verfolgt, die Anzahl des untersuchten Materials ist hier aber nicht gross.¹⁾ Broman gibt auch die Ursprungshöhe an, aber nicht im Verhältniss zu den Wirbelkörpern und Zwischenscheiben, sondern zu den Aortensegmenten.

Ich bekam folgende Mittelwerte (Tabelle 1).

Tabelle 1.

Wirbel	XI. B.	XII. B.					I. L.				II. L.	
Klassengrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Frequenz (Leichenzahl)	Adachi		2	3	7	15	11	6	4	2		M=6.0
	Heidsieck			5	18	18	23	14	7	6	3	M=6.4
	Tsukamoto			2	12	12	30	17	15	9	4	M=7.0
	Taniguchi		2	8	14	22	27	18	7	1	1	M=6.1

M=Mittelwert, B=Brustwirbel, L=Lendenwirbel.

Tabelle 2.

Ursprungshöhe der A. coeliaca.

	Heidsieck			Adachi			Tsukamoto			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
XII. B.	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—	2
	3	2	5	1	2	3	1	1	2	4	3	8
	14	4	18	5	2	7	9	2	11	12	2	14
	12	6	18	13	2	15	9	3	12	19	3	22
I. L.	19	4	23	9	2	11	21	9	30	27	—	27
	11	3	14	4	2	6	14	3	17	16	2	18
	2	5	7	3	1	4	9	6	15	6	1	7
	3	3	6	2	—	2	8	1	9	1	—	1
II. L.	1	2	3	—	—	—	3	1	4	—	1	1
Summe	65	29	94	37	13	50	74	26	100	88	12	100

1) Zit. bei Adachi.

II. A. mesenterica superior.

Die Ursprungshöhe der A. mesenterica superior haben Heidsieck bei den Europäern, Adachi und Tsukamoto bei den Japanern untersucht. Ich habe ihre mittlere Ursprungshöhe ausgerechnet und in folgender Tabelle dargelegt (Tabelle 3).

Tabelle 3.

Wirbel		XII. B.			I. L.				II. L.				III. L.	
Klassengrenzen		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Frequenz (Leichenzahl)	Adachi			4	5	12	12	10	4	1	1			M=7.3
	Heidsieck			3	4	21	22	18	16	8	2	1		M=8.0
	Tsukamoto			3	2	19	20	28	19	6	5	0	2	M=8.5
	Taniguchi				7	22	30	19	18	3	1			M=7.8

Bei meinem Material entspringt die Arterie am häufigsten im mittleren Drittel des I. Lendenwirbels und die mittlere Ursprungshöhe findet sich in der gleichen Höhe. Daraus geht hervor, dass die Höhe bei mir höher als bei Heidsieck und Tsukamoto ist, dagegen niedriger als bei Adachi. Nach Corcy und Aubert entspringt die Arterie bei 120 erwachsenen Franzosen 66 mal (55%) in der Höhe der Bandscheibe zwischen dem XII. Brust- und I. Lendenwirbel, also beträchtlich höher als bei den sonstigen Rassen. Die Befunde bei den Europäern von Broman, Monguidi, Bloch und Michon kann man mit unseren nicht vergleichen, da das Material und die Methode bei ihnen nicht deutlich angegeben sind.

Tabelle 4.

Ursprungshöhe der A. mesenterica superior.

XII. B.	Heidsieck			Adachi			Tsukamoto			Taniguchi		
	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀
I. L.	3	—	3	1	3	4	2	1	3	—	—	—
	3	1	4	3	2	5	1	1	2	5	2	7
	14	7	21	9	3	12	16	3	19	19	3	22
	16	6	22	10	2	12	13	7	20	27	3	30
	17	1	18	9	1	10	22	6	28	18	1	19
II. L.	8	8	16	3	1	4	12	6	18	16	2	18
	4	4	8	1	—	1	6	—	6	3	—	3
	—	2	2	1	—	1	2	3	5	—	1	1
III. L.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—
Summe	66	29	95	37	12	49	78	28	106	88	12	100

III. Aa. renales.

Ich habe auch mit zwei oder mehr Arterien versehene Nieren gesehen, was schon vielen Autoren oft bei ihren statistischen Verfolgungen entgangen ist. Ich habe davon nur die Hauptarterien gezählt, wie es schon Heidsieck getan hatte. Stelle ich die Befunde und Mittelwerte aller Autoren tabellarisch zusammen, so ergibt sich:

Tabelle 5.

Wirbel		XII. B.			I. L.				II. L.				III. L.				IV. L.	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Klassengrenzen																		
Rechte A. renalis	Adachi	2	1	2	9	10	18	8	1	2	2							M= 9.1
	Heidsieck			2	7	19	20	20	10	3	0	1						M= 9.7
	Tsukamoto		2	2	7	10	29	26	12	5	4	0	1	0	1			M=10.1
	Taniguchi			4	9	27	29	23	2	4	2							M= 9.4
Linke A. renalis	Adachi		2	3	3	13	17	8	6	1	2							M= 9.4
	Heidsieck			2	3	21	21	20	10	1	4							M= 9.8
	Tsukamoto			3	4	14	19	24	17	9	6	1	2					M=10.5
	Taniguchi	1	0	11	16	28	29	9	4	1	0	1						M= 9.9

Diese Arterien entspringen bei mir am häufigsten in der Höhe der Bandscheibe zwischen dem I. und II. Lendenwirbel und die durchschnittliche Ursprungshöhe findet sich auch ganz in der gleichen Höhe. Aus Tabelle 5 kann man ersehen, dass die durchschnittliche Ursprungshöhe (Mittelwert) bei Adachi am höchsten, bei Tsukamoto am niedrigsten und bei Heidsieck und mir zwischen denen der beiden Autoren sich bewegt. Helm hat bei der Untersuchung der Nierenlage auch die Ursprungshöhe der Nierenarterien untersucht und konnte konstatieren, dass die Höhe bei $\frac{2}{3}$ der Fälle in der Höhe der Bandscheibe zwischen dem I. und II. Lendenwirbel liegt. Es ist bekannt, dass die rechte und linke Nierenarterie oft nicht in gleicher Höhe entspringen. Ich fand bei 32 unter 100 Fällen, also bei 32%, den Ursprung beiderseits gleich hoch, in 68 Fällen dagegen ungleich hoch, und zwar 47 mal links kaudaler als rechts und 21 mal rechts kaudaler als links. Wenn ich die bisherigen Befunde der Autoren tabellarisch zusammenstelle, so ergibt sich folgendes:

Tabelle 6.

Ursprungshöhe der beiderseitigen Aa. renales.

Autor	rechts höher	links höher	beiderseits gleich hoch
Adachi	69	20	16
Heidsieck	25	14	43
Levi	5	15	35
Kubo	8	6	6
Iijima	10	6	1
Nagasawa	53	27	15
Ooniwa	23	3	4
Tsukamoto	24	7	31
Taniguchi	47	21	32
Total	264	119	183

Auch nach Helm entspringen die beiderseitigen Nierenarterien häufig gleich hoch von der Aorta (45.2%), etwas seltener die linke tiefer als die rechte (39.8%) und ganz selten die rechte tiefer als die linke (15.1%). Bloch und Michon fanden, dass die rechte Arterie bei 11 Franzosen am häufigsten in der Höhe der Bandscheibe zwischen dem I. und II. Lendenwirbel und die linke am häufigsten am Oberrand des II. Lendenwirbels entspringen. Aus obigen kann man mit Sicherheit schliessen, dass die rechte Nierenarterie gewöhnlich höher als die linke entspringt.

Tabdlle 7.

Ursprungshöhe der A. renalis dextra.

XII. B.	Heidsieck			Adachi			Tsukamoto			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
I. L.	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—
	2	—	2	—	2	2	1	1	2	3	1	4
	5	2	7	7	2	9	7	—	7	7	2	9
	16	3	19	9	1	10	4	6	10	24	3	27
II. L.	12	8	20	14	4	18	21	8	29	26	3	29
	15	5	20	7	1	8	18	8	26	21	2	23
	6	4	10	1	—	1	11	1	12	2	—	2
	1	2	3	2	—	2	5	—	5	3	1	4
	—	—	—	2	—	2	4	—	4	2	—	2
III. L.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Summe	57	25	82	43	12	55	73	26	99	88	12	100

Tabelle 8.

Ursprungshöhe der A. renalis sinister.

XII. B.	Heidsieck			Adachi			Tsukamoto			Taniguchi		
	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀
	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1
I. L.	2	—	2	1	2	3	3	—	3	—	—	—
	2	1	3	2	1	3	2	2	4	8	3	11
	18	3	21	11	2	13	10	4	14	13	3	16
	14	7	21	13	4	17	14	5	19	27	1	28
II. L.	12	8	20	6	2	8	14	10	24	25	4	29
	8	2	10	6	—	6	13	4	17	9	—	9
	1	—	1	1	—	1	8	1	9	4	—	4
	—	4	4	2	—	2	6	—	6	1	—	1
III. L.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1
Summe	57	25	82	43	12	55	73	26	99	88	12	100

IV. A. mesenterica inferior.

Der Ursprung findet sich bei meinen Fällen am häufigsten im mittleren Teil des III. Lendenwirbelkörpers und die durchschnittliche Ursprungshöhe auch in der Höhe der Mitte desselben. Stelle ich die Resultate von Heidsieck, Adachi, Tsukamoto und mir tabellarisch zusammen, so ergibt sich (Tabelle 9):

Tabelle 9.

Wirbel	I. L.				II. L.				III. L.				IV. L.				V. L.	
Klassengrenzen																		
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Frequenz (Leichenzahl)	Adachi				1	10	8	14	11	9						M=15.5		
	Heidsieck	1	0	1	2	4	22	10	20	24	17	1				M=15.0		
	Tsukamoto				2	7	15	22	28	16	10	5	0	1		M=16.3		
	Taniguchi					7	19	33	24	12	3	1				M=15.7		

Aus der Tabelle 9 ersieht man, dass die Mittelwerte von Adachi mit den meinen vollkommen übereinstimmen. Die mittlere Ursprungshöhe von Tsukamoto ist viel tiefer als die von Adachi und mir, die von Heidsieck bei den Europäern viel höher als von Adachi, Tsukamoto und mir bei den Japanern, während der Befund von Corcy und Aubert bei den Europäern mit unserem Befund bei den Japanern übereinstimmt, indem nach ihnen die Arterie unter 120 Erwachsenen

96 mal in der Höhe des III. Lendenwirbels und 12 mal in denen der Bandscheibe zwischen dem II. und III. Lendenwirbel entspringt. Unter 11 Fällen der Franzosen entspringen die Arterien nach Bloch und Michon 7 mal vor dem III. Lendenwirbel.

Tabelle 10.

Ursprungshöhe der A. mesenterica inferior.

I. L.	Heidsieck			Adachi			Tsukamoto			Taniguchi		
	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. L.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	2	—	2	—	1	1	—	2	2	—	—	—
	4	—	4	5	10	5	7	—	7	6	1	7
III. L.	19	3	22	8	8	—	7	8	15	15	4	19
	8	2	10	13	14	1	19	3	22	30	3	33
	13	7	20	9	11	2	20	8	28	22	2	24
	13	11	24	6	9	3	12	4	16	12	—	12
IV. L.	3	4	7	—	—	—	9	1	10	2	1	3
	3	3	6	—	—	—	4	1	5	1	—	1
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Summe	68	30	98	41	53	12	78	28	106	88	12	100

V. Teilungshöhe der Aorta abdominalis gegen Wirbelsäule.

Die Höhe der Teilungsstelle steht bei meinen Fällen am häufigsten im kaudalen Teil des IV. Lendenwirbels, wie Tabelle 12 zeigt. Ich habe die Mittelwerte aus den Befunden von Japanern nach Adachi, Tsukamoto und mir sowie von Europäern nach Heidsieck, Quain und Sson-Jaroschewitsch ausgerechnet (Tabelle 11).

Tabelle 11.

Wirbel		II. L.			III. L.			IV. L.			V. L.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Klassengrenzen															
Frequenz (Leichen- zahl)	Adachi					3	13	50	64	46	25	5	2		M=8.7
	Heidsieck					4	10	15	26	27	12	3	1		M=8.7
	Quain	1	2	3		12	43	36	47	30	21	0	1		M=7.9
	Sson-Jarosche- witsch		1	1		5	8	14	15	10	14	1	2		M=8.4
	Tsukamoto					1	13	12	19	26	8	8	8		M=9.3
	Taniguchi					1	3	14	42	33	3	3			M=8.7

Daraus kann man ersehen, dass die Werte von mir mit denen von Adachi und Heidsieck vollständig übereinstimmen. Es ist beachtenswert, dass der Befund von Tsukamoto bei den Japanern trotz der grossen Leichenzahl mit dem von Adachi und mir verschieden sich verhält, was schwer zu verstehen ist.

Die Feststellung von Adachi und Sson-Jaroschewitsch, dass die Aortenteilung im Laufe des Lebens zur Wirbelsäule nach und nach kaudalwärts sich verschiebt, ist richtig, denn auch ich habe diese Beobachtung gemacht.

Tabelle 12.
Höhe der Aortenteilung.

III. L.	Heidsieck			Adachi			Tsukamoto			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	4	—	4	3	—	3	—	1	1	—	1	1
IV. L.	8	2	10	7	6	13	8	5	13	3	—	3
	10	5	15	38	12	50	8	4	12	11	3	14
	21	5	26	50	14	64	15	4	19	37	5	42
	17	10	27	36	10	46	21	5	26	32	1	33
V. L.	4	8	12	20	5	25	6	2	8	2	1	3
	2	1	3	3	2	5	6	2	8	3	—	3
	1	—	1	1	2	3	7	1	8	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—
Summe	67	31	98	158	50	208	73	26	99	88	12	100

B. Entfernung zwischen jeden zwei Ursprüngen der Arterien.

I. Abstand zwischen Ursprüngen der A. mesenterica superior und der A. coeliaca (Tabelle 13).

Tabelle 13.

Abst. zw. A. mesent. sup. u. A. coeliaca	Heidsieck			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
0 cm	—	—	—	3	—	3
$\frac{1}{2}$	1	1	2	1	—	1
1	27	9	36	23	7	30
$1\frac{1}{2}$	25	16	41	46	5	51
2	8	4	12	10	—	10
$2\frac{1}{2}$	6	1	6	5	—	5
3	1	—	1	—	—	—
Leichenzahl	67	31	98	88	12	100
Mittelwert	1.41	1.42	1.43	1.42	1.20	1.40

Adachi fand, dass die Distanz vom unteren Umfang des Ursprungs der *A. coeliaca* bis zum oberen desselben der *A. mesenterica superior* in den 23 Fällen 5–10 mm beträgt. Nach Heidsieck, der die Ursprungsmitten der beiden Gefässe als Messpunkte benutzte, beläuft sich der Abstand am häufigsten auf $1-1\frac{1}{2}$ cm. Bei den Europäern hatten auch Schwalbe, Broman, Frédéric, u. a. sie gemessen, wobei aber die Messungsmethode wenig deutlich angegeben ist. Ich fand den Abstand der beiden Ursprungsmitten von 1 und $1\frac{1}{2}$ cm am häufigsten, doch nicht selten auch von 2 cm. Als Mittelwerte ergibt sich beim Mann 1.42, beim Weib 1.20, durchschnittlich 1.40 cm, also beim Mann etwas länger als beim Weib und bei den Europäern länger als bei den Japanern.

II. Abstand zwischen Ursprüngen der *A. mesenterica superior* und der *A. renalis dextra* und *sinistra* (Tabelle 14, 15).

Tabelle 14.

Abst. zw. <i>A.</i> <i>mes. sup.</i> u. <i>A. ren. dextr.</i>	Heidsieck			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
$-1\frac{1}{2}$	—	—	—	1	—	1
0	1	—	1	8	1	9
$\frac{1}{2}$	7	6	13	16	2	18
1	12	8	20	19	3	22
$1\frac{1}{2}$	18	4	22	17	2	19
2	12	4	16	17	2	19
$2\frac{1}{2}$	2	1	3	3	2	5
3	3	1	4	3	—	3
$3\frac{1}{2}$	—	—	—	4	—	4
Leichenzahl	55	24	79	88	12	100
Mittelwert	1.46	1.27	1.41	1.30	1.33	1.33

Tabelle 15.

Abst. zw. A. mesent. sup. u. A. ren. sinistr.	Heidsieck			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
$-\frac{1}{2}$ cm	—	—	—	1	—	1
0	1	—	1	2	—	2
$\frac{1}{2}$	5	3	8	4	—	4
1	12	7	19	21	3	24
$1\frac{1}{2}$	17	6	23	22	6	28
2	15	4	19	21	2	23
$2\frac{1}{2}$	3	3	6	6	1	7
3	2	1	3	4	—	4
$3\frac{1}{2}$	—	—	—	2	—	2
4	—	—	—	3	—	3
$4\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—
$5\frac{1}{2}$	—	—	—	1	—	1
6	—	—	—	1	—	1
Leichenzahl	55	24	79	88	12	100
Mittelwert	1.52	1.50	1.51	1.76	1.54	1.74

So beträgt die betreffende Entfernung bei mir rechts am häufigsten $1-1\frac{1}{2}$ und 2 cm, links $1\frac{1}{2}$, 1 und 2 cm. Die Mittelwerte lassen sich berechnen nämlich rechts auf $\delta = 1.30$, $\varphi = 1.33$, und $\delta \varphi = 1.33$, links auf $\delta = 1.76$, $\varphi = 1.54$, und $\delta \varphi = 1.74$ cm. Die Entfernung ist also rechts etwas kürzer als links. Auf die Differenz zwischen Japanern und Europäern kann man keinen grossen Wert legen, weil der Abstand nach beiden Seiten bei beiden meistens umgekehrt gross ist.

III. Abstand zwischen Ursprüngen der A. mesenterica inferior und der A. coeliaca (Tabelle 16).

Tabelle 16.

Abst. zw. A. mesent. inf. u. A. coel.	Heidsieck			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
$6\frac{1}{2}$ cm	3	2	1	—	—	—
7	—	—	—	3	5	8
$7\frac{1}{2}$	7	4	11	13	1	14
8	10	3	13	18	3	21
$8\frac{1}{2}$	8	6	14	14	2	16
9	11	5	16	10	1	11
$9\frac{1}{2}$	10	3	13	10	—	10
10	4	2	6	7	—	7
$10\frac{1}{2}$	4	—	4	8	—	8
11	6	3	9	4	—	4
$11\frac{1}{2}$	1	1	2	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—
$12\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	1	—	1
Leichenzahl	64	29	93	88	12	100
Mittelwert	8.96	8.83	8.92	8.84	7.71	8.70

Der häufigere Abstand beträgt bei mir $7\frac{1}{2}$ bis 9 cm, nach Heidsieck $7\frac{1}{2}$ – $9\frac{1}{2}$ cm. Der Mittelwert ist $\delta = 8.84$, $\varphi = 7.71$ und $\delta \varphi = 8.70$ cm. Ein kleiner Geschlechtsunterschied scheint hier zu bestehen, dagegen kein Rassenunterschied.

IV. Abstand zwischen der A. mesenterica inferior und superior (Tabelle 17).

Der Abstand von beiden Aa. mesentericae beträgt bei mir meistens 6–8 cm, nach Heidsieck bei den Europäern $6\frac{1}{2}$ – $8\frac{1}{2}$ cm, nach v. Bardeleben 5–7 cm, nach Schwalbe 69–95 mm. Die Mittelwerte bei den Japanern betragen $\delta = 7.35$, $\varphi = 6.46$ und $\delta \varphi = 7.30$ cm, beim Mann also grösser als beim Weib. Zwischen beiden Rassen ist kein Unterschied erkennbar.

Tabelle 17.

Abst. zw. A. mesent. inf. u. sup.	Heidsieck			Taniguchi		
	δ	φ	$\delta + \varphi$	δ	φ	$\delta + \varphi$
5 cm	3	—	3	1	—	1
$5\frac{1}{2}$	—	2	2	—	—	1
6	2	1	3	8	7	15
$6\frac{1}{2}$	10	5	15	19	1	20
7	13	5	18	12	2	14
$7\frac{1}{2}$	10	7	17	16	2	18
8	11	2	13	13	—	13
$8\frac{1}{2}$	7	4	11	8	—	8
9	2	1	3	6	—	6
$9\frac{1}{2}$	5	2	7	3	—	3
10	1	—	1	—	—	—
$10\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—
$11\frac{1}{2}$	—	—	—	1	—	1
Leichenzahl	64	29	93	88	12	100
Mittelwert	7.52	7.41	7.45	7.35	6.46	7.30

V. Abstand zwischen Ursprüngen der A. mesenterica inferior und der Aortenteilung (Tabelle 18).

In vielen Lehrbüchern ist diese Strecke verschieden gross angegeben. (Broesike: etwa 3–4 cm, Jossel-Waldeyer: 5–6 cm, Testut: 5–6 cm, Schwalbe: 40.5–57 mm), wenngleich der kaudale Messpunkt

nicht exakt erwähnt ist. Nach Heidsieck zog ich als diesen Punkt den Scheitelpunkt des Teilungswinkels heran. Der Abstand beträgt häufig 4–6 cm und der Mittelwert $\delta = 4.96$, $\varphi = 4.29$ und durchschnittlich 4.95 cm. Er ist also beim Weib bei mir und Heidsieck durchschnittlich kürzer als beim Mann, beim Japaner länger als beim Europäer.

Tabelle 18.

Abst. zw. A. mesent. sup. u. Aortenteilung	Heidsieck			Taniguchi		
	δ	φ	$\delta + \varphi$	δ	φ	$\delta + \varphi$
1 cm	—	1	1	—	—	—
$1\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—
2	—	1	1	—	—	—
$2\frac{1}{2}$	1	2	3	—	—	—
3	3	4	7	—	2	2
$3\frac{1}{2}$	11	7	18	1	—	1
4	17	7	24	16	5	21
$4\frac{1}{2}$	13	3	16	21	1	22
5	13	3	16	23	2	25
$5\frac{1}{2}$	5	1	6	11	2	13
6	3	—	3	10	—	10
$6\frac{1}{2}$	—	—	—	6	—	6
7	1	—	1	—	—	—
Leichenzahl	67	29	96	88	12	100
Mittelwert	4.39	3.67	4.17	4.96	4.29	4.95

VI. Abstand zwischen der A. coeliaca und der Aortenteilung (Tabelle 19).

Der Abstand beträgt meistens 13 bis $14\frac{1}{2}$ cm und die Mittelwerte sind beim Mann 13.74, beim Weib 11.96 und durchschnittlich 13.5 cm. Diese Strecke kann man natürlich als die ganze Länge der Bauchaorta ansehen. Der Geschlechtsunterschied ist hier sehr deutlich zu erkennen.

Tabelle 19.

Abst. zw. A. coeliaca u. Aortenteilung	Heidsieck			Taniguchi		
	♂	♀	♂ + ♀	♂	♀	♂ + ♀
10 cm	—	1	1	—	1	1
10½	—	1	1	—	—	—
11	4	2	6	1	3	4
11½	1	5	6	5	2	7
12	5	4	9	7	2	9
12½	6	2	8	8	—	8
13	10	3	13	14	2	16
13½	9	2	11	12	1	13
14	8	—	8	11	1	12
14½	9	3	12	12	—	12
15	3	1	4	6	—	6
15½	3	1	4	6	—	6
16	1	1	2	1	—	1
16½	1	—	1	2	—	2
17	—	—	—	—	—	—
17½	—	—	—	2	—	2
18	—	—	—	—	—	—
18½	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—
19½	—	—	—	1	—	1
Leichenzahl	60	26	86	88	12	100
Mittelwert	13.48	12.65	13.25	13.74	11.96	13.50

Schluss.

Als Resultate der vorliegenden Untersuchung, ausser der Zahl, die in den Tabellen niedergelegt wurde, kann noch folgendes zugefügt werden.

1. In bezug auf die Ursprungshöhe der grossen Äste der Bauchaorta kann man zwischen Japanern und Europäern keinen Unterschied konstatieren.

2. Die rechte Nierenarterie entspringt bei meinem Material häufig viel kranialer als die linke.

3. Es ist beachtenswert, dass die Entfernungen zwischen Aortenteilung und A. coeliaca sowie A. mesenterica inferior beide grösser bei den Japanern als bei den Europäern sind.

Literatur.

1. Adachi, B., Das Arteriensystem der Japaner. Band I und II. Tokyo. 1928.
2. Bloch, J. C. et Michon, L., L'origine des grosses branches de l'aorte abdominale. Bulletins et Mémoires de la Société anatomique de Paris. 92^e Année. 1922. (zitiert bei Adachi).
3. Broman, I., Über die Entwicklung und „Wanderung“ der Zweige der Aorta abdominalis beim Menschen nebst Bemerkungen über Gefässwurzelwanderungen im allgemeinen. Anat. Hefte. Bd. 36. 1908.
4. Broesike, G., Lehrbuch der normalen Anatomie des menschlichen Körpers. 10. Aufl. Berlin. 1920.
5. Corsy et Aubert, Artères de l'intestin grêle et des côlons. Bibliographie anatomique. T. 23. 1913. (zitiert bei Adachi).
6. Dwight, T., The branches of the superior mesenteric artery of the jejunum and ileum. Anat. Anz. Bd. 23. 1903.
7. Frédéric, J., Beitrag zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Äste der Aorta descendens beim Menschen. Morph. Arbeiten. Bd. 7. 1897.
8. Heidsieck, E., Zur Skeletotomie der grossen Äste der Bauchaorta. Anat. Anz. Bd. 66. 1928.
9. Helm, F., Zur Topographie der menschlichen Nieren. Anat. Anz. Bd. 11. 1896.
10. Iijima, H., Lageverhalten der A. und V. renalis und des Ureters der Japaner. Tokyo-Iji-Shinshi. Nr. 2415. 1909. (Japanisch).
11. Kubo, T., Über die Varietäten der A. renalis. Tokyo-Igakkwai-Zasshi. Bd. 21. 1907. (Japanisch).
12. Levi, G., Le variazioni delle arterie surrenali e renali studiate col metodo statistico seriale. Arch. Ital. Anat. e Embriol. Vol. 8. 1909. (zitiert bei Heidsieck).
13. Monguirdi, C., Topografia dei principali rami viscerali dell'Aorta abdominale (con applicazioni alla chirurgia). Milano. 1894. (zitiert bei Adachi).
14. Nagasawa, Y., Niere und Arterie. Pathol. und Therap. Bd. 1. 1927. (Japanisch).
15. Ooniwa, M., Vergleichend-anatomische Bemerkung über die Lage der Niere. Kaibogaku-Zasshi. Bd. 2. 1929. (Japanisch).
16. Piquand, G., Recherches sur l'anatomie du tronc coeliaque et de ses branches. Bibliographie anatomique. T. 19. 1910. (Schwalbe's Jahresberichte. Bd. 19).
17. Quain, Anatomy of the arteries of the human body. London. 1844. (zitiert bei Adachi).
18. Schwalbe, G., Über Wachstumsverschiebungen und ihren Einfluss auf die Gestaltung des Arteriensystems. Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 12. 1878. (zitiert bei Adachi).
19. Ssosan-Jaroschewitsch, A. J., Zur chirurgischen Anatomie der Aortabifurkation. Zeitschr. f. Anat. und Entw.-Gesch. Bd. 79. 1926.
20. Testut, L., Traité d'anatomie humaine. 7. éd. Paris. 1921.
21. Tsukamoto, N., Über die Arterien in der Bauchhöhle bei den Japanern. Kaibogaku-Zasshi. Bd. 2. 1929. (Japanisch).
22. v. Bardeleben, K., Lehrbuch der systematischen Anatomie des Menschen. Berlin. Wien. 1906.