Beiträge zur Anatomie des Lymphgefäßsystems der Wirbeltiere und des Menschen (Japaner).

Von

Takusaburo Kihara.

Professor der Anatomie an der Kaiserlichen Universität zu Kyoto.

Nr. 26

Die Entwicklung der Lymphknötchen am Lymphgefäßsystem des Huhnes.

Von

Michiroku Kondo.

Aus dem Anatomischen Institut der Kaiserlichen Universität zu Kyoto.

Dass im Lymphgefäßsystem des Huhnes die lymphatischen Gebilde nicht in Form von Lymphknoten (Lymphdrüse) und nicht in bestimmten Lymphgefäßen lokalisiert vorkommen, sondern in Form von Lymphknötchen (Lymphfollikel) an dem ganzen Lymphgefäßsystem disseminiert auftreten, habe ich in der vorigen Arbeit¹⁾ konstatiert. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Entwicklung dieser Lymphknötchen.

Die als Untersuchungsmaterial benützten Hühnerembryonen und Hühnchen habe ich selber im Brutofen gezüchtet, so dass ich ihre Alter genau weiss.

1) Kondo, M., Die lymphatischen Gebilde im Lymphgefäßsystem des Huhnes. Okajimas Fol. Anat. Jap. Bd. XV, 1937.

Die Darstellungs- und die Untersuchungsmethode der lymphatischen Gebilde sind wie bei der vorigen Arbeit.

Befund an den Lymphgefäßen in verschiedenen Entwicklungsstadien.

An den Lymphgefäßen der Hühnerembryonen vom 15. Bebrütungstage an bis zur Ausschlüpfung wurden die als Anlage der Lymphknötchen anzusehenden Gebilde nicht vorgefunden.

Auch war an den Hühnchen von dieser Anlage lange Zeit, nämlich bis zum 27. Lebenstage, nichts zu sehen.

1. Hühnchen. 28 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 55 g, Scheitelsteisslänge 12.1 cm.

Die Vasa lymphacea jugularia sind an ihrem cranialen und caudalen Drittel stellenweise mit einer dünnen Schicht von zellreichem perivaskulärem Gewebe umgeben. Die Zellen, die sich in diesem perivaskulären Gewebe finden, sind zum Teil mit ovalem und zum Teil mit rundem Kern versehen. Die Zellen letzterer Art sind jedoch nur spärlich vorhanden und bilden keine zirkumskripten Anhäufungen. Die zellreiche perivaskuläre Schicht findet sich auch an den Vasa lymphacea ischiadica in der Höhe der Mitte des Oberschenkels und an den Vasa lymphacea axillaria in deren Verlauf am Ellenbogengelenk und in der Achselhöhle vor.

2. Hühnchen. 30 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 60.5 g, Scheitelsteisslänge 12.5 cm.

An den Vasa lymphacea jugularia sind nirgends Zellanhäufungen anzutreffen. Die die V. femoralis begleitenden Lymphgefäße sind am rechten sowie am linken Bein in der Höhe der Mitte des Oberschenkels streckenweise von zellreichem perivaskulärem Gewebe umgeben. Die Zellen besitzen meist ovalen Kern.

3. Hühnchen. 31 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 41.5 g, Scheitelsteisslänge 11 cm.

Die Vasa lymphacea jugularia dextra sind in ihrem cranialen und caudalen Drittel, die Vasa lymphacea ischiadica am rechten Bein in der Höhe der Mitte des Oberschenkels, am linken Bein in der Höhe des Kniegelenks, die Vasa lymphacea axillaria am rechten Flügel in der Höhe des Ellenbogengelenks und in der Achselhöhle, am linken Flügel

in der Mitte des Oberarmes stellenweise mit zellreichem perivaskulärem Gewebe versehen.

In diesem zellreichen Gewebe bilden Lymphocyten das Hauptzelelement, doch ist von Knötchenbildung noch nichts zu finden.

4. Hühnchen. 32 Tage nach der Ausbrütung.

Die perivaskulären Zellanhäufungen sind gegen das umgebende Gewebe noch nicht scharf abgegrenzt, obgleich sie ziemlich reich an Lymphocyten sind. Sie finden sich in folgenden Lymphstämmen:

An den Vasa lymphacea jugularia sinistra am cranialen Anfang und thoracalen Ende,

an den Vasa lymphacea ischiadica sinistra in der Höhe des Kniegelenks und an den Vasa lymphacea axillaria in der Höhe des Ellbogengelenks.

5. Hühnchen. 33 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 47.0 g, Scheitelsteisslänge 12 cm.

Perivaskuläre Zellanhäufungen finden sich in dem mittleren Drittel der Vasa lymphacea jugularia dextra, an den Vasa lymphacea ischiadica des rechten Beines in der Höhe des Kniegelenks und in der Mitte des Oberschenkels und am linken Beine in der Höhe der Mitte des Oberschenkels, an den Vasa lymphacea axillaria des rechten Flügels in der Höhe des Ellbogengelenks und in der Achselhöhle. Die meisten Zellanhäufungen sind diffus. Nur eine Zellanhäufung, welche sich an den Vasa lymphacea jugularia findet, ist reich an Lymphocyten und ziemlich gut begrenzt.

6. Hühnchen. 34 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 81.7 g, Scheitelsteisslänge 13.5 cm.

Perivaskuläre Zellanhäufungen finden sich an den linken Vasa lymphacea jugularia in ihrem mittleren und caudalen Drittel, an den Vasa lymphacea ischiadica des rechten Beines im Verlauf am Oberschenkel und weiter am rechten Beine im Verlauf dieser Vasa in der Kniekehle, an den Vasa lymphacea axillaria des rechten Flügels in der Mitte des Vorderarmes, am Ellbogengelenk und in der Achselhöhle, an den gleichnamigen Lymphstämmen des linken Flügels, ausser an den beim rechten Flügel erwähnten Stellen, noch in der Mitte des Oberarmes.

Bei diesem Fall sind alle Anhäufungen bedeutend zellreicher als bei den vorigen Fällen. Aber eine zirkumskripte Lymphocytenansammlung ist noch nicht zu finden.

7. Hühnchen. 36 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 133.7 g, Scheitelsteisslänge 15.0 cm.

Die perivaskulären Zellanhäufungen finden sich an den Vasa lymphacea jugularia dextra am cranialen und caudalen Drittel, an den Vasa lymphacea ischiadica des rechten Beines in der Gegend des Kniegelenkes und am proximalen Ende des Oberschenkels, an den Vasa lymphacea axillaria des rechten und linken Flügels zerstreut im Verlauf am Vorder- und Oberarme.

Die Zellen sind in den meisten Anhäufungen locker angeordnet und bilden noch keine Knötchen. Nur bei einigen Zellanhäufungen an dem caudalen Drittel der Vasa lymphacea jugularia dextra sind die Zellen zahlreich vorhanden und stellen kleine Lymphknötchen dar.

8. Hühnchen. 38 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 100 g, Scheitelsteisslänge 14 cm.

Am Halse sind die Vasa lymphacea jugularia dextra im mittleren und caudalen Drittel, am rechten Bein die mit der V. femoralis verlaufenden Lymphgefäße, am linken Bein die die V. tibialis begleitenden Lymphgefäße, am rechten Flügel die die V. ulnaris und die V. brachialis begleitenden Lymphgefäße mit von Lymphozyten infiltrierten perivaskulärem Gewebe versehen.

Die Infiltration ist jedoch diffuser Natur. Knötchenbildung ist nicht zu finden.

9. Hühnchen. 40 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 14.45 g, Scheitelsteisslänge 14.5 cm.

Am Halse weisen die Vasa lymphacea jugularia dextra keine perivaskulären Zellanhäufungen auf.

Am rechten Oberschenkel sind die die V. femoralis, am linken Unterschenkel die die V. tibialis posterior und an beiden Flügeln die die V. brachialis begleitenden Lymphgefäße mit kleinen perivaskulären Lymphozyteninfiltrationen versehen. Diese Infiltrationen sind im allgemeinen diffus und zellarm. Nur die an den Lymphgefäßen des rechten Unterschenkels befindlichen machen eine Ausnahme, indem sie ziemlich zellreich und gegen die Umgebung scharf begrenzt sind.

Am Halse weisen die Vasa lymphacea jugularia dextra keine perivaskulären Zellanhäufungen auf.

10. Hühnchen. 41 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 165 g, Scheitelsteisslänge 15 cm.

Am Halse finden sich am cranialen und caudalen Drittel der Vasa lymphacea jugularia sinistra hie und da perivaskuläre Lymphinfiltrationen, fehlen sie aber am mittleren Drittel dieser Lymphgefäße. Die einzelnen Infiltrationsherde sind noch nicht reich an Zellen. Nur einige Infiltrationsherde, die kurz vor der Einmündung dieser Lymphgefäße in die Vene liegen, sind zellreich und ragen als knotige Verdickung der Lymphgefäßwand in das umgebende Bindegewebe vor.

Am rechten Bein sind die die V. tibialis posterior begleitenden Lymphgefäße in der Nähe des Kniegelenkes und die die V. femoralis begleitenden Lymphgefäße in der Mitte und in dem proximalen Ende des Oberschenkels mit Lymphozyteninfiltrationen versehen. Die Lymphozyteninfiltrationen am Oberschenkel sind zellreich und ragen als ovale Vorsprung in das umgebende lockere Bindegewebe vor.

11. Hühnchen. 42 Tage nach der Ausbrütung,
Gewicht 200 g, Scheitelsteisslänge 17 cm.

Am Halse sind an den Vasa lymphacea jugularia zahlreiche Lymphozyteninfiltrationen zu finden, nämlich wie folgt:

An den Vasa lymphacea jugularia dextra

am cranialen Drittel	7,
am mittleren Drittel	20,
am caudalen Drittel	19.

An den Vasa lymphacea jugularia sinistra

am cranialen Drittel	5,
am mittleren Drittel	13,
am caudalen Drittel	10.

Die Infiltrationsherde am caudalen Drittel sind zum Teil sehr zellreich und stellen ovale Lymphknötchen dar.

An beiden Beinen sind die Lymphgefäße, die am Tarsus und am Unterschenkel mit der V. tibialis caudalis, am Oberschenkel mit der V. femoralis verlaufen, mit zahlreichen Lymphinfiltrationen besetzt. Diese Infiltrationen sind meist klein und diffus; hie und da finden sich jedoch ziemlich gut begrenzte Infiltrationsherde, die von ausgebildeten Lymphknötchen nicht zu unterscheiden sind.

Solche zellreiche Infiltrationsherde finden sich am rechten Beine 2, nämlich einer am Tarsus und einer am Oberschenkel, am linken Beine 8, nämlich 6 am Unterschenkel und 2 am Oberschenkel.

An den beiden Flügeln sind die am Vorderarm mit der V. ulnaris, am Oberarm mit der V. brachialis und der V. axillaris verlaufenden Lymphgefäße stellenweise mit Lymphinfiltrationen besetzt. Ausserdem

gewahrt man an den die V. axillaris begleitenden Lymphgefäßen des rechten Armes 2, an den die V. ulnaris begleitenden Lymphgefäßen des linken Armes 2 ausgebildete Lymphknötchen.

Zusammenfassende Betrachtung.

Den obigen Beobachtungen nach ist die Entwicklung der Hühnerlymphknötchen kurz zusammengefasst wie folgt:

1) Die Anlage der Lymphknötchen kommt nicht im Embryonalstadium, sondern spät, erst am 28. Tage nach dem Ausschlüpfen als kleine Verdichtungszone des perivaskulären Bindegewebes zum Vorschein, und zwar zerstreut an den Lymphgefäßen der verschiedenen Körperregionen, nämlich an den Lymphgefäßen des Halses, des Beines und des Flügels.

2) Diese Lymphknötchenanlage, die im ersten Stadium ihres Auftretens hauptsächlich aus Mesenchymzellen besteht, wird bald lymphocytenreich und stellt eine Zeitlang das Bild einer diffus in das umgebende Gewebe übergehenden „Lymphinfiltration“ dar.

3) Diese „Lymphinfiltrationen“ werden immer zellreicher, und vom 40. Tage nach dem Ausschlüpfen an finden sich unter ihnen vereinzelt solche, die gegen das umgebende Gewebe gut abgegrenzt sind und zirkumskripte Knötchen darstellen.

4) Diese aus lymphatischen Gewebe bestehenden Knötchen sind rundlich oder oval gestaltet, ragen als flacher Wulst in das Gefäßlumen vor und unterscheiden sich von den Lymphknötchen des erwachsenen Huhnes nur dadurch, dass in ihnen noch keine Sekundärknötchen zu finden sind.

5) Im weiteren Wachstum nimmt an allen Lymphgefäßen die Zahl der jungen Lymphknötchen bedeutend zu, die Zahl der diffusen Lymphinfiltrationen dagegen relativ ab, während die Gesamtzahl der beiden lymphatischen Gebilde keine auffällige Veränderung zeigt.

6) Auf Sekundärknötchen stößt man bis 42. Tage nach der Ausschlüpfung in keinem Lymphknötchen.

Zum Vergleich mit der Entwicklung der Hühnerlymphknötchen sei noch kurz die Entwicklung der Lymphknoten der Ente erwähnt.

Nach Fürther¹⁾ beginnt die Entwicklung der Cervicothoracal- und Lumbalknoten der Ente etwa am 15. Tage, also um die Mitte des Embryonallebens, in der Weise, dass sich an der Lymphknotenanlage

1) Fürther, H., Beiträge zur Kenntnis der Vogel lymphknoten. Jena. Zeits. f. Naturwiss. Bd. L, H. 3, 1913.

entsprechenden Stelle um das vorher einfach röhrenförmige Lymphgefäss eine Verdichtungszone von Mesenchym anlegt, die in Form von Strängen gleichmässig ringsum in das Lumen des Lymphgefässes vorwächst und dieses so in ein maschiges System kleiner Lymphräume umwandelt. In den Mesenchymsträngen, die sich in Lymphstränge umwandeln, entstehen zahlreiche Lymphknötchen, und in diesen treten gegen Ende des ersten Lebensmonates nach dem Ausschlüpfen Lymphoblasten und alsbald auch Keimzentren auf. Die Vollendung der Entwicklung erfolgt gegen Ende des 2. Monats.

Manabe¹⁾ hat bei der Ente die Entwicklung der Cervicothoracal- und Lumbalknoten sowie die der von ihm entdeckten Cervicofacial-, Mesenterial-, Hypogastrical- und Inguinallymphknoten studiert. Nach ihm kommen die genannten Lymphknotenanlagen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander zum Vorschein, und zwar die Anlage der Cervicothoracalknoten am 15., die der Lumbalknoten am 18. und die der anderen Lymphknoten am 22. Embryonaltage.

Die weitere Entwicklung der Lymphknoten vollzieht sich auch nicht in gleicher Weise. Die Lymphstränge, die die Hauptmasse des Lymphknotens bilden, sind in den früh angelegten Cervicothoracal- und Lumbalknoten schon im Embryonalleben in grosser Anzahl entwickelt und bilden, miteinander verbunden, eine spongiöse Markmasse, während sie sich in den spät angelegten Mesenterial-, Hypogastrical-, Inguinal- und Cervicofacialknoten viel später, nämlich erst im zweiten oder dritten Lebensmonate, aus dem lymphatisch infiltrierten perivaskulären Gewebe in geringerer Anzahl als die ersteren Lymphstränge entwickeln.

Dem Obigen nach ist anzunehmen, dass es bei der Ente viel früher als beim Huhn zur Anlage der Lymphknoten kommt, jedoch erst spät zur definitiven Ausbildung, nämlich im zweiten oder dritten Lebensmonate, also ungefähr in derselben Zeit, in welcher beim Huhn die Lymphknötchen zur vollen Entwicklung gelangen.

Zum Schluss danke ich Herrn Professor T. Kihara für seine stete lebenswürdige Unterstützung bei dieser Arbeit.

1) Manabe, S., Über den Bau und die Entwicklung der Entenlymphknoten. Kaibogaku Zasshi, Bd. 3. 1930.