Untersuchung über die V. facialis anterior bei den japanischen Zwillingsfeten.

Von

Hisao Ogawa.

Aus dem Anatomischen Institut der Keio Universität, Tokyo.
(Direktor: Prof. Dr. T. Taniguchi).

Mit 18 Textfiguren.

Inhalt.

I. Einleitung.	101
II. Material und Methode.	101
III. Eigene Befunde.	102
IV. Zusammenfassung.	123
V. Schluss.	133

I. Einleitung.

Morphologische und statistische Untersuchung über das Venensystem des Gesichtes von japanischen Feten und Erwachsenen sind schon von S. Yamada (1935) und Ogo (1933) eingehend durchgeführt worden. Wir finden aber keine Arbeiten in diesem Gebiete bei den Zwillingsfeten. Um diese Lücke der Untersuchung auszufüllen, habe ich die vorliegende Untersuchung unternommen.

II. Material und Methode.

Als Untersuchungsmaterial wählte ich aus dem zahlreichen Material unseres Instituts 18 paarige Zwillinge, bei denen ich ohne venöse Injektion den Verlauf der Venen des Gesichtes genau erforschen konnte.

Sie setzen sich aus 12 EZ-Paaren (♂♂ 8, ♀♀ 4), 6 ZZ-Paaren (♂♂ 2, ♀♀ 1, ♂♀ 3), also insgesamt 23 ♂ und 13 ♀ zusammen. Näheres darüber ist in der Tabelle 1 zusammengestellt.

Die meisten Leichen wurden mit 10% Formolalkohol im ganzen Körper injiziert und in 10% Formollösung konserviert.

Die Untersuchung der Venen des Gesichtes wurde mit gewöhnlichen Präparierungsverfahren vollzogen.

Tabelle 1. Untersuchungsmaterial.

Fall	Eiigkeit	Embryo-Nr.	Geschlecht	Rumpflänge	Körpergewicht	Fetalmonat
1	EZ	1107 1108	♂	15.0 cm 15.0	1875 gr 1650	9
2	EZ	1254 1255	♂	14.7 15.0	1470 1635	8
3	EZ	1261 1262	♀	12.2 11.8	1030 932	7
4	EZ	1300 1301	♂	14.0 14.0	1580 1330	9
5	EZ	1424 1425	♂	10.5 10.5	720 630	7
6	EZ	1431 1432	♀	13.8 13.0	1250 995	7
7	EZ	1445 1446	♂	13.0 13.5	1120 1560	9
8	EZ	1453 1454	♂	14.0 12.5	1140 1070	8
9	EZ	1514 1515	♂	13.5 13.5	1475 1290	8
10	EZ	1537 1538	♂	14.0 13.5	1325 1195	9
11	EZ	1545 1546	♀	15.5 15.3	2605 2285	10
12	EZ	1551 1552	♀	12.8 13.0	1290 1350	8
13	ZZ	1080 1081	♂ ♀	14.0 14.5	1235 1140	7
14	ZZ	1323 1324	♂ ♂	13.3 15.0	1430 1200	9
15	ZZ	1450 1451	♀ ♀	12.7 12.5	1275 1165	7
16	ZZ	1463 1464	♂ ♂	11.2 11.0	1100 1060	7
17	ZZ	1532 1539	♀ ♂	14.0 12.5	1115 880	7
18	ZZ	1558 1559	♀ ♂	10.2 12.0	800 1130	7

III. Eigene Befunde.

Fall 1, EZ, 9 Monate (Fig. 1).

I. Fetus, E.N. 1107, ♂.

Rechts: V. facialis anterior ist mittelstark, sie nimmt 3 mm unter dem Unterrand des Ligamentum palpebrale mediale die V. nasalis externa auf und durchbohrt nach hinten unten ziehend das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. Der Anastomosenast zwischen dem Venennetz im äusseren Augenwinkel und der V. fac. ant. ist ziemlich stark entwickelt und mündet mit der Radix profunda der V. fac. durch einen kurzen ge-

meinschaftlichen Stamm an der Innenfläche des M. zygomaticus in die V. fac. ant. Die V. fac. ant. mündet mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugularis interna.

Links: Die V. fac. ant. ist mittelstark, sie nimmt 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. auf. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und verändert am Vorderrand des Corpus adiposum buccae ihren Verlauf nach hinten oben, um in den Confluens venarum praeauricularis (nach Mochizuki) einzumünden. Am Lateralrand des M. zygomaticus nimmt die V. fac. ant. die ziemlich stark entwickelte V. buccinatoria auf.

II. Fetus, E.N. 1108, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist mittelstark entwickelt. 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. nimmt die V. fac. ant. eine ziemlich stark entwickelte V. nas. ext. auf und nimmt, hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris ziehend, wie dieselbe des I. Fetus, den Anastomosenast vom Venennetz im äusseren Augenwinkel auf. Die V. fac. ant. mündet mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int.

Links: Die V. fac. ant. ist mittelstark entwickelt. Der Abstand der Ausmündung der V. nas. ext. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt 4 mm. Hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verlaufend nimmt die V. fac. ant. am inneren Rand des M. zygomaticus die V. buccinatoria und Ramus prof. v. fac. ant. auf. Am Mittelteil des Wangenfettpfropfes verändert sich die V. fac. ant. rechtwinklig nach hinten und verläuft quer über dem Wangenfettpfropf, um in den Confluens venarum praeauricularis einzumünden.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften zeigt die V. fac. ant. eine mittelstarke Entwicklung. Rechts findet man bei beiden Feten eine deutliche

Fig. 1. Fall 1. EZ.

V.j.i. V. jugularis interna.

C.v.p. ... Confluens venarum praeauricularis.

C.a.b. ... Corpus adiposum buccae.

Bildung der Venenanastomose zwischen der V. fac. ant. und dem Venennetz am äusseren Augenwinkel. Nur rechts des I. Fetus durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, während auf den übrigen drei Gesichtshälften sie hinter demselben verläuft. Hinsichtlich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine ausgesprochene Konkordanz auf zwei Gesichtshälften an der gleichnamigen Körperseite, nämlich rechts der beiden Feten mündet die V. fac. ant. mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. interna ein und links derselben mündet die V. fac. ant., als seltener Befund, in den Confluens venarum praeauricularis.

Fall 2, EZ, 8 Monate (Fig. 2).

I. Fetus, E.N. 1254, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark entwickelt, die V. nas. ext. und V. palp. inf. sind undeutlich, obwohl die V. labialis superior ziemlich stark entwickelt ist. Sehr tief hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verlaufend mündet die V. fac. ant. beiderseits am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. Links etwa 1 cm unter dem Lig. palp. med. fliesst eine kleine Vene in die V. fac. ant., deren Oberende mit der V. fac. ant. in keinem Zusammenhang steht.

II. Fetus, E.N. 1255, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. sehr stark entwickelt. Rechts 2 mm

nach unten entfernt vom Unterrand des Lig. palp. med. und links in der Höhe desselben nimmt die V. fac. ant. die starke V. nas. ext. auf. Ungefähr 1 cm unter dem Lig. palp. med. bemerkt man eine kleine Vene, die die V. fac. ant. und die V. ophthalmica superior miteinander verbindet. Rechts 1.8 cm und links 2.3 cm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt bemerkt man einen stark entwickelten Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae (nach Ogo). Beiderseits verläuft die V. fac. ant. tief hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und mündet am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomasto-

E.N. 1254.

E.N. 1255.

Fig. 2. Fall 2. EZ.

V.j.e....V. jugularis externa.

deus in die V. jugul. ext.

Vergleich: Beim I. Fetus ist die V. fac. ant. beiderseits mittelstark, während beim II. Fetus sie beiderseitig sehr stark entwickelt ist. Mit Ausnahme der rechten Seite des I. Fetus, findet man auf den übrigen drei Gesichtshälften eine kleine Vene, die etwa 2 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. in die V. fac. ant. fließt. Beiderseits nur beim II. Fetus zeigt sich die Anastomose zwischen der V. fac. ant. und dem Venenetz am äusseren Augenwinkel, d.h. Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae eine deutliche Entwicklung. Bezüglich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Konkordanz auf vier Gesichtshälften, sie münden nämlich am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Fall 3, EZ, 7 Monate (Fig. 3).

I. Fetus, E.N. 1261, ♀.

Rechts: V. fac. ant. ist mittelstark entwickelt. Sie nimmt, 2 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt die V. nas. ext. und 1.1 cm von demselben entfernt die V. palp. inf. auf. Nach hinten unten ziehend verläuft die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und mündet am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Links: Die V. fac. ant. ist mittelstark entwickelt, die V. nas. ext. ist undeutlich. 1.1 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. nimmt die V. fac. ant., wie rechts, die V. palp. inf.

auf. Die V. fac. ant. verläuft sehr tief hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und mündet am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugularis externa.

II. Fetus, E.N. 1262, ♀.

Rechts: Die V. fac. ant. ist sehr stark entwickelt. Sie nimmt 2 mm

E.N. 1261.

E.N. 1262.

Fig. 3. Fall 3. EZ.

nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt die V. nas. ext. und 1.1 cm unter demselben die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und mündet, im vorderen unteren Teil des Wangenfettpfropfes nach hinten unten ziehend, am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Links: Die V. fac. ant. ist sehr stark entwickelt. Sie nimmt, 9 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt, die V. palp. inf. auf; die V. nas. ext. kann nicht beobachtet werden. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, nach hinten unten ziehend, am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Vergleich: Beim I. Fetus ist die beiderseitige V. fac. ant. mittelstark, beim II. Fetus beiderseitig sehr stark entwickelt. Beiderseits des I. Fetus verläuft die V. fac. ant. in der inneren Fläche des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superior, während sie beiderseits des II. Fetus das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris durchbohrt. Hinsichtlich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Konkordanz auf je zwei gleichnamigen Gesichtshälften, nämlich die V. fac. ant. mündet rechts der beiden Paarlinge am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext., und links der beiden am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Fall 4, EZ, 9 Monate (Fig. 4).

I. Fetus, E.N. 1300, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. stark entwickelt. 3 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt, nimmt die V. fac. ant. die V. nas. ext. auf. Der Abstand der Ausmündungsstelle der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt rechts 1.5 cm und links 1.2 cm. Rechts bemerkt man eine stark ent-

Fig. 4. Fall 4. EZ.

wickelte V. lab. inf. und links V. lab. sup. und inf. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet entlang dem Vorderrand des Wangenfettpfropfes abgehend, beiderseitig direkt in die V. jug. int.

II. Fetus, E.N. 1301 ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. stark entwickelt. Rechts 4 mm und links 2 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt, nimmt die V. fac. ant. die V. nas. ext. auf. Rechts 1.6 cm und links 1.5 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. fließt die V. palp. inf. in die V. fac. ant. und an der Stelle, wo die V. palp. inf. einmündet, nimmt die V. fac. ant. beiderseits die stark entwickelte V. lab. sup. auf. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. Die V. fac. ant. nimmt die V. lab. inf. auf und mündet beiderseits mit der V. facialis posterior durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften ist die V. fac. ant. stark entwickelt und zwar bemerkt man deutliche Ästebildung, obwohl auf vier Gesichtshälften der Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae fehlt. Bei beiden Paarlingen durchbohrt die V. fac. ant. beiderseits das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup.

Hinsichtlich der Ausmündung der V. fac. ant. findet sich eine Diskordanz zwischen den beiden Paarlingen, nämlich beiderseits des I. Fetus mündet die V. fac. ant. direkt in die V. jugul. int. ein, während beim II. Fetus die beiderseitige V. fac. ant. mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. mündet.

Fall 5, EZ, 7 Monate (Fig. 5).

I. Fetus, E.N. 1424, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist mittelstark entwickelt. Die V. nas. ext. ist undeutlich, der Abstand der Ausmündung der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt 6 mm. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, weit nach unten her-

Fig. 5. Fall 5. EZ.

abziehend, an der Supraklavikulargegend in die V. jugul. ext.

Links: Die V. fac. ant. ist mittelstark entwickelt. Die V. nas. ext. und V. palp. inf. sind undeutlich. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet am unteren Drittel des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

II. Fetus, E.N. 1425 ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark entwickelt, die V. nas. ext. ist nicht deutlich gebildet. Die V. palp. inf. ist rechts schwach und ergiesst sich, 9 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. getrennt, in die V. fac. ant., während die der linken Seite nicht deutlich zu beobachten ist. Links bemerkt man eine kleine V. lab. inf. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, entlang dem Vorderrand des Wangenfettpfropfes nach hinten unten abgehend, beiderseitig am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften ist die V. fac. ant. mittelstark entwickelt und zeigt sehr schwache Ästebildung. Beiderseits des I. Fetus verläuft die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, während beim II. Fetus die V. fac. ant. beiderseits das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. durchsetzt. Bezüglich der Ausmündung der V. fac. ant. findet sich eine Diskordanz zwischen den beiden Paarlingen, nämlich beim I. Fetus mündet die V. fac. ant. beiderseits am Unterteil des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. ein, während beim II. Fetus sie beiderseits am Oberteil desselben Muskels in dieselbe Vene mündet.

Fall 6, EZ. 7 Monate (Fig. 6).

I. Fetus, E.N. 1431, ♀.

Rechts: Die V. fac. ant. ist sehr stark entwickelt. 5 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt nimmt die V. fac. ant. die V. nas. ext. auf. Der Abstand der Ausmündung der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med.

E.N. 1431.

E.N. 1432.

Fig. 6. Fall 6. EZ.

beträgt 1.3 cm. Die V. fac. ant. durchbohrt die seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und verläuft schräg nach hinten, um in den Confluens venarum praeauricularis einzumünden.

Links: Der Hauptstamm der V. fac. ant. ist sehr stark entwickelt, während ihre Äste sehr schwach und nicht aufzufinden sind. Die V. fac. ant. durchbohrt die seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, wie rechts, in den Confluens venarum praeauricularis.

II. Fetus, E.N. 1432, ♀.

Rechts: Die V. fac. ant. ist sehr stark entwickelt. Sie nimmt 4 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. getrennt die V. nas. ext. und 1.2 cm nach unten von demselben entfernt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt die seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und zieht äusserst oberflächlich über dem Wangenfettpfropf schräg nach hinten, um in den Confluens venarum praeauricularis einzumünden.

Links: Die V. fac. ant. ist sehr stark ausgebildet. Sie nimmt 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1 cm nach unten von demselben getrennt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup., und am medialen Rand des M. zygomaticus befindet sich ein mittelstark entwickelter Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae, der mit der Radix profunda der V. facialis durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. fac. ant. mündet. Dann, wie rechts, verläuft die V. fac. ant. äusserst oberflächlich über dem Wangenfettpfropf schräg nach hinten, um in den Confluens venarum praeauricularis einzumünden.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften zeigt die V. fac. ant. sehr starke Entwicklung, obwohl die Ästebildungen schwach sind. Nur links des II. Fetus findet sich die mittelstarke Entwicklung des Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae, der mit der Radix profunda der V. facialis durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. fac. ant. mündet. Auf vier Gesichtshälften dieses Paares durchsetzt die V. fac. ant. die äusserst seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Bemerkenswert ist, dass auf vier Gesichtshälften der beiden Paarlinge die V. fac. ant., als seltener Befund, in den Confluens venarum praeauricularis mündet.

Fall 7, EZ, 9 Monate (Fig. 7).

I. Fetus, E.N. 1445, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt. Sie nimmt 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.6 cm nach unten von demselben getrennt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt die äusserst seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii

sup. Hinter dem M. zygomaticus macht die V. fac. ant. eine starke Windung und vereinigt sich mit einem stark entwickelten Ramus profundus venae fac. ant., welch letzterer so dick ist, dass er aussieht, als wenn er den Hauptstamm der V. fac. ant. bildet. Nach hinten unten zieht die V. fac. ant. herab und fliesst am Hinterrand des M. sternocleidomastoideus, nahe der Supraklavikulargegend, in die V. jugul. ext.

Links: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt. Die V. nas. ext. ist nicht deutlich, 1.4 cm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt befindet sich eine schwache V. palp. inf. Die V. fac. ant. durchbohrt, wie rechts, die äusserst seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, nach unten herabziehend, in der Mittelhöhe des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

II. Fetus, E.N. 1446, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt. Sie nimmt 5 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.4 cm entfernt vom demselben die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt die seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und zeigt, wie die rechte V. fac. ant. des I. Fetus, eine deutliche Windung und mündet direkt in die V. jugul. int.

Links: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt. Sie nimmt 4 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt die V. nas. ext. und 1.4 cm unter demselben die schwache V. palp. inf. auf. Sie durchbohrt, wie rechts, die seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. Sie steigt unter mehrmaliger Windung weit nach unten herab und stellt die V. jugul. anterior dar.

Vergleich: Bei beiden Feten weist die V. fac. ant. beiderseits eine starke Entwicklung auf. Bemerkenswert ist, dass die rechte V. fac. ant. der beiden Paarlinge an der inneren Fläche des M. zygomaticus eine deutliche

E.N. 1445.

E.N. 1446.

Fig. 7. Fall 7. EZ.

V.j.a....V. jugularis anterior.

Windung zeigt. Die vier Gesichtshälften der beiden Feten dieses Paares sind darin konkordant, dass die V. fac. ant. die äusserst seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. durchsetzt. Bezüglich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine weitgehende Diskordanz zwischen beiden Paarlingen, nämlich beim I. Paarling beiderseits mündet die V. fac. ant. am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext., während sie beim II. Paarling rechts direkt in die V. jugul. int. mündet und links zur V. jugul. ant. übergeht.

Fall 8, EZ, 8 Monate (Fig. 8).

I. Fetus, E.N. 1453, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. sehr schwach entwickelt; sie nimmt 2 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext., 1.2 cm unter demselben die V. palp. inf. auf. Beiderseits zieht die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und verläuft entlang dem Vorderrand des Wangenfettpfropfes nach hinten unten, um beiderseitig am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. einzumünden.

II. Fetus, E.N. 1454, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. stark entwickelt. Rechts ist die V. nas. ext. nicht deutlich; 1.2 cm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. getrennt befindet sich eine schwache V. palp. inf. Links

nimmt die V. fac. ant. 2 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.1 cm unter demselben die V. palp. inf. auf. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und verläuft entlang dem Vorderrand des Wangenfettpfropfes nach hinten unten, um beiderseitig direkt in die V. jugul. int. einzumünden.

Vergleich: Bezüglich des Entwicklungsgrades der V. fac. ant. besteht eine Diskordanz zwischen beiden Paarlingen dieses Paares, nämlich beim I. Fetus ist die V. facialis anterior sehr schwach, während die des II. Fetus starke Entwicklung zeigt. Die Ausmündung der V. fac. ant. der beiden

Fig. 8. Fall 8. EZ.

Paarlinge ist stark verschieden, nämlich beim I. Fetus mündet die beiderseitige V. fac. ant. am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext., während diejenige des II. Fetus beiderseits direkt in die V. jugul. int. mündet.

Fall 9, EZ, 8 Monate (Fig. 9).

I. Fetus, E.N. 1514, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist schwach entwickelt. Sie nimmt 2 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt die V. nas. ext., und 1.3 cm nach unten vom demselben getrennt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Links: Die V. fac. ant. ist schwach entwickelt. Die V. nas. ext. ist nicht deutlich beobachtet. 1.2 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. bemerkt man eine kleine V. palp. inf. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, nach hinten unten herabziehend, mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int.

II. Fetus, E.N. 1515, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist schwach, und nimmt 2 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext., und 1.3 cm nach unten vom demselben getrennt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und nimmt die hinter dem M. triangularis quer ziehende V. lab. inf. auf. Die V. fac. ant. mündet direkt in die V. jugul. int.

Links: Die V. fac. ant. ist schwach, und nimmt 4 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext., 1.5 cm nach unten vom demselben entfernt die V. palp. inf. auf. Etwa 1 cm unter dem Unterrand des

E.N. 1514.

E.N. 1515.

Fig. 9. Fall 9. EZ.

Lig. palp. med. befindet sich eine kleine Vene, deren Oberende sich mit der V. ophthalmica sup. vereinigt. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup., und dann die V. lab. inf. aufnehmend nach unten, um in der Supraklavikulargegend in die V. jugul. ext. einzumünden.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften zeigt die V. fac. ant. schwache Entwicklung, obwohl sie deutliche Ästebildung aufweist. Nur links beim II. Fetus bemerkt man eine kleine Vene, die die V. fac. ant. und die V. ophthalmica sup. verbindet. Beiderseits nur beim II. Fetus findet sich eine starke Entwicklung der V. lab. inf. Auf vier Gesichtshälften der beiden Paarlinge verläuft die V. fac. ant. an der inneren Fläche des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Die Ausmündung der V. fac. ant. ist auf vier Gesichtshälften dieses Zwillingspaars stark verschieden, nämlich beim I. Fetus mündet sie rechts am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext., links mit der V. fac. post. durch einen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int., während die V. fac. ant. beim II. Fetus rechts direkt in die V. jugul. int. links am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. mündet.

Fall 10, EZ, 9 Monate (Fig. 10).

I. Fetus, E.N. 1537, ♂.

Rechts ist die V. fac. ant. mittelstark, links sehr stark entwickelt. Beiderseits sind die V. nas. ext. und V. palp. inf. nicht deutlich. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet beiderseitig direkt in die V. jugul. int.

II. Fetus, E.N. 1538, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist sehr stark und nimmt 1.5 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. lab. sup. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet, nach hinten unten herabsteigend, direkt in die V. jugul. interna.

E.N. 1537.

E.N. 1538.

Fig. 10. Fall 10. EZ.

Links: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt, sie nimmt 1.5 cm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt die V. palp. inf. auf und durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Unterwegs nimmt die V. fac. ant. die unter dem M. triangularis quer ziehende V. lab. inf. auf und mündet direkt in die V. jugul. int.

Vergleich: Bei beiden Paarlingen dieses Paares zeigt die V. fac. ant. asymmetrische Entwicklung, indem die Vene beim I. Fetus rechts mittelstark, links sehr stark und beim II. Fetus rechts sehr stark, links stark entwickelt ist. Beim II. Paarling nimmt die V. fac. ant. rechts eine starke V. lab. sup. und links auch eine dicke V. lab. inf. auf. Alle vier Gesichtshälften beider Feten dieses Zwillingspaares sind darin konkordant, dass die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris durchsetzt und direkt in die V. jugul. int. einmündet.

Fall 11, EZ, 10 Monate (Fig. 11).

I. Fetus, E.N. 1545, ♀.

Rechts: Die V. fac. ant. ist schwach und nimmt 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.4 cm nach unten vom demselben entfernt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int.

Links: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt. Der Abstand der Ausmündung der V. nas. ext. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt 5 mm. Ungefähr 1 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. bemerkt man eine kleine Vene, deren Oberende frei endet. Die V. fac. ant. zieht

hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, und an der inneren Fläche des M. zygomaticus (major) nimmt sie den sehr stark entwickelten Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae auf, der unterwegs einen Teil des Venennetzes des unteren Augenlides sammelt. Die

E.N. 1545.

E.N. 1546.

Fig. 11. Fall 11. EZ.

V. fac. ant. geht in der tiefen Schicht des Wangenfettpfropfes weiter nach unten herab und mündet mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int.

II. Fetus, E.N. 1546, ♀.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark und nimmt 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. auf; V. palp. inf. ist nicht deutlich beobachtet. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. Links etwa 1 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. befindet sich eine kleine Vene, deren Oberende frei endet. An der inneren Fläche des M. zygomaticus (major) bemerkt man, wie beim I. Fetus, einen stark entwickelten Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae, der mit der Radix profunda der V. fac. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. fac. ant. mündet.

Vergleich: Hinsichtlich des Entwicklungsgrades der V. fac. ant. besteht eine Diskordanz zwischen beiden Paarlingen, nämlich beim I. Paarling zeigt die V. fac. ant. rechts schwache, links starke Entwicklung, während beim II. Paarling sie beiderseits mittelstark entwickelt ist. Es zeigt sich eine Konkordanz auf der rechten Gesichtsseite beider Paarlinge bezüglich der Verästelung der V. fac. ant., indem bei beiden Feten stark entwickelte Venenanastomose zwischen der V. facialis anterior einerseits und der V. supraorbitalis und V. temp. med. anderseits aufzufinden ist. Alle vier Gesichtshälften beider Feten dieses Zwillingspaares sind darin konkordant, dass die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verläuft und mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. mündet.

Fall 12, EZ, 8 Monate (Fig. 12).

I. Fetus, E.N. 1551, ♀.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark, und nimmt 2 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. auf. Der Abstand der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt rechts 1.0 cm und links 1.2 cm. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup., und an der inneren Fläche des M. zygomaticus (major) befindet sich ein mit der Radix profunda der V. facialis durch kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. fac. ant. sich ergiessender Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae. Beiderseits teilt die V. fac. ant. sich in zwei gleich dicke Venen, welche am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus gesondert in die V. jugul. ext. sich ergiessen.

II. Fetus, E.N. 1552, ♀.

Rechts: Die V. fac. ant. ist mittelstark, sie nimmt in gleicher Höhe mit dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. auf. Der Abstand der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt 1 cm. Die V. fac. ant. verläuft sehr tief hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris; hier befindet sich ein mit der Radix profunda der V. facialis durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. fac. ant. sich ergießender Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae. Am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus mündet die V. fac. ant. in die V. jugul. ext.

Links: Die V. fac. ant. ist mittelstark und nimmt 6 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1 cm unter demselben die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und mündet, wie rechts, am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Fig. 12. Fall 12. EZ.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften beider Feten dieses Zwillingspaares zeigt die V. fac. ant. die gleich mittelstarke Entwicklung. Auf drei Gesichtshälften, ausgenommen von rechter Seite des II. Paarlings, bemerkt man eine mittelstarke Venenanastomose zwischen der V. fac. ant. und dem Venennetz am äusseren Augenwinkel. Auf drei Gesichtshälften, ausgenommen von der rechten Seite des II. Paarlings, durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Hinsichtlich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Konkordanz zwischen beiden Paarlingen, nämlich auf vier Gesichtshälften beider Feten mündet die V. fac. ant. am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext., obwohl sie beiderseits des I. Fetus vor der Ausmündung sich in zwei gleich dicke Venen teilt.

Fall 13, ZZ, 7 Monate (Fig. 13).

I. Fetus, E.N. 1080, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt und nimmt 2 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.4 cm nach unten vom demselben getrennt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. An der Basis mandibulae nimmt die V. fac. ant. eine entlang dem Hinterrand des M. masseter abkommende starke V. masseterica auf und stellt, weit nach unten ziehend, die V. jugularis anterior dar.

Links: Die V. fac. ant. ist ziemlich stark entwickelt. Die V. nas. ext. und V. palp. inf. sind nicht deutlich gebildet. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. nach unten, und mündet am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

II. Fetus, E.N. 1081, ♀.

Beiderseits ist die V. fac. ant. stark entwickelt, 1.1 cm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt nimmt die V. fac. ant. die V. palp. inf. auf. Die V. nas. ext. ist nicht deutlich gebildet. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und zieht weit nach unten herab, um die V. jugul. ant. darzustellen.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften beider Feten dieses Zwillingspaars weist die V. fac. ant. eine starke Entwicklung auf. Nur links beim I. Fetus verläuft sie hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, und auf den sonstigen drei Gesichtshälften durchbohrt sie das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Ausgenommen von der linken Gesichtshälfte des I. Fetus, bei der die V. fac. ant. am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. externa mündet; auf den sonstigen drei Gesichtshälften dieses Zwillingspaars steigt die V. fac. ant. weit nach unten herab, um die V. jugul. ant. darzustellen.

Fall 14, ZZ, 9 Monate (Fig. 14).

E.N. 1080.

E.N. 1081.

Fig. 13. Fall 13. ZZ.

I. Fetus, E.N. 1323, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. sehr stark entwickelt. Rechts nimmt die V. fac. ant. 5 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. auf; links ist die V. nas. ext. nicht deutlich gebildet und befindet sich die V. palp. inf. 1.3 cm nach unten entfernt vom Unterrand des Lig. palp. med. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. die äusserst seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. Die V. fac. ant. steigt entlang dem Vorderrand des Wangenfettpfropfes nach unten herab und mündet rechts mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugularis interna, links am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

E.N. 1323.

E.N. 1324.

Fig. 14. Fall 14. ZZ.

II. Fetus, E.N. 1324, ♂.

Rechts: Die V. fac. ant. ist sehr schwach und nimmt 2 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt die V. nas. ext. und 1.2 cm nach unten vom demselben entfernt die V. palp. inf. auf. Die V. fac. ant. durchbohrt die seichte Schicht des Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und verläuft nach hinten unten, um am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. zu münden.

Links: Die V. fac. ant. ist sehr schwach und nimmt 4 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.4 cm nach unten vom demselben entfernt die V. palp. inf. auf. 1 cm vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt befindet sich eine kleine Vene, deren Oberende sich in die V. ophthalmica sup. ergiesst. Die V. fac. ant. durchbohrt das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und verläuft nach hinten unten, um mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. zu münden.

Vergleich: Hinsichtlich des Entwicklungsgrades der V. fac. ant. besteht eine ausgesprochene Diskordanz zwischen beiden Feten dieses Zwi-

lingspaares, nämlich beiderseits beim I. Fetus zeigt die V. fac. ant. sehr starke Entwicklung, während beiderseits beim II. Fetus sie sehr schwache Entwicklung aufweist. Nur links beim II. Fetus bemerkt man eine kleine Vene, die die V. fac. ant. und die V. ophthalmica superior in Anastomose bringt. Auf vier Gesichtshälften beider Feten durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Bezüglich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Diskordanz zwischen beiden Paarlingen, obwohl rechts beim I. Fetus und links beim II. Fetus sie den gleichen Typus darstellt.

Fall 15, ZZ, 7 Monate (Fig. 15).

I. Fetus, E.N. 1450, ♀.

Beiderseits ist die V. fac. ant. sehr schwach. Rechts sind die V. nas. ext. und V. palp. inf. nicht deutlich. Links 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. befindet sich die V. nas. ext.; die V. palp. inf. ist undeutlich. Beiderseits verläuft die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet rechts am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus und links in der Supraklavikulargegend in die V. jugul. ext.

E.N. 1450.

E.N. 1451.

Fig. 15. Fall 15. ZZ.

II. Fetus, E.N. 1451, ♀.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark entwickelt. Rechts nimmt sie 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. mediale die V. nas. ext., und links 3 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die V. nas. ext. und 1.2 cm unter demselben die V. palp. inf. auf. Beiderseits verläuft die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet direkt in die V. jugul. int.

Vergleich: Die V. fac. ant. des I. Fetus dieses Zwillingspaars ist beiderseits sehr schwach, während beim II. Fetus sie beiderseits mittelstark entwickelt ist. Auf vier Gesichtshälften beider Feten verläuft die V. fac. ant. hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris. Hin-

sichtlich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Diskordanz zwischen beiden Paarlingen, nämlich beim I. Fetus mündet die Vene beiderseits am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext., dagegen beim II. Fetus beiderseits direkt in die V. jugul. int.

Fall 16, ZZ, 7 Monate (Fig. 16).

I. Fetus, E.N. 1463, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark entwickelt, und 4 mm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt nimmt sie die V. nas. ext. auf. Links beträgt der Abstand der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. 9 mm; doch ist sie rechts nicht deutlich zu sehen. Beiderseits verläuft die V. fac. ant., als seltener Befund in dieser Arbeit, ganz über das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

II. Fetus, E.N. 1464, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. mittelstark entwickelt. 4 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. befindet sich die V. nas. ext. und rechts 9 mm von demselben entfernt die V. palpebralis inf. Links, 9 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med., bemerkt man eine kleine Vene, deren Oberende frei endet. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. sehr oberflächlich das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet beiderseits am Vorderrand des oberen Drittels des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Vergleich: Auf vier Gesichtshälften beider Feten dieses Zwillingspaares zeigt die V. fac. ant. eine mittelstarke Entwicklung. Nur links beim II. Paarling findet man eine kleine Vene, die frei entspringt und 9 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. in die V. fac. ant. fließt. Beiderseits beim I. Fetus verläuft die V. fac. ant., als seltener Befund, über dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, während beim II. Fetus beiderseits die seichte Schicht desselben Muskels durchsetzt. Bezüglich der

Fig. 16. Fall 16. ZZ.

Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Konkordanz auf vier Gesichtshälften zwischen beiden Paarlingen dieses Paares, nämlich beiderseits bei beiden Feten mündet die Vene am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext.

Fall 17, ZZ, 7 Monate (Fig. 17).

I. Fetus, E.N. 1532, ♀.

Rechts: Die V. fac. ant. ist stark entwickelt, sie nimmt 4 mm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. die stark entwickelte V. nas. ext. auf. Die V. palp. inf. ist nicht deutlich gebildet. Die V. fac. ant. steigt nach unten mit leichten Windungen, hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. verlaufend, herab und mündet direkt in die V. jugul. int.

Links: Die V. fac. ant. ist sehr stark entwickelt und zeigt einen stark geschlängelten Verlauf. In der Höhe des Lig. palp. med. nimmt die V. fac. ant. die stark entwickelte V. nas. ext. auf. Zwischen der V. nas. ext. und der V. palp. inf. befindet sich eine kleine Vene, deren Ober- und Unterende in die V. fac. ant. sich ergiessen. Der Hauptstrom der V. palp. inf. fließt 1,5 cm nach unten vom Unterrand des Lig. palp. med. getrennt in die V. fac. ant. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet direkt in die V. jugul. int.

E.N. 1532.

E.N. 1539.

Fig. 17. Fall 17. ZZ.

II. Fetus, E.N. 1539, ♂.

Die V. fac. ant. ist rechts stark, links mittelstark entwickelt. Rechts sind die V. nas. ext. und V. palp. inf. nicht deutlich. Links ist die V. nas. ext. nicht deutlich gebildet, der Abstand der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. beträgt 1,4 cm. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. äusserst seicht das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet rechts durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm mit der V. fac. post., links direkt in die V. jugul. interna.

Vergleich: Ausgenommen von der linken Seite des II. Paarlinges,

zeigt die V. fac. ant. auf sonstigen drei Gesichtshälften der beiden Feten dieses Paares eine starke Entwicklung. Bemerkenswert ist, dass nur beim I. Fetus die V. fac. ant. beiderseits einen stark geschlängelten Verlauf aufweist. Beim I. Fetus verläuft die V. fac. ant. beiderseits hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, während beim II. Fetus die V. fac. ant. beiderseits das Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. durchsetzt. Ausgenommen von der rechten Seite des II. Fetus, bei der die V. fac. ant. mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. fließt, ergießt sie sich auf den sonstigen drei Gesichtshälften direkt in die V. jugul. int.

Fall 18, ZZ, 7 Monate (Fig. 18).

I. Fetus, E.N. 1558, ♀.

Beiderseits ist die V. fac. ant. sehr schwach. Ausgenommen vom Ramus profundus venae facialis ant. sind die sonstigen Äste nicht deutlich. Die V. fac. ant. verläuft hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. und mündet rechts direkt in die V. jugul. int., links am Hinterrand des M. sternocleidomastoideus in der Supraklavikulargegend in die V. jugul. ext.

II. Fetus, E.N. 1559, ♂.

Beiderseits ist die V. fac. ant. stark entwickelt. Rechts sind die V. nas. ext. und die V. palp. inf. undeutlich. Links 1.2 cm unter dem Unterrand des Lig. palp. med. befindet sich eine schwache V. palp. inf. und 8 mm unter demselben eine kleine Vene, deren Oberende frei endet. Beiderseits durchbohrt die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris und mündet mit der V. fac. post. durch einen gemeinschaftlichen kurzen Stamm in die V. jugul. int.

Vergleich: Es gibt deutliches diskordantes Verhältnis in bezug auf den Entwicklungsgrad der V. fac. ant., nämlich beim I. Paarling ist die V. fac. ant. beiderseits sehr schwach, während beim II. Paarling sie stark entwickelt ist. Nur links beim II. Fetus bemerkt man eine kleine Vene, die

E.N. 1558.

E.N. 1559.

Fig. 18. Fall 18. ZZ.

frei entspringend 8 mm vom Unterrand des Lig. palp. med. entfernt in die V. fac. ant. fließt. Beim I. Fetus verläuft die V. fac. ant. beiderseits hinter dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris, während beim II. Fetus sie beiderseits den Muskel durchsetzt. Bezüglich der Ausmündung der V. fac. ant. besteht eine Diskordanz zwischen beiden Paarlingen, nämlich beim I. Fetus mündet die V. fac. ant. rechts direkt in die V. jugul. int. links am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. während beim II. Fetus beiderseits die V. fac. ant. sich mit der V. fac. post. durch einen kurzen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. ergießt.

IV. Zusammenfassung.

Über den Entwicklungsgrad der V. fac. ant. bei den Zwillingsets nach verschiedenen Gesichtspunkten, z.B. nach dem Geschlecht, Alter und der Eiigkeit, findet man keinen bedeutenden Unterschied.

4 mal bestehen Asymmetrien derart, dass bei EZ in 2 unter 24 Feten und bei ZZ in 2 unter 12 Feten die V. fac. ant. rechts stärker als an der Gegenseite entwickelt ist.

Vergleicht man unter Berücksichtigung der Eiigkeit den Entwicklungsgrad der V. fac. ant. der beiden Feten desselben Paares miteinander, so ergibt sich zwischen EZ und ZZ kein nennenswerter Unterschied:

1) Bezüglich des Entwicklungsgrades der V. fac. ant. besteht bei 7 EZ- und 1 ZZ-Paare eine Konkordanz auf vier Gesichtshälften eines Paares.

2) Die Konkordanz auf drei Gesichtshälften eines Paares findet sich bei nur 1 ZZ-Paar.

3) Die Konkordanz auf zwei Gesichtshälften eines Paares findet sich bei nur 1 ZZ-Paar (rechts-rechts Konkordanz).

4) Die Diskordanz hinsichtlich des Entwicklungsgrades der V. fac. ant. eines Paares findet sich bei 5 EZ-Paaren und 3 ZZ-Paaren.

Die Art und Weise der Ausmündung der V. fac. ant. wurde nach Mochizuki (1924) in folgende 5 Typen eingeteilt. Durch diese Einteilung möchte ich nun im nachstehenden zum Vergleich der V. fac. ant. bei den Zwillingen übergehen.

Typus I. Die V. fac. ant. mündet mit der V. fac. post. durch einen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int.

Typus II. Die V. fac. ant. mündet direkt in die V. jugul. int.

Typus IIIa. Am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus mündet die V. fac. ant. in die V. jugul. ext.

Typus IIIb. Am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleido-

mastoideus oder in der Supraklavikulargegend mündet die V. fac. ant. in die V. jugul. ext.

Typus IV. Die V. fac. ant. steigt weit nach unten herab und stellt die V. jugul. ant. dar.

Typus V. Die V. fac. ant. mündet in den Confluens venarum praeauricularis.

Aus der Tabelle 2 und 3 ersieht man die Häufigkeit der 5 Typen der Ausmündung der V. fac. ant. auf den einzelnen Gesichtshälften.

Typus I kommt in 1 aller 12 EZ-Paare beiderseits beider Paarlinge, in 1 der EZ-Paar nur rechts bei beiden Paarlingen, in 1 EZ-Paar und in 1 ZZ-

Tabelle 2. Verschiedene Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant.

Fall	Eiigkeit	Embryo-Nr.	Geschlecht	Typus		Vergleich
				R	L	
1	EZ	1107 1108	♂	I I	V V	Konkordanz auf je zwei gleichnamigen Gesichtshälften
2	EZ	1254 1255	♂	IIIa IIIa	IIIa IIIa	Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)
3	EZ	1261 1262	♀	IIIa IIIa	IIIb IIIb	Konkordanz auf je zwei gleichnamigen Gesichtshälften
4	EZ	1300 1301	♂	II I	II I	Diskordanz
5	EZ	1424 1425	♂	IIIb IIIa	IIIb IIIa	Diskordanz
6	EZ	1431 1432	♀	V V	V V	Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)
7	EZ	1445 1446	♂	IIIb II	IIIb IV	Diskordanz
8	EZ	1453 1454	♂	IIIa II	IIIa II	Diskordanz
9	EZ	1514 1515	♂	IIIa II	I IIIb	Diskordanz
10	EZ	1537 1538	♂	II II	II II	Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)
11	EZ	1545 1546	♀	I I	I I	Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)
12	EZ	1551 1552	♀	IIIa IIIa	IIIa IIIa	Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)
13	ZZ	1080 1081	♂ ♀	IV IV	IIIb IV	Konkordanz auf den rechten Gesichtshälften
14	ZZ	1323 1324	♂ ♂	I IIIb	IIIa I	Diskordanz
15	ZZ	1450 1451	♀ ♀	IIIb II	IIIb II	Diskordanz
16	ZZ	1463 1464	♂ ♂	IIIa IIIa	IIIa IIIa	Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)
17	ZZ	1532 1539	♀ ♂	II I	II II	Konkordanz auf den linken Gesichtshälften
18	ZZ	1558 1559	♀ ♂	II I	IIIb I	Diskordanz

Tabelle 3. Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. an den einzelnen Gesichtshälften.

Typus	Summe (72)	Einteilung nach der Eizigkeit		Einteilung nach der Körperseite	
		EZ (48)	ZZ (24)	R (36)	L (36)
I	14 (19.4%)	9 (18.8%)	5 (20.8%)	8 (22.2%)	6 (16.6%)
II	16 (22.2%)	10 (20.9%)	6 (25.0%)	9 (25.0%)	7 (19.5%)
IIIa	20 (27.8%)	15 (31.2%)	5 (20.8%)	11 (30.5%)	9 (25.0%)
IIIb	12 (16.7%)	7 (14.5%)	5 (20.8%)	4 (11.1%)	8 (22.2%)
IV	4 (5.6%)	1 (2.1%)	3 (12.5%)	2 (5.6%)	2 (5.6%)
V	6 (8.3%)	6 (12.5%)	—	2 (5.6%)	4 (11.1%)

Einteilung nach dem Geschlecht		Einteilung nach dem Alter (Fetalmonat).			
♂ (46)	♀ (26)	7m (32)	8m (16)	9m (20)	10m (4)
10 (21.7%)	4 (15.4%)	3 (9.4%)	1 (6.3%)	6 (30.0%)	4
11 (23.9%)	5 (19.2%)	6 (18.7%)	3 (18.7%)	7 (35.0%)	—
14 (30.4%)	6 (23.1%)	8 (25.0%)	11 (68.7%)	1 (5.0%)	—
7 (15.2%)	5 (19.2%)	8 (25.0%)	1 (6.3%)	3 (15.0%)	—
2 (4.4%)	2 (7.7%)	3 (9.4%)	—	1 (5.0%)	—
2 (4.4%)	4 (15.4%)*	4 (12.5%)	—	2 (10.0%)	—

Paar beiderseits bei einem Partner, in 1 EZ-Paar und in 1 ZZ-Paar nur auf einer Gesichtshälfte bei einem Partner, und in 1 ZZ-Paar rechts des I. Fetus und links des II. Fetus, also in 14 von 72 Gesichtshälften (19.4%) vor; seine Häufigkeit zeigt bezüglich der Gesichtshälfte keinen bedeutenden Unterschied zwischen EZ und ZZ, sie ist bei den männlichen Feten als bei den weiblichen, rechts etwas grösser als links.

Typus II kommt in 1 EZ-Paar beiderseits beider Paarlinge, in 2 EZ-Paaren und in 1 ZZ-Paar beiderseits bei einem Partner, in 2 EZ-Paaren und in 1 ZZ-Paar nur auf einer Gesichtshälfte bei einem Partner, und in 1 ZZ-Paar beiderseits eines Partners und links des anderen Partners, also in 16 von 72 Gesichtshälften (22.2%) vor; es fällt auf, dass die Häufigkeit desselben Typus in Bezug auf die Gesichtshälfte beim ZZ grösser als beim EZ, rechts als links, bei den männlichen Feten als bei den weiblichen ist.

Typus IIIa kommt in 2 aller 12 EZ-Paare und in 1 aller 6 ZZ-Paare beiderseits beider Paarlinge, in 1 EZ-Paar nur rechts bei beiden Paarlingen,

in 2 EZ-Paaren beiderseits bei einem Partner, in 1 EZ-Paar und in 1 ZZ-Paar nur auf einer Gesichtshälfte bei einem Partner, also in 20 von 72 Gesichtshälften (27.7%) vor. Die Häufigkeit desselben Typus ist nach der Gesichtshälfte beim EZ grösser als beim ZZ, rechts als links, bei den männlichen Feten als bei den weiblichen.

Typus IIIb kommt in 1 EZ-Paar nur links bei beiden Paarlingen, in 2 EZ-Paaren und in 1 ZZ-Paar beiderseits bei einem Partner, in 1 EZ-Paar und in 1 ZZ-Paar beiderseits bei einem Partner, in 1 EZ-Paar und in 3 ZZ-Paaren nur auf einer Gesichtshälfte bei einem Partner, also in 12 von 72 Gesichtshälften (16.6%) vor. Die Häufigkeit desselben Typus ist an den einzelnen Gesichtshälften beim ZZ grösser als beim EZ, links als rechts, bei den weiblichen Feten als bei den männlichen.

Typus IV kommt in 1 aller 12 EZ-Paare nur auf einer Gesichtshälfte bei einem Partner, und in 1 aller 6 ZZ-Paare nur rechts eines Partners und beiderseits des anderen Partners, also in 4 von 72 Gesichtshälften (5.5%) vor. Die Häufigkeit des Typus IV an den einzelnen Gesichtshälften ist bei ZZ grösser als bei EZ, bei den weiblichen Feten als bei den männlichen, während sie links und rechts fast gleich gross ist.

Typus V kommt in 1 aller 12 EZ-Paare nur links bei beiden Paarlingen und in 1 EZ-Paar beiderseits bei beiden Paarlingen, also in 6 von 72 Gesichtshälften (8.3%) vor, nämlich nur bei eineiigen Zwillingseten; die Häufigkeit dieses Typus an den einzelnen Gesichtshälften ist bei den weiblichen Feten grösser als bei den männlichen.

Nach dem Alter scheint die Häufigkeit des einzelnen Typus bezüglich der Gesichtshälfte keinen auffallenden Unterschied zu zeigen.

Über die Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Individuen unterrichtet die Tabelle 4.

Aus der Tabelle 4 erhellt sich folgendes:

Typus I und II kommen je in 10 von 36 Zwillingseten vor, seine Häufigkeit bei den einzelnen Individuen zeigt keinen nennenswerten Unterschied zwischen EZ und ZZ, sie ist bei den männlichen Feten etwas grösser als bei den weiblichen.

Typus IIIa kommt in 12 von 36 Zwillingseten vor, seine Häufigkeit bei den einzelnen Individuen ist beim EZ grösser als beim ZZ, und bei den männlichen Feten grösser als bei den weiblichen.

Typus IIIb kommt in 9 von 36 Feten vor, die Häufigkeit desselben Typus bei den einzelnen Individuen ist bei ZZ grösser als bei EZ, und bei den weiblichen Feten grösser als bei den männlichen.

Typus IV kommt in 3 von 36 Feten vor, die Häufigkeit desselben Typus bei den einzelnen Individuen ist beim ZZ grösser als beim EZ, während man

Tabelle 4. Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Individuen.

Typus	Summe	ein-seitig	doppel-seitig	nach der Eüigkeit				nach dem Geschlecht			
				EZ (24)		ZZ (12)		♂ (23)		♀ (13)	
				ein-seitig	doppel-seitig	ein-seitig	doppel-seitig	ein-seitig	doppel-seitig	ein-seitig	doppel-seitig
I	10	6	4	3	3	3	1	6	2	—	2
II	10	4	6	2	4	2	2	3	4	1	2
IIIa	12	4	8	3	6	1	2	2	6	2	2
IIIb	9	6	3	3	2	3	1	3	2	3	1
IV	3	2	1	1	—	1	1	2	—	—	1
V	4	2	2	2	2	—	—	2	—	—	2

nach dem Geschlecht keinen Unterschied beobachten kann.

Typus V kommt in 4 von 36 Feten und zwar in nur EZ vor; die Häufigkeit bei den einzelnen Individuen ist bei den weiblichen Feten etwas grösser als bei den männlichen.

Bei den Typen I, IIIb und IV ist die Häufigkeit der einseitigen Verteilung grösser als die der doppelseitigen, dagegen bei den Typen II und IIIa ist die Häufigkeit der doppelseitigen Verteilung grösser als die der einseitigen.

Hieraus geht hervor, dass die Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Individuen gleich wie dieselbe bei den einzelnen Gesichtshälften ist.

Über die Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Zwillingspaaren unterrichtet die Tabelle 5.

Wie es in der Tabelle 5 gezeigt, kann man solches Paar, bei welchem wenigstens eine Gesichtshälfte zum Typus I gehört, in 4 von 12 EZ-Paaren und in 3 von 6 ZZ-Paaren beobachten. Solches Paar, bei welchem wenigstens eine Gesichtshälfte zum Typus II gehört, kommt in 5 von 12 EZ-Paaren und in 3 von 6 ZZ-Paaren vor; solches, bei welchem vier Gesichtshälften alle Typus I oder II darstellen, kommt nur beim EZ vor. Solches Paar, bei welchem wenigstens eine Gesichtshälfte Typus IIIa darstellt, kommt in 6 von 12 EZ- und in 2 von 6 ZZ-Paaren vor; solches, bei welchen irgendeine oder zwei von vier Gesichtshälften zum Typus IIIb gehören, kann man in je 4 mal beim EZ wie auch beim ZZ beobachten. Solches Paar, bei welchem irgendeine der vier Gesichtshälften zum Typus IV gehört, kommt in nur einem von 12 EZ-Paaren vor; in 1 von 6 ZZ-

Tabelle 5. Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Zwillingspaaren.

Typus	EZ (12)					ZZ (6)				
	auf einer Gh.	auf zwei Gh.	auf drei Gh.	auf vier Gh.	Summe	auf einer Gh.	auf zwei Gh.	auf drei Gh.	auf vier Gh.	Summe
I	1	2	—	1	4	1	2	—	—	3
II	2	2	—	1	5	1	1	1	—	3
IIIa	1	3	—	2	6	1	—	—	1	2
IIIb	1	3	—	—	4	3	1	—	—	4
IV	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1
V	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—

Gh. = Gesichtshälften.

Paaren ist es der Fall, wo drei von vier Gesichtshälften mit dem Typus IV gekennzeichnet sind. Solches Paar, bei welchem zwei oder vier Gesichtshälften den Typus V darstellen, kommt in 2 von 12 EZ-Paaren, aber niemals beim ZZ vor.

Hieraus geht hervor, dass die Häufigkeit der verschiedenen Typen des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Zwillingspaaren auch gleich wie dieselbe bei den einzelnen Gesichtshälften ist.

Vergleicht man unter Berücksichtigung der Eizigkeit beide Feten desselben Paares miteinander, so zeigt sich das Ergebnis wie in Tabelle 6.

Aus den obigen Befunden lässt sich folgende Zusammenfassung aufstellen.

Tabelle 6. Vergleich des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Zwillingspaaren.

Vergleich \ Eizigkeit	EZ (12 Paare)	ZZ (6 Paare)
Konkordanz auf vier Gesichtshälften (vollkommene Konkordanz)	5	1
Konkordanz auf drei Gesichtshälften	—	2
Konkordanz auf je zwei gleichnamigen Gesichtshälften	2	—
Diskordanz	5	3

1. Die Häufigkeit der Konkordanz auf vier Gesichtshälften eines Paares (vollkommene Konkordanz) ist beim EZ etwa 2,5 mal grösser als beim ZZ.

2. Die Konkordanz auf drei Gesichtshälften eines Paares findet sich 2 mal nur beim ZZ, während die Konkordanz auf je zwei gleichnamigen Gesichtshälften 2 mal nur beim EZ zu sehen ist.

3. Die Häufigkeit der Fälle, bei welchen sich die Diskordanz hinsicht-

lich der Ausmündung dieser Vene zeigt, ist beim ZZ etwas grösser als beim EZ.

Das konkordante Verhältnis bezüglich des Vorkommens des Typus V kann hochgeschätzt werden, da der Typus V zu der äusserst seltenen Form gehört.

Wenn man bezüglich des Typus den Ähnlichkeitsgrad zwischen den gleichnamigen Körperseiten eines Paares mit dem bei beiden Körperseiten eines Zwillingsindividuums vergleicht, so ergibt sich die Tabelle 7.

Tabelle 7. Vergleich des Ähnlichkeitsgrades zwischen den gleichnamigen Körperseiten eines Paares mit dem zwischen beiden Körperseiten eines Zwillingsindividuums.

	EZ (24)	ZZ (12)
Symmetrische Verteilung der Typen beim Zwillingsindividuums	17 (70.8%)	7 (58.3%)
Konkordanz auf zwei gleichnamigen Körperseiten eines Paares	14 (58.3%)	4 (16.7%)

Diese Tabelle lehrt uns, dass die Häufigkeit der symmetrischen Verteilung der Typen eines Zwillingsindividuums und auch die der Konkordanz auf zwei gleichnamigen Körper-

seiten der Paarlinge beim EZ grösser als beim ZZ sind. Beim EZ wie auch beim ZZ ist die Häufigkeit der Ähnlichkeit bei beiden Körperseiten eines Zwillingsindividuums grösser als die bei gleichnamigen Körperseiten der Paarlinge.

Vergleicht man den Ausmündungsmodus der V. fac. ant. zwischen Einlingsfeten (Yamada 1935) und Zwillingsfeten miteinander, so lässt sich folgende Zusammenfassung aufstellen.

Die Häufigkeit der Gesichtshälfte, bei der die V. fac. ant. in die V. jugularis externa mündet, ist bei den Zwillingsfeten fast gleich (44.4%) wie bei den Einlingsfeten (39.6%).

Die Häufigkeit der Gesichtshälfte, bei welcher der Ausmündungsmodus dem Typus I angehört, ist bei den Einlingsfeten etwa 1.7 mal grösser als bei

Tabelle 8. Vergleich des Ausmündungsmodus der V. facialis anterior bei den einzelnen Gesichtshälften zwischen den Einlingsfeten und Zwillingsfeten.

Typus		I	II	III	IV	V	VI
Einlingsfeten	S. Yamada (250)	86 (34.4%)	39 (15.6%)	99 (39.6%)	27 (10.8%)	15 (6.0%)	17 (6.8%)
Zwillingsfeten	Ogawa (72)	14 (19.4%)	16 (22.2%)	32 (44.4%)	7 (9.7%)	6 (8.3%)	—

Tabelle 9. Vergleich des Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei den einzelnen Individuen zwischen den Einlingsfeten und Zwillingsfeten.

		I			II		
		eins.	dop.	Summe	eins.	dop.	Summe
Einlingsfeten	Yamada (125)	46	20	66 (52.8%)	31	4	35 (28.0%)
Zwillingsfeten	Ogawa (39)	6	4	10 (27.8%)	4	6	10 (27.8%)

III			IV			V		
eins.	dop.	Summe	eins.	dop.	Summe	eins.	dop.	Summe
—	—	75 (60.0%)	—	—	19 (15.2%)	13	1	14 (11.2%)
10	11	21 (58.3%)	2	1	3 (8.3%)	2	2	4 (11.1%)

eins. = einseitig dop. = doppelseitig

den Zwillingsfeten, während die des Typus II bei den Zwillingsfeten (22.2%) etwas grösser als bei den Einlingsfeten (15.6%) ist.

Die Häufigkeit der Gesichtshälfte, bei welcher der Ausmündungsmodus zum Typus IV gehört, ist bei den Einlingsfeten (10.8%) etwa 2 mal grösser als bei den Zwillingsfeten (5.5%), während die Häufigkeit des Typus V bei den Zwillingsfeten ein wenig häufiger als bei den Einlingsfeten ist.

Der Fall, bei welchem die V. fac. ant. sich in zwei gleich starke Venen verzweigt und folgedessen jede zwei verschiedene Ausmündungen besitzt (Typus IV nach Yamada), kommt bei den Zwillingsfeten nicht vor.

Wie in der Tabelle 9 gezeigt, ist die Häufigkeit der Feten, bei welchen der Ausmündungsmodus zum Typus I oder IV gehört, bei den Einlingsfeten grösser als bei den Zwillingsfeten, während die der Feten, bei welchen er dem Typus II, III und V angehört, bei den Zwillingsfeten fast gleich wie bei den Einlingsfeten ist.

Über das Lageverhältnis der V. fac. ant. zum Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris findet man eine eingehende Untersuchung an 30 japanischen Erwachsenen von Ogo (1933). Ich will im folgenden hauptsächlich die Ergebnisse der Zahlenverhältnisse bei den Zwillingsfeten, den Befunden von Ogo gegenüberstellend, mehr ausführlich darlegen.

Die Fälle, bei denen die V. fac. ant. an der inneren Fläche des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verläuft, kommen bei den gewöhnlichen Erwachsenen (Ogo) in 32 von 60 Gesichtshälften (53.3%) und bei den Zwillingsfeten in 31 von 72 Kopfseiten (43.1%) vor.

Die Häufigkeit der Gesichtshälfte, bei welcher die V. fac. anterior das

Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris durchbohrt, ist bei den Zwillingsets (54.1%) auffallend (etwa 4.5 mal) grösser als bei den gewöhnlichen Erwachsenen (11.6%).

Nach Ogo zeigt die V. fac. ant. in 21 von 60 Gesichtshälften ein unklares Lageverhältnis zum Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris.

Bemerkenswert ist, dass beim I. Fetus eines ZZ-Paares (E.N. 1463) die V. fac. ant., als ein seltener Befund in dieser Arbeit, beiderseits über der äusseren Fläche des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verläuft.

Fasst man unter Berücksichtigung der Eizigkeit das Lageverhältnis der V. fac. ant. zum Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris zusammen, so zeigt sich das Ergebnis wie in der Tabelle 10.

Tabelle 10. Lageverhältnis der V. fac. ant. zum Caput zygomaticum des M. quadratus labii sup. an den einzelnen Gesichtshälften.

Diese Tabelle zeigt folgendes:

1) Die Häufigkeit der Gesichtshälfte, bei welcher die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris durchsetzt, ist beim EZ beinahe gleich wie beim ZZ.

2) Die Häufigkeit der Gesichtshälfte, bei welcher die V. fac. ant. an der inneren Fläche des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verläuft, zeigt keinen bedeutenden Unterschied zwischen EZ und ZZ.

Die deutliche Ausbildung der Anastomose zwischen der V. fac. ant. einerseits und dem Venennetz am äusseren Augenwinkel, V. supraorbitalis und V. temporalis media andererseits, nämlich die von Ogo mit „Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae“ genannte Vene kommt bei den Zwillingsets in 8 von 36 Feten (6 einseitig, 2 doppelseitig), also in 10 von 72 Gesichtshälften, und zwar nur bei EZ vor. Bei den übrigen 62 Gesichtshälften sind sie so schwach, dass man sie ohne venöse Injektion nicht deutlich beobachten kann.

In 19 von 24 EZ-Feten (6 einseitig, 13 doppelseitig), also in 32 von 48 EZ-Gesichtshälften und in 8 von 12 ZZ-Feten (3 einseitig, 5 doppelseitig), also in 13 von 24 ZZ-Gesichtshälften, insgesamt in 45 von 72 Gesichtshälften der Zwillingsets zeigt die V. nas. ext. eine deutliche Ausbildung, deren

	EZ (48)	ZZ (24)	Summe (72)
Kreuzt den Muskel durchsetzend	26 (54.2%)	13 (54.2%)	39 (54.2%)
Kreuzt an der inneren Fläche	22 (45.8%)	9 (37.5%)	31 (43.1%)
Kreuzt an der äusseren Fläche	—	2 (8.3%)	2 (2.7%)

Verlauf man ohne besondere venöse Injektion genau verfolgen konnte.

In 18 von 48 EZ-Feten (5 einseitig, 13 doppelseitig), also in 31 von 48 EZ-Gesichtshälften und in 10 von 12 ZZ-Feten (7 einseitig, 3 doppelseitig), also in 13 von 24 ZZ-Gesichtshälften, insgesamt in 44 von 72 Gesichtshälften der Zwillingsfeten weist die V. palp. inf. eine deutliche Ausbildung auf.

Um die Höhe der Ausmündungsstelle der V. nas. ext. und V. palp. inf. zu präzisieren, wurde nach Ogo der Abstand der Ausmündungsstelle von dem Unterrand des Lig. palp. med. gemessen; die Ergebnisse bei den einzelnen Gesichtshälften sind in der Tabelle 11 und 12 aufgeführt.

Tabelle 11. Abstand der V. nas. ext. vom Unterrand des Lig. palp. med. an den einzelnen Gesichtshälften.

	EZ (48)	ZZ (24)
2 mm	9	2
3 mm	12	3
4 mm	5	6
5 mm	3	1
6 mm	1	—

Tabelle 12. Abstand der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. an den einzelnen Gesichtshälften.

	EZ (48)	ZZ (24)
6–10 mm	7	4
11–13 mm	14	6
14–16 mm	10	4

Diese Tabelle lehrt uns, dass beim EZ die Fälle, bei denen der Abstand der Ausmündung der V. nas. ext.

vom Unterrand des Lig. palp. med. 3 mm beträgt, und beim ZZ die Fälle, bei denen er 4 mm beträgt, am häufigsten vorkommen.

Bei 2 unter 48 EZ-Gesichtshälften und bei 1 unter 24 ZZ-Gesichtshälften mündet die V. nas. ext. in der Höhe des Lig. palp. med. in die V. fac. ant.

Aus der Tabelle 12 ersieht man, dass sowohl beim EZ als auch beim ZZ die Fälle, bei denen der Abstand der Ausmündung der V. palp. inf. vom Unterrand des Lig. palp. med. 11–13 mm beträgt, am häufigsten vorkommen.

In 1 EZ-Paar nur links des einen Partners und beiderseits des anderen Partners, in 1 EZ-Paar und in 4 ZZ-Paaren nur links bei einem Partner, und in 1 EZ-Paar nur links bei beiden Paarlingen, also insgesamt bei 10 unter 72 Gesichtshälften bemerkt man deutliche Ausbildung der kleinen Vene an der Stelle, wo die V. angularis in die V. fac. ant. übergeht. Bei den übrigen 62 Gesichtshälften sind sie nicht deutlich gebildet. Ogo bezeichnet sie als „der Sehne des Bogens entsprechende kleine Vene;“ die Verbindung zwischen dem oberen Ende dieser Vene und der V. fac. ant. fehlt oft, dagegen mündet das untere Ende der kleinen Vene immer in die V.

fac. ant.

Bei den Zwillingsfeten fehlt die Verbindung zwischen dem oberen Ende dieser kleinen Vene und der V. fac. ant. an 5 von 10 Gesichtshälften, die solche kleine Vene tragen. Bemerkenswert ist, dass bei den Zwillingsfeten diese kleine Vene bei 9 von 10 solchen Gesichtshälften immer an der linken Seite beobachtet wird.

Was das Lageverhältnis der V. fac. ant. zur Glandula submaxillaris bei den Zwillingsfeten anbelangt, so hing mit ihr die V. fac. ant. in 9 von 72 Gesichtshälften trennbar, in 8 von 72 Gesichtshälften untrennbar, den Drüsenkörper durchsetzend, zusammen.

V. Schluss.

Der Entwicklungsgrad, Verlauf und Ausmündungsmodus der V. fac. ant. bei japanischen Zwillingen wurden morphologisch eingehend untersucht.

1. Das Untersuchungsmaterial betrifft insgesamt 18 paarige Zwillinge (12 EZ-Paare, 6 ZZ-Paare), d.h. 36 Feten (♂ 23, ♀ 13).

2. Bei den Zwillingsfeten zeigt der Entwicklungsgrad der V. fac. ant. nach dem Geschlecht, Alter und der Eizigkeit keinen merkwürdigen Unterschied.

3. Bei 2 von 24 EZ-Feten links und bei 2 von 12 ZZ-Feten rechts ist die V. fac. ant. stärker entwickelt als an der Gegenseite. In allen übrigen Fällen weist die V. fac. ant. die symmetrische Entwicklung auf.

4. Die Häufigkeit der verschiedenen Typen der Ausmündung der V. fac. ant. ist wie folgt:

a) Der Fall, bei dem die V. fac. ant. mit der V. fac. post. durch einen gemeinschaftlichen Stamm in die V. jugul. int. mündet, kommt in 10 von 36 Zwillingsfeten (6 einseitig, 4 doppelseitig), also insgesamt an 14 von 72 Gesichtshälften (19.4%) vor.

b) Der Fall, bei dem sie direkt in die V. jugul. int. mündet, kommt in 10 von 36 Zwillingsfeten (4 einseitig, 6 doppelseitig), also insgesamt an 16 von 72 Gesichtshälften (22.2%) vor.

c) Der Fall, bei dem die betreffende Vene am oberen Drittel des Vorderrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. mündet, kommt in 12 von 36 Zwillingsfeten (4 einseitig, 8 doppelseitig), also insgesamt an 20 von 72 Gesichtshälften (27.7%) vor.

d) Der Fall, bei welchem die betreffende Vene am unteren Drittel des Hinterrandes des M. sternocleidomastoideus in die V. jugul. ext. mündet, kommt in 9 von 36 Zwillingsfeten (6 einseitig, 3 doppelseitig), also insgesamt an 12 von 72 Gesichtshälften (16.6%) vor.

e) Der Fall, bei welchem die V. fac. ant. die V. jugul. ant. darstellt, kommt in 3 von 36 Zwillingsfeten (2 einseitig, 1 doppelseitig), also insgesamt an 4 von 72 Gesichtshälften (5.5%) vor.

f) Der Fall, bei dem die Vene in den Confluens venarum praeauricularis mündet, kommt in 4 von 36 Feten (2 einseitig, 2 doppelseitig), also an 6 von 72 Gesichtshälften (8.3%) vor.

5. Betreffs der Eiigkeit ist die Häufigkeit der verschiedenen Typen der Ausmündung der V. fac. ant. bei den einzelnen Zwillingsindividuen sowie Gesichtshälften wie folgt :

a) Die Häufigkeit des Typus I und II zeigt keinen nennenswerten Unterschied zwischen EZ und ZZ.

b) Die Häufigkeit des Typus IIIa ist beim EZ grösser als beim ZZ, während die des Typus IIIb und IV beim ZZ grösser als beim EZ ist.

c) Typus V. kommt nur beim EZ vor.

6. Bei der Typen I, IIIb und IV ist die Häufigkeit der einseitigen Verteilung grösser als die der doppelseitigen, dagegen bei der Typen II und IIIa ist die letztere grösser als die erstere.

7. Beim EZ wie auch beim ZZ ist die Häufigkeit der Ähnlichkeit bei beiden Körperseiten eines Zwillingsindividuums grösser als die bei den gleichnamigen Körperseiten der Paarlinge.

8. Die Häufigkeit der Ähnlichkeit bezüglich der Typen über die Ausmündung der V. fac. ant. ist wie folgt :

a) Die Zahl der Paare, bei welchen die vollkommene Konkordanz auf vier Gesichtshälften sich befindet, ist beim EZ (5 unter 12 Paaren) grösser als beim ZZ (1 unter 6 Paaren).

b) Die Paare, bei welchen die Konkordanz auf drei Gesichtshälften sich zeigt, sind nur beim ZZ aufzufinden.

c) Die Paare, bei welchen die Konkordanz auf zwei gleichnamigen Gesichtsseiten sich zeigt, sind nur beim EZ aufzufinden.

d) Die Zahl der Paare, bei welchen die Diskordanz sich zeigt, ist beim ZZ (3 unter 6 Paaren) etwas grösser als beim EZ (5 unter 12 Paaren).

e) Die Paare, bei welchen eine spiegelbildliche Konkordanz sich zeigt, sind weder beim EZ noch beim ZZ aufzufinden.

9. Der Fall, bei welchem die V. fac. ant. das Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris durchsetzt, kommt in 26 unter 48 EZ-Gesichtshälften (54.1%), bei 13 unter 24 ZZ-Gesichtshälften (54.1%) vor.

10. Der Fall, bei welchem die V. fac. ant. an der inneren Fläche des Caput zygomaticum des M. quadratus labii superioris verläuft, kommt bei 22 von 48 EZ-Gesichtshälften (45.8%), bei 9 von 24 ZZ-Gesichtshälften (37.5%), also insgesamt in 31 von 72 Gesichtshälften (43.1%) vor.

11. Die deutliche Ausbildung der Anastomose zwischen der V. fac. ant. einerseits und dem Venennetz im äusseren Augenwinkel, V. supraorbitalis und V. temp. med. anderseits, nämlich die von Ogo Ramus communicans superficialis venae temporalis mediae genannte Vene, kommt bei 8 von 36 Zwillingsfeten (6 einseitig, 2 doppelseitig), also an 10 von 72 Gesichtshälften, und nur beim EZ vor.

Am Schlusse spreche ich meinen verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. T. Taniguchi, für die stete freundliche Anregung und Unterstützung bei der Ausführung dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank aus.

Literatur.

- 1) Adachi, B., Das Venensystem der Japaner. Erste Lieferung. Kyoto. 1933.
 - 2) Evans, H. M., Die Entwicklung des Blutgefässsystems. (Keibel-Mall; Die Entwicklungsgeschichte des Menschen. II. 1911).
 - 3) Ellen, P., On subcutaneous vein of the neck. Journal of Anatomy. Vol. LXXII. 1937.
 - 4) Hochstetter, F., Die Entwicklung des Blutgefässsystems. Hertwigs Handbuch der Entwicklungslehre der Wirbeltiere. Bd. 3. Abt. 2. 1906.
 - 5) Mochizuki, S., Die Halsvenen der Japaner. Keio Igaku. Bd. 5. H. 3. 1925.
 - 6) Ogo, M., Die Gesichtsvenen der Japaner. Archiv f. Japanische Chirurgie. Bd. 10. H. 6. 1933.
 - 7) v. Verschuër, O., Ergebnisse der Zwillingsforschung. (Ref. in Verh. Ges. Phys. Anthropol. 1931).
 - 8) Yamada, S., Über das Venensystem des Halses, Gesichtes, Schädeldaches und der Thymusdrüse bei japanischen Feten. Kaibogaku-Zasshi. Bd. 8. H. 1. 1935.
 - 9) Yoshioka, K., Über die A. maxillaris externa (Gesichtsäste) bei den japanischen Zwillingsfeten. Rinsho-Sanka-Fujinka. Bd. 10. H. 12. 1934.
-