Anthropologische Untersuchung über die Ainu-Japaner-Kreuzung. (Vorläufige kurze Mitteilung).

Von

Tadao Mitui und Sigeru Sumi.

Aus dem Anatomischen Institut der Keio Universität, Tokyo.
(Direktor: Prof. Dr. T. Taniguchi).

Mit 4 Figuren auf Tafel XV.

Unter den ostasiatischen Völkern werden die Ainu als eine besondere und stammesgeschichtlich noch unklare Rasse anerkannt. Für alle Reisenden in Hokkaido (Nordjapan) sind die verschiedenen auffallenden Merkmale der Ainu recht interessant, z.B. reichliche Behaarung des ganzen Körpers, tief eingebettete Augen, deutlich ausgeprägte Augenbrauen, lange Wimpern, grosse Augenspalten, lange Kopfformen u.s.w. Über die obigen Merkmale haben wir ziemlich eingehende Untersuchungen angestellt, um diese Merkmale mit Japanern zu vergleichen.

Bekanntlich ist die Zahl der Ainu mehr und mehr im Schwinden begriffen, sie betrug im Jahre 1870 etwa 15,000, nimmt aber heute noch dieselbe Zahl einschliesslich der Mischlinge mit Japanern ein. Das zeigt, dass die reinrassigen Ainu durch den Einschlag des japanischen Blutes stark abzunehmen neigen, indem sie immer mehr Mischlinge neubilden und dadurch das Schwinden ihrer eigentlichen Sitte, Kultur und Sprache allmählich bedingen. Es ist sehr bezeichnend, dass die Ainu in den mittleren Jahren ihre eigene Sprache nicht mehr kennen und nur Japanisch sprechen.

Systematische anthropologische Untersuchungen über die reinrassigen Ainu wurden zwar schon von G. Montandon (1927) und Y. Koya (1937) sehr umfangreich durchgeführt, es gibt aber bisher keine wissenschaftliche Untersuchung über die Ainu-Japaner-Kreuzung, welche die einzelnen charakteristischen Rassenmerkmale allmählich, ja zuweilen verhältnismässig rasch verändert, beschrieben hat.

Die Rassenmischung mit Japanern, wie sie angeben, habe schon seit 200 oder 300 Jahren fortdauernd stattgefunden, besonders in der Küstengegend seit den frühesten Zeiten. Und bis heute seien viele Mischlinge in ver-

erbungswissenschaftlich recht verschiedenem Grade durch die Inzucht oder Rückkreuzung mit der Elternrasse entstanden.

Für die Untersuchung der Rassenmischung kommen natürlich nur solche Familien in Frage, in welchen die Eltern im rassenmässig reinen oder kreuzungsgeschichtlich klaren Zustand gehalten sind, weil sonst die Rassenmerkmale quantitativ sowie qualitativ undeutlich und desorientiert werden.

Aber das allmähliche Schwinden der reinrassigen Ainu und auch ihre Kreuzungsgeschichte sind mit der Zeit immer komplizierter geworden, so dass die anthropologischen Untersuchungen über diese Mischlinge ein bedrohendes Problem in der Rassenhygiene sein muss, wenn sie heute gar nicht oder nicht möglichst schnell vorgenommen werden, weil auch dieses wertvolle Material schliesslich für immer und bedauerlicherweise verlorengeht.

Wir haben auf Anregung und unter der Leitung von Prof. Taniguchi im Jahre 1938 und 1939 die Mischlinge in Hokkaido anthropologisch untersucht. Von dem rassenmässig völlig reinblütigem Material haben wir alle kreuzungsgeschichtlich unklaren Mischlingsfamilien ausgenommen und nur die für uns sicher zweckmässigen typischen Fälle ausgewählt, um die Bastardierung in Nordjapan möglichst genau zu erforschen.

Wir müssen die Tatsache anerkennen, dass die Japaner selbst ein Bastardvolk aufweisen, welches sich aus den Tungiden vom Norden und den Indochinesen, Negriten und Indonesiern vom Süden, und zwar aus den Ainu von unklarer Gegend kommend zusammensetzt. Man kann demnach die Ainu als ein teilnehmender wichtiger Faktor an der Ausbildung des japanischen Volkes ansehen, was aber heute noch einer sicheren wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Einige Kritiker mögen deshalb diese Ainu-Japaner-Kreuzung nicht als eine eigentliche Rassenmischung, sondern nur als eine Rückkreuzung bezeichnen, doch ist eine solche Auffassung für uns nicht beweisführend, denn wir konnten in der Untersuchung über die "Mixo-variation" feststellen, dass die reinrassigen Ainu anthropologisch recht verschieden als die gegenwärtigen Japaner sind.

An dieser Stelle möchten wir nicht unterlassen, den Behörden in Hokkaido unseren herzlichsten Dank auszusprechen, die uns durch ihre tatkräftige Unterstützung zum Zustandekommen dieser Untersuchung verholfen haben.

Dieser vorläufigen Mitteilung soll später eine eingehendere Beschreibung folgen.

I. Merkmale.

Die Untersuchungen an 55 Mischlingsfamilien haben das Folgende ergeben.

1. Die 55 Familien, in welchen einer der Eltern bei 27 Familien fehlt, setzen sich aus 135 Mischlingen, und zwar 116 Kindern und 19 Erwachsenen, oder 66 männlichen und 69 weiblichen

Mischlingen zusammen.

2. Um einen Vergleich mit Mischlingskinder zu ermöglichen, haben wir gleichzeitig 41 reinrassige Ainu—und 97 japanische Kinder untersucht.

3. Gesichtsform. Ainu hat den stärker betonten Backenknochen, also kürzer ausgebildete Form als Japaner. Der betonte Backenknochen scheint dominant zur kurzen Gesichtsform zu sein.

4. Stirn. Die steile Form tritt bei Ainu häufiger auf als bei Japanern. Sie scheint dominant zur fliehenden Form.

5. Nasenrücken. Bei Ainu ist die konkave Form häufiger, dagegen tritt die gerade Form bei ihnen weniger auf als bei Japanern. Die konkave Form scheint dominant zur geraden Form zu sein.

6. Nasenflügel. Der geblähte Nasenflügel, welcher bei beiden Rassen im fast gleichen Prozentsatz auftritt, scheint dominant zum anliegenden.

7. Nasenform. Die Nase des Japaners ist etwas schmaler als bei Ainu. Die schmale Nase scheint dominant zur breiten zu sein.

8. Kinn. Bei Ainu tritt die steile Form häufiger auf als bei Japanern. Sie scheint dominant zur vorstehenden und zurücktretenden Form zu sein.

9. Grösse der Augenlidspalte. Das Auge des Ainu ist grösser als bei Japanern. Das grosse Auge ist dominant zum kleineren.

10. Augenbraue. Sie ist bei Ainu viel dichter und länger als bei Japanern. Die Mischlinge stellen die intermediäre Form dar.

11. Wimper. Sie ist bei Ainu länger als bei Japanern. Die lange Wimper ist dominant zur kurzen.

12. Mongolenfalte. Sie ist bei Japanern in 50% der Fälle beobachtet, jedoch bei Ainu fast niemals. Der Erbgang ist dominant zum Gegenteil, aber nicht einfach dominant, weil sich der Fall zeigte, in welchem sich eine Mongolenfalte von der Kreuzung "fehlt" × "fehlt" aus entwickelte.

13. Epicanthus. Er tritt bei Japanern häufiger auf als bei Ainu. Der Erbgang scheint zum Gegenteil rezessiv.

14. Irisfarbe. Bei beiden Rassen ist sie braun oder schwärzlichbraun. Die dunkle Farbe ist dominant zur hellen.

15. Richtung der Augenlidspalte. Sie ist bei Ainu häufig horizontal, dagegen bei Japanern nach unten medial schief. Die schiefe Richtung scheint dominant zur horizontalen zu sein.

16. Einbettung des Bulbus. Der Augenbulbus ist bei Ainu sehr tief eingebettet, dagegen bei Japanern flach oder vorgewölbt. Die Mischlinge weisen die intermediäre Form auf.

17. Haarform. Sie ist bei beiden Rassen straff oder schlicht ausgebildet. Das straffe Haar scheint dominant zum schlichten zu sein.

18. Ohr läppchen. Bei Ainu ist es hauptsächlich gross frei, bei Japanern dagegen mittelgross angewachsen. Die Grösse des Ohr läppchens vererbt sich intermediär, während das freie Ohr läppchen dominant zum angewachsenen ist.

19. Darwin'sches Höckerchen. Seine prozentuale Häufigkeit ist bei Japanern etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist ganz unklar, doch scheint die fehlende Form dominant zur abgerundeten zu sein.

20. Hautfarbe. Es gibt keinen deutlichen Unterschied zwischen beiden Rassen. Die Mischlinge weisen die intermediäre Form auf.

21. Kopfform. Sie ist beim Japaner brachykephal, beim Ainu dagegen mesokephal ausgebildet. Der Erbgang ist intermediär.

22. Behaarung. Die Behaarung der Ainu ist viel reichlicher als die den Japaner. Die Mischlinge weisen die intermediäre Form auf.

23. Sakralfleck. Bei Ainu tritt er in 46,27 . (nach Inoue), bei Japanern in 93,04 . (nach Nagai) der Fälle auf; bei Mischlingen zeigt sich ein intermediärer Prozentsatz von 66,6%.

II. Über die messbaren Merkmale.

1. Das Untersuchungsmaterial betrifft 13 Ainu-Japaner-Mischlingsfamilien, welche mehr als 15 jährige Mischlinge umfassen.
2. Körpergrösse. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang scheint intermediär.
3. Spannweite. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
4. Grösste Kopflänge. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Der Erbgang ist unklar.
5. Grösste Kopfbreite. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
6. Kleinste Stirnbreite. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
7. Jochbogenbreite. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
8. Physiognomische Gesichtshöhe. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
9. Morphologische Gesichtshöhe. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
10. Physiognomische Obergesichtshöhe. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
11. Breite zwischen den inneren Augenwinkeln. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
12. Breite der Augenlidspalte. Bei Ainu ist sie grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
13. Höhe der Nase. Bei Japanern ist sie etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
14. Breite der Nase. Bei beiden Rassen fast gleich. Der Erbgang scheint intermediär.
15. Physiognomische Länge des Ohres. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Die Mischlinge stellten das Pauperieren dar.
16. Physiognomische Breite des Ohres. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
17. Länge des Ohrläppchens. Bei Ainu ist sie etwas grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
18. Längenbreiten-Index des Kopfes. Bei Japanern ist er grösser als bei Ainu. Der Erbgang scheint intermediär.
19. Morphologische Gesichtsinde. Bei Japanern ist er etwas grösser als bei Ainu. Der Erbgang ist unklar.
21. Jugomandibular-Index. Bei beiden Rassen fast gleich. Der Erbgang scheint intermediär.
22. Höhenbreiten-Index der Nase. Bei Ainu ist er grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
23. Jugofrontal-Index. Bei Ainu ist er grösser als bei Japanern. Der Erbgang ist unklar.
24. Ohrläppchen-Index. Bei beiden Rassen fast gleich. Der Erbgang scheint intermediär.
25. Index der inneren Augenwinkelbreite. Bei Japanern ist er etwas grösser als Ainu. Der Erbgang scheint intermediär.
26. Index der Augenspaltenbreite (zur inneren Augenwinkelbreite). Bei Ainu ist er grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.
27. Index der Spannweite. Bei Ainu ist er grösser als bei Japanern. Der Erbgang scheint intermediär.

Erklärung der Figuren.

Fig. 1. Mischlingsmädchen aus dem Dorfe Kutzaro.
Ziemlich tief eingebetteter Augenbulbus, grosse Augenspalte, deutlich ausgeprägte Augenbraue und straffes Haar sind hier leicht erkennbar. Dahinter sieht man einen japanischen Knaben.

Fig. 2. Mischlingsknabe aus dem Dorfe Kutzaro.
Vater ist reinrassiger Ainu, Mutter ist aber schon halbblütig. Das ist also eine Rückkreuzungsfamilie mit Ainu. Tiefe Einbettung des Augenbulbus, grosse Augenspalte, deutlich ausgeprägte Augenbraue, grosses und freies Ohr läppchen sind hier erkennbar. Dahinter sieht man seine Mutter, die schon halbblütig ist.

Fig. 3. Männlicher Mischling aus dem Dorfe Tikabumi.
83 Jahre alt; zeigt eine Spaltung der Merkmale der Ainu, d.h. lange Wimper, tiefe Einbettung der Augenbulbus, grosses Ohr läppchen, Mesokephalie, stark betonten Backenknochen und reichliche Behaarung, obwohl man hier eine japanische Mongolenfalte sowie schiefe Augenrichtung gleichzeitig erkennen kann.

Fig. 4. Zeigt eine beim Mischlinge auftretende Missbildung aus dem Dorfe Ogebusi, 4 Jahre alt, sein Vater ist Japaner, Mutter ist Ainu. Rechte Hand weist eine angeborene Klumphand und daneben eine Oligodaktylie (nur 4 Finger) auf. An der linken Hand erkennt man eine Polydaktylie (6 Finger). Die dahinter sitzende Frau ist seine Grossmutter (reinrassige Ainu).

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.