Über die postmortalen Veränderungen der Zellen des subkutanen Bindegewebes der Maus.¹⁾

Von

Kikusi Kimura.

(Aus dem Anatomischen Institut der Medizinischen Fakultät zu Okayama;
Vorstand: Prof. K. Yagita und Prof. M. Seki).

Mit 9 Textabbildungen und Tafeln I und II.

Die Fibrozyten und Histiozyten, die Hauptzellen des im tierischen Körper weit verbreiteten lockeren Bindegewebes, sind Gegenstand einer grossen Zahl von Arbeiten gewesen. Seit der Einführung der Eisenhämatein-Lackmethode, die von W. und M. v. Möllendorff (1926) angegeben worden ist, und welche befähigt ist, an Präparaten von dünnen Häutchen des lockeren Bindegewebes die Zellen ausserordentlich scharf zu färben, sind unsere Kenntnisse von den Bindegewebszellen stark gefördert worden. Was aber postmortale Veränderungen der subkutanen Bindegewebszellen bezüglich Form und Funktion anbetrifft, so sind wir darüber nur wenig unterrichtet, und das gilt in weit höherem Masse natürlich vom Verlauf der betreffenden Veränderungen. Darum hat der Verf. Experimente zur Untersuchung der genannten Veränderungen angestellt, dabei hat er die v. Möllendorffsche Färbungsmethode und daneben die supravitale Färbung mittels Neutralrot angewandt.

I. Methodisches.

Die Versuchstiere, nämlich Mäuse, denen man vorher den Kopf abgeschnitten hatte, wurden in drei Gruppen zu je 5 Tieren aufgeteilt. Von diesen insgesamt 15 Mäusen wurden 5 in Zimmertemperatur gebracht, weitere 5 in Gaze eingewickelt etwa 50 cm tief in feuchter Erde nebeneinander eingegraben und die letzten 5 in einem Eisschrank aufbewahrt.

¹⁾ Diese Arbeit wurde durch die Unterstützung aus dem Fonde des Kultusministeriums für Förderung der wissenschaftlichen Forschungen ausgeführt.

Nach Ablauf von je 15 Minuten, 1, 4, 8 und 12 Stunden wurden sodann aus dem Subkutangewebe des Rückens der Tiere dünne Stückchen des lockeren Bindegewebes rasch herausgenommen, auf dem Objektträger sanft ausgebreitet und in 10%ige Formalinlösung eingetaucht. Nachdem die Bindegewebsstückchen 24 Stunden lang fixiert worden waren, wurden diese nach Abspülen im Wasser nach der v. Möllendorffschen Eisenhämatein-Lackmethode gefärbt.

Zur Ausführung der Neutralrot-Supravitalfärbung der Gewebszellen wurden lebende Mäuse auf einem Stativ befestigt. Dann wurde ihnen eine Lösung von Neutralrot in physiologischer Kochsalzlösung (1 : 2500) ins subkutane Gewebe der Gesässgegend unmittelbar eingespritzt. 20 Minuten danach wurden den Mäusen der Kopf abgeschnitten und dann liess man sie für eine bestimmte Zeit im Zimmer oder unter der Erde oder aber im Eisschrank liegen. Darauf wurden aus einer der Einspritzungsstelle nahe liegenden Partie kleine Stückchen des dünnen lockeren Bindegewebes herausgenommen, die dann auf dem Objektträger vorsichtig ausgebreitet und mit einem Deckglas bedeckt wurden. Hierauf untersuchte man diese Stückchen bei Zimmertemperatur mit Hilfe einer Ölimmersion.

II. Ergebnisse der Untersuchung.

1. Befunde der gewöhnlicher Zimmertemperatur ausgesetzten Mäusekadaver.

Nach 15 Minuten.

Bei den Präparaten, die durch Anwendung der Eisenhämatein-Lackmethode gefärbt worden sind, schliessen die Fibrozyten nur eine kleine Zahl von Vakuolen in sich ein und sehen fast homogen aus. Die weitaus meisten Gewebszellen, die am Rand verhältnismässig undeutlich sind, verbinden sich durch Protoplasmaausläufer miteinander. Die Zellkerne, an denen Kernkörperchen sichtbar sind, sind meist elliptisch geformt und in der Mitte der Zellen gelagert.

Die Histiozyten haben eine scharf begrenzte Form, ihr Protoplasma erscheint körnig, enthält aber viel Vakuolen. Stellenweise findet man auch Monozyten (Abb. 1).

Bei Anwendung der Neutralrot-Supravitalfärbung wird beobachtet, dass im Protoplasma der Fibrozyten gleich nach dem Tode kleine gelblichrot gefärbte Granula zahlreich auftreten. Bisweilen treten auch mehrere grössere Granula oder Vakuolen in die Erscheinung (Tafelabb. 1).

Die gelblichroten Granula in den Fibrozyten werden nach Ablauf von

15 Minuten nur rot (Tafelabb. 2). Die Histozyten zeigen im Protoplasma rötlichbraune bis rote Granula und Vakuolen von unregelmässiger Grösse (Tafelabb. 2). Diese Gebilde treten hauptsächlich in der Umgebung des Kerns oder aber auf deren einer Seite auf; bisweilen finden sich ausserdem noch rundliche, tropfenförmige gelblich gefärbte Granula, die schön wie ein Blumenkranz aussehen. Im übrigen sind lichtbrechende Lipoidgranula in kleiner Menge anzutreffen.

Abb. 1. Nach Ablauf von 15 Minuten bei Zimmertemperatur. Die Fibrozyten sind kaum verändert. Eisenhämatein-Lackmethode. Vergr. 280 $\times$.

Abb. 2. Nach Ablauf von 1 Stunde bei Zimmertemperatur. Die Kontur der Zellen ist schärfer geworden.

Nach 1 Stunde.

Es lässt sich bei Anwendung der Eisenhämatein-Lackmethode eine geringe Verkleinerung der Grösse der Fibrozyten feststellen, deren Kontur nun schärfer erscheint (Abb. 2). Die Histozyten weisen zum grössten Teil ein dünner gewordenens Protoplasma auf, dessen Vakuolen sich etwas vergrössert haben.

Bei der Neutralrot-Vitalfärbung kann man feststellen, dass die meisten Histozyten mehr und mehr verblassen und eine hell-gebliche Farbe angenommen haben, obwohl ein Teil der Histozyten auch noch die roten Granula und Vakuolen von unregelmässiger Grösse besitzen (Tafelabb. 3).

Nach 4 Stunden.

Die Verschmälerung der Fibrozyten schreitet noch weiter voran. Die Zahl der Vakuolen nimmt ab (Abb. 3). Bei den meisten Fibrozyten ist die

Kontur wieder undeutlich. Auch die Histiozyten sind nicht mehr scharf begrenzt.

Abb. 3. Nach Ablauf von 4 Stunden bei Zimmertemperatur. Die Zellen verschmälern sich.

Abb. 4. Nach Ablauf von 8 Stunden bei Zimmertemperatur. Die Fibro- und Histiozyten sind mit dünnem Zytoplasma versehen.

Nach 8 Stunden.

Das Protoplasma der Fibrozyten und Histiozyten löst sich weitgehend auf. Bei einem Teil dieser Zellen ist die Zellmembran zerstört und das Protoplasma geht teils in die Umgebung aus (Abb. 4). Die Zellkerne haben im allgemeinen an Volumen stark abgenommen, sind meist länglich.

Nach 12 Stunden.

Der Zelleib der Fibrozyten und Histiozyten ist jetzt in weitem Masse zerstört und aufgelöst (Abb. 5).

Bei der Supravitalfärbung mit Neutralrot lassen sich die Fibrozyten und Histiozyten nach Ablauf von 8–12 Stunden im Protoplasma gleich-

Abb. 5. Nach Ablauf von 12 Stunden bei Zimmertemperatur. Die Zellen sind nun sehr arm an plasmatischen Substanzen.

mässig anfärben; die Vakuolen des Protoplasmas, die unregelmässig gross sind, kolorieren sich mit Neutralrot nur schwer; die Zellkerne nehmen auch nur eine helle Farbe an; die Kernmembran aber färbt sich stärker als alle übrigen Teile; fast keine Granula lassen sich im Kern erkennen (Tafelabb. 4).

2. Befunde der in feuchter Erde eingegrabenem Mäusekadaver.

Nach 15 Minuten.

Der Zelleib der Fibrozyten und Histozyten ist bedeutend geschwollen. Das Protoplasma der Fibrozyten verästelt sich in feine Fortsätze, bildet deutlich ein Netz und schliessen einige Vakuolen von verschiedener Grösse in sich ein (Abb. 6). Die Histozyten haben grosse Vakuolen in reichlicher Menge.

Abb. 6. Eingraben des Tieres in Erde, 15 Minuten. Die Fibrozyten sind deutlich verändert, man sieht deutliche zytoplasmatische Zusammenhänge der Zellen.

Abb. 7. Eingraben des Tieres in Erde, 1 Stunde. Die Vakuolenbildung der Fibrozyten ist nicht mehr auffallend.

Nach 1 Stunden.

Die Vakuolen in den Fibrozyten verringern sich an Zahl und Grösse beträchtlich (Abb. 7). Die Histozyten werden etwas dünner, behalten aber noch immer die wabige Struktur. Die Granula und Vakuolen der Histozyten, die mittels Neutralrot gelblichrot färbbar sind, nehmen an Zahl ab. Zwischen ihnen sind gelblich färbbare kleine Granula diffus vorhanden. Im Protoplasma finden sich übrigens Vakuolen, die sich mit Neutralrot kaum kolorieren (Tafelabb. 5).

Nach 4-8 Stunden.

Die Fibrozyten und Histozyten verhalten sich wie bei Zimmertemperatur, nur dass die Veränderungen des Zytoplasma und Zellkerns etwas stärker sind.

Nach 12 Stunden.

Das Protoplasma der Fibrozyten und Histozyten ist weitaus aufgelöst, so dass auch die Begrenzung dieser Zellen kaum erkennbar ist (vgl. hierzu Abb. 5).

3. Befunde der im Eisschrank aufbewahrten Mäusekadaver.

Nach 15 Minuten.

Die Netzbildung der Fibrozyten erscheint deutlicher als nach dem Eingraben in Erde. Ihr Zelleib ist geschwollen, in welchem auch kleine und grosse Vakuolen vorkommen (Abb. 8). Die Histozyten zeigen weniger Veränderungen. Bei Anwendung der supravitalen Färbung mittels Neutralrot wird beobachtet, dass die Granula an Zahl geringer, an Färbungsintensität etwas schwächer geworden sind, und dass sie einen gelblichen Farbton angenommen haben. Bisweilen kommen aber im Protoplasma rot gefärbte Granula von unregelmässiger Grösse zum Vorschein.

Abb. 8. Aufbewahren des Tieres im Eisschrank, 15 Minuten. Deutliches Fibrozytennetz. Grosse Vakuolen in den Zellen.

Abb. 9. Aufbewahren des Tieres im Eisschrank, 1 Stunde. Das Zytoplasma der Fibro- und Histozyten ist dünner, deren Kerne kontrahiert sind.

Nach 1 Stunde.

Der Umriss der Fibro- und Histiozyten ist ihrem dünnen Zytoplasma entsprechend undeutlich (Abb. 9). Die Zellkerne haben an Grösse etwas abgenommen, ihre Oberfläche ist gefaltet.

Die Zahl der mittels Neutralrot färbbaren Zellgranula nimmt noch stärker ab. Im Zytoplasma der Fibro- und Histiozyten sind mit Ausnahme der bisweilen zum Vorschein kommenden roten Granula und Vakuolen nur schwach gelblich gefärbte Granula von verschiedener Grösse zu sehen. In der Peripherie des Protoplasmas ist eine grosse Menge von Vakuolen vorhanden, welche mittels Neutralrot kaum färbbar sind (Tafelabb. 6).

Nach 8–12 Stunden.

Die Verkleinerung der Zellkerne erfolgt allgemein stärker als beim Liegenlassen in Zimmertemperatur und beim Eingraben im Boden.

III. Zusammenfassung.

Die Fibrozyten und Histiozyten, die in 15 Minuten nach dem Tode des Organismus bei Zimmertemperatur vielleicht noch am Leben bleiben, liefern die Befunde, die von normalen kaum abweichen. Wenn die Tiere in kühler Erde eingegraben oder im Eisschrank aufbewahrt worden sind, treten in 15 Minuten Veränderungen bei Fibrozyten, Fibrohistiozyten und Histiozyten auf, indem das Fibrozytennetz viel deutlicher wird, die Zellen an Volumen zunehmen und viele Vakuolen von verschiedener Grösse zum Vorschein bringen. Das kommt zweifellos daher, dass der osmotische Druck der Zellen infolge von Anhäufungen der Spaltungsprodukte gesteigert wird, was das Eindringen der Flüssigkeit vom Aussenmedium in das Zellinnere herbeiführt. Nach diesen Vorgängen nehmen das Zytoplasma und der Zellkern allmählich an Volumen ab. Nach Ablauf von 8 bis 12 Stunden werden die Zellen deutlich verkleinert, weil wahrscheinlich die Durchlässigkeit der Zellmembran nunmehr so stark erhöht wird, dass die in der Zelle angehäuften Spaltungsprodukte nun durch sie hindurch diffundieren.

Bei der supravitalen Färbung mittels Neutralrot erscheinen die Granula und Vakuolen der Histiozyten anfänglich gelblichrot, dann intensiv rot (infolge der Steigerung der Wasserstoffionenkonzentration); eine Stunde später aber verbleichen sie erheblich (durch die Reduktion des Farbstoffes). Nach Ablauf von 8 bis 12 Stunden wird der ganze Zellkörper gleichmässig angefärbt, weil der angefärbte Vakuoleninhalt sich mit den Protoplasmasubstanzen mischt. Der Zellkern tingiert sich dabei stark.

Literaturverzeichnis.

- Möllendorff, W. u. M. v.: Das Fibrozytennetz im lockeren Bindegewebe; seine Wandlungsfähigkeit und Anteilnahme am Stoffwechsel. Z. Zellforsch 3 (1926).
- Seki, M.: Zur Kenntnis der intra- und supravitalen Färbung. IV. Umladbarkeit der basischen Vitalfarbstoffe als eine wesentliche Vorbedingung für das Eindringen derselben in die Zellen. Z. Zellforsch. 19 (1933).

Erklärung der Abbildungen auf Tafeln I und II.

Den Mäusen wurde eine Neutralrotlösung subkutan eingespritzt. Die getöteten Tiere wurden erst nach Aufbewahren im Zimmer, unter der Erde bzw. im Eisschrank für bestimmte Zeit untersucht.

- Tafelabb. 1. Gleich nach dem Tode. Vergr. 1250×.
- Tafelabb. 2. Nach Ablauf von 15 Minuten bei Zimmertemperatur. Vergr. 1250×.
- Tafelabb. 3. Nach Ablauf von 1 Stunde bei Zimmertemperatur. Vergr. 960×.
- Tafelabb. 4. Nach Ablauf von 8–12 Stunden bei Zimmertemperatur. Vergr. 1250×.
- Tafelabb. 5. Eingraben des Tieres in Erde, 1 Stunde. Vergr. 960×.
- Tafelabb. 6. Aufbewahren des Tieres im Eisschrank, 1 Stunde. Vergr. 1250×.