Anthropologische Untersuchungen an Ainu-Japaner- Mischungsfamilien (I. Mitteilung).

Von

Tadao Mitui und Sigeru Sumi.

Anatomisches Institut der Keio-Gijuku Universität zu Tokyo.
(Vorstand: Prof. Dr. T. Taniguchi).

Mit 37 Figuren auf Tafeln IV-X.

Inhaltsverzeichnis.

I. Einleitung	335
II. Material und Untersuchungsmethode	338
III. Eigene Befunde	339
IV. Zusammenfassung	376
V. Schluss	400
Schrifttum	402

I. Einleitung.

Das Problem der eugenischen Heirat, der Kastration und der Kontrolle der Kunst findet neuerdings in allen Schichten ein beherrschendes Interesse. Für diese drei Probleme, welche der Anwendungsabteilung der Rassenegenik zugehören, ist die erbbiologische Untersuchung über die Bastarden als ätiologische Abteilung die hochwertigste anzusehen.

Urgeschichtlich hat die nordeuropäische Rasse auf ihren Eroberungswegen nach dem Süden in kurzer Zeit die südeuropäische Rasse unterworfen, und über Europa hat sich die Ariankultur ausgebreitet. Die nordeuropäische Rasse zeigt wenig Pigment, das Haar ist blond und die Augenfarbe blau, dagegen die unterworfenen südeuropäischen Rassen mässiges Pigment, das Haar ist braun und die Augenfarbe braun. In dem Europa des 20. Jahrhunderts, wo die Eroberungszüge der nordeuropäischen Rasse wie ein Traum untergegangen sind, ist deutlich sichtbar das Vorwiegen oder der starke Einschlag der südeuropäischen Rasse, die heute so weit ausgebreitet ist, dass die nordeuropäische Rasse sich nur in Skandinavien, Norddeutschland und der Schweiz erhalten hat. Weil die Bastarden der zwei Rassen, d. h. die nord-südeuropäischen Mischlinge eine natürliche Auslese begegnet haben und

weil der Faktor der pigmentreichen südeuropäischen Rasse gegenüber der natürlichen Auslese starke Widerstandskraft besitzt, konnte sich der südeuropäische Typus erhalten, während der nordeuropäische Typus allmählich untergegangen ist.

Die Beziehungen zwischen derartigem Rassenmerkmal und der natürlichen Auslese haben auf die Rassenerhaltung sehr beeinflussend eingewirkt, so dass es kein Zweifel ist, dass gegenüber der Rasseneugenik zwecks Rassenerhaltung der Untersuchung der Vererbungstypen verschiedener Rassenmerkmale grosse Bedeutung zukommt. Hier zeigt sich also, dass die Untersuchung der Vermischung als ätiologische Abteilung der Rasseneugenik nicht fehlen darf.

Überblickt man das Schrifttum, so findet man in Japan und auch in Europa und Amerika zahlreiche Untersuchungen, die sich mit der Vermischung befasst haben. Aber die eingehende und systematische Untersuchung wurde erstmalig von Eugen Fischer (1908) an Hottentotten-Europäer-Bastarden durchgeführt. Seitdem, also seit 30 Jahren, ist die Geschichte der Untersuchungen der Blutvermischung zur Kenntnis gekommen. Man findet aber auch vor E. Fischer Berichte über die Untersuchung der Bastarden. Sie seien im Nachstehenden kurz erwähnt.

1880-84.	E. Baelz :	Japaner-Europäer.
1885.	Neuhaus :	Chinesen-Kanaka.
1895.	Fr. Boas :	Indianer-Europäer.
1908.	Fischer :	Hottentotten-Europäer.
1911.	Bean :	Chinesen-Tagalogen. Negrito-Philippiner.
1912.	Engerrand :	Chinesen-Mexikaner.
1916.	A. G. Janks :	Indianer-Europäer.
1921.	Lundborg :	Juden-Nord und -Südeuropäer.
1923.	E. A. Hooten :	Neger-Europäer.
1927.	Larssen, Godfry :	Hawaier-verschiedene Rassen.
	Flemming :	Chinesen-Europäer.
	Goldschmidt :	Japaner-Europäer in Bonin-Inseln.
	Rodenwaldt :	Malaiin-Europäer.
	Dunn :	Chinesen-Kanaka. Japaner-Kanaka. Kanaka-Europäer.
1928.	Dunn :	Chinesen-Europäer und Polynesier-Europäer (Hawai).
	Lotsy, Goddijn :	Neger-Europäer und Hottentotten-Europäer (Südafrika).
1929.	Davenport, Steggerda :	Neger-Europäer (Jamaika).
	Gates :	Portugiesisch-Tupiindianer.

1930.	Fischer:	Polynesier-Europäer.
	Herskowit:	Neger-Europäer.
1931.	Williams:	Mayaindianer-Europäer (Mexico).
1934.	Lebzelter.	Buschmann-Europäer (Südwestafrika).
1935.	Tao:	Chinesen-Europäer.
1937.	W. Abel.	Nordafrikaeingeborene-Europäer.
		Annamit-Europäer.
1939.	J. Schäuble:	Südamerikanische Maput-Europäer.
	Rita Hausschild:	Neger-Chinesen (Trinidad, Nordamerika).

Ausserdem berichtete Wagenseil, in gleicher Weise wie Goldschmidt, über die Japaner-Europäer- und Europäer-Polynesier-Vermischung in Bonin-Inseln, Leicher über die Deutschen-Juden-Vermischung. Auch finden wir über die Eskimo-Europäer-Vermischung Berichte, die eigentlich in die eingehenden anthropologischen Untersuchungen nicht einzureihen sind, von Nordenskiöld (1886), Stefanson (1913), Fehlinger (1926), Gates (1929).

Aus Obigen geht eindeutig hervor, dass bisher über die Vermischung der Japaner mit anderen Rassen nur die Untersuchungen von Baelz, Goldschmidt, Wagenseil, Dunn vorliegen. Obwohl über die reine Ainurasse, welche in anthropologischer Hinsicht im Mittelpunkt des Interesses steht, eingehende systematische Untersuchungen von Montandon (1927) und Koya (1937) durchgeführt sind, findet man bisher keine systematische Untersuchung der Ainu-Japaner-Vermischung.

Dazu kommt, dass die heutige Einwohnerzahl der in Hokkaido lebenden Ainu nur 15000 erreicht und der Zunahmewert der Bevölkerung vielmehr beinahe Null ist. Es entsteht dadurch eine Minorität, die hier durch die Umschichtung als Folge der grossen Bevölkerungszunahmeziffer der benachbarten Japaner allmählich überdeckt wird. Wenn die anthropologischen Untersuchungen dieser Rasse nicht jetzt durchgeführt werden, so geht das wertvolle Material schliesslich verloren. Wir hatten in den Jahren 1938 und 1939 zweimal die Gelegenheit unter Leitung von Prof. Taniguchi etwas eingehendere Untersuchungen an Bastarden durchzuführen. Unsere Untersuchungen, welche von dem Material und dem Untersuchungsgebiet dargelegt sinob, erheben noch keinen Anspruch auf Vollkommenheit, doch dürfte mit ihnen, wenn sie für die späteren Untersuchungen beitragen sollten, der Zweck unserer Untersuchung erfüllt sein.

Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, ist es uns eine sehr angenehme Pflicht allen jenen Stellen in Hokkaido, die uns beim Zustandekommen der Durchführung unserer Aufgabe entscheidende oder wertvolle Hilfe geleistet haben, unseren aufrichtigsten Dank zu sagen.

II. Material und Untersuchungsmethode.

Das Untersuchungsgut erfasst 55 Mischehen von in Hokkaido lebenden Ainu und Japanern, und zwar 28 Familien, in denen Vater und Mutter noch am Leben sind, und 27 Familien, in denen die eine Seite fehlt. Nach der Art der Vermischung eingeteilt, ergeben sich folgende Feststellungen; 25 Familien: Mutter Ainu, Vater Japaner; 12 Familien: Mutter Japanerin, Vater Ainu; 6 Familien: Mutter Mischling, Vater Japaner; 1 Familie: Mutter Mischling, Vater Ainu; 4 Familien: Vater Mischling, Mutter Ainu; 3 Familien: Mutter Japanerin; Vater Mischling; 3 Familien: Vater und Mutter Mischlinge. Aus diesen Verbindungen sind im ganzen 125 Mischlingskinder hervorgegangen, wovon 19 auf Erwachsene und 116 auf Kinder (von Neugeborenen bis zum vollendeten 4. Lebensjahre) entfallen. Geschlechtlicherseits waren 66 männlich und 69 weiblich.

Es sollen in der ersten Mitteilung vorwiegend die physiognomischen Merkmale, und in der zweiten Mitteilung die an ihnen erhobenen Messungswerte zur Besprechung kommen. Als physiognomische Merkmale gelten die folgenden.

1. Gesichtsform	2. Stirn	3. Nasenrücken
4. Nasenflügel	5. Nasenform	6. Kinn
7. Grösse der Augenlidspalte	8. Augenbraue	9. Wimpern
10. Mongolenfalte	11. Epicanthus	12. Irisfarbe
13. Richtung der Augenlidspalte	14. Einbettung des Bulbus	15. Haarform
16. Ohr läppchen	17. Darwin'sches Höckerchen	18. Hautfarbe
19. Kopfform	20. Behaarung	21. Sakralfleck

Gesichtsform: Nach dem morphologischen Gesichtsinde x $\left(\frac{\text{morphologische Gesichtshöhe}}{\text{Jochbeinbreite}} \times 100 \right)$ von Garson wurden die folgenden Formen erhoben.

Hypereuryprosop		×		78.9
euryprosop		79.0		83.9
mesoprosop		84.0		87.9
leptoprosop		88.0		92.9
hyperleptoprosop		93.0		×

Nasenform: Der Nasenindex $\left(\frac{\text{Nasenbreite}}{\text{Nasenhöhe}} \times 100 \right)$ nach der Beschreibung von Martin eingeteilt ist wie folgt:

Hyperleptorrhin		×		54.9
leptorrhin		55.0		69.9
mesorrhin		70.0		84.9
chamaerrhin		85.0		99.9
hyperchamaerrhin		100.0		×

Kopfform: Nach dem Kopfindex $\left(\frac{\text{grösste Kopfbreite}}{\text{grösste Kopflänge}} \times 100 \right)$ von Garson waren die folgenden Formen vertreten.

Ultradolichokephal		×		64.9
hyperdolichokephal		65.0		69.9
dolichokephal		70.0		74.9
mesokephal		75.0		79.9
brachykephal		80.0		84.9
hyperbrachykephal		85.0		89.9
ultrabrachykephal		90.0		×

Für die Farbenbestimmung der Iris bedienten wir uns der Augenfarbentafel von Dr. B. K. Schultz.

Schwarzbraun	Nr. 15, 16,
dunkelbraun	Nr. 14,
braun	Nr. 13, 12,
hellbraun	Nr. 11.

Hautfarbe: Nach der Hautfarbentafel von Luschan eingeteilt ist die Farbe wie folgt:

Gelblichweiss	Nr. 1-2,
karminweiss	Nr. 3, 9-11,
gelblich	Nr. 4-5,
hellbraun	Nr. 6, 22-23,
fahlweiss	Nr. 7-8,
dunkelkarminweiss	Nr. 12-13,
gelblichbraun	Nr. 14-15.

III. Eigene Befunde.

Familie I.

Vater: Ainu; Mutter: Japanerin. 6 Kinder im Alter von 17, 15, 12, 10, 8 und 6 Jahren. (Fig. 1, Taf. IV).

Vater, 35 J. Gesichtsumriss: Elliptisch; Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken leicht konvex gebogen; Spitze etwas rundlich; Flügel nicht gebläht; mesorrhin. Lippen: Dicke mittelmässig; Lippen vorstehend. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, etwas schief

gerichtet, nach unten medial; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Irisfarbe braun; Augapfel liegt tief. Haar: Straff, tiefschwarz. Ohrläppchen: Gross und frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe: Dunkel (Nr. 12). Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Europrosop. Behaarung: Äusserst dicht.

Mutter, 34 J. Gesichtsumriss: Rhombisch; Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch, Rücken leicht konvex; Spitze rundlich; Flügel gebläht; mesorrhin. Lippen: Dicke mittelmässig; Oberlippe vorstehend. Kinn: Zurücktretend. Augenform: Lidspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Irisfarbe hellbraun; Augapfel liegt flach. Haar: Straff, schwarzbraun. Ohrläppchen: Klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Europrosop. Behaarung dünn.

Kind, 17j. Knabe. Gesichtsumriss: Ovoid. Nase: Flügel gebläht. Kinn: Steil. Augenform: Lidspalte gross und schief gerichtet; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Irisfarbe braun; Augapfel tief liegend. Ohrläppchen: Gross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 12. Gesichtsform: Europrosop. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 15j. Mädchen. Gesichtsumriss: Rundlich. Nase: Flügel nicht gebläht. Kinn: Zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross und schief gerichtet; Augenbraue dicht, Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Irisfarbe dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen: Mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 11. Kopfform: Hyperbrachykephal. Behaarung auffallend.

Kind, 12j. Mädchen. Gesichtsumriss: Rundlich. Nase: Flügel gebläht. Kinn: Zurücktretend. Augenform: Spalte mittelgross und schief gerichtet; Augenbraue mittelmässig; Wimpern mittelmässig; Mongolenfalte (+); Irisfarbe dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen: Mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Behaarung: auffallend.

Kind, 10j. Knabe. Gesichtsumriss: Rund. Nase: Flügel gebläht. Augenform: Augenspalte gross und schief gerichtet; Augenbraue mittelmässig; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen: Mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 8j. Knabe. Gesichtsumriss: Umgekehrt ovoid. Nase: Flügel gebläht. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross und schief gerichtet; Augenbraue mittelmässig; Wimpern mittelmässig; Mongolenfalte (+); Irisfarbe dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen:

Mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 6j. Knabe. Gesichtsumriss: Elliptisch. Nase: Flügel gebläht. Kinn: Steil. Augenform: Augenspalte mittelgross und schief gerichtet; Augenbraue mittelmässig; Wimpern mittelmässig; Mongolenfalte (+); Irisfarbe braun; Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen: Mittelgross, frei; D-Höckerchen cercopithecus-förmig. Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Dolichokephal. Behaarung auffallend. Sakralfleck (—).

Familie II.

Vater: Ainu; Mutter: Japanerin. 4 Kinder im Alter von 14, 9, 7 und 1 Jahren. (Fig. 2, Fig. 3, Taf. IV).

Vater, 38 J. Gesichtsumriss: Ovoid; Stirn etwas fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken leicht konkav; Spitze spitzig; Flügel gebläht; mesorrhin. Lippen: Dicke mittelmässig; Lippe zurückstehend. Kinn: steil. Augenform: Augenbraue dick; Augenspalte mittelgross und schief gerichtet; Wimpern lang und dicht; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Irisfarbe hellbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar: Straff und tief schwarz. Ohrläppchen: mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Hyperprosop. Behaarung auffallend.

Mutter, 33 J. Gesichtsumriss: Elliptisch; Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken gerade; Spitze spitzig; Flügel etwas gebläht. leptorrhin. Lippen: Dicke mittelmässig; Oberlippe vorstehend. Kinn: steil. Augenform: Augenbraue dünn; Augenspalte klein, schief gerichtet; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Irisfarbe dunkelbraun. Augapfel liegt flach. Haar: Straff, schwarzbraun. Ohrläppchen: Mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 3. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Hyperleptoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 14j. Mädchen. Gesichtsumriss: Ovoid; Stirn etwas fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht, leptorrhin. Lippen: Dicke mittelmässig; Oberlippe vorstehend. Kinn: Steil. Augenform: Augenbraue mittelmässig; Augenspalte mittelgross, schief gerichtet; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Irisfarbe dunkelbraun. Haar: Straff, tief schwarz. Ohrläppchen: Mittelgross, frei; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 9j. Mädchen. Gesichtsumriss: Ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin. Lippen: Dicke mittelmässig, vorstehend. Kinn: Zurücktretend. Augenform: Augenbraue mittelmässig; Augenspalte gross und schief gerichtet; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Irisfarbe dunkelbraun. Haar: Straff, schwarzbraun. Ohrläppchen: Mittelgross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal, Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung sehr dünn.

Kind, 7j. Knabe. Gesichtsumriss: Ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; mesorrhin. Lippen: Dick, vorstehend. Kinn: Zurücktretend. Augenform: Augenbraue mitteldick; Augenspalte gross, schief gelegen; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Irisfarbe dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar: Straff, schwarzbraun; Ohrläppchen: Mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Mosokephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung mittelmässig.

Kind, 1j. Mädchen. Gesichtsumriss: Rund; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich, leptorrhin. Lippe vorstehend. Kinn: Zurücktretend. Augenform: Augenbraue mitteldick; Augenspalte mittelgross, schief gerichtet; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Irisfarbe schwarzbraun. Haar: straff, hellbraun. Ohrläppchen: Mittelgross, frei; Darwin'sches Höckerchen rundlich. Haut: Farbe; Nr. 3. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung auffallend. Sakralfleck (+).

Familie III.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 4 Kinder im Alter von 11, 8, 6 und 4 Jahren. (Fig. 4, Fig. 5, Taf. IV).

Vater, 42 J. Gesichtsumriss: Eckig; Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht, mesorrhin. Lippen: Dick, vorstehend. Kinn: Vorstehend. Augenform: Augenbraue mitteldick; Augenspalte mittelgross, schief gerichtet; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Irisfarbe braun. Haar: Straff, tief schwarz. Ohrläppchen: Gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesokephal. Behaarung dünn.

Mutter, 30 J. Gesichtsumriss: Rhombisch; Stirn steil. Nase: Wurzel niedrig; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin.

Lippen: Dicke mittelmässig; vorstehend. Kinn: Vorstehend. Augenform: Augenbraue dick und lang; Augenspalte gross, schief gerichtet; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Augapfel liegt tief. Haar: Straff, tief schwarz. Ohrläppchen: Gross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 11j. Knabe. Gesichtsumriss: Fünfeckig; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; Spitze rundlich; leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenbraue dick und lang; Augenspalte gross, schief gerichtet; Wimpern lang; Mongolenfalte (+) Epicanthus (—); Irisfarbe schwarzbraun; Augapfel liegt tief. Haar: Straff, tief schwarz. Ohrläppchen: Gross und frei; D-Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Gesichtsausdruck ist ganz und gar Ainu und ähnelt der Mutter. Behaarung auffallend.

Kind, 8j. Mädchen. Gesichtsumriss: Fünfeckig; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel niedrig; mesorrhin. Augenform: Augenspalte gross, schief gerichtet; Augenbraue dick und lang; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—). Haar: Straff, tief schwarz. Ohrläppchen: Gross angewachsen; D-Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hyperleptoprosop. Gesichtsausdruck ähnelt ganz der Mutter und ist als typisches Merkmal der Ainu. zu bezeichnen. Behaarung auffallend.

Kind, 6j. Knabe. Gesichtsumriss: Fünfeckig; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel mittelhoch; leptorrhin. Kinn: steil. Augenform: Augenbraue dick und lang; Augenspalte gross, schief gerichtet; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Haar: Straff. Ohrläppchen: Mittलगross, frei; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Haut: Farbe Nr. 13. Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsform: Europrosop. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss: Eckig; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel niedrig; leptorrhin. Augenform: Augenbraue mitteldick; Augenspalte mittelgross, schief gerichtet; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Haar: Straff. Ohrläppchen: Gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Haut: Farbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Gesichtsausdruck ähnelt dem Vater. Behaarung auffallend. Sakralfleck (—).

Familie IV.

Vater: Ainu; Mutter: Japanerin. 2 Kinder im Alter von 7 und 4 Jahren. (Fig. 6, Taf. V).

Vater, 35 J. Stirn leicht fliehend. Nase: Wurzel hoch; leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt tief. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung äusserst dick.

Mutter, 26 J. Stirn gewölbt. Nase: Wurzel niedrig; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt flach. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen klein, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 7j. Mädchen. Stirn gewölbt. Nase: Wurzel niedrig; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt etwas tief. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 9. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Mädchen. Stirn gewölbt. Nase: Rücken niedrig; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt tief. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung auffallend. Sakralfleck (—).

Familie V.

Vater: Ainu; Mutter: Japanerin. 4 Kinder im Alter von 10, 8, 5 und 3 Jahren. (Fig. 7, Taf. V).

Vater, 38 J. Stirn fliehend. Nasenform: Messorrhin. Augenbraue dick; Mongolenfalte (+); Iris braun; Augapfel liegt tief. Haar straff. Ohrläppchen gross, angewachsen. Hautfarbe Nr. 13. Gesichtsform: Hyperdolichokephal. Behaarung auffallend.

Mutter, 36 J. Stirn etwas fliehend. Nasenform: Leptorrhin. Augenbraue dünn; Mongolenfalte (—); Iris; meliert; Augapfel liegt etwas tief. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. Hautfarbe Nr. 8. Kopfform: Brachykephal. Behaarung dünn.

Kind, 10j. Mädchen. Stirn etwas fliehend. Nasenform: Mesorrhin. Augenbraue mittelmässig; Mongolenfalte (+); Iris braun; Augapfel liegt etwas tief. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 8j. Mädchen. Stirn gewölbt. Nasenform: Leptorrhin. Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Iris braun; Augapfel liegt etwas tief. Haar straff. Ohrläppchen gross, frei. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 5j. Mädchen. Stirn gewölbt. Nasenform: Mesorrhin. Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Iris braun; Augapfel liegt etwas tief. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, frei. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Hyperbrachykephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (—).

Kind, 3j. Knabe. Stirn gewölbt. Nasenform: Leptorrhin. Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Iris braun; Augapfel liegt etwas tief. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. Hautfarbe: Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie VI.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 4 Kinder im Alter von 21, 19, 9 und 5 Jahren. (Fig. 8, Taf. V).

Vater, 59 J. Gesicht rhombisch. Augenform: Augenspalte mittelgross, horizontal laufend; Augenbraue mittel; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tritt hervor. Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Hyperleptoprosop. Behaarung dünn.

Mutter, 48 J. Gesicht rhombisch. Augenform: Augenspalte gross, schief gerichtet; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel liegt tief. D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Dolichokephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 21j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid. Augenform: Augenspalte gross, schief gerichtet; Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tritt hervor. D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Dilochokephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 19j. Mädchen. Gesichtsumriss elliptisch. Augenform: Augenspalte gross, schief gerichtet; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel tritt hervor. D-Höckerchen angedeutet; Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 9j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid. Augenform: Augenspalte gross, schief gerichtet; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tritt hervor. D-Höcker-

chen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Mesoprosop. Behaarung sehr dünn.

Kind, 5j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief gerichtet; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tritt hervor. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Hypereuryprosop. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie VII.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 5 Kinder im Alter von 10, 8, 6, 4 und 2 Jahren.

Vater, 33 J. Gesichtsumriss trapezförmig; Stirn fliehend. Nase: Rücken gerade; Spitze spitzig; Flügel nicht gebläht. Kinn steil. Augenform: Augenspalte klein. Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel liegt flach. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen fehlen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal.

Mutter, 30 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht. Kinn tritt hervor. Augenform: Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel liegt tief. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen klein, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal.

Kind, 10j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross, Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal.

Kind, 8j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel liegen etwas tief. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal.

Kind, 6j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (+);

Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augen treten hervor. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. / Kopfform: Brachykephal.

Kind, 4j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar schlicht, dunkelbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal.

Kind, 2j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris schwarzbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen klein, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal.

Familie VIII.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 4 Kinder im Alter von 12, 8, 5 und 3 Jahren.

Vater, 39 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn fliehend. Nase: Rücken gerade; Spitze rundlich; Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue mitteldick; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Augapfel hervortretend. Ohrläppchen mittelgross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung dünn.

Mutter, 38 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze spitzig. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Augapfel liegt tief. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 12j. Mädchen. Gesichtsumriss fünfeckig; Stirn gewölbt. Nase: Rücken gerade; Spitze rundlich. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 8j. Knabe. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 5j. Knabe. Stirn gewölbt. Nase: Rücken gerade; Spitze rundlich. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt etwas tief. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (-). Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend. Sakralfleck (-). An der linken Hand erkennt man eine Polydaktylie (6 Finger).

Kind, 3j. Knabe. Gesichtsumriss eckig; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Spitze rundlich. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel liegt etwas tief. Ohrenläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (-). Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend. Sakralfleck (+).

Familie IX.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 2 Kinder im Alter von 5 und 3 Jahren.

Vater, 30 J. Stirn fliehend. Nase: Rücken gerade; Flügel gebläht; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris hellbraun; Augapfel hervortretend. Haar tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen rundlich. Kopfform: Brachykephal. Behaarung dünn.

Mutter, 23 J. Stirn steil. Nase: Rücken konkav; Flügel nicht gebläht; leptorrhin. Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (-); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt tief. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen (-). Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 5j. Mädchen. Stirn steil. Nase: Rücken konkav; Flügel gebläht; Hyperleptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar tiefschwarz. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen (-). Kopfform: Brachykephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Kind, 3j. Mädchen. Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; Flügel gebläht; leptorrhin. Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (-); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt tief. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (-). Kopfform: Brachykephal. Behaarung dünn. Sakralfleck (+).

Familie X.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 3 Kinder im Alter von 8, 6 und 4 Jahren.

Vater, 37 J. Stirn steil. Mesorrhin. Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt flach. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn.

Mutter, 31 J. Stirn fliehend. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris braun; Augapfel liegt tief. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Dolichokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 8j. Mädchen. Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Hautfarbe Nr. 16. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung etwas dicht. Es hat Strabismus internus (convergens).

Kind, 6j. Knabe. Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 4j. Mädchen. Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief liegend. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (-).

Familie XI.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 2 Kinder im Alter von 4 und 2 Jahren. (Fig. 9, Taf. V).

Vater, 30 J. Nasenspitze rundlich. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue mitteldick; Wimpern kurz; Augapfel vortretend. Haar schwarzbraun. Kopfform: Brachykephal. Behaarung dünn.

Mutter, 28 J. Nasenspitze spitzig. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Augapfel liegt tief. Haar tief schwarz. Kopfform: Dolichokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Knabe. Nasenspitze rundlich. Augenform: Augenspalte mittel; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Augapfel etwas tief liegend. Haar schwarzbraun. Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Kind, 2j. Knabe. Nasenspitze rundlich. Augenorm: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Augapfel liegt etwas tief. Haar schwarzbraun. Kopfform: Brachykephal, Behaarung dünn. Sakralfleck (+).

Familie XII.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 3 Kinder im Alter von 15, 12 und 5 Jahren.

Vater, 45 J. Gesichtsumriss eckig; Stirn fliehend. Augenform: Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Augapfel liegt flach. Gesichtsform: Leptoprosop.

Mutter, 41 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn steil. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (-); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel tief liegend. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 15j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn steil. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenbraue dicht; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief liegend. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend. (Fig. 10, Taf. VI).

Kind, 12j. Knabe. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 5j. Knabe. Gesichtsumriss eckig; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt etwas tief. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XIII.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 15 Jahren.

Vater, 62 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade.

Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte klein, etwas schief gerichtet; Augenbraue dick; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Augapfel vortretend. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. (Fig. 11, Taf. VI).

Mutter, 55 J. Gesichtsumriss eckig; Stirn fliehend. Nasenrücken konkav. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross, horizontal laufend; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Augapfel liegt tief. Haar tiefschwarz. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Leptoprosop. (Fig. 12, Taf. VI).

Kind, 15j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn steil. Nasenrücken gerade. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, ein wenig schief laufend; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel vortretend. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen klein, frei; D-Höckerchen (—). Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. (Fig. 13, Taf. VI).

Familie XIV.

Vater: Ainu; Mutter: Japanerin. 1 Kind im Alter von 4 Jahren.

Vater, 27 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn fliehend. Nase: Wurzel hoch; Rücken gerade; Spitze rundlich; Flügel nicht gebläht; mesorrhin. Lippe mitteldick, vorstehend. Augenform: Augenspalte gross, schief gerichtet; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt tief. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Behaarung äusserst dicht. Kopfform: Dolichokephal. Gesichtsform: Hyperleptoprosop. (Fig. 14, Taf. VI).

Mutter, 21 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken gerade; Spitze rundlich; Flügel etwas gebläht; chamaerrhin. Lippen mitteldick, vorstehend. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief gerichtet; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel liegt flach. Haar schlicht, dunkelbraun. Ohrläppchen (—); D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Behaarung dünn. Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn etwas gewölbt. Nase: Wurzel niedrig; Rücken stark konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; mesorrhin. Lippen dick, vorstehend. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue mitteldick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris schwarzbraun. Haar straff,

schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesopkephal. Gesichtsform: Euryprosop. Sakralfleck (+).

Familie XV.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 7 Jahren.

Vater, 40 J. Stirn fliehend. Nasenrücken konvex; leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Iris hellbraun; Augapfel etwas tief liegend. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn.

Mutter, 29 J. Stirn steil. Nasenrücken gerade; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief liegend. Haar schlicht. Ohrläppchen gross, frei. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dicht.

Kind, 7j. Knabe. Stirn gewölbt. Nasenrücken gerade; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenbraue mittel; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief liegend. Haar straff. Ohrläppchen gross, angewachsen. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung etwas dicht.

Familie XVI.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 2 Jahren.

Vater, 47 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn fliehend. Mesorrhin. Augenform: Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue mittel; Wimpern kurz; Augapfel vortretend. Haar schlicht. Ohrläppchen klein, angewachsen, Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Behaarung dünn.

Mutter, 35 J. Gesichtsumriss rund; Stirn steil. Leptorrhin. Augenform: Augenspalte mittelgross, horizontal laufend; Augenbraue dick; Wimpern mittellang; Augapfel tief liegend. Haar straff. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Behaarung auffallend.

Kind, 2j. Mädchen. Gesichtsumriss eckig; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief laufend; Augenbraue dick; Wimpern lang; Augapfel tief liegend. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XVII.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 2 Kinder im Alter von 4 und 2 Jahren. (Fig. 15, Taf. VI).

Vater, 34 J. Gesichtsumriss trapezförmig. Augenform: Augenspalte klein; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel flach liegend. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11, Behaarung dünn.

Mutter, 24 J. Gesichtsumriss ovoid. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel tief liegend. Haar tiefschwarz. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun; Augapfel etwas tief liegend. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Kind, 2j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris schwarzbraun; Augapfel etwas tief liegend. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 8. Behaarung dünn. Sakralfleck (+).

Familie XVIII.

Vater: Japaner; Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 15 Jahren.

Vater, 54 J. Nase: Rücken gerade; Flügel etwas gebläht; leptorrhin. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris meliert; Augapfel flach liegend. Haar schlicht. Ohrläppchen klein, frei; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn. (Fig. 16, Taf. VII).

Mutter, 47 J. Nase: Rücken konkav; Flügel nicht gebläht; hyperleptorrhin. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief liegend. Haar straff. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Kopfform: Dolichokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung etwas dicht. (Fig. 17, Taf. VII).

Kind, 15j. Knabe. Nase: Rücken etwas konkav; Flügel etwas gebläht; leptorrhin. Augenform: Augenspalte mittel; Augenbraue mittel; Wimpern mittel, Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen rundlich. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn. (Fig. 18, Taf. VII).

Familie XIX.

Vater: Ainu; Mutter: Japanerin. 1 Kind im Alter von 6 Jahren.

Vater, 35 J. Gesichtsumriss eckig. Mesorrhin. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern mittel; Mongolenfalte (—); Iris hellbraun; Augapfel tief liegend. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen gross, frei. Hautfarbe Nr. 11. Behaarung äusserst dicht. (Fig. 19, Taf. VII.)

Mutter, 27 J. Gesichtsumriss rhombisch. Leptorrhin. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel vortretend. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen. Hautfarbe Nr. 10. Behaarung dünn. (Fig. 20, Taf. VII.)

Kind, 6j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Leptorrhin. Augenform: gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief liegend. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei. Hautfarbe Nr. 10. Behaarung auffallend. (Fig. 21, Taf. VII.)

Familie XX.

Vater: F₁; Mutter: Japanerin. 1 Kind im Alter von 4 Jahren.

Vater, 33 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn steil. Nasenspitze spitzig; mesorrhin. Kinn vortretend. Augenform: Augenbraue dick; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris hellbraun; Augapfel etwas tief liegend. Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop.

Mutter, 35 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nasenspitze spitzig; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel vortretend. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 8. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Leptoprosop.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nasenspitze

rundlich; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenbraue dünn; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun; Augapfel tief liegend. Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Sakralfleck (—). Der Gesichtsausdruck ist ganz japanisch.

Familie XXI.

Vater: Japaner; Mutter: F₁. 2 Kinder im Alter von 4 und 3 Jahren.

Vater, 50 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn steil. Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte klein, horizontal laufend; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 13. Behaarung etwas dicht.

Mutter, 33 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn gewölbt. Kinn zurücktretend. Augenform: Gross, horizontal laufend; Mongolenfalte (—); Iris braun; Augapfel vortretend. Haar schlicht. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen (—): Hautfarbe Nr. 10. Behaarung etwas dicht.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, horizontal laufend; Mongolenfalte (+); Iris schwarzbraun; Augapfel liegt flach. Haar liegt straff. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (—).

Kind, 3j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross, etwas schief laufend; Mongolenfalte (+); Iris tief schwarz; Augapfel tief liegend. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen rundlich. Hautfarbe Nr. 3. Behaarung auffallend. Sakralfleck (+).

Familie XXII.

Vater: F₁; Mutter: Japanerin. 3 Kinder im Alter von 23, 21 und 19 Jahren.

Vater, 51 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken leicht konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin. Lippen dick, vorstehend. Kinn steil. Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun. Haar schlicht. Ohrläppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Behaarung etwas dicht. Kopfform: Mesokephal. Gesichts-

form: Mesoprosop.

Mutter, 46 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken gerade; Spitze spitzig; Flügel nicht gebläht; hyperleptorrhin. Lippen mitteldick, vorstehend. Kinn zurücktretend. Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Iris hellbraun. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen (—); D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 7. Behaarung dünn. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Mesoprosop.

Kind 23j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nase: Wurzel hoch; Rücken gerade; Spitze rundlich; Flügel nicht gebläht; leptorrhin. Lippen mitteldick, vorstehend. Kinn steil. Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris braun. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Behaarung etwas dicht. Kopfform: Ultrabrachykephal. Gesichtsförm: Euryprosop. Der Gesichtsausdruck ist japanisch.

Kind, 21j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn steil. Nase: Wurzel niedrig; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin. Lippen mitteldick, vorstehend. Augenbraue dünn; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Haar schlicht, tief schwarz. Hautfarbe Nr. 8. Behaarung dünn. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsförm: Euryprosop. Der Gesichtsausdruck ist ganz japanisch.

Kind, 19j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Nase: Wurzel hoch; Rücken gerade; Spitze spitzig; Flügel nicht gebläht, hyperleptorrhin. Lippen mitteldick; Orthocheilie. Augenbraue mitteldick; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris hellbraun. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Behaarung dünn. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsförm: Hypereuryprosop. Der Gesichtsausdruck ist ganz japanisch.

Familie XXIII.

Vater: F₁; Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 2 Jahren.

Vater, 28 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade, leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte etwas schief laufend; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Iris braun; Augapfel etwas tief liegend. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. Behaarung etwas dicht.

Mutter, 23 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nasenrücken

konkav; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte horizontal laufend; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief liegend. Ohrläppchen klein, angewachsen. Behaarung auffallend.

Kind, 2j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nasenrücken konkav; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte etwas schief laufend; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Ohrläppchen mittelgross, frei. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XXIV.

Vater: F₁; Mutter: Ainu. 4 Kinder im Alter von 19, 17, 12 und 5 Jahren. (Fig. 22, Taf. VII).

Vater, 45 J. Stirn fliehend. Leptorrhin. Mundlippen mitteldick; Orthocheilie. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel flach liegend. Darwin'sches Höckerchen (—). Kopfform: Brachykephal. Behaarung auffallend.

Mutter, 43 J. Stirn steil. Mesorrhin. Mundlippen dick, Procheilie. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun. Augapfel tief liegend. D-Höckerchen (—). Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 19j. Knabe. Mesorrhin. Mundlippen dick, Procheilie. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Augapfel etwas tief liegend.

Kind, 17j. Knabe. Stirn steil. Mesorrhin. Mundlippen zeigen Procheilie. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. D-Höckerchen rundlich. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 12j. Knabe. Stirn gewölbt. Leptorrhin. Mundlippen vortretend. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. D-Höckerchen angedeutet. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 5j. Mädchen. Stirn gewölbt. Mesorrhin. Mundlippe zeigt Procheilie. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris

schwarzbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. D-Höckerchen (—). Kopf-form: Brachykephal. Behaarung auffallend.

Familie XXV.

Vater: Ainu; Mutter: F₁. 5 Kinder im Alter von 12, 7, 5, 3 und 1 Jahren. (Fig. 23, Fig. 24, Taf. VIII).

Vater, 45 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn etwas fliehend. Nasenspitze spitzig; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht, tief schwarz. Ohr läppchen gross, angewachsen: Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopf-form: Mesokephal. Behaarung äusserst dicht.

Mutter, 31 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nasenspitze rundlich; leptorrhin. Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte mittel; Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel vorstehend. Haar straff, schwarzbraun. Ohr läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopf-form: Brachykephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 12j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nasenspitze rundlich; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff, tief schwarz. Ohr läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Kopf-form: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 7j. Mädchen. Gesichtsumriss umgekehrt ovoid; Stirn gewölbt. Nasenspitze rundlich; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff, tief schwarz. Ohr läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopf-form: Brachykephal. Behaarung auffallend.

Kind, 5j. Mädchen. Gesichtsumriss umgekehrt ovoid; Stirn gewölbt. Nasenspitze rundlich; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff, schwarzbraun. Ohr läppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopf-form: Mesokephal. Behaarung auffallend.

Kind, 3j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nasenspitze rundlich; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Iris schwarzbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar

schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Behaarung auffallend. Sakralfleck (—).

Kind, 1j. Knabe. Gesichtsumriss eckig; Stirn gewölbt. Nasenspitze rundlich; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht, schwarzbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 3. Kopfform: Dolichokephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XXVI.

Vater: F₁; Mutter: F₁. 3 Kinder im Alter von 10, 6 und 3 Jahren.

Vater, 31 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade; mesorrhin. Lippen mitteldick, Orthocheilie zeigend. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—). Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Behaarung etwas dicht. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Euryprosop. An Vorderbrust befindet sich die sog. Kreuzfigur.

Mutter, 28 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn steil. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; leptorrhin. Lippen zeigen Orthocheilie. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue lang und dicht; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris hellbraun. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsförm: Leptoprosop.

Kind, 10j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nase; Wurzel niedrig; Rücken konkav; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Euryprosop.

Kind, 6j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn steil. Nasenwurzel niedrig; leptorrhin. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick, Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 8. Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsförm: Hypereuryprosop.

Kind, 3j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nasenwurzel

niedrig, leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mitteldick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun. Haar schlicht, hellbraun. Ohrläppchen gross, frei. D-Höckerchen (—) Hautfarbe Nr. 11. Sakralfleck (+). Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop.

Familie XXVII.

Vater: F₁; Mutter: F₁. 4 Kinder im Alter von 13, 8, 5 und 2 Jahren.

Vater, 45 J. Gesichtsumriss elliptisch. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dick; Wimpern mittel; Mongolenfalte (—); Iris meliert; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Kopfform; Brachykephal. Behaarung auffallend.

Mutter, 35 J. Gesichtsumriss rhombisch. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohrläppchen klein, frei; D-Höckerchen (—). Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 13j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris braun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Kopfform: Brachykephal. Behaarung etwas dicht. (Fig. 25, Taf. VIII).

Kind, 8j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Kopfform: Brachykephal. Behaarung äusserst dicht. Der Gesichtsausdruck ist ganz Ainu.

Kind, 5j. Knabe. Gesichtsumriss eckig. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei, D-Höckerchen (—). Kopfform: Brachykephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 2j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Kinn vortretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris schwarzbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen

angedeutet. Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht.

Familie XXVIII.

Vater: $\frac{1}{4}$ Ainu; Mutter: $\frac{3}{4}$ Ainu. 1 Kind im Alter von 16 Jahren.

Vater, 53 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nasenrücken konvex; leptorrhin. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief laufend; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Iris schwarzbraun. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen klein, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 9. Kopfform. Mesokephal. Gesichtsform: Hyperleptoprosop.

Mutter, 43 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn steil. Nasenrücken konkav; mesorrhin. Augenform: Augenspalte gross, schief laufend; Wimpern lang; Iris schwarzbraun; Augenbraue mittel. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 9. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop.

Kind, 16j. Knabe. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn steil. Nasenrücken konkav. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief laufend; Augenbraue dick; Wimpern lang; Iris schwarzbraun; Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Der Gesichtsausdruck ähnelt der Mutter und ist ganz Ainu. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Nasenform: Mesorrhin.

Familie XXIX.

Mutter: Japanerin. 4 Kinder im Alter von 17, 14, 10 und 7 Jahren.

Mutter, 46 J. Gesichtsumriss eckig; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade; leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel vorstehend. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 7. Kopfform: Brachykephal. Behaarung dünn. Der Mann ist Ainu.

Kind, 17j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Rücken etwas konkav; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris braun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Behaarung dünn.

Kind, 14j. Knabe. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nase: Rücken gerade; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+). Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 10j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte(+); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Behaarung etwas dicht.

Kind, 7j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Rücken konkav; mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 14. Kopfform; Brachykephal. Behaarung dünn.

Familie XXX.

Mutter: Ainu. 5 Kinder im Alter von 15, 11, 8, 4 und 1 Jahren. (Fig. 26, Taf. VIII).

Mutter, 33 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff. Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Behaarung auffallend. Der Mann ist Japaner.

Kind, 15j. Knabe. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Leptorrhin: Kinn steil. Mongolenfalte (+); Epicanthus(—); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend. Der Gesichtsausdruck ist dem Ainu sehr nahe.

Kind, 11j. Mädchen. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Mesorrhin. Kinn steil. Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht. D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 13. Kopfform: Mesokephal. Behaarung äusserst dicht. Der Gesichtsausdruck ist dem Ainu sehr nahe.

Kind, 8j. Mädchen. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkel-

braun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schlicht. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun; Augapfel vorstehend. Haar straff. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Behaarung äusserst dicht. Sakralfleck (+).

Kind, 1j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris schwarzbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 7. Kopfform: Mesokephal. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XXXI.

Mutter: Ainu. 4 Kinder im Alter von 10, 8, 4 und 1 Jahren.

Mutter, 34 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, schief laufend; Mongolenfalte (-); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen gross, frei. Darwin'sches Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend. Der Mann ist Japaner.

Kind, 10j. Mädchen. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn steil. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, in schiefer Richtung laufend; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. D-Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 8j. Mädchen. Gesichtsumriss fünfeckig; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief laufend; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross; Mongolenfalte (+); Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (-). Die rechte Hand

ist im Handgelenk etwa 90° nach radialen Seite gekrümmt, sie zeigt aber nicht die angeborene Klumphand, vielmehr Oligodaktylie (4 Finger). Die linke Hand weist eine Polydaktylie, mit 6 Fingern auf.

Kind, 1j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn scharf. Augenform: Augenspalte gross, horizontal laufend; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung auffallend. Sakralfleck (+).

Familie XXXII.

Mutter: Japanerin. 3 Kinder im Alter von 10, 6 und 3 Jahren. (Fig. 27, Taf. IX).

Mutter, 32 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Leptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Iris hellbraun; Augapfel vorstehend. Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Behaarung dünn. Der Mann ist Ainu.

Kind, 10j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenform: Augenspalte mittelgross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris hellbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung dünn.

Kind, 6j. Knabe. Gesichtsumriss fünfeckig; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittelgross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung dünn.

Kind, 3j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris schwarzbraun; Augapfel tief eingebettet. D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XXXIII.

Mutter: Ainu. 3 Kinder im Alter von 7, 5 und 2 Jahren.

Mutter, 30 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nase: Wurzel hoch; leptorrhin. Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun.

Ohr läppchen gross, frei. Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Behaarung etwas dicht. Der Mann ist Japaner.

Kind, 7 j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel hoch; leptorrhin. Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Ohr läppchen gross, frei. D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Behaarung auffallend.

Kind, 5 j. Knabe. Gesichtsumriss fünfeckig; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel mittelhoch; mesorrhin. Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun. Ohr läppchen gross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (—).

Kind, 2 j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nase: Wurzel niedrig; mesorrhin. Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun. Ohr läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XXXIV.

Mutter: Ainu. 3 Kinder im Alter von 11, 6 und 2 Jahren.

Mutter, 44 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn steil. Nase: Spitze spitzig; Flügel nicht gebläht; hyperleptorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte mittelgross; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff, tief schwarz. Ohr läppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Hyperleptoprosop. Behaarung auffallend. Der Mann ist Japaner.

Kind, 11 j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte mittelgross; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris braun; Augapfel flach liegend. Haar tief schwarz. Ohr läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn.

Kind, 6 j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittelgross; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohr läppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12; Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 2 j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nase: Spitze rundlich; Flügel gebläht; leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross;

Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Haar hellbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 8. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsförm: Hypereuryprosop. Behaarung etwas dicht. Sakralfleck (+).

Familie XXXV.

Mutter: Japanerin. 3 Kinder im Alter von 19, 15 und 11 Jahren.

Mutter, 35 J. Stirn fliehend. Nase: Rücken gerade; Spitze spitzig; mesorrhin. Kinn steil. Augenform: Augenspalte klein, ein wenig schief laufend; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris braun. Ohrläppchen gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Mesoprosop. Behaarung dünn. Der Mann ist Ainu.

Kind, 19j. Mädchen. Nasenrücken gerade; Nasenspitze rundlich; leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittelgross, schief laufend; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 3. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsförm: Mesoprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 15j. Mädchen. Stirn etwas fliehend. Nasenrücken gerade; Nasenspitze rundlich; leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross, etwas schief laufend. Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsförm: Mesoprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind, 11j. Mädchen. Stirn gewölbt. Nasenrücken konkav; Nasenspitze rundlich; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte mittelgross, schief laufend; Wimpern mittelgross; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris hellbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsförm: Euryprosop. Behaarung dünn. (Fig. 28, Taf. IX).

Familie XXXVI.

Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 33 Jahren.

Mutter, 64 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nase: Wurzel niedrig; Rücken konkav; Spitze rundlich; Flügel gebläht; mesorrhin. Lippen mitteldick, Orthocheilie. Kinn steil. Augenform: Augenspalte gross, horizontal laufend; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte

(—); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Behaarung auffallend. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Der Mann ist Japaner.

Kind, 33j. Mann. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn steil. Nase: Wurzel niedrig; Rücken konkav; Spitze spitzig; Flügel gebläht; mesorrhin. Lippen mitteldick, vorstehend. Kinn prognat. Augenform: Augenspalte mittelgross, schief laufend; Augenbraue dicht; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris hellbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Behaarung dünn. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop.

Familie XXXVII.

Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 4 Jahren.

Mutter, 25 J. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohrläppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Dolichokephal. Behaarung äusserst dicht. Gesichtsform: Leptoprosop. Der Mann ist Japaner.

Kind, 4j. Mädchen. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris schwarzbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 3. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung auffallend. Sakralfleck (—).

Familie XXXVIII.

Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 15 Jahren. (Fig. 29, Fig. 30, Taf. IX).

Mutter, 43 J. Stirn steil. Nasenwurzel mittelhoch. Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Dolichokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung etwas dicht. Der Mann ist Japaner.

Kind, 15j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nasenwurzel niedrig. Augenspalte mittelgross; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 15. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform:

Mesoprosop. Behaarung dünn.

Familie XXXIX.

Vater: Japaner. 1 Kind im Alter von 29 Jahren.

Vater, 54 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nase: Rücken etwas konkav; Flügel gebläht; leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittelgross; schief laufend; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel vorstehend. Haar straff. Ohrläppchen klein, frei: Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform; Euryprosop. Behaarung etwas dicht. Die Frau ist Ainu.

Kind, 29j. Mann. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nase: Rücken gerade; Flügel nicht gebläht; mesorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittelgross; schief laufend; Augenbraue dick; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Haar gekräuselt, schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop.

Familie XL.

Mutter: Japanerin. 2 Kinder im Alter von 4 und 2 Jahren.

Mutter, 23 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade; hyperleptorrhin; Nasenflügel nicht gebläht. Kinn zurücktretend. Augenspalte klein; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun. Ohrläppchen gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen rundlich. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Der Mann ist Ainu.

Kind, 4j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn steil. Nasenrücken konkav; leptorrhin; Nasenflügel nicht gebläht. Kinn steil. Augenspalte klein; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform; Brachykephal. Sakralfleck (+).

Kind, 2j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nasenrücken konkav; mesorrhin; Nasenflügel gebläht. Kinn zurücktretend. Augenspalte mittelgross; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Sakralfleck (+).

Familie XLI.

Mutter: Ainu. 2 Kinder im Alter von 16 und 8 Jahren.

Mutter, 44 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel konkav. Haar schlicht. Ohrläppchen gross, frei. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung etwas dicht. Der Mann ist Japaner.

Kind, 16j. Knabe. Gesichtsumriss umgekehrt ovoid; Stirn steil. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief liegend. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 8j. Mädchen. Gesichtsumriss umgekehrt ovoid; Stirn gebläht. Kinn steil. Augenspalte mittelgross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, frei. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn.

Familie XLII.

Mutter: Ainu. 1 Kind im Alter von 19 Jahren. (Fig. 31, Fig. 32, Taf. IX).

Mutter, 64 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nasenwurzel mittelhoch; mesorrhin. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohrläppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung äusserst dicht. Der Mann ist Japaner.

Kind, 19j. Mädchen. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn gewölbt. Nasenwurzel niedrig; leptorrhin. Augenspalte gross; Augenbraue dicht; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel vorstehend. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung etwas dicht.

Familie XLIII.

Mutter: Japanerin. 1 Kind im Alter von 13 Jahren. (Fig. 33, Fig. 34, Taf. X).

Mutter, 48 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn steil. Augenspalte klein; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris schwarzbraun; Augapfel vortretend. Haar schwarzbraun. Ohr-läppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen (-). Kopfform: Mesokephal, Gesichtsform: Leptoprosop. Behaarung dünn. Der Mann ist Ainu.

Kind, 13j. Mädchen. Gesichtsumriss eckig; Stirn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Augapfel tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohr-läppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (-). Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn.

Familie XLIV.

Vater: Japaner. 1 Kind im Alter von 13 Jahren.

Vater, 51 J. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade. Kinn steil. Augenspalte mittelgross, horizontal laufend; Augenbraue dick; Wimpern kurz; Mongolenfalte (-); Epicanthus (-); Iris braun; Augapfel flach liegend. Ohr-läppchen mittelgross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn. Die Frau ist Ainu.

Kind, 13j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn steil. Nasenrücken etwas konkav. Kinn steil. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Ohr-läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn.

Familie XLV.

Mutter: Ainu. 2 Kinder im Alter von 5 und 1 Jahren.

Mutter, 29 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn etwas fliehend. Nasenwurzel hoch; Nasenspitze spitzig; Nasenflügel nicht gebläht. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (-); Epicanthus (-); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff. Ohr-läppchen mittelgross; Darwin'sches Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal. Behaarung auffallend. Der Mann ist Japaner.

Kind, 5j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Nasenwurzel niedrig; Nasenspitze rundlich; Nasenflügel gebläht. Augenspalte

gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schlicht. Ohr läppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Behaarung auffallend. Sakralfleck (—).

Kind, 17. Mädchen. Gesichtsumriss umgekehrt ovoid; Stirn gewölbt. Nasenwurzel niedrig; Nasenspitze rundlich; Nasenflügel gebläht. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dünn; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris tief schwarz. Haar schlicht. Ohr läppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 3. Kopfform: Mesokephal. Sakralfleck (+).

Familie XLVI.

Mutter: Japanerin. 2 Kinder im Alter von 6 und 2 Jahren.

Mutter, 28 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn steil. Leptorrhin. Kinn vortetend. Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern kurz; Mongolenfalte (+); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Haar straff. Ohr läppchen klein, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Der Mann ist Ainu.

Kind, 6j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Hyperleptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris tief schwarz; Augapfel tief eingebettet. Haar straff. Ohr läppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 8.

Kind, 2j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Kinn vortetend. Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris tief schwarz; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schlicht. Ohr läppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 8.

Familie XLVII.

Mutter: F₁. 4 Kinder im Alter von 11, 9, 4, und 1 Jahren.

Mutter, 36 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittelgross, etwas schief laufend; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris meliert; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Darwin'sches Höckerchen (—). Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn. Der Mann ist Japaner.

Kind, 11j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid. Mesorrhin. Kinn zu-

rücktretend. Augenspalte mittelgross, schief laufend; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel flach liegend. Haar straff. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12.

Kind, 9j. Knabe. Gesichtsumriss elliptisch. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross, horizontal laufend; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11.

Kind, 4j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Chamaerrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris schwarzbraun; Augapfel tief eingebettet; Haar schlicht. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Sakralfleck (+).

Kind, 1j. Mädchen. Gesichtsumriss rund. Leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (-); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Sakralfleck (+).

Familie XLVIII.

Mutter: Japanerin. 3 Kinder im Alter von 15, 12 und 8 Jahren.

Mutter, 51 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Nasenrücken etwas konkav: Kinn vortretend. Augenspalte mittelgross; Augenbraue mittel; Wimpern kurz; Mongolenfalte (-); Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (-). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn. Der Mann ist F₁.

Kind, 15j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt; Nasenrücken gerade. Kinn scharf. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (-); Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen rundlich. Hautfarbe Nr. 13. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn.

Kind, 12j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn gewölbt. Nasenrücken gerade. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Augapfel vorstehend. Haar straff. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop.

Behaarung etwas dicht. (Fig. 35, Taf. X).

Kind, 8 j. Mädchen. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nasenrücken gerade. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schlicht. Ohrläppchen klein, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform. Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung auffallend. (Fig. 35, Taf. X).

Familie XLIX.

Vater: F₁. 3 Kinder im Alter von 43, 39 und 36 Jahren.

Vater, 83 J. Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken gerade; Spitze spitzig; mesorrhin. Augenspalte mittelgross schief laufend; Augenbraue mitteldick; Wimpern lang; Mongolenfalte (+). Haar straff. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Behaarung auffallend. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Die Frau ist Ainu.

Kind, 43j. Frau. Stirn steil. Nase: Wurzel niedrig; Rücken konkav; Spitze rundlich; mesorrhin. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraumittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris schwarze braun. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 9. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop.

Kind, 39j. Frau. Stirn fliehend. Nase: Wurzel mittelhoch; Rücken konkav; Spitze spitzig; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross; schief laufend; Augenbraue dünn; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris schwarzbraun. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop.

Kind, 36j. Frau. Stirn fliehend. Nase: Wurzel niedrig; Rücken konkav; Spitze rundlich; leptorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte mittelgross, schief laufend; Augenbraue dünn; Wimpern mittellang; Mongolenfalte (+). Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen rundlich. Hautfarbe Nr. 5. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Leptoprosop.

Familie L.

Mutter: F₁. 2 Kinder im Alter von 6 und 4 Jahren.

Mutter. 28 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn fliehend. Leptorrhin.

Kinn steil. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel flachliegend. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung dünn. Der Mann ist Japaner.

Kind, 6j. Mädchen. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue dünn; Wimpern mittel; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel flachliegend. Haar schlicht, rötlich braun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung auffallend.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn aufgebläht. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross, schief laufend; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris schwarzbraun; Augapfel flachliegend. Haar straff, hellbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Brachykephal; Gesichtsform: Hypereuryprosop. Sakralfleck (+).

Familie LI.

Mutter: F₁. 2 Kinder im Alter von 3 und 1 Jahren.

Mutter, 34 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn fliehend. Leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris hellbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen fehlt. Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Leptoprosop. Der Mann ist Japaner.

Kind, 3j. Knabe. Gesichtsumriss eckig; Stirn steil. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dünn; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (—); Iris schwarzbraun; Augapfel flachliegend. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen (—). Kopfform: Hyperbrachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn.

Kind, 1j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Augenspalte mittelgross; Augenbraue dünn; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Iris schwarzbraun; Augapfel flachliegend. Haar schlicht, hellbraun. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 7. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Sakralfleck (+).

Familie LII.

Mutter: Ainu. 2 Kinder im Alter von 15 und 6 Jahren. (Fig. 36, Fig. 37, Taf. X).

Mutter, 40 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn fliehend. Leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dick; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris meliert; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen gross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Mesoprosop. Behaarung äusserst dicht. Der Mann ist F₁.

Kind, 15j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn fliehend. Mesorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue dicht; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar straff, tief schwarz. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung äusserst dicht.

Kind, 6j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte gross; Augenbraue mittel; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar straff, schwarzbraun. Ohrläppchen gross, angewachsen; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Hypereuryprosop. Behaarung äusserst dicht. Sakralfleck (—).

Familie LIII.

Mutter: F₁. 1 Kind im Alter von 13 Jahren.

Mutter, 36 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn gewölbt. Leptorrhin. Kinn steil. Augenspalte mittel; Augenbraue dicht; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun; Darwin'sches Höckerchen (—). Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn. Der Mann ist Japaner.

Kind, 13j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Mesorrhin. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross; Augenbraue dicht; Wimpern lang; Mongolenfalte (+); Epicanthus (+); Iris meliert; Augapfel vorstehend. Haar tiefschwarz, D-Höckerchen (—). Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung dünn.

Familie LIV.

Mutter: F₁. 1 Kind im Alter von 17 Jahren.

Mutter, 47 J. Gesichtsumriss rhombisch; Stirn steil. Nasenrücken konkav. Kinn zurücktretend. Augenspalte mittelgross; Augenbraue mittel; Wimpern mittel; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris dunkelbraun; Augapfel tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 12. Kopfform: Brachykephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung etwas dicht.

Kind 19j. Knabe. Gesichtsumriss ovoid; Stirn fliehend. Nasenrücken konvex. Kinn zurücktretend. Augenspalte gross; Augenbraue dicht; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Epicanthus (—); Iris braun; Augapfel flach liegend. Haar tief schwarz. Ohrläppchen gross, frei; D-Höckerchen angedeutet. Hautfarbe Nr. 11. Kopfform: Mesokephal. Gesichtsform: Euryprosop. Behaarung etwas dicht.

Familie LV.

Mutter: F₁. 1 Kind im Alter von 4 Jahren.

Mutter, 33 J. Gesichtsumriss elliptisch; Stirn fliehend. Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris braun; Augapfel tief eingebettet. Haar tief schwarz. Ohrläppchen gross, angewachsen; Darwin'sches Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 10. Kopfform. Mesokephal. Behaarung auffallend. Der Mann ist Japaner.

Kind, 4j. Knabe. Gesichtsumriss rund; Stirn gewölbt. Augenspalte gross; Wimpern lang; Mongolenfalte (—); Iris dunkelbraun; Augapfel etwas tief eingebettet. Haar schwarzbraun. Ohrläppchen mittelgross, frei; D-Höckerchen (—). Hautfarbe Nr. 11. Kopfform; Brachykephal. Behaarung äusserst dicht. Sakralfleck (—).

IV. Zusammenfassung.

1. Gesichtsform.

Tabelle 1.

		Gesamt- zahl	Hypereury- prosop	Eury- prosop	Meso- prosop	Lepto- prosop	Hyper- leptoprosop
Japaner	Erwachsene	32	1 (3.1%)	8 (25%)	11 (34.1%)	9 (28.5%)	3 (9.3%)
	Kinder	98	15 (15.3%)	34 (34.6%)	31 (31.6%)	15 (15.3%)	3 (3.2%)
Ainu	Erwachsene	34	6 (17.6%)	8 (23.5%)	12 (35.2%)	6 (17.6%)	3 (6.1%)
	Kinder	44	15 (34.1%)	22 (50%)	6 (13.6%)	1 (2.3%)	0

In der Tabelle 1 umfassen die Kinder die Individuen unter dem vollendeten 14. Lebensjahre; auch die Erwachsenen erfassen beiderlei

Geschlecht. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass das Gesicht bei Ainu kürzer als bei Japanern ist und bei Kindern die Gesichtform im allgemeinen kürzer zu neigen scheint.

Tabelle 2. (Die Zahlen in jeder Rubrik geben die Zahl der Vermischung an. Das neben der Zahl stehende K bedeutet Kinder und E Erwachsene. ? bedeutet das Fehlen der väterlichen oder mütterlichen Seite.

Kreuzung	Familienzahl	hypereuryprosop	euryprosop	mesoprosop	leptoprosop
mesoprosop × mesoprosop	5	6 (5 K, 1 E)	6 (4 K, 2 E)	6 K	0
mesoprosop × euryprosop	4	3 K	4 K	2 K	1 K
leptoprosop × mesoprosop	3	1 K	0	7 K	0
leptoprosop × leptoprosop	3	1 K	3 K	0	2 K
euryprosop × euryprosop	3	4 K	4 (2 K, 2 E)	4 (3 K, 1 E)	0
euryprosop × leptoprosop	2	3 K	1 K	0	0
euryprosop × hypereuryprosop	2	1 K	2 K	0	0
leptoprosop × hyperleptoprosop	2	1 K	1 K	2 (1 K, 1 E)	1 E
hyperleptoprosop × hypereuryprosop	1	2 K	0	1 K	1 K
hypereuryprosop × leptoprosop	1	0	2 K	0	0
hyperleptoprosop × euryprosop	1	0	1 K	0	0
hyperleptoprosop × mesoprosop	1	0	2 K	0	0
euryprosop × ?	9	5 K	10 (7 K, 3 E)	4 (3 K, 1 E)	2 (1 K, 1 E)
mesoprosop × ?	7	5 K	6 (5 K, 1 E)	4 (2 K, 2 E)	2 K
leptoprosop × ?	6	4 K	2 K	3 K	1 E
hypereuryprosop × ?	3	3 K	2 K	1 E	1 K
hyperleptoprosop × ?	2	1 K	3 K	0	1 K

Von „euryprosop × leptoprosop“, „hyperleptoprosop × euryprosop“, „euryprosop × ?“ und „leptoprosop × ?“ in Tabelle 2 gesehen, scheint das Kurzgesicht gegenüber dem Langgesicht dominant vererbt zu sein.

Boas berichtete bei Europäer-Indier-Vermischung, Fischer bei Europäer Hottentotten-Vermischung, Rodenwaldt bei Europäer-Malaien-Vermischung ausser dem Mitteltypus noch die Abspaltung in euryprosop and leptoprosop. Boas und Fischer führten ferner an, dass vielmehr Leptopro-

sopie gegenüber Euryprosopie dominant vererbt sein könnte; nach Lundborg zeigt sich bei Nordeuropäer-Juden und Südeuropäer-Juden-Vermischung ausnahmslos die Neigung zu Leptoprosopie.

Tao untersuchte die Europäer-Chinesen-Bastarden und kam dabei zu dem Ergebnis, dass der Mitteltypus die erste Stellung einnimmt.

Während nach Gates das Vorspringen der Backenknochen bei Portugiesen-Tupi-Indianer-Vermischung dominant vererbt ist, desgleichen auch nach J. Schäuble bei Europäer-südamerikanischer Maput-Vermischung, scheint in unserer Untersuchung, die Neigung zur dominanter Vererbung zu Euryprosopie möglicherweise auf die dominante Vererbung der vorspringenden Wangenknochen der Ainu zurückzuführen sein.

Rodenwaldt und Lundborg stellten die Tatsache fest, dass die Gesichtsform der Bastarden länger (luxiert) oder kürzer (pauperiert) wird als die der Eltern.

2. Stirn.

Tabelle 3.

		Gesamtzahl	gewölbt	steil	fliehend
Japaner	Erwachsene	31	2 (6.5%)	3 (10.0%)	26 (83.5%)
	Kinder	97	51 (52.8%)	28 (28.7%)	18 (18.5%)
Ainu	Erwachsene	34	3 (9.0%)	10 (29.0%)	21 (62.0%)
	Kinder	41	22 (54.0%)	10 (24.0%)	9 (22.0%)

Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass bei Japanern die fliehende Stirn etwas häufiger als bei Ainu und bei Kindern die Stirn im allgemeinen gewölbt ist.

Tabelle 4.

Kreuzung	Familienzahl	gewölbt	steil	fliehend
fliehend × fliehend	10	16 K	2 K	8 (5 K, 3 E)
fliehend × steil	10	17 K	5 (3 K, 2 E)	0
fliehend × gewölbt	6	17 K	1 E	1 E
gewölbt × steil	1	2 K	0	0
steil × steil	1	3 K	1 K	0
fliehend × ?	18	25 (23 K, 2 E)	8 (5 K, 3 E)	8 (5 K, 3 E)
steil × ?	6	10 K	0	2 (1 K, 1 E)
gewölbt × ?	2	6 K	0	0

Nach „fliehend × steil“ und „fliehend × ?“ in der Tabelle 4 dünkt es, als ob die steile Stirn gegenüber der fliehenden dominant sei.

3. Nasenrücken.

Tabelle 5.

		Gesamtzahl	konkav	gerade	konvex
Japaner	Erwachsene	30	17 (57.0%)	12 (40.0%)	1 (3%)
	Kinder	97	83 (85.6%)	15 (13.4%)	1 (1%)
Ainu	Erwachsene	34	32 (94.0%)	2 (6.0%)	0
	Kinder	41	38 (92.7%)	3 (7.3%)	0

Wie in Tabelle 5 ersichtlich ist, ist bei Ainu „konkav“ häufiger und „gerade“ weniger als bei Japanern, und bei Kindern häufigere Neigung zu „konkav“.

Tabelle 6.

Kreuzung	Familienzahl	konkav	gerade	konvex
konkav × konkav	15	43 (39 K, 4 E)	0	1 K
gerade × konkav	9	18 (17 K, 1 E)	5 (3 K, 2 E)	1 K
konvex × konkav	1	1 K	0	0
gerade × gerade	1	1 K	0	0
gerade × konvex	1	0	1 K	0
konkav × ?	23	45 (42 K, 3 E)	4 (3 K, 1 E)	1 E
gerade × ?	5	10 (6 K, 4 E)	3 (2 K, 1 E)	0

Nach „gerade × konkav“, „konkav × ?“ und „gerade × ?“ in der Tabelle 6 scheint es, als ob der konkave Nasenrücken gegenüber dem geraden dominant sei.

Leicher fand bei 150 europäischen Familien, dass der konvexe Nasenrücken dominant, der konkave rezessiv und auch der konvexe gegenüber dem geraden rezessiv ist. Auch bei der Familienuntersuchung in Deutschland fand Fischer den konkaven Typus rezessiv und den geraden bzw. konvexen dominant vor. Die gleiche Tatsache beobachtete Rodenwaldt bei Bastarden (Mesitzen) in Kisar. Kuroda schliesst aus seiner Untersuchung bei koreanischen Familien, dass der gerade Typus vielleicht gegenüber dem konkaven und konvexen dominant sei.

Während Scheidt bei deutschen Familien, wie in unserer Untersuchung, ein starkes Auftreten des konkaven Typus gegenüber dem geraden Typus nachweisen konnte, berichteten Davenport und Steggerda, dass der konkave Typus bei Negern gegenüber dem europäischen nicht immer dominant sei. Nach ihnen sei in dieser Hinsicht noch Vieles unklar.

4. Nasenflügel.

Tabelle 7.

		Gesamtzahl	gebläht	etwas gebläht	nicht gebläht
Japaner	Erwachsene	31	22 (71.00%)	6 (19%)	3 (10%)
	Kinder	97	87 (89.6%)	5 (5.2%)	5 (5.2%)
Ainu	Erwachsene	34	24 (71%)	4 (11%)	6 (18%)
	Kinder	41	38 (92.7%)	1 (2.4%)	2 (4.9%)

In Tabelle 7 ist demnach zwischen Japaner und Ainu kein merklicher Unterschied zu erkennen. Die Kinder zeigen im allgemeinen die Neigung zur Aufblähung.

Tabelle 8.

Kreuzung	Familienzahl	gebläht	etwas gebläht	nicht gebläht
gebläht × gebläht	16	34 (33 K, 1 E)	1 K	0
gebläht × etwas gebläht	5	15 (13 K, 2 E)	2 E	1 K
gebläht × nicht gebläht	4	13 (11 K, 2 E)	0	3 (1 K, 2 E)
etwas gebläht × nicht gebläht	2	1 K	1 K	0
etwas gebläht × etwas gebläht	1	4 K	0	0
gebläht × ?	20	45 (37 K, 8 E)	0	1 E
etwas gebläht × ?	4	8 (7 K, 1 E)	0	0
nicht gebläht × ?	3	7	0	0

Obgleich sich aus Tabelle 8 nichts Bindendes entnehmen lässt, scheint von „gebläht × nicht gebläht“ „gebläht × ?“ und „nicht gebläht × ?“ gesehen, der vorgewölbte Nasenflügel dominant zu sein.

Leicher fand bei 150 europäischen Familien den schmalen Nasenflügel dominant und den breiten rezessiv. Nach Abel ist bei Mitteleuropäern der geblähte Nasenflügel rezessiv, wohingegen er nach Tao bei Europäer-Chinesen-Vermischung dominant ist. Das Obige wurde von Fischer, Lebzelter, Davenport, Steggerda bei Europäer-Hottentotten-Vermischung, von Hooten bei Europäer-Neger-Vermischung, Rodenwaldt bei Europäer-Kisar-Vermischung, Dunn bei Chinesen-Hawaiinsulaner nachgewiesen. Neuerdings hat J. Schauble, auch bei Spanier-Maput-Vermischung die Dominanz des aufgeblähten Nasenflügels nachgewiesen. Unsere Befunde stimmen mit dieser Tatsache überein.

5. Nasenform.

Tabelle 9.

		Gesamtzahl	hyperleptorrhin	leptorrhin	mesorrhin
Japaner	Erwachsene	30	2 (6.5%)	19 (63.5%)	9 (30.0%)
	Kinder	96	5 (5.2%)	76 (79.2%)	15 (15.6%)
Ainu	Erwachsene	34	2 (6%)	15 (44%)	17 (50%)
	Kinder	41	0	18 (44%)	23 (56%)

Hieraus geht hervor, dass die Nase der Japaner vorwiegend leptorrhin, die der Ainu vorwiegend mesorrhin ist und bei Kindern im allgemeinen zu chamaerrhin neigt.

Tabelle 10.

Kreuzung	Familienzahl	mesorrhin	leptorrhin	hyperleptorrhin	chamaerrhin
leptorrhin × mesorrhin	16	18 (15K, 3E)	19 K	1 K	0
leptorrhin × leptorrhin	6	6 K	14 (13K, 2E)	0	0
mesorrhin × mesorrhin	3	7 (6K, 1E)	2 K	0	0
leptorrhin × hyperleptorrhin	2	0	3 (1K, 2E)	1 E	0
leptorrhin × ?	17	17 (16K, 1E)	21 (17K, 4E)	0	1 K
mesorrhin × ?	9	10 (8K, 2E)	6 (3K, 3E)	1 K	0
hyperleptorrhin × ?	2	1 K	4 K	0	0

Wenn man von „leptorrhin × mesorrhin“, „leptorrhin × ?“ und „mesorrhin × ?“ in Tabelle 10 folgert, so ist die lange Nasenform gegenüber der kurzen dominant vererbt.

Von den Forschern seien diejenigen erwähnt, die bei den verschiedenen Rassen leptorrhin als dominant vererbt beschrieben haben: Bei Mitteleuropäern (Abel), Nordeuropäern gegenüber der dicken kurzen Nase bei Juden (Leicher), Europäern gegenüber chamaerrhin bei Kisar (Rodewalt) Spaniern gegenüber chamaerrhin bei Maya-Indianer (G.D. Williams).

Auch bei Südamerikanern wird leptorrhin als dominant angegeben, während nach Chervin, Salaman, Fischer, Hooton chamaerrhin rezessiv ist.

6. Kinn.

Tabelle 11.

		Gesamtzahl	vorgetreten	steil	zurückgetreten
Japaner	Erwachsene	29	6 (21%)	14 (48%)	9 (31%)
	Kinder	97	0	36 (37%)	61 (63%)
Ainu	Erwachsene	33	3 (9%)	24 (73%)	6 (18%)
	Kinder	41	0	19 (46%)	22 (54%)

Hiernach ist das steile Kinn bei Ainu häufiger als bei Japanern, und bei Kindern neigt das Kinn zurückzutreten.

Tabelle 12.

Kreuzung	Familienzahl	zurückgetreten	steil	vorgetreten
steil × steil	8	6 (5 K, 1 E)	12 (11 K, 1 E)	0
steil × vortreten	7	9 (8 K, 1 E)	9 (6 K, 3 E)	1 K
steil × vortreten	4	9 K	5 K	1 K
vortreten × zurücktreten	3	3 E	2 E	0
zurückgetreten × zurückgetreten	2	6 (5 K, 1 E)	0	1 E
vorgetreten × vorgetreten	1	0	2 K	2 K
steil × ?	23	17 (16 K, 1 E)	28 (24 K, 4 E)	1 E
zurückgetreten × ?	4	2 (1 K, 1 E)	6 K	1 K
vorgetreten × ?	2	1 K	3 K	1 K

Von „steil × zurückgetreten“, „steil × ?“, „zurückgetreten × ?“ und „hervorgetreten × ?“ in Tabelle 12 gefolgert, scheint das steile Kinn gegenüber den anderen Typen dominant zu sein.

Bei der Vermischung der Europäer mit Chinesen neigt das Kinn etwas nach vorn vorzutreten (Ta o).

7. Grösse der Augenlidspalte.

Tabelle 13.

		Gesamtzahl	gross	mittelgross	klein
Japaner	Erwachsene	31	3 (10%)	21 (68%)	7 (22%)
	Kinder	97	13 (13.4%)	40 (41%)	44 (45.5%)
Ainu	Erwachsene	34	27 (80%)	1 (20%)	0
	Kinder	41	39 (95.1%)	2 (4.9%)	0

Hiernach ist die Augenlidspalte der Ainu vorwiegend grösser als bei Japanern, und zwischen Kindern und Erwachsenen ist kein merklicher Unterschied zu erkennen.

Tabelle 14.

Kreuzung	Familienzahl	gross	mittelgross	klein
gross $\times$ mittelgross	16	28 (24 K, 4 E)	16 (14 K, 2 E)	0
mittelgross $\times$ mittelgross	4	5 K	4 (1 K, 3 E)	0
gross $\times$ gross	3	7 K	0	0
gross $\times$ klein	3	7 K	2 K	0
klein $\times$ mittelgross	2	3 K	2 K	0
gross $\times$?	13	21 (19 K, 2 E)	5 (4 K, 1 E)	1 K
mittelgross $\times$?	11	18 (15 K, 3 E)	3 (2 K, 1 E)	0
klein $\times$?	3	2 K	3 (2 K, 1 E)	1 K

Von „gross $\times$ klein“ und „gross $\times$?“ in der Tabelle 14 ist es eindeutig, dass die grosse Augenlidspalte der Ainu gegenüber der kleinen bei Japanern dominant ist.

Sowohl bei Europäer-Chinesen-Vermischung (Ta'o) als auch bei Inselasien-Chinesen-Vermischung (Rita, Hausschild) sei die grosse Augenlidspalte dominant.

8. Augenbrauen.

Tabelle 15.

		Gesamtzahl	dick	etwas dick	dünn
Japaner	Erwachsene	31	2 (6.5%)	14 (45%)	15 (48.5%)
	Kinder	97	1 (1%)	31 (32%)	65 (67%)
Ainu	Erwachsene	34	27 (80%)	7 (20%)	0
	Kinder	41	37 (90%)	4 (10%)	0

Aus der Tabelle 15 geht hervor, dass im allgemeinen die Augenbrauen der Ainu dick, dagegen die der Japaner dünn sind. Zwischen Kindern und Erwachsenen ist ein merklicher Unterschied nicht zu erkennen.

Tabelle 16.

Kreuzung	Familienzahl	dick	etwas dick	dünn
dick $\times$ etwas dick	12	24 (22 K, 2 E)	12 (10 K, 2 E)	0
dick $\times$ dünn	10	6 (4 K, 2 E)	16 (15 K, 1 E)	2 (1 K, 1 E)
etwas dick $\times$ etwas dick	3	1 K	9 K	0
dick $\times$ dick	2	2 K	2 K	0
dünn $\times$ etwas dick	1	1 E	0	0
dick $\times$?	12	18 (16 K, 2 E)	7 (6 K, 1 E)	2 K
etwas dick $\times$?	9	6 (4 K, 2 E)	9 (7 K, 2 E)	3 (1 K, 2 E)
dünn $\times$?	6	4 (3 K, 1 E)	8 (7 K, 1 E)	1 K

Von „dick $\times$ dünn“ und „dünn $\times$?“ in der Tabelle 14 erkennt man, dass die Vermischung die mittlere Form wählt.

Routil, Robert haben bei Familien in Wien den starken Haarwuchs zwischen der linken und rechten Augenbraue, d. h. die erbliche Beziehung der Razelbildung untersucht und festgestellt, dass, wie in unseren Befunden, alle die mittlere Form einnehmen.

9. Wimpern.

Tabelle 17.

	Gesamtzahl	Gesamtzahl	lang	mittellang	kurz
Japaner	Erwachsene	31	7 (10%)	5 (16%)	23 (74%)
	Kinder	97	3 (7.2%)	46 (47.3%)	44 (45.5%)
Ainu	Erwachsene	34	29 (85%)	5 (15%)	0
	Kinder	41	40 (97.6%)	1 (2.4%)	0

Die Tabelle 17 erhellt, dass die Wimpern der Ainu länger als die bei Japanern und bei Kindern im allgemeinen länger als bei Erwachsenen sind.

Tabelle 18.

Kreuzung	Familienzahl	lang	mittellang	kurz
kurz $\times$ lang	11	20 (18 K, 2 E)	10 (8 K, 2 E)	0
lang $\times$ mittel	6	18 (16 K, 2 E)	1 K	0
lang $\times$ lang	5	13 (11 K, 2 E)	3 (2 K, 1 E)	0
kurz $\times$ mittel	2	3 K	0	1 K
mittel $\times$ mittel	2	5 K	1 K	0
lang $\times$?	17	31 (28 K, 3 E)	8 (5 K, 3 E)	0
kurz $\times$?	9	9 K	10 (7 K, 3 E)	1 K
mittel $\times$?	1	1 K	0	0

Von „kurz $\times$ lang“, „lang $\times$?“ und „kurz $\times$?“ in der Tabelle 18 erkennt man, dass die langen Wimpern der Ainu gegenüber den kurzen der Japaner dominant vererbt sind.

Die langen Wimpern der Europäer sind gegenüber den kurzen der Chinesen dominant (Tao).

Die Tatsache, dass bei Japanern gewöhnlich die kurzen Wimpern zu finden sind, ist deshalb leicht denkbar, weil wegen Vorhandensein der Mongolenfalte am oberen Augenlid der Wurzelteil der Wimpern verdeckt wird; jedoch ist es bei Japaner-Ainu-Vermischung eine unleugbare Tatsache, dass bei den Fällen mit Mongolenfalte und auch langen Wimpern (es gibt auch solche, bei denen die Mongolenfalte nur eine Randfalte darstellt) die langen Wimpern dominant vererbt sind.

10. Mongolenfalte.

Tabelle 19.

		Gesamtzahl	Mongolenfalte (+)	Mongolenfalte (-)
Japaner	Erwachsene	31	16 (52%)	15 (48%)
	Kinder	97	91 (93.8%)	6 (6.2%)
Ainu	Erwachsene	34	4 (12%)	30 (88%)
	Kinder	41	12 (29%)	29 (71%)

Wie die Tabelle 19 zeigt, fehlt die Mongolenfalte bei den meisten Ainu, wohingegen sie bei Japanern ausserordentlich häufig vorkommt. Die Kinder zeigen zu den Erwachsenen einen höheren Wert des Vorkommens.

Tabelle 20.

Kreuzung	Familienzahl	Mongolenfalte (+)	Mongolenfalte (-)
(+) × (-)	17	47 (43 K, 4 E)	3 (2 K, 1 E)
(-) × (-)	9	16 (16 K, 2 E)	5 K
(+) × (+)	2	3 (2 K, 1 E)	0
(-) × ?	19	35 (32 K, 3 E)	6 (3 K, 3 E)
(+) × ?	8	17 (14 K, 3 E)	2 (1 K, 1 E)

Von „(+)(-)“, „(-) × ?“ und „(+)(?)“ in der Tabelle 20 aus gesehen, ist die Mongolenfalte der Japaner dominant vererbt.

Die dominante Vererbung der Mongolenfalte wurde nachgewiesen bei Japaner-Europäer- und bei Polynesier-Europäer- und Polynesier-Japaner-Vermischung in Bonin-Inseln (Wagenseil), bei Chinesen-Hawainer-Vermischung (Neuhaus, Dunn), bei Annamit-Europäer-Vermischung (Abel), bei der Familienuntersuchung in Timor (Bylmer), bei Chinesen-Neger (Inselasien)-Vermischung (Rita Hausschild).

Fischer hingegen fand bei Europäer-Hottentotten-Vermischung, dass die sog. Mongolenfalte der Hottentotten rezessiv ist, desgleichen auch die sog. Mongolenfalte bei Eskimo-Europäer-Vermischung. Somit wurde bestätigt, dass die Eskimo und Hottentotten gegenüber den Mongolen nicht die gleichen erbbiologischen Merkmale aufweisen.

Dunn, Tao, Rita Hausschild wiesen besonders daraufhin, dass die Vererbung der Mongolenfalte vom einheitlichen Faktor abhängig sei; aber nach unseren Befunden ist es sehr schwer, dieser Ansicht zuzustimmen. Weil die Mongolenfalte von verschiedenen Faktoren gebildet wird, so dass sie von ihrer Struktur nicht als monadisches Merkmal betrachtet werden kann. Ihre Bildung ist von folgenden verschiedenen Faktoren abhängig: Am

oberen Augenlidrande parallel ziehende Deckfalte, im medialen Abschnitt des oberen Augenlidrandes vorhandene, nach unten medial schief laufende, den Caruncula lacrimalis verdeckende Randfalte, dem Zustand des M. levator palpebrae superioris und dem Zustand der Fettablagerung im oberen Augenlide. Dazu kommt, wie schon oben erwähnt, die äusserst auffällige Altersveränderung der Mongolenfalte und, wie auch die Befunde an Koreanern von Kuroda zeigen, ergibt sich ein 50–60% Wert des Auftretens der Mongolenfalte von Neugeborenen bis zum 9. Lebensjahre, der ins 10.–19. Lebensjahr gelangend auf 40% vermindert und über dem 60. Lebensjahr nur 3,5% ausmacht. Daraus wird verständlich, dass die Untersuchung der erblichen Beziehung nicht immer leicht ist.

Dazu noch bestätigen unsere Befunde, dass, wie in der Tabelle 20 ersichtlich, von $(-)\times(-)$ die erwachsenen Bastarden $(+)$ zeigen. Wenn wir nun die Mongolenfalte mit monadischem Merkmal festlegen, oder wenn der Faktor $(-)$ zum Faktor $(+)$ rezessiv wäre, so müsste $(-)$ als Erscheinungstyp der Homozygot des rezessiven Faktors sein. Das bedeute, dass $(-)\times(-)$ immer $(-)$ erzeugen müssten. Nach unseren Befunden ist jedoch die Kreuzung des Homozygot des rezessiven Faktors, d.h. $(-)\times(-)$, $(+)$ entstanden. Es lässt sich daraus nicht schliessen, dass der Mongolenfalte als monadische Form eine erbliche Beziehung zukommt.

II. Epicanthus.

Tabelle 21.

		Gesamtzahl	Epicanthus (+)	Epicanthus (-)
Japaner	Erwachsene	31	2 (6,5%)	29 (93,5%)
	Kinder	97	40 (41%)	57 (59%)
Ainu	Erwachsene	34	1 (3%)	33 (97%)
	Kinder	41	7 (17%)	34 (83%)

Hiernach ist der Wert des Auftretens der Epicanthus bei Japanern ein wenig grösser als bei Ainu. Die Kinder zeigen gegenüber den Erwachsenen einen etwas höheren Wert.

Tabelle 22.

Kreuzung	Familienzahl	Epicanthus (-)	Epicanthus (+)
$(-)\times(-)$	24	52 (46 K, 6 E)	12 (11 K, 1 E)
$(+)\times(-)$	4	4 (2 K, 2 E)	6 K
$(-)\times?$	26	38 (32 K, 6 E)	18 (13 K, 5 E)
$(+)\times?$	1	1 K	1 K

Wenn auch sich aus der Tabelle 22 nichts Sicheres schliessen lässt, so scheint es uns, als ob Epicanthus im Gegensatz zur Mongolenfalte rezessiv vererbt ist. Bei Spanier-Maya-Indianer-Vermischung (Williams) wurde eine dominante Vererbung des Epicanthus nachgewiesen.

Es wird angegeben, dass Epicanthus als eine Art der bisherigen Mongolenfalte den Angulus oculi übersteigt und eine Verlängerung darstellt. Wir haben die Mongolenfalte besonders unterschieden, die nach dem Zustand der Verlängerung wie folgt verschiedenartig ist: Entweder verläuft sie vom Angulus oculi medialis schräg nach unten medial und geht in die Haut des Nasenrückens über, oder sie verläuft vom Angulus oculi medialis abwärts, an dessen Ende dann lateralwärts, um in die Haut des Wangenteils überzugehen.

12. Irisfarbe.

Tabelle 23.

		Gesamt- zahl	schwarz- braun	dunkel- braun	braun	hellbraun	melirt
Japaner	Erwachsene	29	1 (3%)	13 (45%)	6 (21%)	7 (12%)	2 (7%)
	Kinder	96	7 (7.3%)	69 (72%)	9 (9.3%)	11 (24%)	0
Ainu	Erwachsene	33	0	11 (33%)	16 (49%)	5 (15%)	1 (3%)
	Kinder	41	3 (7.3%)	25 (61%)	9 (22%)	3 (7.3%)	1 (2.4%)

In der Tabelle 23 erkennt man zwischen Japanern und Ainu keinen merklichen Unterschied. Nur bei Kindern vom 1.-5. Lebensjahre ist die ganz schwarze und schwarzbraune Farbe am häufigsten vertreten, so dass demnach dieses Alter im Vergleich zu Erwachsenen im allgemeinen zur dunkleren Farbe neigt.

Tabelle 24.

Kreuzung	Familien- zahl	schwarz- braun	dunkel- braun	braun	hell- braun	melirt
hellbraun × dunkelbraun	7	3 K	13 (10K, 3E)	0	0	0
braun × braun	4	3 K	6 K	0	0	0
braun × dunkelbraun	4	4 K	7 K	0	0	0
dunkelbraun × dunkelbraun	3	1 K	3 K	0	0	0
braun × hellbraun	2	1 K	7 K	2 (1K, 1E)	0	0
Mischfarbe × dunkelbraun	2	1 K	3 K	1 K	0	0
schwarzbraun × schwarzbraun	1	1 E	0	0	0	0
hellbraun × hellbraun	1	0	0	1 E	2 E	0
braun × melirt	1	0	0	4 K	0	0
braun × ?	12	8 (7K, 1E)	17 (16K, 1E)	1 K	1 K	1 K
hellbraun × ?	7	6 K	7 (6K, 1E)	3 (2K, 1E)	1 E	0
dunkelbraun × ?	7	4 K	7 (6K, 1E)	2 (1K, 1E)	0	0
schwarzbraun × ?	2	2 K	0	1 K	0	0
melirt × ?	1	0	1 K	1 K	0	0

Die Tabelle 24 erhellt, dass die dunkle Iris gegenüber der hellen immer dominant vererbt ist.

Fischer kam zur Überzeugung, dass die blauen Augen gegenüber den dunkleren als grau, grün und hellblau rezessiv sind. Davenport und Rodenwaldt fanden ebenfalls die braune Farbe gegenüber den blauen Augen dominant vor. Die dunkle Farbe der Chinesen ist nach Tao gegenüber der hellen der Europäer dominant; sie erreicht bei Europäer-Chinesen-Vermischung, nach Flemming, 68%, so dass die dunkle Farbe als dominant vererbt bezeichnet wurde. Williams fand bei Malaienindianer (Mexico)-Spanier-Vermischung, Schäuble bei südamerikanischer Maput-Spanier-Vermischung, W. Abel bei nordafrikanischer Eingeborenen-Europäer-Vermischung und bei Annamit-Europäer-Vermischung die dunkle Farbe gegenüber der hellen dominant vor. Unsere Befunde stehen hiermit im Einklang.

Dahingegen hat A. G. Janks bei Indianer-Europäer-Vermischung die Mittelform angeführt.

Auch die Farbe der Iris ist wie die der Haut polyfaktorisch. Deswegen weist der Bau der Iris (Irisstroma, Gefässschicht und Pigmentgranula) wesentliche allerlei Reihenfaktoren auf. Wenn wir aber die Untersuchungen der Vermischung bis in die Jetztzeit, oder die Befunde der Familienuntersuchung überblicken, so kann man daraus schliessen, dass entsprechend des Erscheinungstyps die dunkle Farbe gegenüber der hellen die Dominanz zeigt.

13. Richtung der Augenlidspalte.

Tabelle 25.

		Gesamtzahl	geneigt (nach unten medial)	etwas geneigt	horizontal
Japaner	Erwachsene	31	18 (58%)	10 (32%)	3 (10%)
	Kinder	97	95 (97.9%)	2 (2.1%)	0
Ainu	Erwachsene	34	23 (68%)	7 (20%)	4 (12%)
	Kinder	41	36 (87.9%)	3 (7.3%)	2 (4.9%)

In der Tabelle 25 erkennt man, dass zwischen Japanern und Ainu kein auffallender Unterschied besteht, aber die Kinder im Vergleich zu Erwachsenen häufiger die Neigung (nach unten medial) zeigen. Montandtanon (1927), Koya (1937) haben ebenfalls berichtet, dass die Augenlidspalte der Ainu horizontal gelegen ist.

Tabelle 26.

Kreuzung	Familienzahl	geneigt	etwas geneigt	horizontal
geneigt × geneigt	15	42 (36 K, 6 E)	0	0
geneigt × etwas geneigt	6	14 (13 K, 1 E)	2 K	0
horizontal × etwas geneigt	3	1 K	2 K	0
etwas geneigt × etwas geneigt	2	8 K	0	0
horizontal × horizontal	1	0	1 K	1 K
geneigt × horizontal	1	4 (2 K, 2 E)	0	0
geneigt × ?	18	34 (22 K, 6 E)	1 K	1 K
etwas geneigt × ?	7	14 (11 K, 3 E)	3 K	1 K
horizontal × ?	2	2 (1 K, 1 E)	0	0

Von „geneigt × horizontal“, „geneigt × ?“ und „horizontal × ?“ in der Tabelle 26 gesehen, scheint die geneigte Augenlidspalte gegenüber der horizontalen dominant zu sein.

Nach Tao ist bei Chinesen-Europäer-Vermischung das nach unten medial liegende schiefe Auge gegenüber der horizontal liegenden Augenlidspalte als „rezessiv oder dominant“ schwer bestimmbar, obwohl man das schiefe Auge als gering dominant ansehen könne. Während Rodenwalt bei Kisaren-Vermischung die schräge Augenspalte in 50% vorfand, ist nach der Untersuchung von Fischer die horizontal liegende Augenlidspalte der Europäer gegenüber der schrägen der Hottentotten dominant vererbt.

14. Einbettung des Bulbus.

Der Bulbus des Ainu ist immer tief eingebettet, während der des Japaners flach liegt oder hervortritt.

Tabelle 27.

Kreuzung	Familienzahl	eingebettet	etwas eingebettet	flach	hervortretend
flach × eingebettet	12	5 (2 K, 3 E)	26 (25 K, 1 E)	1 K	1 K
hervortretend × eingebettet	8	6 K	9 K	0	5 (3 K, 2 E)
eingebettet × etwas eingebettet	4	3 K	6 K	1 K	0
etwas eingebettet × etw. eingebettet	1	0	2 K	1 K	0
hervortretend × etw. eingebettet	1	1 K	0	0	0
flach × flach	1	0	0	3 K	0
hervortretend × flach	1	1 K	0	1 K	0
eingebettet × ?	17	16 (12 K, 4 E)	12 (11 K, 1 E)	6 (5 K, 1 E)	3 (2 K, 1 E)
hervortretend × ?	6	2 K	6 (5 K, 1 E)	1 K	5 (4 K, 1 E)
flach × ?	3	0	3 K	2 K	0
etw. eingebettet × ?	1	1 K	1 K	0	1 K

Von „flach $\times$ eingebettet“ und „hervortretend $\times$ eingebettet“ in der Tabelle 27 betrachtet, nimmt der Grad des Hervortretens des Bulbus bei der Vermischung die Mittelform ein.

Bezüglich des Auges bei obiger Vermischung sind die Grösse und Richtung der Augenlidspalte, die Wimpern, die Irisfarbe, die Mongolenfalte, der Epicanthus und der Grad des Hervortretens des Bulbus erörtert worden. So zeigt die Augenlidspalte nach zahlreichen Forschern eine kleinzyllindrische Form, die Augenbrauen sind kurz, am oberen Lid befindet sich die Mongolenfalte und der Epicanthus, der Bulbus tritt hervor, und das nach unten medial schiefstehende Auge wird mit sog. Mongolenaugen bezeichnet. Wir haben jedoch in unserer Untersuchung nachgewiesen, dass bei Japanern mit diesem nach medial schiefgelegenen Mongolenaugen die Mongolenfalte dominant ist, dagegen die kleine Augenspalte und die kurzen Wimpern eindeutig rezessiv sind. Wir haben somit festgestellt, dass die Vermischung zwischen Ainu und Japanern den Träger der charakteristischen Augen kennzeichnet, und können daher hier dem Mendelschen Spaltungsgesetz zustimmen.

15. Haarform.

Tabelle 28.

		Gesamtzahl	straff	schlicht
Japaner	Erwachsene	28	21 (75%)	7 (25%)
	Kinder	97	88 (90.7%)	9 (9.3%)
Ainu	Erwachsene	34	28 (82%)	6 (18%)
	Kinder	41	32 (78%)	9 (22%)

Aus der Tabelle 28 geht hervor, dass zwischen Japanern und Ainu kein deutlicher Unterschied in der Haarform besteht und dass, obwohl zwischen Kindern und Erwachsenen sich ein auffallender Unterschied nicht bemerkbar macht, bei Kleinkindern von 1. bis 5. Jahren die schlichte Haarform zu 100% vorkommt.

Tabelle 29.

Kreuzung	Familienzahl	straff	schlicht
straff $\times$ straff	17	35 (30 K, 5 E)	14 K 0
straff $\times$ schlicht	9	12 (11 K, 1 E)	7 (5 K, 2 E) 0
straff $\times$?	23	34 (30 K, 4 E)	9 K 1 E
schlicht $\times$?	6	14 (9 K, 5 E)	4 K 0

Von „straff $\times$ schlicht“ und „schlicht $\times$?“ gesehen, scheint das straffe Haar gegenüber dem schlichten dominant zu sein.

Es wurde angegeben, dass bei Hottentotten-Europäer-Vermischung das straffe Haar dem gekräuselten gegenüber rezessiv, auch in der Familienuntersuchung zwischen Europäern das straffe gegenüber dem welligen oder gekräuselten (Fischer) rezessiv, ferner das straffe Haar der Eskimo gegenüber dem schlichten der Europäer rezessiv ist.

Wie die Untersuchungen der verschiedenen Forscher zeigen, ist das straffe Haar der Chinesen gegenüber dem welligen oder gekräuselten Haar der Philippiner (R.B. Bean), bei Tagalen-Chinesen-Vermischung das straffe Haar der Chinesen, bei Spanier-Maya-Indianer-Vermischung das straffe Haar gegenüber dem welligen (Williams), bei Engländer-Chinesen-Vermischung das straffe Haar zu 47% (Flemming), bei Chinesen-Europäer-Vermischung das straffe Haar der Chinesen (Tao, Landauer), das straffe Haar der Chinesen gegenüber dem gekräuselten der Hawaien (Dunn), bei Malaien-Chinesen-Vermischung (Hagen) das straffe Haar gegenüber dem schlichten bei Maputen-Europäer-Vermischung (Schäuble), das straffe Haar der Annamiten gegenüber dem schlichten der Europäer (W. Abel) dominant vererbt.

Rita Hausschild äusserste sich jedoch, dass das straffe Haar der Mongolen nicht immer die Dominanz gegenüber dem gekräuselten Haar der Inselasien zeigt, sondern vielmehr eine Mittelform von straff und gekräuselt einnehme. Rutil und Robert gelangten in der Untersuchung von Wiener Familien zu dem Ergebnis, dass die erbliche Beziehung zwischen straffen, schlichten und gekräuselten Haar vielfach unklar sei, und dass besonders bei der Kreuzung von gekräuselt und straff die mittlere Form in den Vordergrund trete.

Bezüglich der Erbanlage des Haares ist bisher für wellig C, für straff L und für gekräuselt S angegeben worden, aber in den letzten Jahren sind diesbezüglich verschiedene Fragen aufgetaucht, die eine solche Festlegung nicht zulassen. Wir kamen zur Erkenntnis, dass das straffe Haar unter lissotriche zu schlichtem dominant vererbt zu sein scheint.

16. Ohrläppchen.

Tabelle 30.

	Gesamtzahl	gross, frei	gross, angewachsen	mittel, frei	mittelgross angewachsen	klein, frei
Japaner	E 31	0	4 (13%)	3 (10%)	12 (38%)	4 (13%)
	K 97	1 (1%)	0	16 (16,5%)	24 (25%)	19 (19,6%)
Ainu	E 32	13 (41%)	6 (19%)	7 (22%)	4 (12%)	1 (3%)
	K 41	6 (14,6%)	3 (7,3%)	21 (51%)	10 (24%)	0

Wie die Tabelle 30 eindeutig zeigt, sind die Ohrläppchen der Ainu grösser als die der Japaner, sie sind bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen etwas kleiner. Quelprud fand bei Europäern die Ohrläppchen der Kinder bis zum 15. Lebensjahre frei, vom 15. bis 50. Lebensjahre angewachsen und nach dem 50. Lebensjahre wiederum frei; aber beim weiblichen Geschlechte ist „angewachsen“ häufiger als beim männlichen.

Tabelle 31.

Kreuzung	Familienzahl	gross frei	gross angew.	mittel-gross frei	mittel-gross angewachsen	klein frei	klein angewachsen
gross frei × gross frei	1	0	0	4 K	0	0	0
gross frei × mittel angew.	2	0	1 K	0	0	1 K	0
gross frei × klein angew.	3	0	1 E	6 K	1 K	0	0
gross frei × fehlt	2	0	0	1 E	1 E	0	1 E
gross angew. × gross angew.	1	1 K	1 K	2 K	0	0	0
gross angew. × mittel frei	2	0	0	4 K	1 K	0	0
gross angew. × mittel angew.	2	2 K	0	2 K	2 K	0	0
gross angew. × klein frei	2	0	0	2 K	3 K	0	0
mittel frei × mittel angew.	4	1 K	0	7(5K,2E)	3 K	1 E	0
mittel frei × klein frei	1	0	0	0	1 E	0	0
mittel frei × klein angew.	1	0	0	0	1 K	0	1 K
mittel angew. × mittel angew.	3	0	1 K	5 K	1 K	1 K	0
mittel angew. × klein frei	1	0	0	0	2 K	0	0
mittel angew. × klein angew.	2	0	0	1 K	2 K	0	0
klein frei × fehlt	1	0	0	2 K	1 K	1 K	1 K
gross frei × ?	11	4 K	2 K	9 K	5(2K,2E)	0	0
gross angew. × ?	6	1 E	1 E	6(5K,1E)	4(3K,1E)	0	2 K
Mittel frei × ?	7	1 E	0	10 K	2 K	1 K	4 K
Mittel angew. × ?	2	1 K	1 K	2 K	1 E	0	0
klein frei × ?	2	0	0	2 K	2(1K,1E)	1 K	1 K
klein angew. × ?	1	0	0	0	1 K	0	1 K

Von „gross frei × fehlt“ und „gross angewachsen × klein frei“ gesehen, zeigt die Grösse des Ohrläppchens die mittlere Erbformel.

Man erkennt von „gross frei × klein angewachsen“, „mittel frei × mittel angewachsen“, „gross frei × ?“ und „mittel frei × ?“, dass die freie Form gegenüber der angewachsenen Form dominant zu sein scheint.

Fischer berichtete, dass bezüglich der Grösse des Ohrläppchens

das grosse Ohrläppchen vielfach dominant vererbt ist; es fehlt jedoch dafür noch ein sicherer Beweis.

Hildén untersuchte auf der Insel Runö (Finnland) 247 Personen und fand bei 160 das freie und bei 87 das angewachsene Ohrläppchen und kam zur Ansicht, dass das freie Ohrläppchen dominant vererbt ist. Auch Leicher führte gleiche Befunde an. Rodenwaldt fand in seiner Untersuchung bei Mesitzen, dass die Europäer das grosse freie Ohrläppchen besitzen, das zum kleinen und angewachsenen Ohrläppchen der Kisaren dominant ist. Nach Carrière kommt das angewachsene Ohrläppchen dominant vor. Quelprud wies darauf hin, dass es nicht möglich sei, einen Schluss über die Erbformel des Ohrläppchens zu fällen, wenn die Alters- und Geschlechtsveränderung berücksichtigt werden. Das Obige also lehrt, dass es sich hierbei nicht um die Befunde der Vermischung handelt, sondern um solche, die auf der Familienuntersuchung in derselben Familie beruhen. Die künftigen Untersuchungen sind daher notwendig.

17. Darwin'sches Höckerchen.

Tabelle 32.

		Gesamt- zahl	Affenschwanz- form	rundlich	Spuren	fehlt
Japaner	Erwachsene	30	0	2 (7%)	12 (40%)	16 (53%)
	Kinder	97	2 (2.1%)	3 (3.1%)	34 (35%)	58 (59.8%)
Ainu	Erwachsene	33	0	0	11 (33%)	22 (76%)
	Kinder	41	0	1 (2.4%)	14 (34%)	26 (63.6%)

Die Tabelle 32 lehrt uns, dass der Wert des Auftretens des Darwin'schen Höckerchens bei Japanern etwas grösser als bei Ainu ist, und dass sich zwischen Kindern und Erwachsenen ein deutlicher Unterschied nicht zeigt.

Tabelle 33.

Kreuzung	Familien- zahl	fehlen	angedeutet	rundlich	cercopithecus
fehlen × angedeutet	13	17 K	17 (15K, 2E)	1 K	1 K
fehlen × fehlen	8	7 (6 K, 1 E)	11 (7 K, 4 E)	2 (1 K, 1 E)	0
angedeutet × angedeutet	5	8 K	4 K	1 K	0
fehlen × breit	1	2 K	0	0	0
fehlen × ?	22	27 (23K, 4E)	21 (18K, 3E)	1 K	0
angedeutet × ?	5	5 (4 K, 1 E)	6 (5 K, 1 E)	1 E	0
breit × ?	1	2 K	0	0	0

Obwohl über das Darwin'sche Höckerchen sich nichts Sicheres sagen

lässt, stellt, von "fehlen $\times$ rundlich" und "rundlich $\times$?" gesehen, das Fehlen zu rundlich dominante Befunde dar.

Nach der Untersuchung der europäischen Zwillingen von Quelpprud tritt das Darwin'sches Höckerchen in der Kindheit, unabhängig vom Geschlecht, deutlich zutage; sobald es in das erwachsene Alter kommt, tritt es beim männlichen Geschlecht wieder deutlich in Erscheinung und ist beim weiblichen Geschlecht eher abgeschwächt. Nach ihm ist der Wert des rechten Höckers in gewissem Grade höher als der des linken, und wenn das Darwin'sche Höckerchen nur an einer Seite auftritt, betrifft es immer die rechte Seite. (In unserer Untersuchung war es immer auf die rechte Seite beschränkt).

Weiterhin hat Quelpprud in der Familienuntersuchung bei 163 europäischen Familien das folgende Ergebnis erhalten.

(+) $\times$ (+) Kinder 2/5 (—),
 (+) $\times$ (—) Kinder 1/2 (+),
 (—) $\times$ (—) Kinder 2/5 (+).

Er äusserste sich dahin, dass die Erbformel des Darwin'schen Höckerchens sich schwer bestimmen lässt, es vielleicht nicht durch einen einzigen Gens, sondern durch einen Hauptgens und die Einwirkung verschiedener Nebengens zustandekommen könne. Es ist schwer für uns, die Erbformel zu schliessen.

18. Hautfarbe.

Tabelle 34.

		Gesamt- zahl	Nr. 3	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Nr. 13	Nr. 14	Nr. 15
Japaner	Erwachsene	30	1 (3.2%)	2 (6.5%)	2 (6.5%)	0 1 (1.0%)	10 (33.3%)	9 (30.0%)	5 (16.6%)	1 (3.3%)	0	0
	Kinder	96	0	0	4 (4.2%)	21 (21.9%)	39 (40.6%)	24 (25.0%)	3 (3.1%)	2 (2.1%)	2 (2.1%)	0
Ainu	Kinder	34	0	0	0	0	9 (26.4%)	14 (41.1%)	10 (29.4%)	1 (2.9%)	0	0
	Erwachsene	41	0	0	0	0	8 (19.6%)	16 (39.0%)	13 (31.7%)	3 (7.3%)	1 (2.4%)	0

Die Tabelle 34, nach der Luschan'schen Hautfarbentafel aufgemacht, lässt zwischen Japanern und Ainu keinen deutlichen Unterschied erkennen, und auch zwischen Kindern und Erwachsenen ist ein deutlicher Unterschied schwer aufzufinden, jedoch ergibt sich im Vergleich zu Erwachsenen die schon bekannte Tatsache, dass die Hautfarbe der Kleinkinder, besonders

der Neugeborenen und Säuglinge auffallend die Neigung zur weisslichen Farbe zeigt.

Tabelle 35.

Kreuzung	Familien- zahl	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Nr. 13	Nr. 14	Nr. 15	Nr. 16	Nr. 9	Nr. 8	Nr. 7	Nr. 5	Nr. 3
Nr. 10×Nr. 11	8	9 K	5 K	2 K	0	1 K	0	1 K	1 K	0	0	0	0
Nr. 10×Nr. 12	4	4 K	6 K	5 (4 K. 1 E)	1 K	0	0	0	0	1 K	0	0	1 K
Nr. 12×Nr. 12	3	0	2 (1 K. 1 E)	3 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. 11×Nr. 11	3	1 K	2 K	0	0	0	0	0	0	1 K	0	0	1 K
Nr. 10×Nr. 10	2	1 K	2 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 K
Nr. 10×Nr. 13	1	0	1 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 K
Nr. 10×Nr. 7	1	2 E	0	0	0	0	0	0	0	1 E	0	0	0
Nr. 13×Nr. 8	1	1 K	3 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. 11×Nr. 8	1	1 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. 9×Nr. 9	1	0	1 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. 12×Nr. 3	1	3 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 K
Nr. 12×Nr. 11	1	1 E	2 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. 11× ?	11	5 K	10 (9 K. 1 E)	8 (6 K. 2 E)	1 K	0	0	0	1 E	2 K	1 K	1 E	1 E
Nr. 10× ?	10	5 K	6 (5 K. 1 E)	4 (3 K. 1 E)	0	0	0	0	0	0	1 K	0	2 K
Nr. 12× ?	5	0	5 (4 K. 1 E)	3 K	0	0	1 K	0	0	1 K	0	0	0
Nr. 7× ?	1	0	1 K	2 (1 K. 1 E)	0	1 K	0	0	0	0	0	0	0

Von „Nr. 10×Nr. 12“, „Nr. 10×Nr. 13“, „Nr. 13×Nr. 8“ und „Nr. 12×Nr. 3“ erkennt man, dass als Hautfarbe der Mischlinge die Mittelform der Eltern vertreten ist.

Davenport fand bei Europäer-Neger-Mischlinge in Jamaika, dass die Hautfarbe derselben nicht die einfache Mittelform der Eltern, sondern die des väterlichen oder mütterlichen stark ausgeprägten Anteils annimmt. Desgleichen beobachtet Fischer bei Europäer-Hottentotten-Mischlingen die Spaltung der Hautfarbe als erbliche Erscheinung.

Nach Flemming ist bei Europäer-Chinesen-Mischlingen die gelbe Hautfarbe als dominant vorzufinden. Lebzelter spricht auch von Dominanz der gelben Hautfarbe bei Europäer-Buschmann-Mischlingen. Auch Tao, welcher die Europäer-Chinesen-Mischlinge untersuchte, äusserte sich, dass bei erwachsenen Mischlingen die gelbe Hautfarbe dominant vererbt ist. Schäuble fand die gelbe Hautfarbe bei Südamerikaner-Maputen-Mischlingen, W. Abel die dunkle Hautfarbe der Morokkaner und Anamiten zur blassweissen Hautfarbe aller Europäer dominant vererbt.

Wohingegen nach Fischer die blassweisse Hautfarbe der Europäer zur dunklen Hautfarbe der Polynesier eher dominant sein dürfte, auch bei

Mischlingen, am Reheboth, die blassweisse Hautfarbe der Europäer zur dunklen Hautfarbe der Hottentotten dominant, und nach Hagen bei Chinesen-Malaien-Mischlingen die helle Hautfarbe zur dunklen dominant vererbt ist.

Wenn man nun die Berichte, welche die Vererbung der Mittelform wie unsere Befunde zeigen, anführt, dann findet sich die Mittelform bei Norweger-Eskimo-Mischlingen (Gates), bei Europäer-Indier-Mischlingen (A. G. Janks), bei Europäer-Kisar-Mischlingen (Mesitzen) (Rodenwalt), bei Chinesen-Europäer-Mischlingskindern (bei erwachsenen Mischlingen ist, wie schon erwähnt, die dunkle Farbe dominant) (Tao) und bei Chinesen-Inselasien-Vermischung (Rita Hausschild). Mori und Kaneko haben ausserdem beobachtet, dass die Ainu-Japaner-Mischlinge die Mittelform der beiden Rassen nehmen.

Indessen trägt der Farbenton der Haut bekanntlich eindeutig das polygenetische Merkmal, und wenn das allerlei Reihe sich in den Farbstoffkörnern, der Struktur der Haut (sogar Fischer nahm den Dickenfaktor an) und den Gefässen bestimmen liesse, dann müsste die Haut der Bastarden in 2³ d.h. 8 Arten von Stufen zu unterscheiden sein und demgemäss das Vorhandensein der Mittelform zu Recht stehen. So ist in den bisherigen Berichten gefolgert worden, dass die dunkle bzw. helle Farbe entweder dominant oder rezessiv vorkommt, es würde aber sehr gewagt sein, auf Derartiges hin sofort einen Schluss zu fällen, vor allem in dem Falle, wo das Material nicht hinreichend ist. Dazu kommt, dass das „Nachdunkeln“ der Haut, welches von den verschiedenen Forschern anerkannt ist, noch einer sorgfältigen Überlegung bedarf.

19. Kopfform. (Nach der Garson'schen Einteilung).

Tabelle 36.

		Gesamt- zahl	hyper- dolicho- kephal	dolicho- kephal	meso- kephal	brachy- kephal	hyper- brachy- kephal	ultra- brachy- kephal
Japaner	Erwachsene	30	0	1 (3%)	12 (40%)	14 (47%)	3 (10%)	0
	Kinder	97	0	2 (2.1%)	16 (16.5%)	44 (45%)	25 (26%)	10 (10.4%)
Ainu	Erwachsene	34	1 (3%)	7 (21%)	22 (65%)	4 (11%)	0	0
	Kinder	41	0	2 (5%)	18 (44%)	21 (51%)	0	0

Aus der Tabelle 36 geht hervor, dass die Japaner vorzugsweise die Brachykephalie und die Ainu vorzugsweise die Mesokephalie zeigen, und dass die Kinder im allgemeinen zu Brachykephalie neigen.

Tabelle 37.

Kreuzung	Familien- zahl	ultra- brachy- kephal	hyper- brachy- kephal	brachy- kephal	meso- kephal	dolicho- kephal
mesokephal × brachykephal	13	o	4 K	16 (15 K, 1 E)	15 (13 K, 2 E)	2 K
mesokephal × mesokephal	6	1 E	2 K	9 (7 K, 2 E)	2 K	2 K
hyperbrachykephal × dolichokephal	3	o	o	4 K	1 K	o
mesokephal × dolichokephal	1	o	o	1 E	2 K	1 E
dolichokephal × dolichokephal	1	o	o	1 K	o	o
brachykephal × dolichokephal	1	o	o	1 K	1 K	o
hyperbrachykephal × brachykephal	1	1 K	o	1 K	o	o
hyperdolichokephal × brachykephal	1	o	1 K	2 K	1 K	o
mesokephal × ?	20	o	1 K	19 (16 K, 3 E)	22 (18 K, 4 E)	2 K
brachykephal × ?	7	o	4 K	4 K	10 (7 K, 3 E)	o
dolichokephal × ?	1	o	o	o	1 K	o

Von „hyperbrachykephal × dolichokephal“, „brachykephal × dolichokephal“ und „hyperdolichokephal × brachykephal“ in der Tabelle 37 gesehen, nimmt die Kopfform der Bastarden die Mittelform der Eltern.

Tao kam in der Untersuchung über die erwachsenen Mischlinge zu dem Ergebnis, dass die Kurzköpfe der Chinesen zu den Langköpfen der Europäer dominant sind; auch Dunn erhielt die gleichen Befunde. Hagen fand bei Malaien-Chinesen-Mischlingen ebenfalls die Dominanz der Kurzköpfe. Desgleichen auch H. Bryn bei norwegischen Mischlingsfamilien. Hilden erhielt in der Familienuntersuchung bei 268 Personen in der Insel Runö die gleichen Befunde.

Indessen beobachtete Boas in der Familienuntersuchung von 192 in Amerika lebenden jüdischen Familien eine Dominanz der Langköpfe, auch Luschan führte eine solche an.

Flemming fand bei Chinesen-Europäer-Mischlingen die Mittelform zu 40%, die kurzköpfige Spaltung zu 15% und die Langköpfe zu 5% (der übrige Prozentsatz zeigte die gleiche Form der Eltern). Geipel gelangte in seiner Familienuntersuchung bei über 16 Jährigen der Bremer-Marsch-Gegend in Europa zu dem Ergebnis, dass die Schädel alle die Vererbung der mittleren Form erkennen lassen. Auch wir können hierüber übereinstimmende Befunde anführen. Rita Hausschild hat in einer neulich durchgeführten Untersuchung bei Chinesen-Inselasien-Mischlingen festgestellt, dass die Bastarden

den Inselasiern geneigte Mittelform zeigten.

In der bisherigen Rassenkunde ist die Einteilung der Rassen in langköpfige oder kurzköpfige vorgenommen worden. Als Vertreter der kurzköpfigen Rasse ist am meisten bekannt die asiatische Rasse. Aber die Mongolen, Chinesen und Malaien weisen unter sich nicht immer die gleiche Kopfform auf, und auch bei Chinesen sind auffallende ländliche Unterschiede nachgewiesen worden. (So bei Nordchinesen die Mittelform, bei Südchinesen die kurze Form). Neuerdings hat K. Gerhart mit dem Längen-Breiten-Index des Kopfes die Kopfform festgelegt und betont, dass sie sogleich als rassisches Merkmal nicht angesehen werden kann.

Die wesentliche Kopfform unterliegt sehr leicht den Umweltseinflüssen, dementsprechend ist ihre Variabilität ziemlich gross, indem bei den gegenwärtigen Ainu der Variationskoeffizient von 3.66 bei Japanern 4.54 zeigt (Koya). Es wird angegeben, dass die in Osteuropa eingewanderten Juden die Träger der kurzen Kopfform sind, dagegen die in Nordamerika lebenden Juden die Mittelform besitzen. Auch die Napoleaner und Sizilianer mit länger Kopfform, welche in Nordamerika eingewandert sind, haben die Mittelform angenommen, und auch die Indianerkinder in Nordamerika zeigen alle die Mittelform. Das Obige zeigt also, dass der Einfluss der Umwelt sich sehr auffallend kenntlich macht.

Wenn in diesem Sinne die erblichen Beziehungen der Kopfform erörtert werden sollen, dann sind für eine genaue Beurteilung noch weitere ausgedehnte Untersuchungen sehr erwünscht. Wir haben hier nur versucht, die Befunde der Mittelform bei Ainu-Japaner-Mischlingen zur Kenntnis zu bringen.

20. Behaarung.

Die starke Behaarung kennzeichnet den Ainu, und ist beim Japaner nicht vorzufinden. Wie die Tabelle 38 zeigt, scheint die Behaarung der Bastarden die Mittelform der Eltern zu nehmen.

Tabelle 38.

((-) bedeutet dünn, (+) etwas auffallend, (++) auffallend, (##) sehr auffallend)

Kreuzung	Familienzahl	(-)	(+)	(++)	(##)
(++) × (+)	9	3 (2 K, 1 E)	12 (10 K, 2 E)	2 (1 K, 1 E)	0
(##) × (-)	6	0	1 K	15 (14 K, 1 E)	0
(+) × (-)	5	6 (4 K, 2 E)	2 K	3 K	0
(++) × (+)	2	0	4 K	3 (2 K, 1 E)	1 K
(##) × (+)	1	0	1 K	4 K	0
(+) × (+)	1	0	1 K	1 K	0

(-) × (-)	1	0	1 K	1 K	0
(-) × ?	11	17 (16 K, 1 E)	6 (5 K, 1 E)	3 K	0
(+) × ?	7	1 K	8 K	8 K	3 K
(#) × ?	5	0	2 E	3 (1 K, 2 E)	2 K
(+) × ?	3	3 (2 K, 1 E)	3 (2 K, 1 E)	1 K	0

Danforth, der 1921 bei Amerikanern sich zum Ziel setzte zu untersuchen, ob der zweite Phalanx des Fingers mengenmässig behaart ist oder nicht, hat in Familienuntersuchungen festgestellt, dass die reichliche Behaarung dominant vererbt ist. Indessen äusserste sich Fischer, dass diese Untersuchung sehr unsicher sei, dazu noch bei Europäer-Neger-Mischlingen (Mulatten) vielmehr die dem Neger nahe kommende dünne Behaarung gefunden werde. Ausserdem kam A. G. Janks in seiner Untersuchung bei Indianer-Europäer-Mischlingen zu dem Ergebnis, dass die Mittelform vererbt ist, und auch bei Europäer-Eskimo-Mischlingen zeigen die A. G. Janks Befunde die Mittelform wie die unsrigen.

21. Sakralfleck.

Die früher von Inoue, Nanura, Nakashima und Murayama über das Sakralfleck der Ainu-Säuglinge und Kleinkinder in Hokkaido durchgeführten Untersuchungen brachten als Ergebnis, dass das Sakralfleck unter den 186 reinen Ainu bis zum vollendeten 5. Lebensjahre in 46.27% vorhanden ist. Sie haben zugleich unter 71 Bastardensäuglingen das Sakralfleck in 74.6% aufgefunden.

Wie die Tabelle 39 zeigt, kam das Sakralfleck bei 36 Bastardensäuglingen unserer Untersuchung in 66.6% der Fälle vor. Nach Nagai und Nanura nimmt es bei Japanern den hohen Wert von 93.03% ein. Ausserdem nach der Untersuchung von Kato findet es sich im 1. Lebensjahre zu 99.5%, im 2. zu 98%, im 3. zu 99% und im 4. zu 86%, also bis zum 3. Lebensjahre absolut positiv.

Tabelle 39.

Kreuzung	Familienzahl	Sakralfleck (+)	Sakralfleck (-)
Ainu × Japaner	24	24 (66.6%)	12 (33.4%)
Japaner × F ₁	6	5 (62.5%)	3 (37.5%)
Ainu × F ₁	3	2 (50%)	2 (50%)
F ₁ × F ₁	1	1 (100%)	0

Im allgemeinen haben bezüglich des Sakralfleckes Larssen, Gofrey die bifaktorielle Hypothese aufgestellt, indem sie das Vorhandensein des

Farbstoffes mit P (dominant), sein Nichtvorhandensein mit p (rezessiv), das Vorhandensein des Sakralflecks mit o (rezessiv) und sein Nichtvorhandensein mit O (dominant) darstellen. Wenn auch wir dementsprechend verfahren, dann muss es bei Japanern PPoo und bei Ainu ($P_{po} + p_{po}O$) sein. In diesem Falle ist bei ihrer Vermischung ein 75%iger positiver Wert aufzufinden. Unsere Befunde nähern sich jedoch diesem Wert und sind viel näher den obenerwähnten Befunden der Mischlinge von Inoue, so dass auch wir der Ansicht von Baelz, dass die Vermischung für das Auftreten des Sakralflecks bei Ainu verantwortlich zu machen ist, zustimmen müssen.

Bei den von Larsson und Godfery untersuchten Mischlingskindern in Hawaii neigt das Sakralfleck früher zu verschwinden als bei vollblütigen Kindern. Toa führte ebenfalls an, dass bei Chinesen-Europäer-Mischlingen sich die gleiche Neigung zeige. Indessen lässt sich in unseren Befunden über das verzögerte oder rasche Verschwinden des Sakralflecks nichts Sicheres sagen, und sind hierfür noch längere Beobachtungen notwendig.

Im vorigen Abschnitt haben wir zwar entsprechend der Hypothese von Larsson und Godfrey bei Ainu $P_{po} + p_{po}O$ angenommen, es erscheint aber die Anwendung der zwei Formeln gegenüber solch einheitlicher, vollblütiger Rasse sehr fraglich und gilt die Möglichkeit einer Nachprüfung durch spätere Untersuchungen.

V. Schluss.

1. Es wurden 55 in Hokkaido lebende Ainu-Japaner-Mischlingsfamilien untersucht, und zwar 28 Familien, wo beide Eltern lebten und 27 Familien, wo die eine Seite fehlte. Die Gesamtzahl der Mischlingskinder dieser Familien betrug 135, davon waren 19 Erwachsene und 116 Kinder (von Neugeborenen bis zum vollendeten 14. Lebensjahre). Dem Geschlecht nach waren 66 männlich und 69 weiblich.

2. Zwecks vergleichender Beobachtung wurden zugleich 97 japanische Kinder und 41 vollblütige Ainukinder untersucht.

3. Gesichtsform: Der Ainu neigt zur etwas kürzeren Gesichtsform als der Japaner. Die kurze Gesichtsform scheint zur langen dominant zu sein.

4. Stirn: Sie ist beim Ainu weniger steil als beim Japaner. Die steile Form scheint zur fliehenden dominant zu sein.

5. Nasenrücken: Beim Ainu ist der Nasenrücken häufiger konkaver als beim Japaner, die gerade Form kommt wenig vor. Die konkave Form scheint zur geraden dominant zu sein.

6. Nasenflügel: Die geblähte Form des Nasenflügels zeigt zwischen Ainu und Japaner nahezu gleichen Wert, jedoch scheint die geblähte Form

zur nicht geblähten dominant zu sein.

7. Nasenform: Japaner neigt viel mehr als Ainu zur etwas engeren Form. Leptorrhin scheint zur chamaerrhin dominant zu sein.

8. Kinn: Ainu besitzen die steile Form häufiger als Japaner. Die steile Form scheint zur vorstehenden und zurücktretenden Form dominant zu sein.

9. Grösse der Augenlidspalte: Sie ist weitaus grösser als bei Japanern. Die grosse Augenlidspalte scheint zur kleinen dominant vererbt zu sein.

10. Augenbraue: Sie ist bei Ainu viel dichter als bei Japanern und bei Vermischung zeigt sich die Mittelform.

11. Augenwimpern: Sie sind bei Ainu weitaus länger als bei Japanern, die langen Wimpern sind zu den kurzen dominant vererbt.

12. Mongolenfalte: Sie fehlt bei Ainu, jedoch ist sie bei Japanern sehr oft anzutreffen. Die Erbformel ist dominant.

13. Epicanthus: Sie ist bei Japanern etwas häufiger als bei Ainu. Die Erbformel ist eher als rezessiv anzusehen.

14. Irisfarbe: Zwischen Ainu und Japanern ergibt sich kein merklicher Unterschied, obgleich die dunkle Farbe zur hellen dominant ist.

15. Richtung der Augenlidspalte: Bei Japanern und Ainu ist sie immer nach unten medial gerichtet, am häufigsten ist die schiefe Richtung nehmende Augenspalte. Nach den Befunden der erwachsenen Mischlinge scheint die schiefe Augenspalte zur horizontal gelegenen dominant zu sein.

16. Grad des Hervortretens des Augapfels: Bei Ainu tief eingesunken, dagegen bei Japanern flach oder hervortretend. Bei Vermischung zeigt sie sich die Mittelform.

17. Form der Behaarung: Bezüglich des Vorkommens von "straff und schlicht" lässt sich zwischen Ainu und Japanern kein merklicher Unterschied erkennen, jedoch scheint „straff“ zu „schlicht“ dominant zu sein.

18. Ohr läppchen: Bei Ainu trifft man vielfach das grosse freie Ohr läppchen, bei Japanern vielfach das mittelgrosse angewachsene Ohr läppchen. Die Grösse des Ohr läppchens nimmt die Erbformel der Mittelform; die freie Form scheint zur angewachsenen dominant zu sein.

19. Darwins'ches Höckerchen: Das tritt bei Japanern etwas häufiger als bei Ainu auf. Die fehlende Form ist zur rundlichen Form dominant nachgewiesen.

20. Hautfarbe: Zwischen Ainu und Japanern besteht kein merklicher Unterschied, jedoch zeigt sie bei Vermischung die Mittelform.

21. Kopfform: Brachykephalie ist bei Japanern am häufigsten, Mesokephalie bei Ainu am häufigsten vertreten. Die Erbformel scheint die Mittelform zu sein.

22. Behaarung: Sie ist bei Ainu viel deutlicher als bei Japanern. Bei Mischlingen zeigt sich die Mittelform.

23. Sakralfleck: Der Wert des Vorkommens des Sakralflecks bei Kindern unter dem 5. Lebensjahre erreichte 46% (Inoue), bei Japanern 93% (Nagai). Nach unseren Befunden zeigte der Wert des Vorkommens bei Mischlingskindern von Ainu und Japaner 66.6%. Wenn man entsprechend der bifaktoriellen Hypothese von Larsson, Godfrey verfährt, dann dürfte sich bei Japanern PP_{oo} und bei Ainu p_{po}O+Pp oO ergeben.

Am Schlusse kommen wir der angenehmen Pflicht nach Herrn Prof. Dr. Taniguchi unseren ergebensten Dank für die liebenswürdige Leitung in dieser Untersuchung auszusprechen. Zu grossem Danke sind wir auch Herrn Assistent Prof. Dr. S. Kato verpflichtet, der uns durch stete freundliche Beratung angeregt hat.

Mittel für diese Untersuchung wurden uns aus dem wissenschaftlichen Fonde des Unterrichtsministeriums zur Verfügung gestellt, wofür wir hiermit unseren ergebensten Dank aussprechen.

Schrifttum.

- 1) Adachi, B.: Über die blauen Flecken des Beckens der Kindern. Chugai-Ijischinpo 1902. (Japanisch).
- 2) Ando, S.: Untersuchung über die Vererbung der Konstitution. Minzoku-Seibutsugaku-Kenkyu. I.M. 1936. (Japanisch).
- 3) Inoue, Z. und Nanura, K.: Über die Kinderflecken bei Ainu in Hokkaido. Minzoku-Eisei. Bd.6. 1937. (Japanisch).
- 4) Iwanami,: Zoologische Enzyklopädie. 1935. Tokyo. (Japanisch).
- 5) Kanaseki, T.: Rassenkunde des Japaners. Iwanami-Koza. Biologie. Bd.7. 1932. Tokyo. (Japanisch).
- 6) ———: Allgemeine Somatologie. Zinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.1. B.2. B.3. 1938. Tokyo. (Japanisch).
- 7) Kawakami, R.: Allgemeine menschliche Erblehre. 1939. Tokyo. (Japanisch).
- 8) Kiyono, K.: Anthropologische Untersuchung über Japaner in Dolmenzeit. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.2. 1938. (Japanisch).
- 9) Komai, T.: Vererbung des Japaners. 1934. Tokyo. (Japanisch).
- 10) ———: Vererbung des Menschen. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. B.8. 1939. (Japanisch).
- 11) Koya, Y.: Lehre von Rassenhygiene. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.2. 1938. (Japanisch).
- 12) ———: Untersuchung über den Geschlechtsunterschied des menschlichen Körpers. Minzoku-Seibutsugaku-Kenkyu. I. M. 1936. (Japanisch).
- 13) ———: Theorie und Anwendung den medizinischen Statistik. 1934. Tokyo. (Japanisch).
- 14) ———: Umwelteinfluss und Entartung der Rasse. 1939. (Japanisch).

- 15) Koyama, E.: Politische Anthropologie. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.10. 1939. (Japanisch).
- 16) ———: Allgemeine Rassenkunde. 1939. (Japanisch).
- 17) ———: Anthropologisches Heft. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.5. 1938. (Japanisch).
- 18) Kuroda, S.: Untersuchung über die Gesichtsform der gegenwärtigen Koreaner. Jinruigaku-Zasshi. Bd.59. 1937. (Japanisch).
- 19) ———: Untersuchung über die Gesichtsform der gegenwärtigen Koreaner. Jinruigaku-Zasshi. Bd.53. 1937. (Japanisch).
- 20) Nando, I.: Untersuchung der Rasse. 1903. (Japanisch).
- 21) Matsumura, R. und Oshima, Y.: Menschen und Rasse. Iwanami-Koza. Biologie. Bd.7. 1932. (Japanisch).
- 22) Mori, O. und Kaneko, U.: Farbenton der äusseren Haut der Ainu. Kaibogaku-Zasshi. Bd.9. 1936. (Japanisch).
- 23) Nagahama, M.: Statistische und histologische Untersuchung der Kinderflecke. Zika-Zasshi. Heft 74. 1902. (Japanisch).
- 24) Nagai, K.: Über die Kinderflecke bei japanischen und Ainu-Säuglingen. Zido-Kenkyu. Bd.36. (Japanisch).
- 25) Nishida, S.: Urzeit von Japan. 1930. (Japanisch).
- 26) Nishimura, S.: Rasse des alten Japans. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.11. 1939. (Japanisch).
- 27) Rei, G.: Verteilung der Säuglinge mit den Kinderflecken in Formosa. Kaibogaku-Zasshi. Bd.14. 1939. (Japanisch).
- 28) Haga, E.: Kinderflecke bei den japanischen Kindern. Tokyo-Igakukai-Zasshi. 1888. (Japanisch).
- 29) Suda, A.: Haut und Haar des Japaners. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.1. 1938. (Japanisch).
- 30) Tanaka, Y.: Die Erblehre. 1934. Tokyo. (Japanisch).
- 31) Taniguchi, T.: Vererbung, Konstitution und Mischlinge. 1939. Tokyo. (Japanisch).
- 32) Yashiro, S.: Untersuchung über Sacchalin-Ainu. 1927. (Japanisch).
- 33) Yokoo, Y.: Die Messung der Sacchalin-Ainu. Jinruigaku-Zasshi. Bd.54. 1939. (Japanisch).
- 34) ———: Der Mongolen. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.11. 1939.
- 35) ———: Allgemeine Craniologie. Jinruigaku-Senshigaku-Koza. Bd.5. 1938.
- 36) Abel, W.: Über Europäer-Marokkaner- und Europäer-Annamiten-Kreuzung. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 36. 1937.
- 37) Aichel, O.: Kurzer Bericht über die Ergebnisse meiner Reise nach Chile und Brasilien. Verh. d. Ges. f. ph. Anthr. Tübingen. 1929.
- 38) Bälz, E.: Die körperliche Eigenschaften der Japaner. Mitt. d. Ges. f. Natur u. Völkerk. Ostasiens. Tokyo. 1885.
- 39) ———: Über die Rassenelemente in Ostasien, speziell in Japan. 1900. Tokyo.
- 40) Baur-Fischer-Lenz.: Menschliche Erblehre und Rassenhygiene. Bd. 1. 1935.
- 41) Bean,: Heredity of hairform among the Filipinos. Amer. Natural. Biol. 45. 1911.
- 42) Boas, Fr.: Zur Anthropologie der nordamerikanischen Indianer. Z. Ethn. Bd. 27. 1895.
- 43) ———: The Half-Blood-Indian. An anthropometric study. Popular Science Monthly 45. 1894.
- 44) Brennemann, J.: The sacral or so-called mongolian pigment spots of earliest infancy and childhood, with special reference to their occurrence in the American negro. Amer. Anthr. Vol. 9. 1907.

- 45) Davenport, Ch.: Heredity of skin color in Negro-White-Crosses. Carneg. publ. Nr. 188. Washington. 1913.
- 46) Davenport, Ch.: Nasal breadth in Negro and White-Crossing. Eug. News. Vol. 13, Nr. 3. 1928.
- 47) ———: Heredity of eye color in Man. Science 26. 1907.
- 48) ———: Principles of Breeding. 1907.
- 49) Davenport a. Steggerda.: Race crossing in Jamaica. Washington. D. C. 516. 1929.
- 50) Dunn, L.: Some results of race mixture in Hawaii. Eug. in Race and State. Baltimore. 1923.
- 51) ———: An anthropometric study of Hawaiian of pure and mixed blood. Papers of Peabody Mus. of Amer. Archeol. a. Anth. Havard. Univ. Vol. II. Nr. 3. 1928.
- 52) Engerrand.: Revue anthropologie. 1912.
- 53) Fehlinger, H.: Geschlechtsleben und Fortpflanzung der Eskimos. Abh. u. Ges. d. Sexualforsch, Bd. 4, H. 6. 1926.
- 54) Fischer, E.: Die Rehobother Bastards und Bastardierungsprobleme beim Menschen. Jena. 1913.
- 55) ———: Schädelform und Vererbung. Z. f. indukt. Abst. u. Vererb. Bd. 33. und Münchner med. Wschr. 1923. Nr. 50. 1924.
- 56) ———: Versuch einer Genanalyse des Menschen. Z. f. ind. Abst. u. Vererb. Bd. 54. 1930.
- 57) ———: Europäer-Polynesier-Kreuzung. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 28. 1930.
- 58) ———: Kreuzung mit Chinesen in Europa. Der Erbarzt. Nr. 8. 1935.
- 59) ———: Altersveränderung in Gesicht bei Rehobother-Bastarden. 1908-31. Verh. d. deutsch. Gesell. f. Rassenk. Bd. 9. 1938.
- 60) ———: Neue Rehobother Bastardstudien I. Antlitzveränderungen verschiedener Altersstufen bei Bastarden. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 37. H. 2. 1938.
- 61) Flemming.: Anthropological studies of children. Eugenics Rev. Vol. 18. 1927.
- 62) Frets. G. P.: Heredity of eye color in man. Eugenical News. Vol. 20. 1935.
- 63) ———: Über die Dominanz des brachykephalen Kopfindex. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 27. 1935.
- 64) Gates, a. Ruggles.: Mendelian heredity and racial differences. Journ. Roy. Anthr. Inst. Vol. 55. 25.
- 65) Gates, R.: A pedigree study of American crosses in Canada. Journ. Roy. Anthr. Inst. Vol. 18. 1929.
- 66) ———: Heredity in man. London. 1929.
- 67) Geipel.: Über die Wahrscheinlichkeit eines mathematischen Zusammenhanges zwischen den Längenbreitenindizes der Köpfe der Eltern und Kindern in Familien. Verh. d. Gesell. f. Rassenf. Bd. 9. 1936.
- 68) Gerhart, k.: Zur Frage der Brachykephalie und Schädelform. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 37. 1938.
- 69) Geyer, E.: Kurze Berichte über die anthropologischen Ergebnisse der Lapplandexpedition. 1913-14. Anthr. Anz. Jg. VIII, 1932.
- 70) Goldschmidt, R.: Neu-Japan. Berlin. 1927.
- 71) ———: Die Nachkommen der alten Siedler auf den Bonin-Inseln. Die Naturwissenschaften. Bd. 15. 1927.
- 72) Hagen, B.: Anthropologischer Atlas ostasiatischer und melanisischer Völker. Wiesbaden. Kreiders Verlag. 1898.
- 73) ———: Kopf- und Gesichtstypen ostasiatischer und melanisischer Völker. Stuttgart. 1906.
- 74) Hausschild, R.: Rassenkreuzung zwischen Negern und Chinesen auf Trinidad. I.W.

- Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 38. 1939.
- 75) Herskovits and Melville, J.: Race crossing and human heredity. Scient. Monthl. Vol. 39. 1934.
- 76) Hilden.: Studien über das Vorkommen der Darwin'schen Ohrspitze in der Bevölkerung Finnlands. Fennia 52. Nr. 4. 1929.
- 77) Hooton, E. A.: Observations and queries as to the effect of race mixture on certain physical characteristics. Eug. in Race and State. Baltimore. 1923.
- 78) Jarcho.: Die Altersveränderungen der Rassenmerkmale bei den Erwachsenen. Anthr. Anz. Bd. 12. 1935.
- 79) Jenks, A.: Indian-White-Amalgamation. Studies in Soc. Scienc. Univ. of Minnesota. No. 6. 1916.
- 80) Jennes, D.: The blond Eskimo. Amer. Anthr. Vol. 23. 1921.
- 81) Kleiweg de Zwaan.: Bijdrage tot de anthropologie der Menangkabau-Maleiers Door. 1908.
- 82) Koya, Y.: Rassenkunde der Aino. 1937.
- 83) Krieg, H.: Die Biologie und Soziologie der Mischlingsbevölkerung von Paraguay. Z. f. Rassenkunde. Bd. 2. 1936.
- 84) Kröber, A. L. and Waterman, T. T.: Source book in anthropology. New York. 1931.
- 85) Krogman, W. M.: The cephalic Type of the full-blood and mixed blood Seminole Indians of Oklahoma. Z. f. Rassenk. Bd. 3. 1936.
- 86) Landauer, W.: Die Vererbung von Haar- und Hautmerkmalen, ausschliesslich Färbung und Zeichnung mit Berücksichtigung von Rassendifferenzierung und Deszendenz. Z. f. indukt. Abst. u. Vererb. Bd. 42. 1926.
- 87) ———.: Die Vererbung von Haar- und Hautmerkmalen, ausschliesslich Färbung und Zeichnung III. Z. f. ind. abs. u. Vererb. Bd. 50. 1929.
- 88) Larsan, N. P. and L. St. Godfrey.: Sacral pigment spot a record of seven hundred cases with a genetic theory to explain its occurrence. Amer. Journ. phys. Anthr. Vol. 10. 1927.
- 89) Lebzelter.: Über Khoisan-Mischlinge in Südafrika. Z. f. Morph. u. Anthr. (Fischer, Festb.) Bd. 34. 1934.
- 90) Leicher: Die Vererbung an der Variationen der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Gehörorgans. München. Ohrheilkunde der Gegenwart. Bd. 12. 1928.
- 91) ———.: Über die Vererbung der Nasenform. Verh. ges. phys. Anthr. 3. 1929.
- 92) Lenz, Fr.: Muss das Nachdunkeln der Haare als Dominanzwechsel aufgefasst werden? Arch. Rass. u. Ges.-Biol. Bd. 16. 1925.
- 93) Lotze, J. P. and W. A. Goddjin.: Voyages of exploration to judge of the bearing of hybridisation upon evolution. Genetica. Vol. 10. 1928.
- 94) ———. and ———.: The human hybrids (South America). Genetica. Vol. 10. 1928.
- 95) Lundborg.: Die Rassenmischung bei Menschen. Bibli. genet. 8. 1931.
- 96) Macy Bayley: Growth changes in the cephalic index during the first five years of life. Human Biology. Vol. 8. 1936.
- 97) Maecaughey, V.: Race mixture in Hawaii. Journ. Hered. Vol. 10. 1919.
- 98) Martin, R.: Lehrbuch der Anthropologie. 1928.
- 99) Mjen J. A.: Harmonic and disharmonic race crossings. Eugen. in Race a. State. Vol. II. 1923.
- 100) Montandon, G.: Au Pays des Ainou. 1927.
- 101) Müller, H. J.: On the variability of mixed races. American Naturalist. Vol. 70. 1936.
- 102) Neuhaus, R.: Verhandlungen. Z. Ethnol. Bd. 17. S. 30. 1885.
- 103) Nordenskiöld.: Grönland. 1886.

- 104) Quelprud, T.: Zur Erblichkeit des Darwin'sche Höckerchens. Z. f. ind. Abst. Bd. 62. 1932. und 67. 1934.
- 105) ———.: Untersuchungen der Ohrmuschel von Zwillingen. Z. f. ind. Abst. Bd. 62. 1932. u. Bd. 67. 1934.
- 106) Renner, O.: Artbastarde bei Pflanzen. Handbuch der Vererbungswissenschaft. Bd. II. 1929.
- 107) Rodenwaldt, E.: Die Mesitzen auf Kisar. I. II. Jena. 1928.
- 108) ———.: Die Rückkreuzung der Rassenmischung in der Kolonialländern auf Europa. Arch. f. Rass. Gesell. Biol. Bd. 32. 1938.
- 109) ———.: Wie bewahrt der Deutsche die Reinheit seines Blutes in Ländern mit farbiger Bevölkerung. Die Auslandsdeutsche. 1936.
- 110) ———.: Vom Seelenkonflikt der Mischlinge. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 34. 1934.
- 111) Routil, Robert.: Ein Beitrag zum Erb stadium des menschlichen Haarkleides. Z. f. Rassenk. Bd. 9. 1939.
- 112) Salaman.: Heredity of the Jew. Journ. of Genetics. Vol. I. 1911.
- 113) Saller, K.: Mikroskopische Beobachtungen an den Haaren der Kisaren und Kisarbastarden. 1927.
- 114) Schäuble J.: Indianer und Mischlinge in Südchile. Z. f. Morph. und Anthr. Bd. 38. 1939.
- 115) Scheidt, W.: Allgemeine Rassenkunde. München. 1925.
- 116) ———.: Die Asymmetrie der Körpergrössenkurven und die Annahme der Polimerie. Arch. Rass. Gesell. Berlin. 1925.
- 117) ———.: Untersuchungen über die Erblichkeit der Gesichtszüge. Z. f. ind. Abst. u. Vererb. Bd. 60.
- 118) ———.: Annahme der Nachweise von Rassenmischung. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 27. 1930.
- 119) Schlaginhaufen, O.: Bastardierung und Qualitätsänderung. Natur. u. Mensch. Nr. I. 1920.
- 120) Schreiner, A.: Zur Erblichkeit der Kopfform. Genetica. Vol. 5. 1924.
- 121) Schwidetzky, I.: Eine erbliche Sonderbildung der Augenbrauen. Z. f. Rassenk. Bd. 7. 1938.
- 122) Stefanson.: My life with the Eskimos. 1913.
- 123) Steggerda.: Physical development of negro-white hybrids in Jamaica. Amer. Journ. Phy. Anthr. 12. 1928.
- 124) Tao, Y. K.: Chinesen-Europäer-Mischlinge. Eugenik. H. II. 1931.
- 125) ———.: Chinesen-Europäerinnen-Kreuzung. Z. f. Morph. u. Anthr. Bd. 33. 1935.
- 126) Tupper, K.: Studien an den Weichteilen der Augengegend. Verh. d. deutsch-Gesell. f. Rassenk. Bd. 9. 1938.
- 127) Weber, E.: Beiträge zur Erbphysiologie der menschlichen Untersuchung über die Körperbehaarung bei Zwillingen. Z. f. menschl. Vererb. u. Konst. Bd. 23. 1931.
- 128) Williams, George Del.: Maya-Spanish Crosses in Yucatan. Papers of Peabody Mus. of Amer. Archeol. a., Ethnol. Havard Univ. Vol. 13. 1931.
- 129) Zarfl.: Über die morphologische Bedeutung der blauen Geburtsflecke. Z. f. Kinderh. Bd. 31. 1921.

Fig. 1.

Fig. 1. Familie I: Vater ist Ainu und Mutter Japanerin mit 5 Kindern.

Fig. 2.

Fig. 2. u. 3. Familie II: Vater ist Ainu und Mutter Japanerin mit 4 Kindern.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 4. u. 5. Familie III: Vater ist Japaner und Mutter Ainu mit 3 Kindern von 8, 6 und 4 Jahren.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 6. Familie IV: Vater ist Ainu und Mutter Japanerin mit einem Mädchen.

Fig. 7.

Fig. 7. Familie V: Vater ist Ainu und Mutter Japanerin mit 4 Kindern.

Fig. 8.

Fig. 8. Familie VI: Vater ist Japaner und Mutter Ainu mit 4 Kindern.

Fig. 9.

Fig. 9. Familie XI: Vater ist Japaner und Mutter Ainu mit 2 Kindern. In der Mitte stehende Knabe ist Ainu.

Fig. 10.
Familie XII:
15 jähriges
Mischlings-
mädchen.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 11, 12. u. 13. Familie XIII:

Vater ist Japaner und Mutter Ainu mit einem Mischlingsknaben.

Fig. 14.

Fig. 14. Familie XIV: Vater ist Ainu und Mutter Japanerin mit einem Kind.

Fig. 15.

Fig. 15.
Familie XVII:
Vater ist Japaner
und Mutter Ainu
mit 2 Kindern.

Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18. Fig. 19. Fig. 20. Fig. 21.
Fig. 16, 17. u. 18. Familie XVIII:
Vater ist Japaner und Mutter Ainu mit einem Mischlingsknaben.
Fig. 19, 20. u. 21. Familie XIX:
Vater ist Ainu und Mutter und Japanerin mit einem Mischlingsmädchen.

Fig. 22.

Fig. 22. Familie XXIV:
Vater ist F₁ und Mutter Ainu mit
4 Kindern.

←Fig. 23.
Fig. 23. Familie
XXV: Vater
ist Ainu und
Mutter F₁ mit 4
Kindern im Alter
von 7. 5. 3. und
1 Jahren.

Fig. 24.→
12 jähriges
Mädchen in
der Familie
XXV.

Fig. 25.
Fig. 25. 13 jähriges
Mädchen in der
Familie XXVII.

←Fig. 26.
Fig. 26. Familie XXX:
Mutter (Ainu) mit 5
Mischlingskindern.

Fig. 27.

Fig. 27. Familie XXXII: Japanische Mutter mit 3 Mischlingskindern. Der Greis mit starken Backenhaaren ist Ainu.

Fig. 28.

11 jähriges Mädchen in Familie XXXV.

Fig. 29.

Fig. 29. u. 30. Familie XXXVIII: Mutter (Ainu) und Sohn.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 31. u. 32. Familie XLII: Mutter (Ainu) und Tochter.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 33. u. 34. Mutter (Japanerin) und
Mischlingstochter in Familie XLIII.

Fig. 35.

Fig. 35. Mischlingskinder im Alter von 12,
und 9 Jahren in Familie XLVIII.

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 36. u. 37. Familie LII:
Mutter mit 2 Knaben und
die Mutter (Ainu) ihres
Mannes.