Über das Gitterfaserbild im Hypothalamus-Hypophysen-System des Menschen*

Von

Yutaka Sano

Aus dem Anatomischen Institut der Medizinischen Akademie
der Kyoto-Präfektur, Kyoto.

(Direktor: Prof. Dr. H. Noda)

Einleitung

Seitdem A. Schiff (1925) den Begriff des Zwischenhirn-Hypophysen-Systems in die medizinische Wissenschaft einführte, ist man sich allmählich darüber klar geworden, daß das Zwischenhirn, besonders der Hypothalamus, klinisch und physiologisch in inniger Beziehung zur Hypophyse steht, und daß es darum von großer Wichtigkeit ist, beide als ein System zu erforschen. Schon früher wurden zahlreiche Untersuchungen betreffs der Verbreitung der Nerven und Gefäße in diesem Teile veröffentlicht. Neuerdings ist jedoch das Studium des Problems, wie beide Systeme zusammenarbeiten, noch schwieriger geworden, indem die Ergebnisse der verschiedenen Forschungen, die sich mit der Neurosekretion befassen, noch mit einzubeziehen sind.

Außer den Gefäßen und Nerven kommt noch die Gewebslücke als funktioneller Vermittler zwischen Hypothalamus und Hypophyse in Betracht. Schon Edinger (1911) berichtete, daß ein Färbemittel, welches er in den Vorderlappen injizierte, dann durch die Gewebslücke im Hypothalamus erschien. Popa und Fielding (1930, 1932), Wislocki und King (1936), Wislocki (1937, 1938 a, b.), Green (1948, 1951), Green und Harris (1947), Harris (1947, 1948), Mc Cornell (1953) usw. stellten in ihren Studien über das Hypophysenpfortadersystem fest, daß diese Gefäße sehr viel Bindegewebe mitführen. Spatz, Diepen und Gaupp (1948), Nowakowski (1951), Christ (1951) usw. legten den Ton auf die „Kontaktfläche“ zwischen Adenohypophyse und Neurohypophyse, besonders Spatz zeigte 4 Möglichkeiten der Verknüpfung von Adenohypophyse und Tuber cinereum über das

* Vorgetragen am 3. April, 1951 bei der 56. Versammlung der Japanischen Anatomischen Gesellschaft in Tokyo.

Infundibulum auf, in welch letzterem er die bilateralen humoralen Verbindungswege zwischen den beiden vermutete.

Seit mehreren Jahren haben Prof. T. Kihara und seine Schüler in Japan die Theorie von dem „extravaskulären Saftbahnsystem“ entwickelt. Diese Theorie wurde durch die Ergebnisse vieler Untersuchungen als zutreffend erkannt, und die Haupteinsicht, die sie vermittelt, besteht darin, daß das Gitterfasernetz als drittes Saftbahnsystem neben dem Blut- und Lymphgefäßsystem eine bedeutungsvolle Rolle spielt. Die erste Aufgabe bestand für mich nun darin, die Versuche betreffs des Ductus hypophyseocerebralis von Kylin (1935) nachzuprüfen. Das Resultat dieser Forschung war negativ. Aber ich untersuchte weiter, ob irgendein histologischer Bau nachweisbar wäre, der etwa den Ductus von Kylin ersetzen möchte, und ob die Theorie von Kihara auf das Hypothalamus-Hypophysen-System angewandt werden könnte. Die von mir hierbei gewonnene Auffassung dürfte sehr bemerkenswert sein, wie im folgenden dargelegt wird.

Die Terminologie betreffend, bediene ich mich der Nomenklatur von Christ (1951), nur daß ich die proximale Erhebung der Pars infundibularis (sog. Pars tuberalis) als Endanschwellung bezeichnen und die Gefäßnervenzone als Bindegewebe-Gefäßzone. Seine Nomenklatur ist im übrigen den Resultaten meiner Untersuchung nach einwandfrei. (Abb. 9).

Material und Methode

Hypophyse und Hypothalamus wurden vom Menschenmaterial sorgfältig abgelöst, ohne beide am Hypophysenstiel zu trennen. Sofort wurden sie mit Carnoy, Formol-Alkohol oder Formol (1:9) fixiert und in Celloidin eingebettet. Für jeden Fall fertigte ich je zwei frontale, sagittale und horizontale Serienschnitte an und führte die Silberimprägnation hauptsächlich nach Bielschowsky-Maresch (Modifikation von Sano 1952) aus.

- 1) Einstellen der Celloidinschnitte in 0,25%ige Lösung von Kaliumpermanganat 15 Min.
- 2) Auswaschen in dest. Wasser, dann entfärben in 1%iger Oxalsäurelösung 5 Min.
- 3) Auswaschen in dest. Wasser und sensibilisieren in 25%iger Eisenalaunlösung 20 Min.
- 4) $\frac{1}{2}$ stündiges Auswaschen in 5–6 mal gewechseltem dest. Wasser.
- 5) Impägnieren in ammoniakalischer Silberlösung nach Rio Hortega 30 Sekunden.

6) Abspülen in dest. Wasser 10–30 Sek., danach reduzieren in Formol 1:9 (Brunnenwasser).

7) Auswaschen, Vergolden, Fixieren, gründliches Auswaschen.

Ich verwandte zugleich Hämalan-Erythrosin, Masson-Goldner, Azan, Van Gieson und Nissl-Färbung. Darauf fertigte ich Paraffinpräparate sowie Präparate in Carbowax-Einbettung an. Auch Tuscheinjektionspräparate stellte ich zum Vergleich her.

Weil die Bindegewebsmenge und der argyrophile Charakter sich mit dem Alter ändern, benutzte ich kein Material von Minderjährigen oder Hochbejahrten.

Erläuterung der Befunde

1. Bindegewebe der intrasellären Hypophyse.

a) Bindegewebe des Vorderlappens.

Die Kapsel der intrasellären Hypophyse besteht aus kollagenem Bindegewebe und wird nach der Methode von Van Gieson, Azan und Masson-Goldner deutlich gefärbt. Von dieser Kapsel aus zieht das Bindegewebe allerorten in die Lücken zwischen den Zellsträngen in den Vorderlappen hinein. Das Bindegewebe zeigt argyrophilen Charakter. Die Gitterfasern lassen sich in folgende 3 Gruppen einteilen: 1) die der Basalmembran der Drüsenzellstränge, 2) die der Grundhäutchen um die feinen Blutgefäße und 3) die interstitiellen Gitterfasern. Romeis schrieb bereits über diese. In der Basalmembran schlingen sich die Gitterfasern längs und quer ineinander, aber in den Grundhäutchen laufen sie spiral oder quer zur Längsachse der Gefäße. Die interstitiellen Gitterfasern bilden die Brücke zwischen beiden. Die Gitterfasermenge ist nicht in jeder Gegend dieselbe. Außerdem verlieren sie mit dem Alter nach und nach ihren argyrophilen Charakter und werden durch kollagenes Bindegewebe ersetzt. Bei den sogenannten seitlichen Bindegewebe-Gefäßstränge ist die Bindegewebsmenge sehr groß, der größte Teil derselben besteht aber aus kollagenem Bindegewebe.

Wenn man Tusche direkt in den Vorderlappen injiziert, so verbreitet sich diese durch das interstitielle Gitterfasernetz in die ganzen Vorderlappen und zwar in die Zwischenzone, besonders in das interstitielle Bindegewebe der Pars infundibularis.

b) Bindegewebe der Zwischenzone.

In der Stelle, wo sich Adenohypophyse und Neurohypophyse

berühren, dringt zusammen mit den Gefäßen reichlich Bindegewebe hinein. Wegen ihrer bald großen, bald kleinen Kolloidvakuolen zeigt die Zwischenzone einen besonderen Anblick.

Die Fasern des den Hinterlappen begrenzenden Bindegewebes verlaufen parallel und sind gekrümmt als Ganzes kapselartig zur Hinterlappen. Da sich in der Zwischenzone ein mittlerer Bindegewebe-Gefäßstrang befindet, so scheint die Zwischenzone in kollagenen Fasern begraben zu sein. Aber auch in diesem Gebiet findet man gewiss die Gitterfasern der Basalmembran und der Grundhäutchen. Der mittlere Bindegewebe-Gefäßstrang geht in die seitlichen Bindegewebe-Gefäßsträngen über.

c) Bindegewebe des Hinterlappens.

Das Bindegewebe des Hinterlappens ist kaum nach einer Färbemethode färbbar, die nicht mit der elektiven Färbekraft für argyrophiles Bindegewebe rechnet. Es ist also die Methode von Van Gieson, Azan, Masson usw. nicht anzuwenden. Außerdem werden Pituizyten mit argyrophilen Fortsätze im Hinterlappen beobachtet. Bei der Benutzung der Imprägnationsmethode muß man also besondere Aufmerksamkeit hierauf verwenden, wie schon Romeis betonte.

Wie im Vorderlappen wird auch im Hinterlappen Bindegewebe aus Gitterfasern gebildet, das mit der aus kollagenen Fasern gebildeten Kapsel und dem mittleren Bindegewebe-Gefäßstrang in Verbindung steht. Meist dringt es mit dem Gefäß zusammen nach innen. Das Bindegewebe im inneren Teile des Hinterlappens wird beinahe ganz von Gitterfasern gebildet. Da es hier auch an den Zellsträngen fehlt, die in dem Vorderlappen vorhanden sind, umgeben sie nicht nur den direkten Umfang des Gefäßes, sondern breiten sich auch im Parenchymgewebe, sehr stark aus.

Das Gitterfasermaschenwerk im Hinterlappen ist sehr kompliziert wegen der örtlichen Verschiedenheit sowie des Unterschiedes zwischen Zentrum und Oberfläche. Doch kann man deutlich folgende 3 Typen unterscheiden. Typ I: die Gitterfasern sind stark gestreckt und bilden ein Netzwerk. Sie finden sich im Parenchym des Hinterlappens, das von den Neuroglia und von Nervenfasern gebildet ist, die Enden der Fasern sind sehr fein (entsprechend dem Romeis'schen Typ I) (Abb 1). Typ II: die Fasern sind kraus, verhältnismäßig kurz und besitzen dicke und gekrümmte Endigungen (entsprechend dem Romeis'schen Typ II) (Abb 2). Typ III: die Fasern befinden sich stets nahe der Kapsel, verlaufen parallel und

gerade und zeigen nur geringe Neigung zur Netzbildung (Abb 3). Typ II wird nicht auf Grund der abgelagerten Silberpartikel beurteilt—die Imprägnationstechnik ist in diesem Falle unzureichend—, sondern wird konstant beobachtet.

Obige 3 Typen stellen Übergangsformen dar. Das Gefäß verläuft in diesem Netz, darum scheint eine innige Beziehung zwischen Gefäß und Netz zu bestehen.

Je näher wir dem Trichterstiel kommen, desto mehr nehmen obige Gitterfasern an Zahl ab, sie breiten sich weniger aus und ihr Auftreten beschränkt sich immer enger auf die Umgebung des Gefäßes. In diesem Fall durchzieht das Gitterfasernetz stets die Umgebung des Gefäßes, ohne Beziehung zu der Dicke des letzteren, d. h. ein dickes Gefäß führt nicht auch immer ein größeres Netz mit. Die Gitterfasern breiten sich fein und frei aus, umgeben das Gefäß und treten in Verbindung mit den Netzen der Nachbargefäße. Wie im Teile des Trichterstiels scheint sich in solchen Gebilden ein Sinusoid-Gitterfaser-System anzudeuten. (Abb. 4).

2. Bindegewebe der extrasellären Hypophyse.

a) Bindegewebe der Pars infundibularis (sog. Pars tuberalis).

Einige, das sogenannte hypophysären Pfortadersystem bildenden Gefäße verlaufen parallel von oben nach unten in diesem Teile. Ihr interstitielles Bindegewebe ist reichlicher als in dem Vorderlappen. Die Zellstränge bilden eine gleichmäßige, longitudinal lange Reihe. Zwischen diesem Teile und dem Trichterstiel wird die aus Gitterfasern gebildete Grenzmembran beobachtet. Viele Gefäße laufen über diese der Pia mater entsprechende Membran in den Trichterstiel hinein. Es sind ziemlich viel Gitterfasern, die diese Gefäßgruppe, nämlich die Nowakowski'schen „Spezialgefäße“, begleiten, und zwar umspinnen diese Gitterfasern nicht nur immer ein Gefäß, sondern bisweilen auch einige Gefäße gemeinsam. (Abb. 5).

b) Bindegewebe des Trichterstiels. (Abb. 5 u. 6).

Das Bindegewebe dieses Teils besteht stets aus nur Gitterfasern in der Umgebung des Gefäßes. Wie oben erwähnt, bestehen die Gefäße des Trichterstiels aus den von Pars infundibularis über die Grenzmembran eindringenden Gefäßen, aus den mit den Gefäßen des Hinterlappens sich verbindenden Gefäßen und aus den von den Bindegewebe-Gefäßzone eindringenden Gefäßen. Diese sind alle Sinusoide und werden von einem dichten Gitterfasernetzwerk

umgeben. Doch ist letzteres ein sich nicht nur perivaskulär, sondern auch intervaskulär verbreitendes, eigentümliches Netzwerk. Zerstreut im Trichterstiel findet sich ein Gebilde, das aus einigen Sinusoiden und aus einem diese gemeinsam umgebenden Gitterfasernetzwerke besteht. Man kann jedes dieser Gebilde als ein Sinusoid-Gitterfaser-System bezeichnen.

Sein Grösse ist allerdings nicht gleichmäßig, die Gitterfasern aber sind in diesen Fällen bei weitem zahlreicher im Verhältnis zu ihrem Kaliber als bei allen sonstigen Gefäßen. Eine bestimmte Beziehung wird jedoch zwischen Gefäßkaliber und Gitterfasern nicht bemerkt; im Gegenteil, bei mäßig großem Kaliber scheint die Anzahl der begleitenden Gitterfasern gering zu sein.

c) Bindegewebe der Bindegewebe-Gefäßzone (Gefäßnervenzone, neurovascular zone).

Die Bindegewebe-Gefäßzone ist das Gewebe, das die hintere Fläche des Trichterstiels und des Trichters bedeckt und an der Grenze zu Pars caudalis tuberis endet. Im hinteren unteren Teil des Hypophysenstiels umgeben die Drüsenzellenstränge der Pars infundibularis den Trichterstiel. Auch im mittleren Teile finden sich hie und da diese Zellstränge; je näher aber an Radix infundibuli, desto mehr werden das Gewebe nur von den Gefäßen und den Bindegewebe gebildet. Von diesem Gewebe dringen die Gefäße in den Trichterstiel und das Infundibulum ein. Man darf diesen Gewebsaufbau nicht als Gefäßnervenzone bezeichnen, sondern muß ihn Bindegewebe-Gefäßzone nennen. Noch dazu ist dieses Gewebe deutlich als verdickte Pia mater zu betrachten, da es geht zur Pia mater der Pars caudalis tuberis über.

d) Bindegewebe der Endanschwellung der Pars infundibularis.

Einige Gefäße dringen vom Cavum leptomeningicum in die Spitze der Endanschwellung ein. Das Endothel dieser Gefäße erscheint zuweilen zylindrisch oder kubisch und zeigt einen epitheloidzellenähnlichen Anblick. Die in die Endanschwellung eindringende Gefäßgruppe anastomosiert mit den in Pars infundibularis longitudinal verlaufenden hypophysären Pfortadern und dringt in das Christische Infundibulum ein, das den Recessus infundibuli umgibt. Deshalb werden die Zellstränge der Endanschwellung von den Gefäßen und dem sie begleitenden Bindegewebe getrennt und keine typischen und longitudinal nebeneinander verlaufenden Zellstränge werden beobachtet; ihre Ordnung ist gestört.

e) Bindegewebe des Infundibulum. (Abb. 7).

In diesem Teil setzt sich der Trichterstiel auf dem Hypothalamus an. Amerikanische Forscher nennen diesen Abschnitt „median eminence“. Auch wird in diesem Teil der „proximal capillary plexus“ solchen Forschern beobachtet. Die von der Endanschwellung eindringende Gefäße, die mit dem Trichterstiel verbundenen Gefäße und die aus der Bindegewebe-Gefäßzone eindringende Gefäße, alle diese Gefäße sammeln sich hier und bilden den „plexus“ des Sinusoid-Gitterfaser-Systems. Doch dieses eigentümliche System tritt gar nicht in das Gebiet des Nucl. infundibularis (Nucl. arcuatus) ein; in dem die Vorderwand des Recessus infundibuli bildenden Teile, dringt dieses System auch nicht in Regio oralis tuberis ein, und ebenfalls verbindet es sich nicht mit dem Kapillarplexus des Nucl. supraopticus. Auch caudalwärts dringt es keineswegs in Pars caudalis tuberis ein. Stattdessen erreicht das Gitterfasernetz sehr wohl subependymal den in das Infundibulum von hinten oben nach vorn unten eindringenden Recessus infundibuli, oder er tritt deutlich in die intraependymale Schicht ein. Dieses Sinusoid-Gitterfasersystem konzentriert sich in Radix infundibuli, vereinigt sich und läuft außerhalb des Hirns hinaus. (Abb. 8). Deshalb ist die Bindegewebe-Gefäßzone des Infundibulum sehr dick und reicht bis zu der halben Dicke des Nervengewebes, das den Boden des dritten Ventrikels bildet. Das Proximalende dieser Bindegewebe-Gefäßzone ist als klare Grenze erkannt. Es ist zugleich der Endpunkt der die Pars caudalis tuberis bedeckenden, äußeren Gliafaserschicht, und entspricht Sulcus infundibularis oder Sulcus tubero-infundibularis, die Christ und Spatz makroskopisch feststellten.

3. Bindegewebe des Tuber cinereum.

Wie in den anderen Teilen des Hypothalamus stellt auch in diesem Teile das Bindegewebe nichts anderes dar als den sogenannten Pialtrichter der Gefäßwand, der ins Gehirn eindringt; nur sehr wenig Gitterfasern werden im engen schlitzförmigen Virchow-Robin'schen Raum beobachtet.

Die Ausbreitung dieser Gitterfasern geschieht nicht so kubisch, breit und intervaskulär wie im Infundibulum, sondern nur perivaskulär.

Das Proximalende der Bindegewebe-Gefäßzone ist, wie oben erwähnt, stark verdickt. Am Übergangsort in die Pia mater, die Tuber cinereum bedeckt, ist sie noch dicker als die gewöhnliche Pia mater. Doch dauert dies nur bis zu dem Graben, den Pars

caudalis tuberis und Corpus mamillare bilden. Die Pia mater der Oberfläche des Corpus mamillare stellt doch das eigentliche dünne Pialgewebe dar.

Obige Befunde werden im folgenden Schema zur Darstellung gebracht und der Christ'schen Nomenklatur gegenübergestellt. (Abb. 9).

Diskussion

Wenn man nun diese Befunde mit den vielen vorhergewonnenen Resultaten vergleicht, erkennt man, daß es nur wenig ist, was neu an Vorderlappen und Hinterlappen entdeckt wurde und was dem umfassenden Befund zuzusetzen ist, den Romeis (1940) schon im Möllendorffschen Handbuch veröffentlichte. Zu den 2 Typen der Gitterfaseranordnung im Hinterlappen, die Romeis unterschied, füge ich nur noch Typ III, bei dem die Gitterfasern gerade, parallel zur Kapsel verlaufen.

Es ist bereits lange bekannt, daß das Nervenbündel im Trichterstiel, vom Gefäß selbst etwas entfernt und diese rund umfassend, verläuft, weshalb dieser Teil bei Imprägnation der Nervenfasern stets hell bleibt; Greving nennt diesen hellen Teil die Insel (Infundibularinsel) und vermutet, daß sie im Zentrum aus Zellen und Blutkapillaren bestehe und wohl eine endokrine Funktion ausübe. Als Romeis die Bodiansche Imprägnationsmethode verwandte und eine Nachfärbung mit Säurefuchsin-Phosphormolybdänsäure-Anilinblau vornahm, um diese Insel zu untersuchen, beobachtete er, daß ein Mantel von Pituizytenfasern das Gefäß mitsamt den Gitterfasern seiner Umgebung bedeckte. Da Drüsenzellen fehlten, widersprach er der Greving'schen Meinung, nach welcher die Insel eine endokrine Funktion habe. Romeis'sche Ansicht dürfte richtig sein, aber die Anzahl der von Anilinblau gefärbten Gitterfasern ist so gering seinem Mikrophotogramm nach, daß sein Befund nicht die von Greving aufgezeigte, große Insel erklärt. Bei meinen Schnittpräparaten wird es deutlich, daß gerade die die Sinuskapillaren umgebenden, sehr zahlreichen Gitterfasern das Wesen der Infundibularinsel sind. Um dies zu beweisen, muss man aufjedem Fall die Gitterfaser-Imprägnierungsmethode verwenden.

Nach den Beschreibungen von Kiyono (1926), Cushing (1929), Popa und Fielding (1930), Popa (1934), Romeis (1940) usw. werden die Ependymzellen des Recessus infundibuli stellenweise abgeschält oder fehlen überhaupt. Bei meinen Präparaten beobachtete ich solch einen Teil, den ich nicht für ein künstliches Erzeugnis halten konnte.

Romeis meinte, daß wohl irgendein Fasergewebe diesen Teil füllen dürfte, aber um was für Fasern es sich hierbei handeln könnte, sagte er nicht.

Bei meinen Präparaten verlaufen die vielen vom Gitterfasernetz umfangenen Sinuskapillaren unter dem Subependym parallel, aber in der Stelle ohne Ependym wird das Sinusoid-Gitterfaser-System nicht immer beobachtet.

Früher studierte Kylin (1935) das Hypothalamus-Hypophysen-System, um den Übergang des Vorderlappenhormons in den Liquor cerebrospinalis des dritten Ventrikels zu erklären. Er berichtete, daß in dem System ein von Ependym oder ähnlichen Zellen bedeckter Gang beobachtet wird, der vom Recessus infundibuli des Hypothalamus aus den Vorderlappen erreicht. Es sei dies der „Ductus hypophyseocerebralis“. Ich vermöchte jedoch in keinem Präparat einen solchen Gang zu finden. Ich versuchte es mit einer Tuscheinjektion in den dritten Ventrikel, aber ich konnte keinen Gang in der Schnittfläche entdecken.

Das charakteristische Bindegewebe des Sinusoid-Gitterfaser-Systems entspricht den „capillary loops“ nach Green und Harris, oder den „Spezialgefäßen“ nach Nowakowski (1951). Bei der Katze berichtete Nowakowski über solche Spezialgefäße und ein sie umgebendes argyrophiles Bindegewebe, d. h. er bemerkte meine Gitterfasern. Da aber bei der Katze die Spezialgefäße selbst kaum eine Querverbindung haben, wie ich und Nakagawa (1952) feststellten, läßt es sich nur schwer beurteilen, ob die Gitterfasern hier die deutliche intervaskuläre Ausbreitung wie beim Menschen haben. Darum berichtete er nur über das deutlich erkennbare Netz des Mantelplexus. Die Grenzschicht an dem nervösen Zentralorgan betreffend, veröffentlichte Max Clara (1951) in *Tuber cinereum* ein gleiches Resultat wie ich.

Wie oben beschrieben hielten Spatz und seine Schüler den makroskopischen Sulcus infundibularis für die deutliche Grenze zwischen *Tuber cinereum* und Infundibulum. Auch behaupteten sie, daß das Infundibulum gar keine äußere Gliafaserdeckschicht habe. Dann schieden sie streng *Tuber cinereum* vom Infundibulum. Diese Ansicht stimmt völlig damit überein, dass englische und amerikanische Forscher bei Betrachtung des Gefäßsystems eine „median eminence“ zu unterscheiden versuchen. Im Infundibulum zeigen von mir beschriebene Gitterfasern eine deutliche Ausbreitung. Im *Radix infundibuli*, d. h. an der Grenze zwischen *Pars caudalis tuberis* und Infundibulum, laufen die Gitterfasernetze deutlich gruppenweise aus dem Gehirn heraus. Wenn es sich um das Bindegewebe handelt, darf die Grenze zwischen

Tuber cinereum und Infundibulum nicht so unbestimmt wie gewöhnlich behandelt werden.

Caselli (1900), Thom (1901), Creutzfeld (1908), Edinger (1911) usw. bemerkten schon früher das Vorhandensein von Lymphgefäßen in der Hypophyse. Dies gilt aber nur für die Lymphspalte, heute meint man vielmehr, daß der Hypophyse das Lymphgefäß fehle, wie Thaon (1907), Trautmann (1909), Lucen, Pariost und Richard (1934) usw. behaupteten. Romeis (1940) berichtete ebenfalls, daß er nur bei einem einzigen von zahlreichen Fällen einen sicher Lymphgefäß-ähnlichen Kanal in der Zwischenzone feststellte, daß jedoch im allgemeinen kein Lymphgefäß in der Hypophyse vorhanden sei.

Als ferner Edinger (1911) Berlinerblau in den Vorderlappen injizierte, erschien dieses durch die Gewebslücke des Vorderlappens in dem Boden des Zwischenhirns. Uchimura (1936), Katsunuma (1936) usw. konstatierten ebenfalls, daß Tuscheartikel durch den Vorderlappen im Zwischenhirnboden erschienen. Herring (1908), Collin (1936), Cushing usw. glaubten auch, daß Kolloid der Hypophyse durch das Infundibulum im Zwischenhirnboden und im dritten Ventrikel erscheine. Als Durchgang legten sie nicht viel Gewicht auf die Gefäße, sondern auf die Gewebslücke. Einige Forscher machten nicht nur solche morphologische, sondern auch biologische Untersuchungen und beobachtete, daß Hypophysenhormon im Liquor cerebrospinalis des dritten Ventrikels erscheint (Dixon 1923, Trendelenburg 1930, Kylin 1935 sowie Araki 1948). Das Gefäß-System allein betreffende Studien genügen nicht, den humoralen Weg zu erklären.

Wie in der Einleitung erwähnt, erklärten Kihara und seine Schüler seit mehreren Jahren, daß ein extravaskulärer Saftstrom im Gitterfasernetz fließt, wobei sie uns neu auf das Gitterfasergewebe als extravaskuläres Saftbahnsystem hinwiesen. Sakaida (1947) aus der Schule Kiharas bewies, daß die Gitterfasern der Hypophyse auch ihre Aufgabe als ein Glied des Saftbahnsystems erfüllen. Doch berichtete sie nichts vom Hypophysenstiel und Zwischenhirn. Demnach ist zu vermuten, daß das von mir beschriebene, zahlreiche Gitterfasern aufweisende Netzwerk, welches vom Hinterlappen durch den Hypophysenstiel Radix infundibuli erreicht und nicht nur perivaskuläre sondern auch intervaskuläre Ausbreitung besitzt, auch funktionell eine große Aufgabe als Saftbahn zu erfüllen hat. Doch ist im physiologischen Zustände die Richtung des Saftstroms noch nicht bestimmbar.

Andererseits findet man neue Forschungen betreffs des Gefäßsystems, die das Zwischenhirn und die Hypophyse in Betracht ziehen. Benda

(1927), Cameron (1929), Pietsch (1930) usw. richteten ihr Augenmerk darauf, daß das Gefäß des Vorderlappens durch Pars tuberalis (d. h. Pars infundibularis nach Christ) mit dem Hypothalamus verbunden ist. Cameron nahm an, daß Pars tuberalis der Weg des Sekrets des sogenannten Zwischenlappen-Tuberalisapparats (nach Cameron) zum Zwischenhirnboden sei. Pietsch vermutete, daß die Blutkapillaren und die Gewebslücke in Pars tuberalis das Vorderlappensekret zum Hypothalamus trügen. Popa und Fielding (1930) schrieben über das an der Oberfläche des Hypophysenstiels verlaufende „portal vessel“, d. h. über das an beiden Enden Blutkapillaren besitzende, neue Gefäßsystem. Sie glaubten, daß gerade dieses System den das Hypophysenhormon zum Zwischenhirn tragenden Weg darstelle. Nach Collinscher Meinung sind für das venöse Blut der Hypophyse 2 Wege da: der eine führt durch Sinus cavernosus in den allgemeinen Kreislauf hinein, den anderen bildet hauptsächlich das an der Vorderwand des Recessus infundibuli befindliche Gefäßnetz, d. h. das sogenannte hypophysäre Pfortadersystem (nach Collin). Dieser Weg reiche bis zum Nukleus des Tuber cinereum. Die Popaschen und Fieldingschen Forschungen erfuhren durch Aveta und Penta (1935), Wislocki und King (1936), Green (1947), Mc Cornell (1953) usw. allmählich viele Nachbesserungen. Je weiter jedoch die Forschung des Gefäßsystems fortschreitet, desto deutlicher wird es, daß Pars infundibularis den wichtigsten humoralen Weg des Hypothalamus-Hypophysen-Systems darstellt.

In einige Tiere, z. B. Meerschweinchen (Drage, 1944), Walfische (Fuse 1940, Waslocki und Geiling 1936), Elefanten (Wislocki, 1930) sowie auch Hunde, Katzen usw. trennt sich der Vorderlappen von der Neurohypophyse, ohne mit dieser zu verwachsen, und das starke, bindegewebige Septum oder die Hypophysenhöhle trennt die beiden Gebilde völlig (Geiling, Vos und Oldham 1940). Es scheint, daß sich hier das Hindernis zeigt, welches es anatomisch schwer macht, das Zwischenhirn und die Hypophyse, besonders den Vorderlappen, als ein System zu erfassen. Harris (1947) berichtet jedoch, daß auch bei diesen Tieren Pars infundibularis durch das Gefäß, d. h. durch das „hypophyseal portalsystem“ mit der „median eminence“ des Tuber cinereum verbunden sei. Spatz und seine Schüler berichten ebenfalls, daß eine Kontaktfläche zwischen Pars infundibularis und Infundibulum beobachtet werde.

Wislocki und King (1936), Wislocki (1938), Rioch, Wislocki und O'Leary (1940), Green und Harris (1947), Harris (1947, 1948) Green (1948, 1951) usw. verbesserten die Untersuchung über das Pfor-

tadersystem von Popa und Fielding: die Äste der A. carotis interna und A. communicans dringen in die „Endanschwellung“ und weiter in das Tuber cinereum, besonders in die sogenannten „median eminence“, in welcher sie den „proximal capillary plexus“ bilden, ein (beim Menschen ist dies teilweise im Trichterstiel), verlaufen nach unten in der Pars infundibularis, dringen in den Hypophysenvorderlappen ein und lassen wieder den „distal capillary plexus“ entstehen. Nach ihrer Ansicht, gehört die „median eminence“ eher zur Hypophyse, indem man ein solches Gefäßsystem in Betracht zieht. Tatsächlich wurden von O'Conner (1947), Green (1948) usw. die das Hinterlappenhormon nicht sezernierenden Pituizyten in „median eminence“ festgestellt. In inniger Beziehung ferner mit den Studien von Markee und Hinsey (1933), Books und Gersch (1938), Taubenhaus und Soskin (1941), Harris (1948) usw. entstand die Auffassung von der sogenannten „neurovascular transmission“. Hiernach wird irgendeine chemische Substanz, vielleicht Adrenalin, in den Sinuskapillaren der median eminence aufgenommen und der „chemical mediator“ reizt durch das hypophysäre Pfortadersystem den Vorderlappen.

Sakanaka (1939) teilte das Zwischenhirn-Hypophysen-System in zwei Teile ein. Ich aber teile es in 3 Teile ein; ein vaskuläres Zwischenhirn-Vorderlappen-System bezüglich des Gefäßsystems und ein nervöses Zwischenhirn-Hinterlappen-System bezüglich des Nervensystems, weiter noch ein bindegewebiges Zwischenhirn-Hypophysen-System bezüglich des Gitterfasergewebes. Besonders die Gitterfasern wünsche ich betonen, weil das Gitterfasernetzwerk nicht nur den Hinterlappen, sondern auch den Vorderlappen mit dem Infundibulum verbindet. Nach Popa besitzt das Gefäß des Tuber cinereum eine besondere Gliascheide, wogegen Wislocki diese nur als eine Sammlung von Gefäßästchen verstehen will. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um nichts anderes als um das das Gefäß des Infundibulum umschlingende Gitterfasernetz.

E. Scharrer, Roussy et Mosinger usw. beachteten vor allem den drüsenzellenartigen Befund, den die spezifischen Nuclei des Hypothalamus, d. h. die Nervenzellen des Nucl. supraopticus und Nucl. paraventricularis, zeigten, und stellten demnach ihre Neurosekretionstheorie (Neuricrine, Zwischenhirndrüse) auf. Neuerdings aber nach dem Bericht von Bargmann und seinen Schülern (1949) fließen die nach der Gomorischen (1941) Chromalaun-Hämatoxylin-Phloxin-Methode gefärbten Sekretgranula entlang der Zellfortsätze in die Hypophyse ab. Ich konnte bei diesen Nuclei kein spezielles Netzwerk aus Gitterfasern beobachten. Ich denke, man muß erst noch weiter untersuchen, ob die

entlang des Zellfortsatzes absteigenden Sekretgranula bis zum Ende sich diesen Fortsatz entlang bewegen, oder ob sie unterwegs in das Gitterfasernetz eindringen.

Wie gesagt, sind es viele, die sich mit dem Hypothalamus-Hypophysen-System beschäftigen. Ihre Berichte sind sehr verschieden. Wenngleich auch die Fortschritte in der Forschung unverkennbar sind, so bleiben doch noch viele Fragen, die auf Antwort warten. Ich beschäftigte mich mit einem Spezialteil, mit dem verhältnismäßig vernachlässigten Bindegewebe.

Zusammenfassung

1) Beim menschlichen Hypothalamus-Hypophysen-System kann stets kollagenes Bindegewebe in der intrasellären Hypophyse in Form von mittleren und seitlichen Bindegewebe-Gefäßsträngen beobachtet werden. Auch das Vorhandensein von kollagenem Bindegewebe im interstitiellem Bindegewebe haben wir im Vorderlappen und in der benachbarten Pars infundibularis festgestellt. Hierbei zeigt sich natürlich ein individuelles Variieren je nach dem Lebensalter usw.

2) In Vorderlappen und Pars infundibularis werden die Zellstränge durch Gitterfasern getrennt. Man kann bei dem Netzwerk folgende 3 Gruppen unterscheiden.

- a) Das Netz, das die Basalmembran der Zellstränge bildet.
- b) Das Netz, das die Grundhäutchen der Sinuskapillaren bildet.
- c) Das Netz, das sich in der Lücken der beiden Netzwerke befindet.

3) Bei dem Gitterfasernetz des Hinterlappens kann man folgende 3 Typen unterscheiden.

- a) Typ. I: Die Gitterfasern sind sehr gestreckt, sie bilden miteinander ein Netzwerk und befinden sich im Parenchym.
- b) Typ. II: Sie sind kraus, verhältnismäßig kurz, und besitzen dicke und gekrümmte Endigungen.
- c) Typ. III: Die Gitterfasern verlaufen parallel und gerade am Rande und zeigen nur geringe Neigung zur Netzbildung.

4) Im Trichterstiel werden charakteristische Sinusgefäße beobachtet, die sich mit den Gefäßen des hypophysären Pfortadersystems in der Pars infundibularis und den des Hinterlappens verbinden und die von einem reichlichen Gitterfasernetzwerk, das sich nicht nur perivaskulär sondern auch intervaskulär findet, umgeben sind. Man kann ein solches Netzwerk als „Sinusoid-Gitterfaser-System“ bezeichnen.

5) Das Sinusoid-Gitterfaser-System erstreckt sich ins Infundibulum, verbindet sich mit der von der Endanschwellung hineingedrungenen Gefäßgruppe zusammen, umgibt den Recessus infundibuli und erreicht schließlich die Radix infundibuli, hinten, wo die äußere Gliafaserdeckschicht endet. Inzwischen vereinigt sich dieses System mit der aus der Bindegewebe-Gefäßzone (Gefäßnervenzone oder neurovascular zone) herausdringenden Gefäßgruppe.

Andererseits erreicht dieses System die subependymale oder intraependymale Schicht.

6) Das Sinusoid-Gitterfaser-System zieht weder in das Gebiet des Nucleus infundibularis noch in die Pars caudalis tuberis hinein, sondern tritt ausnahmslos an der Radix infundibuli aus dem Gehirn heraus. Infolgedessen ist die Bindegewebe-Gefäßzone dieses Teils bemerkenswert verdickt. Die die Pars caudalis tuberis bedeckende Pia mater ist ebenfalls ziemlich verdickt, an der Oberfläche des Corpus mamillare ist sie jedoch wieder wie gewöhnlich.

7) Die Gitterfasern der Gefäße im Hypothalamus sind genau so wie bei den Gefäßen des gewöhnlichen Zentralnervensystems ausgebildet. Nur wenig ausgebreitetes perivaskuläres Netz überbrückt die schmalen, schlitzförmigen sogenannten Virchow-Robinschen Räume. Hier ist kein Sinusoid-Gitterfasersystem vorhanden.

8) Das Sinusoid-Gitterfaser-System bildet wahrscheinlich einen humoralen Weg, indem es eine Gewebslücke des Hypothalamus-Hypophysen-Systems sichern und trägt vermutlich auch zur Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen Adenohypophyse und Neurohypophyse bei.

Schluß

Ich erforschte das ganze argyrophile Bindegewebe im Hypothalamus-Hypophysen-System als ein Teilsystem desselben.

An der extrasellären Hypophyse werden Sinusoid-Gitterfaser-Systeme beobachtet. Dieses System besteht aus vielen sinuösen Gefäßen und sie gemeinsam umgebenden Gitterfasernetz. Alle diese und andere Gitterfasergruppen bilden zusammen ein extravaskuläres Saftbahnsystem, das Hypothalamus, Vorderlappen und Hinterlappen miteinander verbindet. Bei dem Sinusoid-Gitterfaser-System handelt es sich um eine sehr spezifischen Virchow-Robinschen Räume.

Literatur

- 1) Araki, C. (1948) Gegenwertige Zustände d. Untersuchung über die innere Sekretion der Hypophyse. (Jap.) Tokyo.
- 2) Bargmann, W. (1949) Z. Zellforsch., 34, 610.
- 3) Benda, C. (1927) Zbl. Path., 40, 238.
- 4) Bodian, D. (1937) Anat. Rec., 69, 153.
- 5) Books, C. Mc. & J. Gersch (1938) Anat. Rec., 70, 10.
- 6) Cameron, G. R. (1929) Veröff. Kriegs- u. Konstit. Path., zit. nach Romeis.
- 7) Caselli, A. (1900) Reggio Emilia, zit. nach. Romeis.
- 8) Christ, J. (1951) Dtsch. Z. Nerven., 165, 340.
- 9) Collin, R. (1935) C. R. Soc. Biol., 118, 1560.
- 10) Collin, R. (1936) Scientia (Milano), 59, 20. zit. nach Romeis.
- 11) Creutsenfelt, H. G. (1908) Jb. Hamburg Staatskrank., 13, 273. zit. nach Romeis.
- 12) Cushing, H. (1925) Lancet, 209, 851 and 899.
- 13) Cushing, H. (1933) Amer. J. Path., 9, 539.
- 14) Drager, G. A. (1944) Anat. Rec., 88, 235.
- 15) Edinger, L. (1911) Arch. mikr. Anat. 78, 496.
- 16) Fuse, G. (1939) Arb. a. d. Anat. Inst. Sendai, Heft. 22, 137.
- 17) Fuse, G. (1940) Arb. a. d. Anat. Inst. Sendai, Heft. 23, 296.
- 18) Geiling, E. M. K., B. J. Vos (jr) & F. K. Oldham (1940) Endocrinol. 27, 369.
- 19) Gomori, G. (1937) Amer. J. Path., 13, 993.
- 20) Gomori, G. (1941) Amer. J. Path., 17, 395.
- 21) Green, J. D. (1948) Anat. Rec., 100, 273.
- 22) Green, J. D. (1951) Anat. Rec., 109, 99.
- 23) Green, J. D. & G. W. Harris (1947) J. Physiol., 108, 359.
- 24) Greving, R. (1926a) Dtsch. Z. Nerven., 83, 179.
- 25) Greving, R. (1926b) Z. Neur., 104, 466.
- 26) Greving, R. (1928) Klin. Wschr., 734.
- 27) Greving, R. (1935) Bumke u. Foerster's Handb. d. Nenrol., 1, 874.
- 28) Harris, G. W. (1947) Nature, 159, 874.
- 29) Harris, G. W. (1948) Physiol. Rev., 28, 139.
- 30) Harris, G. W. (1949) J. Endocrinol., 6, 17.
- 31) Harris, G. W. & R. T. Johnson (1950) Nature, 165, 819.
- 32) Herring, P. T. (1908) Q. J. exp. Physiol., 1, 121, 161, 186, 261, u. 281.
- 33) Hinsey, J. C. & J. E. Markee (1933) Proc. Soc. Exp. Biol. & Med., 31, 270.
- 34) Ingram, W. R. (1940) Res. publ. Ass. nerv. ment. Dis., 20, 195. zit. nach Christ.
- 35) Katsunuma, S. (1936a) Psych. et neurol. (jap.), 40, 733.
- 36) Katsunuma, S. (1936b) Diagnostik u. Therapie (jap.), 23, 17.
- 37) Kihara, T. (1950) Sympos. haematol. (jap.), 3, 118.
- 38) Kiyono, H. (1926) Virchow's Arch., 259, 388.
- 39) Kylin, E. (1935a) Acta med. scand., 85, 457.
- 40) Kylin, E. (1936b) Klin. Wschr., 347.
- 41) Le Gros Clark, W. E. (1938) The hypothalamus, London, Oliver & Boyd.
- 42) Lucien, M., J. Pariost et G. Richard (1934) Traite d'endocrinologie L'hypophyse. Paris: G. Doin. zit nach Romeis.
- 43) Max Clara (1951) Dtsch. Z. Nerven., 166, 166.
- 44) Mc Cornell, E. M. (1953) Anat. Rec., 115, 175.
- 45) Nowakowski, H. (1951) Dtsch. Z. Nerven., 165, 261.

- 46) O'Conner, W. J. (1947) *Biol. Rev.*, 22, 30.
- 47) Pietsch, K. (1930) *Z. mikr. anat. Forsch.*, 22, 227.
- 48) Popa, Gr. T. (1934) Vol. jubil. Parhon. Inst. artegraf. "Brawo" Iasi. zit. nach Romeis.
- 49) Popa, Gr. T. & K. Fielding (1930a) *J. Anat. (Lond.)*, 65, 88.
- 50) Popa, Gr. T. & K. Fielding (1930b) *Lancet*, 219, 238.
- 51) Popa, Gr. T. & K. Fielding (1933) *J. Anat. (Lond.)*, 67, 227.
- 52) Rioch, D. M., G. B. Wislocki & J. L. O'Leary (1940) *Res. publ. Ass. nerv. ment. Dis.*, 20, 3. zit. nach Romeis.
- 53) Romeis, B. (1940) Möllendorff's Hb., Innere sek. Drüse II. Hypophyse.
- 54) Roussy, G. et M. Mosinger (1937) *Presse Med.*, 45, 433.
- 55) Sakaida, I. (1947) *Acta anat. nippon.*, 23, 45.
- 56) Sakanaka, T. (1939) *Psych. et neurol. (jap.)*, 43, 396 u. 563.
- 57) Sano, Y. (1952) *Arch. hist. jap.*, 3, 201.
- 58) Sano, Y. u. Y. Nakagawa (1952) *Acta anat. nippon*, 27, Suppl., 42.
- 59) Scharer, E. (1936) *Z. ges. Anat.*, 106, 169.
- 60) Spatz, H. (1951) *Acta Neuroveg.*, 3, 5.
- 61) Spatz, H., R. Diepen u. V. Gaupp (1948) *Dtsch. Z. Nervenhe.*, 159, 229. zit. nach Nowakowski.
- 62) Taubenhaus, M. & S. Soskin (1942) *J. Clin. Endocrinol.*, 2, 171.
- 63) Thom, W. (1901) *Arch. mikr. Anat.*, 57, 632.
- 64) Trautmann, A. (1909) *Arch. mikr. Anat.*, 74, 311.
- 65) Trendelenburg, P. (1930) *Klin. Wsch.*, 7, 1679.
- 66) Uchimura, H. (1936) *Psych. et neurol. (jap.)*, 40, 754.
- 67) Wislocki, G. B. (1937a) *Anat. Rec.*, 67, 273.
- 68) Wislocki, G. B. (1937b) *Anat. Rec.*, 69, 361.
- 69) Wislocki, G. B. (1937c) *Amer. J. Anat.*, 61, 95.
- 70) Wislocki, G. B. (1938a) *Anat. Rec.*, 70, 451.
- 71) Wislocki, G. B. (1938b) *Anat. Rec.*, 72, 137.
- 72) Wislocki, G. B. (1939) *Anat. Rec.*, 74, 321.
- 73) Wislocki, G. B. & L. S. King (1936) *Amer. J. Anat.*, 58, 421.
- 74) Wislocki, G. B. & E. M. K. Geiling (1936) *Anat. Rec.*, 66, 17.

Erklärung der Abbildungen

- Abb. 1. Gitterfasernetze im Hinterlappen. Abschnitt aus dem mittleren Drittel. Typ. I. Fixierung, Formol-Alkohol; Celloidin, 20 μ . imprägniert nach Bielschowsky-Maresch (Sano), Vergr. 1:550.
- Abb. 2. Gitterfasernetze im Hinterlappen. Abschnitt aus dem mittleren Drittel. Typ. II. Herkunft und Technik wie Abb. 1. Vergr. 1:140.
- Abb. 3. Gitterfasernetze im Hinterlappen. Abschnitt aus dem peripheren Teil. Typ. III. Herkunft und Technik wie Abb. 1. Vergr. 1:140.
- Abb. 4. Gitterfasernetze um eine Blutkapillare des Hinterlappens.
 1. Lichtung der längs angeschnittenen Blutkapillaren.
 2. Flachgetroffene Wandung der Kapillare mit querverlaufenden Fasernetzen.
 3. In das Parenchym eindringende Gitterfasern.
 Herkunft und Technik wie Abb. 1. Vergr. 1:550.
- Abb. 5. Horizontalschnitt durch Trichterstielfundament und anliegende Pars infundibularis.

E.G.—Abschnitt eines in den Hypophysenstiel eindringenden Blutgefässes mit begleitenden Gitterfasernetzen.

G.M.—Grenzmembran zwischen Pars infundibularis (Pars inf.) und Trichterstiel (Tst.).

Fix., Carnoy; Celloidin, 20 μ . Technik wie Abb. 1. Vergr. 1:325.

Abb. 6. Intervaskuläre Gitterfasernetze aus dem inneren Abschnitt des Horizontalschnitts durch den Trichterstiel.

Herkunft und Technik wie Abb. 5. Vergr. 1:550.

Abb. 7. Sinusoid-Gitterfaser-System im Infundibulum. Sagittalschnittserie. Herkunft und Technik wie Abb. 1. Vergr. 1:550.

Abb. 8. Medianer Sagittalschnitt durch das Grenzgebiet zwischen Radix infundibuli (Rad. inf.) und Pars caudalis tuberis (P.c.t.) P.m.=Pia mater. V.III=Ventriculus tertius. Herkunft und Technik wie Abb. 1. Vergr. 1:325.

Abb. 9. Schema eines paramedian gelegenen Sagittalschnittes durch das Tuber cinereum und die Hypophyse zur Verdeutlichung der Gitterfaserverbreitung.

..... =Äussere Gliafaserdeckschicht

=Gebiet des Nucl. infundibularis

C.m. =Corpus mamillare

Ch. =Chiasma fasc. opt.

D.S. =Diaphragma sellae

E.p.i. =Endanschwellung der Pars infundibularis

H.L. =Hinterlappen

Hst. =Hypophysenstiel

Inf. =Infundibulum

Pars inf.=Pars infundibularis

P.c.t. =Pars caudalis tuberis

P.o.t. =Pars oralis tuberis

R.i. =Recessus infundibuli

Rad. inf.=Radix infundibuli

Sulc. inf.=Sulcus infundibularis

Tst. =Trichterstiel

V.L. =Vorderlappen

Z.z. =Zwischenzone