広視野への注意の定位が脳活動に与える影響： 事象関連電位による研究

○原澤賢充・小峯一晃（非会員）

（NHK 放送技術研究所）

キーワード：視覚的注意，広視野，事象関連電位

Visual attention oriented toward very large visual field affected cortical activities: an ERP study

Masamitsu HARASAWA, Kazuteru KOMINE[#]

(Science and Technology Research Laboratories, Japan Broadcasting Corporation)

Key Words: Visual attention, very wide visual field, event-related potential

目 的

視覚的空間的注意の向けられる範囲についてはスポットライトのアナロジーを使ってこれまで多くの研究がなされてきた。しかしそのほとんどの扱う視野範囲は視角 20°~30°程度に過ぎない。現在の映像ディスプレイ環境が実現しうる 100°近い視野角について調べたものは見当たらない。本研究は、水平視野角 80°の画面に刺激を呈示し、これに注意を向けたときの脳活動を計測することで、広い視野範囲に注意を向けることで生じる視覚情報処理への影響について考察した。

方 法

水平画面角約 80°の広視野視覚刺激に対して探索課題を行い、そのときの脳活動を頭皮に設置した電極から記録した。**参加者**：健康な視力をもつ 5 人の成人が実験に参加した。**装置**：刺激は 4K プロジェクタから W4.3m×H2.4m のスクリーンに投影し 2.5m の視距離で観察した。脳活動は Polymate II を用いて頭皮上から記録した。**刺激**：画面中央の注視点を中心とする 6 本の仮想的な同心円上に配置された 66 本の線分によって構成された。線分の大きさは皮質拡大係数 (Rovamo & Virsu, 1979) に準拠して変化させた (Fig. 1)。同心円の半径は 1.6°~25.6°、線分長は 1.7°~13.4°とした。標的刺激以外の線分の方位はすべて同じとした。**手続き**：標的刺激の出現範囲について 3 つの条件を設けた。標的刺激は視野中心から 2, 4, もしくは 6 本の同心円上に出現することとし、これを小・中・大視野条件とした。試行開始時に出現範囲を示す手がかり刺激を 2 秒間呈示し、そのオンセットから 10 秒後に最初の課題刺激が呈示された。1 試行中に課題刺激は 6 枚呈示され (呈示時間 500 ミリ秒, SOA2 秒), 参加者は課題刺激が呈示されるたびに標的刺激の有無をボタン押しで回答した。視野条件間で難易度の差がないようにするため、予備実験を実施し、標的刺激と他の線分との方位差を参加者・条件ごとに調節した。視野が広い条件ではより大きな方位差を用いた。**測定**：事象関連電位は 0.05-30 Hz の帯域通過フィルタを使用し、両耳アーク接続を基準として Cz, Pz, P3, P4, T3, T4 より導出した。

結 果

課題成績は視野条件間で差がなかった ($F(2,8)=.03, p=.98$)。正答した刺激について課題刺激の呈示に同期した事象関連電位を算出し、270~320 ミリ秒の区間を加算平均し N2 成分として分析した。後頭部の N2 成分の振幅が注意を向けた視野の大きさによって減衰する傾向が見られた (測定部位と視野条件の交互作用: $F(10,40)=4.2, p=.0005$)。この傾向は特に Pz で顕著だった。標的刺激が出現しなかったとき (Fig. 2 下・破線) すなわち視野条件による刺激の差のない場合でも注意視野の大きさによって N2 成分が異なる傾向が見られた。

考 察

注意を向ける視野範囲の条件ごとに標的・妨害刺激間の方

位差を調整することで、条件間で課題難易度を均一にした状態で、注意視野の大きさを操作したところ、視野が大きくなるほど事象関連電位の N2 成分が減衰する傾向が示された。この傾向は標的刺激が出現しない条件でも見られたため、能動的な視覚的注意の定位によって生じたものと考えられる。後頭部で生じる N2 成分は視覚的注意の定位との関連が指摘されており (Folstein & Van Petten, 2008), 本研究の結果もこれと矛盾しない。注意範囲の広がりによる N2 成分の減衰が課題難易度にかかわらず生じたことは、広視野への空間的注意の定位によって注意に関連する認知情報処理が阻害される可能性を示唆していると考えられる。

Fig. 1. Task stimulus

Fig. 2. ERP waveforms and N2 amplitudes

引用文献

- Rovamo, J. & Virsu, V. (1979). An estimation and application of the human cortical magnification factor. *Experimental Brain Research*, **37**, 495-510.
- Folstein, J. R. & Van Petten, C. (2008). Influence of cognitive control and mismatch on the N2 component of the ERP: A review. *Psychophysiology*, **45**, 152-170.