高齢者の手指巧緻性と精神的健康度との関連

○水上喜美子¹・熊谷享子²・堅田明義³

(¹仁愛大学人間学部・²名古屋女子大学短期大学部・³中部学院大学人間福祉学部)

キーワード：高齢者，手指巧緻性，精神的健康度

The relationship between hand and finger dexterity and mental health in elderly dwellers

Kimiko MIZUKAMI¹, Takako KUMAGAI² and Akiyoshi KATADA³

(¹Jin-ai Univ., ²Nagoya women's Univ., ³Chubu Gakuin Univ.)

Key Words: elderly, dexterity, mental health

目 的

超高齢社会となった我が国では，健康寿命を延伸させ，生活機能の維持・向上といった高齢期の健康づくりに重点が置かれている。この健康寿命とは，健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間とされている（厚生労働白書，2014）。

高齢者が健康で自立した日常生活を営む上で手指の運動機能は食事や行為動作，書字などに影響を与える重要な要素であると指摘されている（Shiffman,1992）。坪井・門間・河野ら（2013）は，18～94歳の718名を対象にIPU巧緻動作検査と改定長谷川式簡易知能検査を実施し，手指巧緻動作の低下が認知機能の低下に大きく影響していることを明らかにした。さらに，認知症者においては，年齢との関連が弱くなること（坪井・林・大橋・目黒，2016）や，粗大動作よりも手指の課題遂行能力が低下することが報告されている（坂本・菊池・繁田，2006）。しかし，手指巧緻性が高齢者の健康観に影響しているのかについては検討されていない。

そこで，本研究では，介護予防通所施設に通う高齢者の手指巧緻性と認知機能や身体動作との関連を検討し，健康観に与える影響について明らかにすることを目的とした。

方 法

実験参加者 在宅で生活し，介護予防通所施設に自ら通所でき，脳梗塞などの既往歴のない高齢者29名を対象とした。男性8名，女性21名で，平均年齢は75.0±5.3歳（年齢範囲60-83歳）であった。

測定 身体動作の測定は，明治生命厚生事業団（2001）の生活体力評価を参考にa)起居能力，b)手指巧緻能力，c)身体作業能力，d)棒反応課題（敏捷性）を実施した。a)起居能力：仰向けになるように教示し，起きて立ち上がり，ボールに触れ，椅子に腰かけてから立ち上がり，両手でボールに触れるまでの時間を測定した。b)手指巧緻能力：48本のペグが差し込まれた上部のペグボードから両手で2本のペグを抜き取り，それを下部のボードに移動し終わるまでの所要時間を測定した。c)身体作業能力：ロープを床面につけながらまたぎ，身体の前につけてくる動作を3回連続して実施した。d)棒反応課題：リアクションBG（竹井機器工業製）が落ちてきた時に握った親指の再上端の値を記録した。7回測定し最高値と最低値を除いた5回の平均値を算出した。認知機能は，Mini Mental State Examination（MMSE：森・三谷・山鳥，1985）を用いて評価した。

調査 日常生活能力は，老研式活動能力指標（古谷野・柴田ら，1987）を，サポートは，ソーシャルサポート尺度（岩佐・権藤ら，2007）を，精神的健康度は，WHO精神的健康状態（WHO-5：岩佐・権藤ら，2007）を用いて調査した。

測定と調査の手続き 研究についての説明を行い，同意が得られた人を対象として実施した。また，対象者の負担を減らすために，数日かけて測定を行った。

結 果および考 察

高齢者の手指巧緻性と年齢・認知機能・身体動作との関連

まず，Figure1に巧緻性と年齢との散布図を示した。年齢との関連性は認められず（ $r=.35, n.s.$ ），所要時間40秒前後に分布が集中していた。次に，Figure2に巧緻性と認知機能の散布図を示した。認知機能との関連性は認められなかったが（ $r=-.27, n.s.$ ），認知機能と年齢との間には関係がみられた（ $r=-.52, p<.01$ ）。この結果から今回の対象者は加齢に伴い認知機能が低下していたといえる。さらに，巧緻性が身体動作（起居や身体作業能力）や敏捷性との関連性について検討した。この結果，巧緻性と身体動作との関連性は高かったが（起居： $r=.58, p<.01$ ；身体： $r=.64, p<.01$ ），敏捷性とは関連はみられなかった（ $r=.18, n.s.$ ）。

以上のことより，巧緻性は敏捷性との関連は弱く，起居や身体作業能力のような身体動作との関連が強いことが認められた。坪井・林ら（2016）も，認知症者では巧緻性と認知機能との関連がみられにくいことを報告しており，巧緻性が認知機能をスクリーニングする指標になりにくく，加齢の影響を受けにくい指標であると言える。

Figure1.巧緻性と年齢の散布図

Figure2.巧緻性とMMSEの散布図

高齢者の手指巧緻性と精神的健康度との関連

手指巧緻性と日常生活能力や精神的健康度などとの関係について検討した（Figure3参照）。この結果，巧緻性はソーシャルサポートとは関連がみられなかった（ $r=-.02, n.s.$ ）が，日常生活能力（ $r=-.43, p<.05$ ）や精神的健康度（ $r=-.45, p<.05$ ）の間には関係が認められた。つまり，巧緻性が維持されていた人は活動性も保たれており，健康度も高いことが示唆された。手先が自分の思うように使えなくなることは，日常生活で困難さを感じるだけでなく，健康観にも影響を与えることが明らかになった。

高齢者の巧緻性は，主観的な老いを感じる一側面を表しており，身体機能の衰えと認知機能の衰えを自覚していく過程とは異なることが予測される。

Figure3.巧緻性と健康度の散布図