●〈症例〉

月経による増悪を繰り返した腸管Behçet病に mesalazine が著効した1例

上平晶一 青柳有司 吉田見紀 小沢達雄

東京北社会保険病院／消化器科

〔Key Words〕腸管Behçet病, 月経

和文要旨

症例は27歳, 女性。1日数行の軟便と軽度の腹痛が出現し, 月経期には1日10行以上の水様便と絞られるような腹痛に増悪していた。大腸内視鏡にて回盲部に下掘れ潰瘍とアフタ様病変の多発を認め, 口腔内アフタ, 結節性紅斑, 外陰部潰瘍と合わせて, 不全型Behçet, 腸管型と診断した。mesalazine 1,500mg/日の投与にて, 消化器症状が著明に改善。これに伴い主症状も軽快した。内服は約4カ月で中止したが, 症状の再発は認めていない。

はじめに

原因不明の全身性炎症疾患であるBehçet病(以下, BD)の中, 消化管に病変を有する特殊型を腸管BDと呼んでいる。BDでは月経により皮膚症状や外陰部潰瘍などの主症状が増悪することが知られているが, 月経により消化器症状が増悪した腸管BDの報告例は認められず, 貴重な症例と考え報告する。

症 例

患者: 27歳, 女性。

家族歴: 特記事項なし。

既往歴: 15~16歳から生理痛が強く, 口内炎が頻繁に出現していた。

生活歴: 喫煙10本/日×6年, アルコール機会飲酒, 23歳時第一子出産。

現病歴: 2004年から生花店に勤務。店長に昇進し, 多忙となった2006年7月頃から絞られるような腹痛と下痢が出現した。月経期間中は早朝, 腹痛で覚醒することが多く, 1日10行以上の水様便が出現していたが, 非月経期の腹痛はしくしくする程度で, 下痢も1日数行の軟便であった。10月心窩部痛も出現したため, 当院内科外来を受診。上部消化管内視鏡にて幽門前底部にアフタ様病変の多発が認められ(Fig. 1), teprenone

Table 1 Laboratory data.

血球		生化学	
WBC	14,000/mm ³	TP	6.9g/dl
Lymph	12.1%	ALB	4.5g/dl
Mono	10.9%	AST	22IU/L
Neut	75.1%	ALT	13IU/L
RBC	422×10 ⁴ /mm ³	ALP	293IU/L
HB	12.9g/dl	γ-GTP	20IU/L
HT	37.70%	BUN	13mg/dl
PLT	24.4×10 ⁴ /mm ³	Cr	0.57mg/dl
尿		ESR	
タンパク	(-)	CRP	4.6mg/dl
トウ	(-)	抗核抗体	(-)
潜血	(-)	リウマトイド因子	(-)

と lactomin が処方された。心窩部痛は改善したが, 下腹部痛と下痢は持続した。11月下腹部痛を訴え, 婦人科を受診。月経前症候群と診断され, scopolamine butylbromide と loxoprofen が開始されたが症状不変のため, 消化器科に紹介された。12月の月経期には口腔に多発性アフタ潰瘍が, 小陰唇に有痛性潰瘍が出現し, 両下腿伸側にあった皮疹が硬結となり疼痛を伴うようになった。

現症: 37.2℃の微熱と口腔にアフタ潰瘍, 両下腿伸側に結節性紅斑様皮疹が認められた。右前腕正中部の静脈採血部位に発赤腫脹があり, 針反応陽性と考えられた。腹部は平坦・軟だが, 右下腹部中心に軽度の圧痛が認められた。虹彩や眼底に異常所見はなかった。

血液検査(Table 1): 軽度の炎症所見が認められたが, 抗核抗体やリウマトイド因子は陰性であった。

大腸内視鏡(Fig. 2): 回盲弁に凝血塊の付着した径15mm大の境界明瞭な下掘れ潰瘍が, 回腸末端部には多発性アフタ様病変が認められた。病理所見はリンパ球浸潤を主体とした非特異的炎症で, 血管炎や granuloma は認められなかった。

臨床経過: 口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍, 皮膚症状, 外陰部潰瘍の主症状三つと回盲部潰瘍の副症状一つで不完全型, 腸管BDと診断し, 回盲部潰瘍に対して mesalazine 1,500mg/日と Miya-BM 3g/日を開始した。徐々に下痢の性状と回数が改善し, 腹痛も軽減した。口腔アフタ潰瘍には dexamethasone, 下腿の結節性紅斑と陰部潰瘍には difluprednate 塗布を開始した。約1カ月で下腹部痛と下痢が消退し, 月経期の増悪もないことから, 2007年4月自己判断で内服を中止。消化器症状がないことから, その後も投薬は行っていない。6月大腸内視鏡で回盲部潰瘍の治癒とアフタ様病変の残存を確認した(Fig. 3)。消化器症状の軽快にともない, 白血球とCRPは正常化し, 下腿の皮疹と採血時の針反応, 陰部潰瘍も消失したが, 現在も口腔内アフタ性潰瘍は認めている。

Fig. 1 Endoscopic picture shows aphthoid erosions in the antrum.

Fig. 3 Colonoscopy shows aphthoid erosions of the ileum after 6 months.

考 察

厚生省特定疾患ベーチェット病調査班の臨床診断基準によるとBDは、口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍、皮膚症状、眼症状、外陰部潰瘍の四主症状と五つの副症状の組み合わせで、完全型、不全型、疑い、特殊型に分類され、さらに特殊型は腸管型、血管型、神経型に分けられる¹⁾。BDの経過中に何らかの消化器症状を呈することは少なくないが、回盲部潰瘍で代表される消化器病変を有し、腸管BDと診断されるものは数%にすぎない²⁾。

BDの増悪因子として、感染、気象条件、手術、外傷、月経、ストレスなどが知られているが、本例では仕事が非常に多忙となった時期に発症し、月経期間中に主症状と消化器症状が増悪しており、ストレスと月経が発症と増悪に関与しているものと推察された。BDでは、月経に伴い主症状が増悪することが知られているが、本例の如く下痢、腹痛といった消化器症状が月経に伴い増悪した報告例は本邦において検索しえた限り

Fig. 2 Colonoscopy shows an ulcer of the ileocecal valve.

では認められなかった(医学中央雑誌1983-2007年)。

腸管BDへの薬物治療としてはsteroidを中心にcolchicine, salazosulfapyridine, mesalazine, ciclosporin, azathioprineなどが投与される。本例では通常量のmesalazineで消化器症状が改善し、それに伴い皮膚症状も軽快した。

腸管BDでは消化管病変の炎症が限局性パターンをとるため、その活動性が白血球やCRPなどの増加として捉えにくいとされており³⁾、腹痛や下痢といった消化器症状の変化を見逃さないことが重要と考えられる。本例の腹痛は下腹部全体に出現し、月経期に増強するというものであった。痛みの性状や部位から回盲部潰瘍にともなう腹痛と月経痛の鑑別は困難であり、非月経期に下腹部痛や持続性の下痢が出現した場合はただちに大腸内視鏡を施行する予定である。

文 献

- 1) 厚生省特定疾患ベーチェット病調査班。ベーチェット病基準とその手びき。1987。
- 2) 三浦誠司, 小平 進, 三重野寛治, 他: 腸管ベーチェット病。別冊日本臨床「消化管症候群」, 401-404, 1994。
- 3) 星野恵津夫, 帯刀 誠, 大林隆晴, 他: 長期観察例からみた腸型Behçet病と単純性潰瘍の治療。胃と腸, 38: 183-191, 2003。

A case of intestinal Behçet disease worsened in menstruation and improved by mesalazine

Masakazu Kamihiro Yuji Aoyagi
Miki Yoshida Tatsuo Ozawa

Department of Gastroenterology, Tokyo-Kita Social Insurance Hospital.